

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Захворювання периферичного відділу нервової системи

Категорія: **Неврологія**

Кількість запитань: **169**

1. Згинально-ліктьовий рефлекс випадає при ураженні:

- A) Променевого нерва (nradialis)
- B) Ліктьового нерва (nlnaris)
- C) Серединного нерва (nmedianus)

*** D) М'язово-шкірного нерва (nmusculocutaneus)**

- E) Довгого грудного нерва (nthoracicus longus)

2. Передні гілки спинномозкових нервів утворюють такі сплетення, крім:

- A) Шийного
- B) Плечового

*** C) Сонячного**

- D) Поперекового
- E) Крижового
- F) Куприкового

3. Міжреберний нерв - це:

- A) Продовження задньої гілки спинномозкового нерва

*** B) Продовження передньої гілки спинномозкового нерва**

4. Зона автономної чутливості серединного нерва (nmedianus):

- A) Шкіра 1 пальця і долонної поверхні кінцевої фаланги мізинця

*** B) Шкіра долонної поверхні кінцевої фаланги 2 пальця**

5. При ураженні серединного нерва (nmedianus) виникають:

*** A) Порушення згинання та розгинання середніх і дистальних фаланг 2, 3 пальців**

*** B) Порушення згинання кінцевої фаланги 1 пальця, порушення протиставлення 1 пальця**

- C) Порушення приведення 1 пальця

6. Форма кисті при ураженні серединного нерва (nmedianus):

A) Кігтиста кисть

*** B) Мавпяча кисть**

7. Серединний нерв (nmedianus) забезпечує такі функції, крім:

*** A) Приведення 1 пальця**

B) Згинання, розгинання середніх та дистальних фаланг 2, 3 пальців

C) Згинання кінцевої фаланги 1 пальця

D) Протиставлення 1 пальця іншим пальцям

E) Пронація передпліччя

8. При ураженні серединного нерва (nmedianus) виникають:

*** A) Пекучий біль у руці, вегетативно-трофічні зміни кисті, порушення чутливості в зоні іннервації**

B) Випадання розгинально-ліктьового рефлексу

*** C) Периферичний параліч м'язів, що ним іннервуються**

9. Відведення руки до горизонтального рівня і вище забезпечують:

*** A) Пахвовий (naxillaris) і довгий грудний нерв (nthoracicus longus)**

B) М'язово-шкірний (nmusculocutaneus) і додатковий нерв (naccessorius)

10. М'язово-шкірний нерв (nmusculocutaneus) плеча іннервує:

*** A) Плечовий (mbrachialis), дзьобо-плечовий (mcoracobrachialis), двоголовий (mbiceps) м'язи плеча**

B) Дзьобо-плечовий (mcoracobrachialis), триголовий (mtriceps), плечовий (mbrachialis) м'язи

C) Двоголовий (mbiceps), триголовий (mtriceps), плечовий м'язи (mbrachialis)

11. М'язово-шкірний нерв (n musculocutaneus) утворюється з передніх гілок спинномозкових нервів:

- A) C8-Th1
- B) C4-C5
- * C) C5-C7**

12. До утворень периферичної нервової системи відносяться:

- * A) Передні та задні корінці, спинномозкові нерви, спинномозкові вузли**
- * B) Нервові сплетення**
- * C) Черепні нерви**
- * D) Вегетативні вузли**
- E) Зони Захар'їна Геда

13. Спинномозковий нерв утворюється з:

- A) Волокон заднього та переднього корінців білої сполучної гілки
- * B) Волокон переднього корінця, аферентних волокон спинномозкового вузла та вегетативних волокон**
- C) Волокон переднього корінця, еферентних волокон спинномозкового вузла та вегетативних волокон

14. Спинномозковий нерв ділиться на:

- * A) Задню, передню, менінгеальну та білу сполучну гілки**
- B) Задню, передню, менінгеальну, сіру сполучну гілки
- C) Задній та передній корінці, менінгеальну, білу сполучну гілки

15. Функція білої сполучної гілки спинномозкового нерва:

- * A) Вегетативна**
- B) Соматична

16. З яких гілок спинномозкового нерва утворюються сплетення?

- A) Задніх гілок
- * B) Передніх гілок**
- C) Сполучних гілок

17. Функція задніх гілок спинномозкових нервів:

- * A) Чутлива та рухова іннервація задньої поверхні тулуба**
- B) Утворення сплетень
- C) Утворення вузлів симпатичного відділу вегетативної нервової системи

18. Не утворюють сплетення:

- * A) Передні грудні гілки**
- B) Передні шийні гілки
- C) Передні поперекові гілки

19. Основні ознаки, що лежать в основі класифікації захворювань периферичної нервової системи, яка затверджена ВООЗ (1982):

- * A) Етіологічні**
- * B) Патоморфологічні**
- C) Топічні

20. Етіологічні чинники нейропатій:

- * A) Генетично зумовлені**
- B) Виключно набуті
- * C) Метаболічно-обмінні і токсичні**
- * D) Ішемічні**
- * E) Інфекційні**
- * F) Механічні**

21. Морфологічною основою ураження периферичних нервів є:

- * А) Валлерівське переродження**
- * В) Сегментарна демієлінізація**
- * С) Аксональна дегенерація**
- Д) Дендритна дегенерація

22. Класифікація нейропатій по клінічним проявам:

- * А) Змішані**
- * В) Рухові**
- * С) Вегетативні**
- * D) Чутливі**
- Е) Виключно рухові та чутливі

23. Основні клінічні ознаки полінейропатій проявляються наявністю:

- * А) Симетричного та дифузного ураження периферичного відділу нервової системи**
- В) Одночасного ураження декількох периферичних нервів

24. Які розлади можуть виникати при ураженні нерва кінцівки?

- * А) Рухові, вегетативні, чутливі**
- В) Вісцеральні, вегетативні, чутливі
- С) Поліневритичні, рефлексорні

25. У фазі випадіння функції рухових волокон нерва можуть виникати:

- А) Атонія, атрофія, гіперрефлексія, реакція переродження
- В) Параліч, атонія, атрофія, реакція переродження, міастенічний синдром
- * С) Параліч, атонія, атрофія, арефлексія, реакція переродження**

26. У фазі подразнення функції рухових волокон нерва можуть виникати:

*** А) М'язова контрактура, фасцикулярні посмикування**

В) Парез, фібрилярні посмикування

С) Міоклонічний гіперкінез, м'язова контрактура

27. У фазі подразнення функції чутливих волокон нерва можуть виникати:

*** А) Біль, парестезії, гіперестезія в зоні іннервації**

В) Анестезія в автономній зоні, біль при пальпації нерва

С) Гіперпатія, синдром Шарко

28. У фазі випадіння функції чутливих волокон нерва можуть виникати:

А) Парестезія, гіперестезія в зоні іннервації

*** В) Анестезія в автономній зоні, гіперпатія в зоні іннервації**

С) Біль, парестезії, дисоційоване порушення чутливості в зоні іннервації

29. Вегетативні розлади, які виникають при ураженні нерва або сплетення:

*** А) Трофічні, секреторні, вазомоторні порушення**

В) Вазомоторні порушення, гіпертріхоз

С) Синдром вегетативно-судинної дистонії, синдром Рейно

30. Вазомоторні розлади, які не є характерними для ураження нерва або сплетення:

А) Позитивний симптом "білої плями"

*** В) Відсутність пульсу на дистальних судинах**

С) Ціаноз у зоні іннервації

Д) Гіперемія в зоні іннервації

Е) Блідість у зоні іннервації

Ф) Зміна температури шкіри в зоні іннервації

31. Секреторні зміни, які виникають при ураженні нерва або сплетення:

- * А) Ангідроз або гіпергідроз у зоні іннервації**
- В) Сальність шкіри та гіпертрихоз у зоні іннервації

32. Трофічні розлади, які виникають при ураженні нерва або сплетення:

- * А) Гіпертрихоз та гіперкератоз**
- * В) Атрофія шкіри**
- * С) Трофічні виразки**
- * D) Остеопороз кісток**
- Е) Синдром Рейно

33. Шийне сплетення утворюється:

- А) Задніми гілками C1-C4 спинномозкових нервів
- * В) Передніми гілками C1-C4 спинномозкових нервів**
- С) Передніми гілками C5-Th1 спинномозкових нервів

34. Пальпація шийного сплетення здійснюється:

- * А) По задньому краю середини груднино-ключично-соскоподібного м'яза**
- В) По передньому краю середини груднино-ключично-соскоподібного м'яза
- С) Над ключицею

35. Нерви шийного сплетення іннервують:

- * А) Глибокі м'язи шиї, груднино-ключично-соскоподібний та трапецієподібний м'язи, діафрагму**
- В) Задні м'язи шиї, груднино-ключично-соскоподібний та трапецієподібний м'язи, передній зубцюватий м'яз

36. М'язи, що піднімають надпліччя іннервуються:

- * А) Гілками шийного сплетення**
- В) Додатковим нервом (naccessorius) та довгим грудним нервом (nthoracicus longus)
- С) Тильним нервом лопатки (ndorsalis scapulae)

37. Найдовший нерв, що формується із шийного сплетення:

*** А) Діафрагмальний (nphrenicus)**

В) Довгий грудний нерв (nthoracicus longus)

38. Діафрагмальний нерв (nphrenicus) іннервує:

*** А) Перикард, плевру, діафрагму, частково очеревину**

В) Перикард, стравохід, печінку, частково очеревину

С) Селезінку, діафрагму, плевру, перикард

39. До симптомів випадіння функції діафрагмального нерва (nphrenicus) відносяться:

А) Порушення перистальтики, порушення дихання, ікання

*** В) Високе стояння купола діафрагми, порушення дихання, утруднення при кашлі**

С) Низьке стояння купола діафрагми, порушення дихання, утруднення при кашлі

40. До симптомів подразнення діафрагмального нерва (nphrenicus) відносяться:

*** А) Ікання, задишка, біль у ділянці шиї та в грудній клітині**

В) Біль у ділянці серця, високе стояння купола діафрагми

41. До чутливих розладів при ураженні шийного сплетення відносяться:

А) Біль та гіпестезія поверхневих видів чутливості в задньолатеральній ділянці плеча і шиї, скроневій ділянці, навколоушній частині лица

*** В) Біль та гіпестезія поверхневих видів чутливості в латеральній ділянці шиї, в заушній ділянці та в частині вушної раковини, в навколоключичній ділянці**

42. Із задніх гілок шийних спинномозкових нервів утворені:

*** А) Підпотиличний (nsuboccipitalis), великий потиличний нерви (noccipitalis major)**

В) Малий потиличний (noccipitalis minor), діафрагмальний нерви (nphrenicus)

43. При двобічному ураженні шийного сплетення:

*** А) Голова схиляється вперед**

В) Голова схиляється назад

44. В утворенні плечового сплетення беруть участь:

А) Задні гілки C5-Th1 спинномозкових нервів

*** В) Передні гілки C5-Th1 спинномозкових нервів**

С) Задні гілки C4-Th2 спинномозкових нервів

45. Первинні пучки плечового сплетення утворені із спинномозкових нервів:

*** А) Верхній - з C5-C6, середній - з C7, нижній - із C8-Th1**

В) Верхній - з C5-C7, середній - з C8, нижній - із C8-Th1

С) Верхній - з C4-C5, середній - з C6, нижній - із C7-Th1

46. Первинні пучки плечового сплетення проходять:

А) Між груднино-ключично-соскоподібним та переднім драбинчастим м'язами (mscalenus anterior)

*** В) Між передніми і середніми драбинчастими м'язами (mmscalenus anterior et medialis)**

47. Первинні пучки плечового сплетення діляться на гілки:

*** А) Під ключицею**

В) Над ключицею

48. Первинні пучки плечового сплетення діляться на:

*** А) Передню і задню гілки**

В) Зовнішню і внутрішню гілки

49. Вторинні пучки плечового сплетення розташовуються навколо:

*** А) Підкрильцевої артерії (aaxillaris)**

В) Підключичної артерії (asubclavia)

50. Вегетативні волокна, що входять у плечове сплетення:

А) Білі сполучні волокна

*** В) Сірі сполучні волокна**

51. Плечове сплетення ділиться на:

А) Надлопаткову і підлопаткову частину

*** В) Надключичну і підключичну частину**

52. Короткі гілки плечового сплетення відходять від:

*** А) Надключичної частини**

В) Підключичної частини

53. Короткі гілки плечового сплетення іннервують:

*** А) М'язи шиї і плечового пояса**

В) Трапецієподібний м'яз, груднино-ключично-соскоподібний м'яз

54. Довгі гілки плечового сплетення відходять від:

А) Надключичної частини

*** В) Підключичної частини**

55. Від надключичної частини плечового сплетення відходять:

*** А) Передні грудні нерви (nnthoracales anteriores) та задні нерви грудної клітки (nnthoracales posteriores)**

В) Великий потиличний (noccipitalis major) та діафрагмальний нерви (nphrenicus)

56. До групи задніх нервів грудної клітки належать:

А) Підключичний (nsubclavius) та м'язово-шкірний нерви (nmusculocutaneus)

*** В) Тильний нерв лопатки (ndorsalis scapulae) та довгий грудний нерв (nthoracicus longus)**

57. Короткі гілки плечового сплетення забезпечують:

- * **A) Приведення плеча**
- * **B) Обертання плеча всередину та зовні**
- C) Відведення руки до горизонталі

58. До симптомів ураження коротких гілок плечового сплетення відносяться:

- * **A) Неможливість зведення лопаток та приведення плеча**
- * **B) Атрофія м'язів плечового пояса**
- * **C) "Крилоподібна" лопатка**
- * **D) Випадіння лопатково-плечового рефлексу**
- E) Неможливість відведення плеча та супінація

59. Латеральний вторинний пучок плечового сплетення утворює:

- * **A) М'язово-шкірний нерв (n musculocutaneus), зовнішній корінець серединного нерва (radices lateralis n medianus)**
- B) Променевий нерв (n radialis), м'язово-шкірний нерв (n musculocutaneus)

60. Задній вторинний пучок плечового сплетення утворює:

- * **A) Пахвовий нерв (n axillaris), променевий нерв (n radialis)**
- B) Променевий нерв (n radialis), м'язово-шкірний нерв (n musculocutaneus)
- C) Променевий нерв (n radialis), серединний нерв (n medianus), довгий грудний нерви (n thoracicus longus)

61. Медіальний вторинний пучок плечового сплетення утворює:

*** А) Ліктьовий нерв (ulnaris), внутрішній корінець серединного нерва (radices medialis n medianus), внутрішні шкірні нерви плеча та передпліччя (nncutaneus brachii et antebrachii medialis)**

В) Променевий нерв (nradialis), внутрішній корінець ліктьового нерва (radices medialis n ulnaris), внутрішні шкірні нерви плеча та передпліччя (nncutaneus brachii et antebrachii medialis)

С) Ліктьовий нерв (ulnaris), внутрішній корінець серединного нерва (radices medialis n medianus), зовнішні шкірні нерви плеча та передпліччя (nncutaneus brachii et antebrachii lateralis)

62. Пахвовий нерв (naxillaris) утворюється з передніх гілок спинномозкових нервів:

А) C4-C5

*** В) C5-C6**

С) C7-C8

63. Пахвовий нерв (naxillaris) іннервує:

*** А) Дельтоподібний м'яз, малий круглий м'яз, шкіру плеча над дельтоподібним м'язом**

В) Дельтоподібний м'яз, ромбоподібний м'яз, шкіру зовнішньої поверхні передпліччя

64. При ураженні пахвового нерва (naxillaris) виникають:

*** А) Атрофія дельтоподібного м'яза, розлад чутливості шкіри над дельтоподібним м'язом, обмежене відведення руки до горизонталі**

В) Атрофія дельтоподібного м'яза, розлад чутливості на зовнішній поверхні плеча, неможливість підняття руки вище горизонталі

65. М'язово-шкірний нерв (nmusculocutaneus) плеча забезпечує:

А) Розгинання в ліктьовому суглобі, відведення плеча

*** В) Підіймання руки вперед, згинання в ліктьовому суглобі**

66. Внутрішній шкірний нерв плеча (ncutaneus brachii medialis) іннервує:

А) Шкіру передньої поверхні плеча та медіальної поверхні передпліччя до променево-зап'ясткового суглоба

*** В) Шкіру медіальної поверхні плеча до ліктьового суглоба**

67. Ліктьовий нерв (nlnaris) утворюється з передніх гілок спинномозкових нервів:

А) C4-C5

В) C5-C7

*** С) C8-Th1**

68. Ліктьовий нерв (nlnaris) забезпечує:

*** А) Зведення 1 - 5 пальців, розведення 2 - 5 пальців**

*** В) Згинання та розгинання середньої і кінцевої фаланг 4 - 5 пальців**

С) Відведення 1 пальця

69. До автономної зони чутливості ліктьового нерва (n. ulnaris) відносяться:

*** А) Шкіра ліктьового краю кисті, шкіра долонної поверхні кінцевої фаланги 5 пальця**

В) Шкіра ліктьового краю кисті та шкіра кінцевих фаланг 2 пальців

70. Компресія ліктьового нерва (n. ulnaris) можлива в:

*** А) Кубітальному каналі та каналі Гюйона**

В) Каналі зап'ястя та аркаді Фрозе

71. При ураженні ліктьового нерва (n. ulnaris) виникає усе зазначене, за винятком:

А) Трофічних розладів

В) Рухових розладів

С) Вазомоторних розладів

*** D) Випадання згинально-ліктьового рефлексу**

Е) Чутливих розладів у зоні іннервації ліктьового нерва

72. При ураженні ліктьового нерва (n. ulnaris) виникають:

*** А) Неможливість приведення 1 - 5 пальців і розведення 2 - 5 пальців, згинання та розгинання середніх та дистальних фаланг 4 - 5 пальців**

В) Обмежене згинання кінцевої фаланги 1 пальця, неможливість приведення всіх п'яťох пальців і розведення 2 - 5 пальців

73. Серединний нерв (n. medianus) утворюється з передніх гілок спинномозкових нервів:

А) C4-C5

В) C3-C6

*** С) C5-C8, Th1**

74. Пучки плечового сплетення, що утворюють серединний нерв (n. medianus):

А) Первинні

*** В) Вторинні**

С) Третинні

75. Вегетативні волокна переважають у:

А) Ліктьовому нерві (n. ulnaris)

*** В) Серединному нерві (n. medianus)**

С) Променевого нерві (n. radialis)

76. Компресія серединного нерва (nmedianus) можлива в:

A) Каналі Гюйона

*** В) Каналі зап'ястя**

77. Променевий нерв (nradialis) утворюється з передніх гілок спинномозкових нервів:

A) C4-C5

*** В) C5-C8, Th1**

C) C8-Th1

78. Променевий нерв (nradialis) виконує переважно:

*** А) Рухову функцію**

B) Вегетативно-трофічну функцію

C) Чутливу функцію

79. Променевий нерв (nradialis) забезпечує такі функції, крім:

A) Відведення 1 пальця

*** В) Приведення 1-5 пальців**

C) Супінації передпліччя і кисті

D) Розгинання 2 - 5 пальців в основних фалангах

E) Розгинання основної і кінцевої фаланги першого пальця

80. Зона автономної чутливості променевого нерва (nradialis):

*** А) Шкіра основної фаланги 1 пальця, ділянка "анатомічної табакерки"**

B) Шкіра кінцевих фаланг 2, 3 пальця, ділянка "анатомічної табакерки"

81. Тунельна компресія променевого нерва (n. radialis) може виникати:

- * А) У спіральному каналі**
- * В) У плече-пахвовому куті**
- * С) На рівні ліктьового суглоба (радіальний тунельний синдром)**
- * D) На рівні аркади Фрозе**
- Е) На рівні кубітального каналу
- Ф) В пахвинній зоні

82. До ознак тотального ураження плечового сплетення відносять:

- А) Трофічні виразки, периферичний параліч руки, високе стояння купола діафрагми
- * В) Анестезія шкіри руки, вегетативно-трофічні порушення руки**
- * С) Периферичний параліч руки**
- Д) Анестезія шкіри, периферичний параліч руки, гіперрефлексія

83. При ураженні верхнього первинного пучка плечового сплетення виникають наступні клінічні ознаки, за винятком:

- * А) Атрофії м'язів кисті**
- В) Зниження карпорадіального та випадання згинально-ліктьового рефлексу
- С) Неможливості відведення і підймання руки вище горизонталі та згинання в ліктьовому суглобі
- Д) Атрофії м'язів проксимального відділу руки
- Е) Гіпестезії у ділянці надпліччя й плеча

84. При ураженні середнього первинного пучка плечового сплетення спостерігається:

- * А) Зникнення розгинально-ліктьового рефлексу, утруднене розгинання кисті і пальців**
- В) Зникнення згинально-ліктьового рефлексу, неможливість розгинання в ліктьовому суглобі

85. При ураженні нижнього первинного пучка плечового сплетення спостерігається:

*** А) Периферичний параліч м'язів кисті, порушення чутливості на внутрішній поверхні плеча, передпліччя та кисті**

В) Утруднене розгинання в ліктьовому суглобі, відсутність згинально-ліктьового рефлексу

86. При ураженні верхнього первинного пучка плечового сплетення виникає параліч:

*** А) Ерба-Дюшена**

В) Дежерин-Клюмпке

С) Тотальний

87. При ураженні нижнього первинного пучка плечового сплетення виникає параліч:

А) Ерба-Дюшена

*** В) Дежерин-Клюмпке**

С) Тотальний

88. В утворенні поперекового сплетення беруть участь:

*** А) Передні гілки, L1 - L3, частково L4, Th12 спинномозкових нервів**

В) Задні гілки, L1 - L3, частково L4, Th12 спинномозкових нервів

С) Передні гілки L2 - L5, частково L1, S1 спинномозкових нервів

89. Нерви, що утворюються з поперекового сплетення:

*** А) Niliohypogastricus, nilioinguinalis, ngenitofemoralis, ncutaneus femoris lateralis, nobturatorius, nfemoralis**

В) Niliohypogastricus, nilioinguinalis, ngenitofemoralis, ncutaneus femoris lateralis, nobturatorius, nischiadicus

90. Шкіру медіальної поверхні стегна іннервують:

- * А) Стегново-статевий (ngenitofemoralis), замикальний нерв (nobturatorius)**
- В) Задній шкірний нерв стегна (ncutaneus femoris posterior), нижній сідничний нерв (ngluteus inferior)
- С) Стегновий (nfemoralis), клубово-паховий нерв (nilioinguinalis)

91. Нерв, що є частиною рефлексорної дуги кремастерного рефлексу:

- А) Замикальний (nobturatorius)
- * В) Стегново-статевий (ngenitofemoralis)**
- С) Стегновий (nfemoralis)

92. Функцію закладення ноги на ногу забезпечує:

- А) Стегновий нерв (nfemoralis)
- * В) Замикальний (nobturatorius)**
- С) Клубово-паховий (nilioinguinalis)

93. Nervus femoralis утворюється з передніх гілок:

- А) Th12-L2 спинномозкових нервів
- * В) L2-L4 спинномозкових нервів**
- С) L4-S1 спинномозкових нервів

94. У складі nervus femoralis переважають:

- * А) Рухові волокна**
- В) Вегетативні волокна
- С) Чутливі волокна

95. Nervus femoralis здійснює зазначені функції, за винятком:

- * А) Відведення ноги**
- В) Розгинання в колінному суглобі
- С) Згинання в кульшовому суглобі
- Д) Учасі у згинанні в колінному суглобі

96. Зона чутливості nervus femoralis:

- * А) Коліно, передня поверхня стегна, внутрішня поверхня верхніх 2/3 гомілки**
- В) Зовнішня поверхня гомілки, задня поверхня стегна
- С) Внутрішня поверхня стегна

97. У реалізації колінного рефлексу бере участь:

- * А) Стегновий нерв (nfemoralis)**
- В) Стегнево-статевий нерв (ngenitofemoralis)
- С) Замикальний нерв (nobturatorius)

98. При ураженні nervus femoralis спостерігається:

- * А) Відсутність колінного рефлексу**
- * В) Гіпотрофія м'язів передньої поверхні стегна**
- * С) Неможливість розгинання в колінному суглобі**
- * Д) Обмежене згинання в кульшовому суглобі**
- Е) Неможливість згинання в колінному суглобі

99. Nervus femoralis не страждає:

- А) При діабеті
- * В) При тромбофлебіті**
- С) При паховому лімфаденіті
- Д) При патологічних процесах у паху
- Е) При гематомах по ходу нерва

100. У складі латерального шкірного нерва стегна (ncutaneus femoris lateralis) переважають:

A) Вегетативні волокна

*** В) Чутливі волокна**

C) Рухові волокна

101. Компресія латерального шкірного нерва стегна (ncutaneus femoris lateralis) найбільш часто виникає:

A) Внутрішньотазово

*** В) На рівні пахової зв'язки**

102. До причин ураження латерального шкірного нерва стегна (ncutaneus femoris lateralis) відносяться:

*** А) Інфекції**

*** В) Інтоксикації**

*** С) Внутрішньотазове здавлювання**

D) Патологія хребта

*** Е) Компресія на рівні пахової зв'язки**

103. При ураженні латерального шкірного нерва стегна (ncutaneus femoris lateralis) виникає:

*** А) Шкірна гіперестезія або гіпестезія, парестезії, трофічні порушення шкіри на передньозовнішній поверхні стегна**

B) Випадання колінного рефлексу, шкірна гіперестезія або гіпестезія, парестезії, трофічні порушення шкіри передньозовнішньої поверхні стегна

104. Ураження зовнішнього шкірного нерва стегна (ncutaneus femoris lateralis) - це:

A) Хвороба Катуніо

*** В) Meralgia paraesthetica, хвороба Рота**

105. В утворенні сакрального сплетення беруть участь:

- * А) Передні гілки спинномозкових нервів**
- В) Задні гілки спинномозкових нервів
- С) Передні та задні гілки спинномозкових нервів

106. В утворенні сакрального сплетення (plexus sacralis) беруть участь:

- * А) L5, S1-S2, частково L4, S3**
- В) S3-S5

107. Сакральне сплетення (plexus sacralis) ділиться на гілки:

- * А) Довгі і короткі**
- В) Передні і задні

108. Короткі гілки сакрального сплетення (plexus sacralis) іннервують:

- * А) М'язи тазу, м'язи, що відводять стегно, сідничні м'язи**
- В) М'язи гомілки, сідничні м'язи

109. Короткі гілки сакрального сплетення (plexus sacralis) забезпечують:

- * А) Чутливість задньої поверхні стегна**
- В) Чутливість зовнішніх статевих органів

110. До довгих гілок сакрального сплетення (plexus sacralis) відносяться:

- * А) Nervus ischiadicus**
- В) Nervus gluteus inferior
- С) Nervus femoralis

111. Nervus gluteus inferior складається з:

- * А) Рухових волокон**
- В) Чутливих волокон

112. При ураженні нижнього сідничного нерва (n. gluteus inferior) не утруднені:

A) Біг, стрибки

*** B) Розгинання гомілки**

C) Піднімання по східцях

D) Вставання з положення сидячи

E) Розгинання в кульшовому суглобі

113. При ураженні верхнього сідничного нерва (n. gluteus superior) утруднене:

*** A) Відведення ноги в кульшовому суглобі**

B) Приведення ноги в кульшовому суглобі

C) Відведення і приведення ноги в кульшовому суглобі

114. Хо́да при двобічному паралічі верхнього сідничного нерва (n. gluteus superior):

*** A) "Качина" хода**

B) "Півняча" хода

115. Nervus ischiadicus утворюється з передніх гілок:

A) L1-L3 спинномозкових нервів

*** B) L5-S3 спинномозкових нервів**

C) S3-S5 спинномозкових нервів

116. Найбільша кількість вегетативних волокон міститься у складі:

*** A) Nervus ischiadicus**

B) Nervus femoralis

C) Nervus cutaneus femoris lateralis

117. Кінцевими гілками nervus ischiadicus є:

- * А) Малогомілковий і великогомілковий нерви (nperoneus et ntibialis)**
- В) Задній і зовнішній шкірні нерви стегна (ncutaneus femoris posterior et lateralis)
- С) Передній і задній шкірні нерви гомілки (ncutaneus cruris anterior et posterior)

118. Соромітний нерв (n pudendus) іннервує:

- * А) Шкіру навколо заднього проходу**
- * В) Шкіру статевого члена (клітора)**
- * С) Поперечний м'яз промежини**
- * D) М'яз, що стискує анальний отвір**
- * Е) М'яз, що стискує частину сечовипускального каналу**
- Ф) Шкіру нижньої третини сідниць

119. Розлади сечовипускання, дефекації і статевої діяльності можуть виникати при ураженні:

- * А) Nervus pudendus, plexus sacralis**
- В) Nervus genitofemoralis, plexus sacralis

120. Анальний рефлекс може випадати при ураженні:

- * А) Nervus pudendus, plexus sacralis**
- В) Nervus gluteus superior, nervus cutaneus femoris posterior

121. Задній шкірний нерв стегна (nervus cutaneus femoris posterior) переважно складається:

- А) Із рухових волокон
- * В) Із чутливих волокон**
- С) Із вегетативних волокон

122. Задній шкірний нерв стегна (nervus cutaneus femoris posterior) утворюється:

- A) Із поперекового сплетення
- * B) Із крижового сплетення**
- C) Із куприкового сплетення

123. Шкіра стегна не іннервується:

- A) Nervus femoralis
- B) Nervus obturatorius
- C) Nervus genitofemoralis
- D) Nervus cutaneus femoris posterior
- * E) Nervus ischiadicus**

124. Шкіра гомілки іннервується:

- A) Nervus pudendus, nervus obturatorius
- * B) Nervus femoralis et nervus ischiadicus**

125. При ураженні nervus tibialis виникає:

- * A) Неможливість згинання стопи та пальців, приведення та розведення пальців, випадання ахіллового рефлексу, трофічні розлади, больовий синдром**
- B) Неможливість розгинання (тильного згинання) стопи та пальців, приведення та розведення пальців, випадає ахіллов рефлекс, трофічні розлади, больовий синдром

126. При ураженні nervus peroneus виникають:

- * A) Неможливість тильного згинання стопи, відведення та розгинання зовнішнього краю стопи, степпаж**
- B) Неможливість підшовного згинання стопи, відведення та розгинання зовнішнього краю стопи, випадання ахіллового рефлексу, степпаж,

127. Вважається, що серед захворювань хребта найбільш часто неврологічними проявами супроводжується:

- A) Спондильоз
- * B) Остеохондроз**
- C) Спонділіт
- D) Спонділоартрит

128. Характерні риси остеохондрозу хребта:

- A) Деструкція тіл хребців, спондильоз
- * B) Дегенеративно-дистрофічне ураження міжхребцевого диска, реактивні зміни тіл суміжних хребців і суглобів**

129. У розвитку остеохондрозу:

- * A) Ураження пульпозного ядра передуює реактивним змінам у хребцях**
- B) Реактивні зміни в хребцях передують ураженню пульпозного ядра

130. У розвитку спондильозу переважає:

- A) Ураження пульпозного ядра
- * B) Дегенерація волокон фіброзного кільця та поздовжніх зв'язок**

131. Характерні рентгенологічні ознаки остеохондрозу:

- * A) Зменшення висоти міжхребцевого простору, патологічна рухомість хребців, потовщення та нерівність замикальних пластинок, горизонтальні крайові розростання тіл хребців, зміна конфігурації хребта**
- B) Зменшення висоти тіл хребців, патологічна рухомість хребців, потовщення та нерівність замикальних пластинок, вертикальні крайові розростання тіл хребців, зміна конфігурації хребта

132. Характерні рентгенологічні ознаки спондильозу:

*** А) Утворення переважно вертикальних крайових кісткових розростань, кальцінація поздовжніх зв'язок, розповсюджується на декілька сегментів**

В) Утворення переважно горизонтальних крайових кісткових розростань, кальцінація поздовжніх зв'язок, зменшення висоти міжхребцевого простору, розповсюджується на 1 - 2 сегменти

133. Основні синдроми, що входять до розділу "Вертеброгенні ураження" класифікації захворювань периферичної нервової системи (під редакцією ІП Антонова):

*** А) Рефлекторні, корінцеві, корінцево-судинні**

В) Рефлекторні, корінцево-судинні, провідникові

С) Компресійні, рефлекторні, поліневритичні

134. При грижі диска можуть бути стисненими:

*** А) Судина, корінець, спинний мозок**

В) Нервове сплетення, судина, корінець

135. Виникнення рефлекторних синдромів при остеохондрозі обумовлене впливом змінених хребцевих структур на:

А) Корінці спинномозкових нервів

*** В) Рецептори - закінчення синуввертебральних нервів Люшка**

136. Варіанти рефлекторних синдромів при остеохондрозі:

*** А) Вегетативно-судинні, нейродистрофічні, м'язово-тонічні**

В) Корінцеві, вазомоторні, спінальні

137. Варіанти компресійних синдромів при остеохондрозі:

*** А) Корінцеві, судинні, спінальні**

В) М'язово-тонічні, вегетативно-судинні, нейродистрофічні

138. Подразнення від рецепторів уражених структур хребта при остеохондрозі, що викликає рефлекторні синдроми, не поширюються на:

- A) М'язи
- B) Судини
- C) Синуверебральний нерв
- D) Передній та задній корінці спинномозкових нервів
- E) Передній та задній роги спинного мозку

*** F) Передній канатик спинного мозку**

139. При дискогенній компресії корінця в перший тиждень захворювання переважають:

- * A) Набряк, венозний застій, асептичне запалення**
- B) Атрофія, асептичне запалення, венозний застій

140. Корінцевий синдром не є характерним для:

- * A) Інтрамедулярної пухлини**
- B) Туберкульозного спондиліту
- C) Екстрамедулярної пухлини
- D) Остеохондрозу хребта

141. Клінічні прояви вертеброгенної компресії заднього корінця:

- A) ,Біль, больова та температурна гіпалгезія у відповідному дерматомі, периферичний парез
- * B) Біль, розлади усіх видів чутливості у відповідному дерматомі, зниження рефлексів відповідного рівня**

142. Виникнення болю, рефлекторних синдромів зумовлюють подразнення рецепторів зазначених утворень, крім:

- A) Жовтої зв'язки
- B) Фіброзного кільця
- C) Епідуральної клітковини
- D) Задньої поздовжньої зв'язки

*** E) Пульпозного ядра**

143. Вертеброгенні рефлекторні синдроми шийного рівня:

*** A) Цервікалгія, цервікокраніалгія, цервікобрахіалгія, плечелопатковий периартроз**

B) Цервікалгія, цервікобрахіалгія, цервікокраніалгія, радикулоішемія, задній шийний симпатичний синдром

144. Вертеброгенні рефлекторні синдроми поперекового рівня:

*** A) Люмбаго, люмбалгія, підколінний, люмбоішіалгія, синдром грушоподібного м'яза**

B) Люмбаго, люмбалгія, підколінний, люмбоішіалгія, синдром кінського хвоста

145. Дегенеративно-дистрофічні зміни хребта більш часто зустрічаються на:

*** A) Шийному та попереково-крижовому рівнях**

B) Крижовому та куприковому рівнях

C) Шийному та грудному рівнях

146. Дискогенна компресія шийних корінців частіше виникає на рівні:

A) C4-C5

B) C4-C6

*** C) C5-C7**

147. Дискогенна компресія попереково-крижових корінців частіше виникає на рівні:

A) L2-L3

*** B) L5-S1**

C) S1-S2

148. Клінічні форми заднього шийного симпатичного синдрому:

*** A) Іритативна, ішемічна**

B) Вегетативна, больова

149. Клінічні прояви іритативної форми заднього шийного симпатичного синдрому:

*** A) Головний біль**

*** B) Кохлеовестибулярний синдром**

*** C) Оптичні розлади**

D) Дроп-атаки

150. У хворого виникли короточасні приступи інтенсивного болю в половині лиця, що тривають до декількох хвилин і можуть провокуватися жуванням, розмовою. Можливий діагноз:

A) Синдром Слудера

*** B) Невралгія трійчастого нерва**

151. У хворого повисла голова, утруднені її рухи назад та в сторони, спостерігається атрофія задніх м'язів шиї, трапецієподібних, груднично-ключично-соскоподібних м'язів по обидва боки. Уражено:

A) Шийне сплетення

B) Плечове сплетення

*** C) Передні роги C1-C5 сегментів спинного мозку**

D) Передні роги C8-Th2 сегментів спинного мозку

152. У хворого розвилася: слабкість правої кисті, кисть звисає, неможливо відведення першого пальця, розгинання його кінцевої фаланги Зниження больової чутливості 2 фаланги першого пальця Уражено:

*** А) Променевий нерв (nradialis)**

- В) Серединний нерв (nmedianus)
- С) М'язово-шкірний нерв (n musculocutaneus)
- Д) Плечове сплетення
- Е) Передні і задні С7-С8 корінці справа

153. Після пологів у хворі розвинулись: звисаюча стопа, гіпотрофія та гіпотонія м'язів передне-зовнішньої поверхні гомілки, порушення поверхневих видів чутливості на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи, степпаж Уражено:

- А) Нижній сідничний нерв (n gluteus inferior)

*** В) Малогомілковий нерв (nperoneus)**

- С) Великогомілковий нерв (n tibialis)
- Д) Крижове сплетення (plexus sacralis)
- Е) Передні і задні корінці L4-S1

154. У хворого виник пекучий біль у кисті, яка стала набряклою та синюшною, ділянка узвишшя 1 пальця гіпотрофічна, неможливе протиставлення 1 пальця Уражено:

- А) Ліктьовий нерв (n ulnaris)
- В) Променевий нерв (nradialis)

*** С) Серединний нерв (nmedianus)**

- Д) Плечове сплетення
- Е) Передні і задні роги С5-С6 справа

155. У хворого після травми виникли: слабкість у проксимальному відділі правої руки, обмеження активних рухів у плечовому та ліктьовому суглобах, рух кисті збережений Діагноз:

A) Параліч Дежерин-Клюмпке

*** B) Параліч Ерба-Дюшена**

C) Травматичне ураження пахвового нерва

D) Травматичне ураження довгого грудного нерва

156. При наявності анестезії у ділянці кінцевих фаланг 2-3 пальців руки, порушення м'язово-суглобної чутливості в кінцевій фаланзі 2 пальця, ураженим є:

A) Nmusculocutaneus

B) Nradialis

C) Nulnaris

*** D) Nmedianus**

E) Naxillaris

157. У хворого "кігтиста" кисть, неможливе розведення 2 - 5 пальців і приведення 1 - 5 пальців, порушена чутливість у мізинці та по ульнарному краю кисті Уражено:

A) Nmedianus

B) Plexus brachialis

C) Nmusculocutaneus

D) Nradialis

*** E) Nulnaris**

158. У хворого виникли: оніміння і біль по переднє-зовнішній поверхні стегна, що посилюються в положенні стоячи, зниження больової чутливості по зовнішньо-передній поверхні стегна Уражено:

- A) Nfemoralis
- B) Nilioinguinalis
- C) Plexus lumbalis
- D) Niliohypogastricus)

*** E) Ncutaneus femoris lateralis)**

159. У хворого виник біль на передній поверхні стегна, ослаблене згинання в кульшовому суглобі і розгинання гомілки, знизився колінний рефлекс Уражено:

*** A) Стегновий нерв (nfemoralis)**

- B) Замикальний нерв (nobturatorius)
- C) Задні корінці L3-L4
- D) Поперекове сплетення (plexus lumbalis)
- E) Крижове сплетення (plexus sacralis)

160. У хворої після пологів виникла слабкість у нозі, різко ослаблене приведення ноги, не може покласти ногу на ногу, знизилась больова чутливість у нижній третині внутрішньої поверхні стегна Уражено:

- A) Стегновий нерв (nfemoralis)
- B) Сідничий нерв (nischiadicus)

*** C) Замикальний нерв (nobturatorius)**

- D) Поперекове сплетення (plexus lumbalis)
- E) Крижове сплетення (plexus sacralis)

161. У хворого виникли: біль по задній поверхні стегна та гомілки, слабкість розгинання і відведення в кульшовому суглобі, стопі, зниження больової чутливості по задній поверхні стегна та гомілки, випав ахілловий рефлекс
Уражено:

A) Стегновий нерв (nfemoralis)

*** B) Крижове сплетення (plexus sacralis)**

C) Задні корінці L1-S2

D) Передні корінці L1-S2

162. У хворого виникли: біль в сідничній ділянці, парез м'язів гомілки, випав ахіллов рефлекс, порушилась чутливість на заднє-зовнішній поверхні гомілки і стопи
Уражено:

*** A) Сідничий нерв (n ischiadicus)**

B) Малогомілковий нерв (nperoneus)

C) Великогомілковий нерв (ntibialis)

D) Задні корінці L5-S2

E) Передні корінці L5-S2

163. У хворого стопа звисає, степпаж при ході, розлад чутливості на тильному боці стопи
Уражено:

A) Стегновий нерв (nfemoralis)

B) Сідничий нерв (n ischiadicus)

*** C) Малогомілковий нерв (nperoneus)**

D) Великогомілковий нерв (ntibialis)

E) Задній корінець L5-S1

164. У хворого виникли: біль по задній поверхні стегна і гомілки, порушення поверхневої чутливості по задній поверхні гомілки, випадіння ахіллова рефлексу, слабкість згиначів стопи і пальців Уражено:

A) Корінець L5

*** B) Корінець S1**

C) Сідничий нерв (nischadicus)

D) Малогомілковий нерв (nperoneus)

E) Великогомілковий нерв (ntibialis)

165. У хворого виникли: біль по зовнішній поверхні стегна, гомілки і стопи, порушення чутливості на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи, слабкість розгинання 1 пальця стопи, ахілов рефлекс збережений Уражено:

*** A) Корінець L5**

B) Корінець S1

C) Малогомілковий нерв (nperoneus)

D) Сідничий нерв (n ischiadicus)

E) Великогомілковий нерв (ntibialis)

166. У хворого виникли: стріляючий біль у ногах, переважно - по задній поверхні, гіпестезія поверхневих видів чутливості по задньобоківій поверхні ніг, асиметричний периферичний парез ніг, істинне нетримання сечі Уражено:

*** A) Кінський хвіст**

B) Мозковий конус

C) Сідничі нерви

D) Задні роги L1-S2

E) Передні роги L1-S2

167. У хворого виникли: біль у попереку з іррадіацією по передній поверхні стегна, симптом Вассермана, гіпестезія на внутрішній поверхні стегна, зниження колінного рефлексу Уражено:

A) L5-S1 корінці

*** B) L2-L3 корінці**

C) L1-L2 корінці

168. Для яких хвороб притаманний біль вертеброгенного генезу:

*** A) Хвороба Педжета**

*** B) Хвороба Реклінгаузена**

C) Спинальний сифіліс

D) Пухлини спинного мозку

E) Герпетичний гангліоніт

169. При ураженні яких структу може виникнути синдром звисаючої кісті?

*** A) Ураженні nradialas**

*** B) Оклюзії периферичної гілки (arolandica) середньої мозкової артерії**

C) Ураженні nularis

D) Оклюзії периферичних гілок передньої мозкової артерії