

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Захворювання вегетативної нервової системи

Категорія: **Неврологія**

Кількість запитань: **73**

1. Для ваго-інсулярних вегетативних пароксизмів характерним є:

А) Тахікардія, підвищення артеріального тиску, мідріаз

*** В) Брадикардія, зниження артеріального тиску, міоз**

2. Для ураження шийного відділу симпатичного стовбура характерним є:

*** А) Синдром Горнера, геміатрофія лица, трофічні порушення в зоні іннервації**

В) Параліч м'язів, синдром Горнера, геміатрофія лица, трофічні порушення в зоні іннервації

3. Симпатичні нейрони переважають у вузлах, які розташовані:

А) Поблизу від "робочого органу"

*** В) Віддалено від "робочого органу"**

4. Синонімом вегетативної нервової системи є:

*** А) Автономна**

В) Соматична

5. У сегментарній вегетативній нервовій системі виділяють такі відділи:

*** А) Симпатичний**

*** В) Парасимпатичний**

С) Гіпоталамічний

Д) Таламічний

6. Кількість нейронів, які входять до сегментарних вегетативних апаратів:

*** А) Перевищує кількість нейронів головного мозку**

В) Менше кількості нейронів головного мозку

7. Вегетативні нейрони переважно закладені в:

А) Головному мозку

*** В) Спинному мозку**

8. Симпатична іннервація обличчя та шиї забезпечується з:

A) C3-C8 сегментів

*** B) C8-Th3 сегментів**

9. Симпатична іннервація верхніх кінцівок забезпечується з :

A) C8-Th3 сегментів

*** B) Th4-Th7 сегментів**

10. Симпатична іннервація тулуба забезпечується з:

A) C8-Th5 сегментів

*** B) Th5-Th9 сегментів**

11. Симпатична іннервація нижніх кінцівок забезпечується з:

A) L1-S5 сегментів

*** B) Th9-L2 сегментів**

12. Нейрони симпатичного відділу сегментарної вегетативної нервової системи здебільшого представлені в:

*** A) Грудному відділі спинного мозку**

*** B) Верхньопоперековому відділі спинного мозку**

C) Нижньопоперековий відділ спинного мозку

D) Сакральному відділі спинного мозку

13. Нейрони парасимпатичного відділу сегментарної вегетативної нервової системи здебільшого представлені в:

*** A) Вегетативних ядрах стовбура головного мозку**

B) Люмбальному відділі спинного мозку

*** C) Сакральному відділі спинного мозку**

14. Прегангліонарні вегетативні волокна в спинному мозку виходять разом із:

- * А) Передніми корінцями**
- В) Задніми корінцями
- С) Як задніми, так і передніми корінцями

15. Симпатичний стовбур складається з:

- А) 10-15 вузлів
- В) 15-20 вузлів
- * С) 20-22 вузлів**

16. Верхній шийний симпатичний вузол розташований:

- * А) На рівні С2 - С3 хребців**
- В) На рівні С4 - С5 хребців

17. Постгангліонарні волокна від верхнього шийного симпатичного вузла прямують до:

- А) Судин вертебрального басейну
- * В) Головного мозку та лиця**

18. Гілки внутрішнього сонного сплетення направляються:

- * А) До черепних нервів, до ganglion ciliare, у барабанну порожнину**
- В) До спинномозкових нервів, до під'язичного нерва

19. Постгангліонарні волокна від зірчастого вузла прямують до:

- А) Судин вертебрального басейну
- * В) Головного мозку та лиця**

20. Волокна, що відходять від циліоспінального центру Будге направляються:

- А) В орбіту
- * В) У шийні симпатичні вузли**

21. Сегментарний циліоспінальний центр Будге бере участь у забезпеченні:

*** А) Симпатичної іннервації**

В) Парасимпатичної іннервації

22. Симпаталгії відрізняються від соматичних болів:

А) Меншою дифузністю і еферентним супроводженням

*** В) Більшою дифузністю і еферентним супроводженням**

23. Парасимпатичні нейрони переважають у вузлах, які розташовані:

*** А) Поблизу від "робочого органу"**

В) Віддалено від "робочого органу"

24. Прегангліонарні волокна є більш короткими, а постгангліонарні - більш довгими:

*** А) У симпатичній нервовій системі**

В) У парасимпатичній нервовій системі

25. Прегангліонарні волокна є більш довгими, а постгангліонарні - більш короткими:

А) У симпатичній нервовій системі

*** В) У парасимпатичній нервовій системі**

26. Грудний відділ симпатичного стовбура розташовується:

*** А) Перед голівками ребер**

В) На передній поверхні тіл грудних хребців

27. Великий черевний нерв утворюється з волокон:

*** А) Th5-Th9 симпатичних вузлів**

В) Th10-Th11 симпатичних вузлів

28. Малий черевний нерв утворюється з волокон:

А) Th5-Th9 симпатичних вузлів

*** В) Th10-Th11 симпатичних вузлів**

29. Великий черевний нерв утворюється на рівні:

*** А) Th9-Th10 хребців**

В) Th6-Th8 хребців

30. Черевні нерви утворюють:

А) Верхнє підчеревне сплетіння

*** В) Черевне (сонячне) сплетіння**

31. Люмбальний відділ симпатичного стовбура розташований:

А) На поперечних відростках люмбальних хребців

*** В) На передній поверхні тіл люмбальних хребців**

32. Сакральні симпатичні вузли розташовані:

А) По серединній лінії крижів

*** В) На передній поверхні крижів, медіально від передніх крижових отворів**

С) На задній поверхні крижів латерально

33. Виключно симпатичну іннервацію мають:

*** А) Мозковий прошарок надниркових залоз, потові залози, кровоносні судини**

В) Сальні залози, кровоносні судини, сечовий міхур

34. Спінальні симпатичні центри для іннервації тазових органів розташовані:

*** А) У бокових рогах L1- L2 сегментів спинного мозку**

В) У бокових рогах S1-S3 сегментів спинного мозку

35. Спінальні парасимпатичні центри для іннервації тазових органів розташовані:

*** А) У S3-S5 сегментах спинного мозку**

В) У S1-S3 сегментах спинного мозку

36. З урахуванням даних онтогенезу ядра гіпоталамуса поділяють на:

*** А) Ядра переднього, середнього медіального, середнього латерального та заднього відділів**

В) Ядра поверхневого, середнього та глибинного відділів

37. До специфічних ядер гіпоталамуса належать:

*** А) Супраоптичне, паравентрикулярне та мілкоклітинне ядро сірого горба**

В) Супраоптичне, паравентрикулярне та ретикулярне ядра

38. Ерготропну функцію переважно забезпечує:

*** А) Симпатична вегетативна система**

В) Парасимпатична вегетативна система

39. Трофотропну функцію переважно забезпечує:

А) Симпатична вегетативна система

*** В) Парасимпатична вегетативна система**

40. Особливості передачі імпульсів по постгангліонарних парасимпатичних волокнах:

*** А) Коротка післядія**

В) Довга післядія

41. Особливість поширення парасимпатичного подразнення:

А) Дифузне, генералізоване

*** В) Локальне, негенералізоване**

42. Ефекти симпатичного подразнення у порівнянні з парасимпатичним подразненням:

*** А) Більш дифузні і генералізовані**

В) Менш дифузні і генералізовані

43. Функція специфічних ядер гіпоталамуса проявляється:

*** А) Однозначним ефектом**

В) Ефектами, які можуть відрізнятися в залежності від сили подразнення

44. Функція неспецифічних ядер гіпоталамуса проявляється:

А) Однозначним ефектом

*** В) Ефектами, які можуть відрізнятися в залежності від сили подразнення**

45. Здатність до нейрокринії характерна для:

*** А) Специфічних ядер гіпоталамуса**

В) Неспецифічних ядер гіпоталамуса

46. Внаслідок подразнення структур лімбіко-ретикулярного комплексу виникає:

А) Специфічна вегетативна реакція

*** В) Поєднання психічних, соматичних і вегетативних реакцій**

47. Схильність до брадикардії характерна для:

*** А) Ваготонії**

В) Симпатикотонії

48. Схильність до тахікардії характерна для:

А) Ваготонії

*** В) Симпатикотонії**

49. Схильність до артеріальної гіпотензії характерна для:

- * А) Ваготонії**
- В) Симпатикотонії

50. Схильність до артеріальної гіпертензії характерна для:

- А) Ваготонії
- * В) Симпатикотонії**

51. Активація симпатичної вегетативної системи сприяє:

- * А) Розширенню бронхів**
- В) Звуженню бронхів

52. Схильність до спазмів бронхів характерна для:

- * А) Ваготонії**
- В) Симпатикотонії

53. Посилена перистальтика кишечника характерна для:

- * А) Ваготонії**
- В) Симпатикотонії

54. Гіпергідроз шкіряних покрів є характерним для:

- * А) Ваготонії**
- В) Симпатикотонії

55. Сухість шкіряних покрів є характерною для:

- А) Ваготонії
- * В) Симпатикотонії**

56. Розширення зіниць є характерним для:

- А) Ваготонії
- * В) Симпатикотонії**

57. Ортостатичний синкопальний стан - це:

*** А) Короткочасна втрата свідомості при переході хворого з горизонтального положення у вертикальне**

В) Короткочасна втрата свідомості при переході хворого з вертикального положення в горизонтальне

С) Короткочасна втрата свідомості при будь-якій зміні положення хворого

58. Для симпато-адреналових вегетативних пароксизмів характерним є:

*** А) Тахікардія, підвищення артеріального тиску, мідріаз**

В) Брадикардія, підвищення артеріального тиску, міоз

59. Для ураження середніх і нижніх грудних симпатичних вузлів характерним є:

А) Парестезії у стопах, розлад діяльності сечового міхура

*** В) Порушення функції органів травлення**

60. Для ураження лямбального відділу симпатичного стовбура характерним є:

А) Парези ніг, парестезії, судинні порушення в ногах

*** В) Похолодання ніг, парестезії, пекучий біль, гіпергідроз ніг**

61. Для заднього шийного симпатичного синдрому характерним є:

*** А) Цефалгії, вестибуло-кохлеарні та оптичні порушення, вегетативні пароксизми**

В) Цефалгії, парези рук, фотопсії, синкопальні стани, вегетативні пароксизми

62. До ознак ураження гіпоталамічної зони відносять:

*** А) Порушення формули сну**

*** В) Нейроендокринні та нейротрофічні порушення**

*** С) Вегетативно-судинний синдром**

Д) Лікворно-гіпертензійні кризи

Е) Лікворно-гіпотензійні кризи

63. При нецукровому діабеті спостерігається:

*** А) Поліурія, низька питома вага сечі**

В) Поліурія, висока питома вага сечі

64. Синдром вегетативно-судинної дистонії може виникати внаслідок:

*** А) Ендокринної перебудови організму**

*** В) Ураження вісцеральних органів**

*** С) Органічного ураження нервової системи**

*** D) Неврозів**

Е) Маніакально-депресивного психозу

65. Типи перебігу вегетативних розладів при вегетативно-судинній дистонії:

*** А) Перманентний**

*** В) Пароксизмальний**

*** С) Перманентно-пароксизмальний**

D) Прогредієнтний

66. Вегетативні кризи можуть протікати:

*** А) По симпатичному типу**

*** В) По парасимпатичному типу**

*** С) По змішаному типу**

D) Дієнцефальному типу

67. Вегетативно-судинна дистонія є:

А) Самостійною нозологічною одиницею

*** В) Синдромом**

68. Мігрень має спадковий характер:

*** А) Так**

В) Ні

69. Найчастіші клінічні прояви неускладненої мігрені:

А) Напади однобічного головного болю, наявність симптомів органічного ураження нервової системи, добре самопочуття в міжприступному періоді

*** В) Напади однобічного головного болю, відсутність симптомів органічного ураження нервової системи, добре самопочуття в міжприступному періоді**

70. Сучасні підходи до лікування мігрені:

А) Лікування виключно приступу

*** В) Лікування під час приступу і в міжприступному періоді**

71. Форми мігрені, що підлягають стаціонарному лікуванню:

А) Звичайна

В) Шийна

С) Психогенна

*** D) Геміплегічна**

*** E) Офтальмічна**

72. Кластерна цефалгія частіше виникає:

*** А) Вночі**

В) Вдень

С) Ввечері

73. Кластерна цефалгія супроводжується слезотечею, ринореєю, гіперемією кон'юнктиви та обличчя:

*** А) Так**

В) Ні