

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нормальна анатомія - база тестів 2005 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2005 року**

Кількість запитань: **191**

1. Хворому виставлено діагноз водянки яєчка (гідроцеле). Яка з оболонок яєчка утворює мішок, в середині якого накопичується рідина?

*** A) Tunica vaginalis communis testis**

- B) Tunica dartos
- C) Fascia spermatica interna
- D) Fascia spermatica externa
- E) Tunica albuginea

2. При певних скаргах хворого 70 років лікар вирішив дослідити пульс на стопі. На якій артерії краще за все це зробити?

*** A) a. dorsalis pedis**

- B) a. tibialis posterior
- C) a. tibialis anterior
- D) a. plantaris medialis
- E) a. plantaris lateralis

3. При розтині парапроктиту, який локалізований ближче до сідничного горба, була пошкоджена судина. Яка імовірніше за все?

*** A) a. pudenda interna**

- B) a. rectalis inferior
- C) v. rectalis inferior
- D) a. pudenda extena
- E) a. perinealis

4. При виконанні нижньої трахеотомії в ургентному порядку, яка проведена по середній лінії, в подальшому виявлена наявність кровотечі. Яке судинне утворення було пошкоджено?

*** А) arcus venosus jugularis**

В) v. jugularis anterior

С) a. thyroidea inferior

Д) v. thyroidea inferior

Е) v. jugularis externa

5. У потерпілого травма колінного суглоба з розтрощенням наколінника. Сухожилок якого м'яза стегна може бути пошкоджено при даній травмі?

*** А) Чотириголового м'яза стегна**

В) Двоголового м'яза стегна

С) Кравецького м'яза

Д) Великого привідного м'яза

Е) Довгого привідного м'яза

6. На другий день після тренувань у спортзалі гімнаст скаржиться на біль з лівого боку при обертанні тулуба вправо. Скорочення якого м'яза на протилежному від обертання боці може викликати біль?

*** А) Зовнішнього косого м'яза живота**

В) Внутрішнього косого м'яза живота

С) Поперечного м'яза живота

Д) Великого грудного м'яза

Е) Малого грудного м'яза

7. Під час підготовки до змагань гімнаст отримав травму з вивихом у плечовому суглобі. Сухожилок якого м'яза плеча проходить всередині порожнини вищезазначеного суглоба і може бути пошкодженим?

*** А) Двоголового м'яза плеча**

- В) Триголового м'яза плеча
- С) Дзьобоплечового м'яза
- Д) Плечового м'яза
- Е) Дельтоподібного м'яза

8. В одну із клінік звернулися батьки хлопчика 12 років. Хлопчик мав ріст біля 2-х метрів, але був складений пропорційно і розумово розвинений відповідно своєму віку. При обстеженні на рентгенограмі черепа виявлено збільшення турецького сідла. Яка структура головного мозку була змінена у хлопчика?

*** А) Гіпофіз**

- В) Епіфіз
- С) Таламус
- Д) Середній мозок
- Е) Задній мозок

9. У хворого діагностовано пухлина мозку, яка розміщена в задньому розі бічного шлуночка і ділянці „пташиної шпори”. Порушення якої функції розвинеться у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися даліше.

*** А) Порушення функції зору**

- В) Порушення функції слуху
- С) Порушення функції нюху
- Д) Порушення функції смаку
- Е) Порушення функції вестибулярного аналізатора

10. Після операції апендектомії у хворого залишилась понижена чутливість шкіри над пахвинною складкою на боці проведеної операції. Гілки якого нерва були пошкоджені хірургом в процесі оперативного втручання?

*** А) Клубово-пахвинного нерва**

- В) Стегногого
- С) Затульного
- Д) Клубово-підчеревного
- Е) Статено-стенового

11. При огляді хворого лікар-невропатолог встановив відсутність „колінного рефлекса” при постукуванні по зв’язці наколінка. Який нерв може бути пошкоджений в цьому випадку?

*** А) Стегновий**

- В) Затульний
- С) Сідничний
- Д) Великогомільковий
- Е) Загального малогомільковий

12. Хворий виявляє скарги на неспроможність розуміти слова (сенсорна афазія), хоча звуки він чує. Про порушення якого кіркового аналізатора йдеться?

*** А) Слуховий аналізатор усної мови**

- В) Мовноруховий аналізатор
- С) Руховий аналізатор письмової мови
- Д) Зоровий аналізатор письмової мови
- Е) Ядро слухового аналізатора

13. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на порушення рівноваги тіла, після травми голови. Функція якого ядра порушена?

*** А) Ядро намету**

- В) Зубчасте ядро
- С) Хвостате ядро
- Д) Мигдаликоподібне ядро
- Е) Сочевицеподібне ядро

14. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в кульшовому суглобі та у всіх привідних м'язах і шкірі над ними при рухах. Який нерв ушкоджено?

*** А) Затульний нерв**

- В) Клубовопаховий нерв
- С) Стегновий нерв
- Д) Латеральний шкірний нерв стегна
- Е) Задній шкірний нерв стегна

15. Хворий скаржиться на болі в ділянці діафрагми при диханні, які з'явилися після незначного ушкодження грудної клітини. Про порушення якого нерва йдеться?

*** А) Діафрагмальний нерв**

- В) Міжреберні нерви
- С) Надключичні нерви
- Д) Надлопатковий нерв
- Е) Поперечний нерв шиї

16. У хворого запальний гнійний процес шкіри першого міжпальцевого проміжку ноги. Які лімфатичні вузли є регіональними для вказаної ділянки і прореагують болем та припухлістю?

*** А) Поверхневі пахвинні**

- В) Поверхневі та глибокі пахвинні
- С) Передні великогомілкові
- Д) Задні великогомілкові та підколінні
- Е) Зовнішні клубові

17. До лікаря звернувся хворий з періодонтитом другого нижнього великого кутнього зуба зліва. При обстеженні виявлено поширення запального процесу на лімфатичні вузли. Які лімфатичні вузли втягнуті в запальний процес?

*** А) Піднижньощелепні**

- В) Привушні
- С) Лицеві
- Д) Підборідні
- Е) Бічні шийні

18. У хворой виявлена злоякісна пухлина щитоподібної залози. Які лімфатичні вузли можуть бути уражені пухлинним процесом?

*** А) Глибокі передні шийні**

- В) Бічні шийні
- С) Підборідні
- Д) Піднижньощелепні
- Е) Заглоткові

19. До ЛОР-лікаря звернулась жінка із загостренням хронічного тонзиліту (запалення піднебінних мигдаликів). При огляді виявлено збільшення та гіперемія піднебінних мигдаликів. Збільшення яких лімфатичних вузлів може спостерігатися?

*** А) Заглоткові та глибокі бічні шийні**

- В) Привушні
- С) Лицеві
- Д) Передні шийні
- Е) Потиличні

20. Після черепно-мозкової травми у хворого спостерігається втрата можливості сприйняття написаного тексту, читати (алексія). В якій ділянці кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр?

*** А) Gyrus angularis**

- В) Gyrus supramarginalis
- С) Gyrus paracentralis
- Д) Gyrus lingualis
- Е) Gyrus parahipocampalis

21. Після ЧМТ у хворого 48 років, спостерігається втрата можливості виконувати рукою точні та тонкі рухи, пов'язанні з кресленням букв, знаків та слів (аграфія). В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний за цю функцію центр (ядро)?

*** А) Задній відділ середньої лобової звивини**

- В) Задній відділ верхньої лобової звивини
- С) Лобовий полюс
- Д) Кутова звивина
- Е) Нижня тім'яна часточка

22. Після ЧМТ у хворого 39 років спостерігається втрата можливості вимовляти слова (рухова афазія). В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний за цю функцію центр ?

*** А) Задній відділ нижньої лобової звивини**

- В) Передній відділ верхньої лобової звивини
- С) Задній відділ верхньої лобової звивини
- Д) Очкочаймова частина
- Е) Лобовий полюс

23. Після ЧМТ у хворого 49 років спостерігається втрата можливості впізнавати форму об'ємних речей доторканнями (стереогнозія). В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр (ядро)?

*** А) Верхня тім'яна часточка**

- В) Нижня тім'яна часточка
- С) Надкрайова звивина
- Д) Тім'яна звивина
- Е) Кутова звивина

24. До лікаря-окуліста звернулася жінка 56 років зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено порушення процесу акомодатції кришталику. Функція якої анатомічної структури порушена у хворої? = М. ciliaris

*** А) М. sphincter pupillae**

- В) М. dilatator pupillae
- С) Lig. pectinatum iridis
- Д) Corpus vitreum

25. До лікаря-окуліста звернувся чоловік 45 років зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено діагноз: міопія. За рахунок чого у хворого виник цей стан?

*** А) Подовження внутрішньої вісі очного яблука**

- В) Зменшення внутрішньої вісі очного яблука
- С) Звужування зіниць
- Д) Розширювання зіниць
- Е) Скорочування m. ciliaris

26. До лікаря-окуліста звернулась жінка 38 років зі скаргами на погіршення зору. При обстеженні було встановлено діагноз: гіперметропія. Що стало причиною виникнення цього стану?

*** А) Зменшення внутрішньої вісі очного яблука**

- В) Скорочування m.ciliaris
- С) Звуження зіниць
- Д) Розширення зіниць
- Е) Подовження внутрішньої вісі очного яблука

27. До реанімаційного відділення поступив чоловік 45 років с обтурацією верхніх дихальних шляхів, що потребує негайного оперативного втручання в передній ділянці шиї (трахеотомія). В межах якого трикутника шиї виконується ця операція ?

*** А) Trig. omotracheale**

- В) Trig. omotrapezoideum
- С) Trig. Caroticum
- Д) Trig. omoclaviculare
- Е) Trig. submandibulare

28. В травмотологічне відділення поступив постраждалий з відкритим переломом плечової кістки, сильною кровотечею та пошкодженням судини, що проходить разом з променевим нервом у каналі на плечі. Яку судину ушкоджено?

*** A) profunda brachii**

- B) brachialis
- C) circumflexa humeri anterior
- D) circumflexa humeri posterior
- E) circumflexa scapulae

29. У больного опухоль брюшной полости, сдавливающая нижнюю полую вену. Какой кава-кавальный анастомоз на передней стенке живота обеспечит отток венозной крови?

*** A) Между верхней и нижней надчревными венами**

- B) Между непарной и полунепарной венами
- C) Между позвоночными и пупочными венами
- D) Между верхними и нижними прямокишечными венами
- E) Между пупочной и верхней надчревной венами

30. Во время удаления камня из общего желчного протока хирург может травмировать сосуды, проходящие в печеночно-двенадцатиперстной связке. Назовите эти сосуды?

*** A) Собственная печеночная артерия, воротная вена**

- B) Общая печеночная артерия, печеночные вены
- C) Печеночные вены, воротная вена
- D) Воротная вена, правая печеночная артерия
- E) Левая печеночная артерия, правая желудочная артерия

31. У больного опухоль брюшного отдела пищевода и кардиальной части желудка. Какую артерию необходимо перевязать при операции?

*** А) Левую желудочную**

В) Правую желудочную

С) Левую желудочно-сальниковую

Д) Правую желудочно-сальниковую

Е) Селезеночную

32. Вследствие полученной травмы дистальной части предплечья нарушена его пронация. Функция какой мышцы нарушена в результате травмы?

*** А) M. pronator quadratus**

В) M. pronator teres

С) M. palmaris longus

Д) M. anconeus

Е) M. flexor pollicis longus

33. Женщине нанесена глубокая поперечная рана в области передней поверхности медиального надмыщелка плечевой кости. Какой артериальный анастомоз будет повреждён при этом?

*** А) Между передней возвратной локтевой и нижней локтевой коллатеральной артериями**

В) Между лучевой и локтевой артериями

С) Между лучевой возвратной и коллатеральной лучевой артериями

Д) Между задней возвратной локтевой и верхней локтевой коллатеральной артериями

Е) Между средней коллатеральной и возвратной межкостной артериями

34. Больному произведена операция по поводу грыжи белой линии живота, локализующейся ниже пупка. Какие анатомические структуры нужно будет укрепить во время операции?

*** А) Апоневрозы всех боковых мышц живота**

- В) Наружную косую мышцу живота
- С) Внутреннюю косую мышцу живота
- Д) Поперечную мышцу живота
- Е) Прямую мышцу живота

35. После травмы на рентгенограмме пострадавшего определяется перелом плеча в области большого гребня. Функция какой мышцы будет в этом случае нарушена?

- А) Дельтовидной
- В) Малой грудной

*** С) Большой грудной**

- Д) Подключичной
- Е) Передней зубчатой

36. Хирург проводит первичную хирургическую обработку глубокой резаной раны наружной поверхности правого коленного сустава. Какую связку должен сшить врач

*** А) Lig. collaterale fibulare**

- В) Lig. collaterale tibiale
- С) Lig. popliteum obliquum
- Д) Lig. popliteum arcuatum
- Е) Lig. patellae

37. Во время операции на грудном отделе позвоночного столба хирург рассек связки, соединяющие дуги позвонков. Определите какие связки рассек хирург?

*** A) Ligg. flava**

- B) Ligg. intertransversaria
- C) Ligg. interspinalia
- D) Lig. longitudinale posterius
- E) Lig. supraspinale

38. После травмы локтевого сустава пострадавший не может производить вращение предплечья вокруг вертикальной оси. Определите, в каком суставе произошел перелом.

*** A) Проксимальном лучелоктевом**

- B) Плечелоктевом
- C) Плечелучевом
- D) Дистальном лучелоктевом
- E) -

39. Пострадавшему поставлен диагноз - перелом плечевой кости в средней трети со смещением отломков. Какая борозда плечевой кости будет повреждена?

*** A) Sulcus nervi radialis**

- B) Sulcus intertubercularis
- C) Sulcus nervi ulnaris
- D) Sulcus arteriosus
- E) Canalis nutricium

40. У больного произведена трепанация и выскабливание ячеек отростка височной кости по поводу его гнойного воспаления, перешедшего из среднего уха. На каком отростке произведено хирургическое вмешательство?

*** A) Processus mastoideus**

B) Processus zygomaticus

C) Processus styloideus

D) Processus pterygoideus

E) -

41. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на біль у грудній клітці при глибокому вдиху, підвищення температури тіла. При рентгенологічному обстеженні органів грудної клітки у нього спостерігаються ознаки ексудативного плевриту. В якому з перелічених анатомічних утворень переважним чином може накопичуватися рідина?

*** A) Recessus costodiaphragmaticus pleure**

B) Recessus costomediastinalis pleure

C) Recessus frenicomediastinalis pleure

D) Sinus transversus pericardii

E) Sinus obliquus pericardii

42. У приймальне відділення швидкої медичної допомоги доставлено 5-річного хлопчика, який під час гри проковтнув дрібну деталь іграшки. На який бронх повинна бути направлена увага лікаря для пошуку чужорідного тіла і його видалення при проведенні бронхоскопії?

*** A) Правий головний бронх**

B) Лівий головний бронх

C) Ліві часточкові бронхи

D) Праві часточкові бронхи

E) Ліві сегментарні бронхи

43. У хірургічне відділення звернувся хворий зі скаргами на стискаючий біль у грудній клітці, заруднене ковтання. Після всестороннього обстеження діагностували пухлину в нижній частині стравоходу. Хворий був госпіталізований для оперативного втручання. Яка серозна оболонка грудної порожнини може бути пошкоджена при проведенні операції у цій ділянці?

*** А) Права середостінна частина плеври**

В) Ліва середостінна частина плеври

С) Ліва реброва частина плеври

Д) Діафрагмова частина плеври

Е) Права реброва частина плеври

44. У хворого діагностували ексудативний плеврит. Виникла необхідність здійснення пункції порожнини плеври. В якій частині міжребрового простору потрібно лікарю провести голку?

*** А) В нижній частині міжребрового простору, по верхньому краю ребра**

В) Посередині міжреберного простору, на рівній віддалі від країв сусідніх ребер.

С) У задній частині міжребрового простору, по нижньому краю ребра

Д) В передній частині міжребрового простору, посередині віддалі між краями сусідніх ребер.

Е) У верхній частині міжребрового простору, по нижньому краю ребра

45. До лікаря звернувся хворий із скаргами на біль ниючого, пекучого характеру в ділянці скроні. Підвищення слиновиділення. Під час огляду спостерігається гіперемія шкіри та поява крапель поту навколо вуха. Який нерв пошкоджений?

*** А) Вушно-скроневий**

В) Носовійковий

С) Щічний

Д) Язиковий

Е) Нижньокомірковий

46. До лікаря звернувся хворий 50 років, із скаргами на пекучий біль у ділянці нижніх двох третин передньо-зовнішньої поверхні стегна, який посилюється під час ходьби та стояння. Який нерв пошкоджено?.

*** А) Бічний шкірий нерв стегна**

- В) Затульний
- С) Статено-стегновий
- Д) Стегновий
- Е) Задній шкірний нерв стегна

47. При обстеженні больового була поставлена діагноза подколенная флегмона. В анамнезі больового отримав укушенную рану в передній області верхньої третини бедра. По какому каналу инфекция распространилась в подколенную ямку?

*** А) Приводящему**

- В) Бедренному.
- С) Паховому.
- Д) Голено-подколенному.
- Е) Запирательному.

48. До лікаря звернувся хворий із скаргами на біль ниючого характеру, який спочатку виникає на вестибулярній поверхні ясен, а потім поширюється на всю передню поверхню зубів нижньої щелепи. Під час об'єктивного обстеження на щоці та вестибулярній поверхні ясен у ділянці нижніх премоларів та моларів знижені всі види чутливості. Який нерв пошкоджено?

*** А) Щічний**

- В) Носовийковий
- С) Підборідний
- Д) Язиковий
- Е) Нижньокомірковий

49. Під час огляду лікар виявив у хлопчика набряк калитки, гіперемію, пальпаторно – біль. В ході обстеження діагностовано гідроцеле, тобто скупчення серозної рідини між:

*** A) lamina parietalis et lamina visceralis tunica vaginalis testis.**

B) cutis et tunica dartos.

C) fascia spermatica externa et fascia cremasterica.

D) fascia spermatica interna et fascia cremasterica.

E) fascia spermatica externa et fascia spermatica interna.

50. Під час виконання столярних робіт у працівника була травмована ділянка анатомічної табакерки. Які функціональні порушення спостерігатимуться у даного пацієнта?

*** A) розгинання та відведення великого пальця, променеве відведення кисті.**

B) згинання та приведення великого пальця..

C) згинання та приведення великого пальця, ліктьове приведення кисті.

D) розгинання та відведення великого пальця.

E) розгинання великого пальця.

51. До травматолога звернувся чоловік із травмою плеча. При обстеженні встановлено, що порушені функції розгинання, приведення та пронації плеча. Пошкодження якого м'яза викликало такий стан?

*** A) великого круглого.**

B) підостьового.

C) малого круглого.

D) підлопаткового.

E) надостьового

52. В травматологічне відділення звернувся чоловік із різаною раною підшовової поверхні правої ступні. При огляді спостерігається обмежене піднімання латерального краю ступні. Функція якого м'яза порушена?

*** А) довгого малогомілкового.**

В) довгого м'яза – згинача великого пальця ступні.

С) триголового м'яза литки.

Д) камбалоподібного.

Е) переднього великогомілкового.

53. В хірургічне відділення доставлено пацієнта з різаною раною медіального краю передпліччя. При обстеженні виявлено, що в хворого перерізано ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка і ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка. Які з рухів пошкоджено у хворого? = приведення кисті.

*** А) згинання кисті.**

В) розгинання і відведення кисті.

С) відведення кисті.

Д) розгинання кисті.

54. Якого зміщення зазнають відламки плечової кістки у хворого із переломом її в нижній третині, враховуючи місце прикріплення круглого м'яза-привертача?

*** А) верхній відламок зміщений досередини.**

В) нижній відламок зміщений досередини.

С) верхній відламок зміщений назад.

Д) верхній відламок зміщений догори.

Е) нижній відламок зміщений назовні.

55. Хворий з ножовим пораненням верхньолатеральної ділянки плеча скаржиться на неможливість підняти руку до горизонтального рівня. Який із м'язів пошкоджено?

*** А) дельтоподібний.**

В) триголовий.

С) дзьобо-плечовий.

Д) двоголовий.

Е) плечовий.

56. У пацієнта, який постраждав в автотранспортній пригоді, було діагностовано перелом шийки стегнової кістки з ушкодженням структурних компонентів кульшового суглоба. Через певний час після проведеного лікування у хворого виявлені ознаки некрозу головки стегнової кістки. Ушкодження якого елемента суглобу могло спричинити дані зміни?

*** А) Lig. capitis femoris.**

В) Labrum acetabulare.

С) Lig. pubofemorale.

Д) Lig. pubofemorale.

Е) Суглобова капсула.

57. У підлітка віком 13 років при проведенні рентгенографічного дослідження кульшового суглобу виявлено зону просвітлення між головкою та діафізом стегнової кістки шириною 3 мм. Як, на вашу думку, потрібно розцінювати цю ситуацію?

*** А) Як норму (незавершений процес скостеніння).**

В) Як перелом шийки стегнової кістки.

С) Як тріщину шийки стегнової кістки.

Д) Як вивих головки стегнової кістки.

Е) Як артефакт на рентгенологічній плівці.

58. У хворої банальна ангіна ускладнилася заглотковим абсцесом, локалізованим в spatium retroviscerale. Куди найімовірніше може поширитися нагнійний процес у даному випадку?

*** А) В заднє середостіння.**

В) В spatium interaponeuroticum suprasternale.

С) В переднє середостіння.

Д) В spatium pretracheale.

Е) В spatium interscalenum.

59. У хворої 45 років встановлено гнійний холецистит. Якщо жовчевий міхур знаходиться в типовому положенні то, в який відділ очеревинної порожнини попаде гній під час розриву жовчного міхура.

*** А) В печінкову сумку**

В) В чепцеву сумку

С) В лівий бічний канал

Д) В верхній дванадцятипалокишковий закуток

Е) В передшлункову сумку

60. До уролога звернувся хворий 72 років із скаргами на біль у лівій нирці. При обстеженні встановлено, що це пов'язано з постічним перетисканням лівого сечовода товстим кишечником, перевантаженим каловими масами. Який відділ товстої кишки задіяний?

*** А) Сигмоподібна кишка**

В) Висхідна ободова кишка

С) Низхідна ободова кишка

Д) Поперечна ободова кишка

Е) Сліпа кишка

61. При проведенні маніпуляцій в ротовій порожнині лікар-стоматолог вводить ватний тампон в просвіт між щокою і альвеолярним відростком верхньої щелепи. Що він закриває?

*** А) Вивідний отвір протоки привушної залози**

- В) Вивідний отвір протоки піднижньощелепної залози
- С) Вивідний отвір протоки під'язикової залози
- Д) Вивідний отвір протоки щитоподібної залози
- Е) Вивідний отвір протоки загрудинної залози

62. У хворого після катетеризації сечового міхура в загальному аналізі сечі появилась велика кількість свіжих еритроцитів, що ймовірно, пов'язано з пошкодженням найвужчої частини сечовипускного каналу. Яка частина сечівника пошкоджена?

*** А) Перетинчаста частина.**

- В) Передміхурова частина.
- С) Ближча частина.
- Д) Дальша частина.
- Е) Губчаста частина.

63. Больной, 28 лет, поступил в нефрологическое отделение с диагнозом - опущение правой почки (нефроптоз). Рентген-контрастная урография подтвердила предварительный диагноз. Какое положение относительно 12 ребра в норме занимает правая почка?

*** А) 12 ребро пересекает почку в верхней трети.**

- В) 12 ребро пересекает почку в нижней трети.
- С) 12 ребро пересекает почку посередине.
- Д) 12 ребро проецируется на верхний полюс
- Е) 12 ребро проецируется на верхний полюс

64. У больного ринит, который осложнился конъюнктивитом. По какому пути скорей всего произошло распространение инфекции.

*** А) Носослезный канал**

- В) Верхняя глазная щель
- С) Нижняя глазная щель
- Д) Подглазничный канал
- Е) Резцовый канал

65. В результате ножевого ранения в область яремной вырезки грудины у пострадавшего отмечается кровотечение и возникла опасность воздушной элиболии. Какая вена скорее всего повреждена?

*** А) Передняя яремная вена.**

- В) Внутренняя яремная вена.
- С) Наружная яремная вена.
- Д) Подкишечная вена
- Е) Позвоночная вена

66. Больной с циррозом печени поступил в отделение с обильным кровотечением из вен пищевода. Нарушение оттока крови, по какой вене приводит к такому осложнению.

*** А) По воротной вене.**

- В) По верхней поллой вене.
- С) По нижней поллой вене.
- Д) По непарной вене.
- Е) По легочным венам.

67. У больного с резанной раной голени отмечается отсутствие кожной чувствительности в заднее-латеральной и заднее-медиальной областях голени, тыльной и подошвенной поверхности стопы. Укажите предполагаемое место повреждения нервных стволов.

*** А) Подколенная ямка.**

В) Под надколенником.

С) Над голеностопным суставом.

Д) Средняя треть голени спереди

Е) Нижняя треть голени сзади.

68. После перенесенного геморрагического инсульта больной перестал понимать устную речь. Где локализован патологический очаг?

*** А) Задние отделы нижней лобной извилины.**

В) Задние отделы верхней височной извилины.

С) Задние отделы средней лобной извилины.

Д) Верхняя теменная доля.

Е) Медиальная поверхность верхней височной извилины.

69. У больного, 47 лет, с опухолью головного мозга при специальном рентгенологическом исследовании выявлено расширение I-III желудочков. Укажите наиболее вероятную локализацию опухоли.

*** А) Средний мозг.**

В) Конечный мозг.

С) Продолговатый мозг.

Д) Мост.

Е) Мозжечок

70. У больного, 45 лет, при профилактическом обследовании на медиальной стенке левой подмышечной впадины обнаружен метастатический Лимфоузел. Укажите наиболее вероятную локализацию первичной опухоли.

*** А) Молочная железа.**

В) Поднижнечелюстная слюнная железа.

С) Легкое.

Д) Желудок.

Е) Щитовидная железа.

71. У тяжелоатлета при подъеме штанги произошел разрыв грудного лимфатического протока. Укажите наиболее вероятное место повреждения.

*** А) В области аортального отверстия диафрагмы.**

В) В области пояснично-крестцового сочленения.

С) В заднем средостении.

Д) В месте впадения в венозный угол.

Е) В области шеи.

72. До лікаря звернулась жінка 35 років зі скаргами на те, що після операції видалення щитоподібної залози у неї спостерігається порушення мови, хрипота. Пошкодження якого нерва під час операції могло стати причиною цього явища?

*** А) Поворотного гортанного нерва.**

В) Верхнього гортанного нерва

С) Языкового нерва.

Д) Языково-глоткового нерва.

Е) Під`язикового нерва.

73. До лікаря звернувся чоловік 58 років зі скаргами на різкий біль в м'язах задньої поверхні стегна і гомілки при рухах. Ушкодження якого нерва може бути причиною болю?

*** А) Сідничого нерва.**

- В) Нижнього сідничого нерва.
- С) Верхнього сідничого нерва.
- Д) Затульного нерва.
- Е) Стегнового нерва.

74. До лікаря звернулась жінка 45 років зі скаргами на утруднення ходіння, неможливість відвести стопу та повернути її всередину. Об'єктивно лікар констатував зниження тонусу латеральної групи м'язів гомілки. Ураження якого нерва може бути причиною цього явища?

*** А) Поверхневого малогомілкового нерва.**

- В) Глибокого малогомілкового нерва.
- С) Великомілкового нерва.
- Д) Сідничого нерва.
- Е) Стегнового нерва.

75. Хворий 40 років скаржиться на біль в задніх м'язах гомілки при згинанні стопи і при ходінні. Ураження якого нерва може бути причиною цього явища?

*** А) Великомілкового нерва.**

- В) Поверхневого малогомілкового нерва.
- С) Глибокого малогомілкового нерва.
- Д) Сідничого нерва.
- Е) Стегнового нерва.

76. Хворий 60 років скаржиться на біль в передніх м'язах гомілки, що посилюється при розгинанні стопи. Ураження якого нерва могло спричинити це явище?

*** А) Глибокого малогомілкового нерва.**

В) Поверхневого малогомілкового нерва.

С) Великогомілкового нерва.

Д) Стегнового нерва.

Е) Затульного нерва.

77. У хворої жінки 64 років лікар - невропатолог констатував відсутність чутливості шкіри тильної поверхні стопи. Чутливість збереглася лише в першому міжпальцевому проміжку та в шкірі латерального краю тила стопи і медіального краю до основи великого пальця. Який нерв уражений у хворої?

*** А) Поверхневий малогомілковий.**

В) Глибокий малогомілковий.

С) Великогомілковий.

Д) Підшкірний нерв.

Е) Затульний нерв.

78. Чоловік 65 років скаржиться на оніміння шкіри медіальної поверхні гомілки і медіального краю тила стопи. Ураження якого нерва може бути причиною цього?

*** А) Підшкірного нерва.**

В) Поверхневого малогомілкового нерва.

С) Глибокого малогомілкового нерва.

Д) Великогомілкового нерва.

Е) Затульного нерва.

79. У хворого з пухлиною лівого головного бронху з`явилися скарги на затруднення проходження їжі. Який орган при цьому може бути залучений до пухлинного процесу?

*** А) Стравохід.**

В) Трахея.

С) Головні бронхи.

Д) Загрудинна залоза.

Е) Серце.

80. Хвора жінка 62 років звернулася до лікаря зі скаргами на біль в кульшовому суглобі під час рухів, а також біль у м'язах медіальної поверхні стегна. Ураження якого нерва могло спричинити це явище?

*** А) Затульного нерва.**

В) Стегнового нерва.

С) Сідничого нерва.

Д) Статєво-стєгнового нерва.

Е) Клубово-пахвинного нерва.

81. Хворий 62 років звернувся до лікаря зі скаргами на різкий біль в шкірі задньої поверхні стегна до підколінної ямки. Ураження якого нерва могло призвести до цього?

*** А) Заднього шкірного нерва стегна.**

В) Стегнового нерва.

С) Бічного шкірного нерва стегна.

Д) Верхнього сідничного нерва.

Е) Нижнього сідничного нерва.

82. У чоловіка 68 років, що хворіє на остеохондроз, з`явилися різкі болі в м'язах живота (бічних та передніх). При об`єктивному обстеженні лікар констатував підвищену больову чутливість шкіри підчеревної ділянки. Ураження якого нерва могло спричинити ці болі?

*** А) Клубово-підчеревного нерва.**

- В) Сідничого нерва.
- С) Затульного нерва.
- Д) Стегного нерва.
- Е) Статено - стегового нерва.

83. У жінки 70 років, що хворіє на остеохондроз, з`явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів?

*** А) Пахвового нерва.**

- В) Підлопаткового нерва.
- С) Дорсального нерва лопатки.
- Д) Підключичного нерва.
- Е) Грудно-спинного нерва.

84. Медсестра вводила хворій ліки в м'язи задньої поверхні плеча. Раптом хвора відчувала сильний біль в м'язах плеча, який розповсюджувався на задню поверхню передпліччя. Який нерв було ушкоджено при введенні ліків?

*** А) Променевий нерв.**

- В) Ліктьовий нерв.
- С) Серединний нерв.
- Д) М'язово-шкірний.
- Е) Пахвовий нерв.

85. У жінки 67 років, що хворіє на остеохондроз, з`явився різкий біль в м'язах передньої поверхні плеча, який посилювався при згинанні в плечовому і ліктьовому суглобах. Об`єктивно лікар констатував також підвищену больову чутливість шкіри передньо-латеральної поверхні передпліччя. Який нерв уражений у хворої?

*** А) М`язово-шкірний.**

В) Променевий.

С) Серединний.

Д) Ліктьовий.

Е) Пахвовий.

86. Під час автокатастрофи чоловік 40 років отримав травму нижнього шийного відділу хребта, після чого у нього наступив параліч м`язів на задній поверхні плеча і передпліччя. Який нерв був травмований у нього?

*** А) Променевий нерв.**

В) Ліктьовий нерв.

С) Серединний нерв.

Д) М`язово-шкірний нерв.

Е) Пахвовий нерв.

87. В результаті перенесеного інсульту у хворого порушені рухи очного яблука, верхня повіка опущена, зіниці розширені і не реагують на світло. Ядра якого нерва постраждали у хворого?

*** А) Окорухового нерва.**

В) Блокового нерва.

С) Відвідного нерва.

Д) Лицевого нева.

Е) Трійчастого нерва.

88. При огляді хворого хірург встановив поранення середньої третини лівої нирки. Цілісність якого органу слід перевірити при цьому, беручи до уваги синтопію лівої нирки?

*** А) Підшлункової залози.**

- В) Печінки
- С) Тонкої кишки.
- Д) Шлунку
- Е) Низхідної ободової кишки.

89. На рентгенограмі нирок при пієлографії лікар виявив ниркову миску в яку безпосередньо впадали малі чашечки (великі були відсутні). Яку форму сечовивідних шляхів нирки виявив лікар?

*** А) Ембріональну**

- В) Фетальну.
- С) Зрілу.
- Д) Ампулярну.
- Е) Деревоподібну.

90. У хворого внаслідок травми лобкових кісток сталося їх зміщення в області симфіза. Функція якого внутрішнього органу при цьому може бути порушена?

*** А) Сечового міхура.**

- В) Сім`яних міхурців.
- С) Прямої кишки.
- Д) Сім`яного канатика.
- Е) Ампул сім`яиносних протоків.

91. У хворого розвинулась пухлина в області дна сечового міхура. Який орган вона може ушкодити, беручи до уваги синтопію сечового міхура?

*** А) Передміхурову залозу**

В) Ампули сім'явиносних протоків.

С) Сім'яний канатик.

Д) Пряму кишку.

Е) Сім'яні міхурці.

92. Хворому призначена катетеризація сечового міхура. В якому найбільш вузькому місці поруч із згином може бути ушкоджений сечовід при необережному введенні катетера?

*** А) Перетинчаста частина.**

В) Передміхурова частина.

С) Губчаста частина.

Д) Зовнішній отвір сечівника.

Е) Внутрішній отвір сечівника.

93. Під час пологів у жінки були травмовані м'язи сечостатевої діафрагми, після чого жінка не утримує сечу. Який м'яз при цьому постраждав?

*** А) Зовнішній м'яз-замикач сечівника.**

В) Сфінктер сечового міхура.

С) Поверхневий поперечний м'яз промежини.

Д) Глибокий поперечний м'яз промежини.

Е) Сіднично-печеристий м'яз.

94. На рентгенограмі нирок при пієлографії лікар виявив, що малі чашки впадають у 2 великі чашки, які переходять у ниркову миску, з якої починається сечовід. Яку форму сечовивідних шляхів нирки виявив лікар?

*** А) Зрілу.**

- В) Ембріональну.
- С) Дворогу.
- Д) Кістозну.
- Е) Фетальну.

95. У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурія (немає виділення сечі). Які анатомічні структури вірогідніше усього було пошкоджено при операції?

*** А) Сечоводи.**

- В) Сечівник.
- С) Зовнішній сфінктер сечівника.
- Д) Внутрішній сфінктер сечівника.
- Е) Цибулинно-губчастий м'яз.

96. При огляді хворого хірург встановив поранення верхньої третини нирки. Цілісність якого органу слід перевірити при цьому, беручи до уваги синтопію лівої нирки?

*** А) Шлунку**

- В) Печінки.
- С) Тонкої кишки.
- Д) Підшлункової залози.
- Е) Низхідної ободової кишки.

97. При огляді хворого хірург встановив поранення в області верхніх двох третин правої нирки. Цілісність якого органу слід перевірити при цьому, беручи до уваги синтопію правої нирки?

*** А) Печінки.**

- В) Підшлункової залози.
- С) Тонкої кишки.
- Д) Шлунку.
- Е) Низхідної ободової кишки.

98. У хворого при пораненні спини постраждала грудна лімфатична протока. В який відділ середостіння повинен проникнути хірург для оперативного ушивання цього органу?

*** А) Заднє середостіння**

- В) Переднє середостіння
- С) Середнє середостіння
- Д) Верхнє середостіння
- Е) Присереднє середостіння

99. У хворого при пораненні спини постраждала грудна аорта. В який відділ середостіння буде витікати кров у першу чергу?

*** А) Заднє середостіння**

- В) Переднє середостіння
- С) Середнє середостіння
- Д) Верхнє середостіння
- Е) Присереднє середостіння

100. При пораненні передньої області шиї по серединній лінії спостерігається інтенсивна кровотеча та затруднення дихання. При обстеженні встановлено, що разом з трахеєю поранено перешийок щитоподібної залози. На якому рівні, відносно трахеї, знаходиться поранення?

*** А) II-III хрящів трахеї**

В) III-IV хрящів трахеї

С) IV-V хрящів трахеї

Д) V-VI хрящів трахеї

Е) VI-VII хрящів трахеї

101. В лікарню надійшов чоловік з інфекційним ураженням області переднього середостіння. Який орган може постраждати при розповсюдженні інфекції у задньому напрямку?

*** А) Серце.**

В) Стравохід.

С) Загрудинна залоза.

Д) Трахея.

Е) Грудна аорта.

102. При операції на правій легені хірургу треба видалити нижню частку правої легені. На яку щілину слід орієнтуватися хірургу при оперативному втручанні?

*** А) Косу.**

В) Горизонтальну.

С) Поздовжню.

Д) Верхню.

Е) Нижню.

103. Лікарю-патологоанатому доставлена частина легені разом з пухлиною, яку видалив хірург. Лікар встановив, що процес охопив дихальну паренхіму та кінцеві бронхіоли. Які відзнаки допомогли виключити часточкові бронхіоли з зони ураження?

*** А) Відсутність хрящової тканини.**

В) Відсутність м'язової тканини.

С) Відсутність епітелію.

Д) Відсутність адвентиції.

Е) Відсутність жирової тканини.

104. У хворого з`явилися ознаки запалення слизової оболонки передніх та середніх комірок решітчастої кістки. Через яке утворення носової порожнини стало можливим розповсюдження інфекції?

*** А) Через середній носовий хід.**

В) Через верхній носовий хід.

С) Через нижній носовий хід.

Д) Через загальний носовий хід.

Е) Через хоани.

105. У хворого з`явилися ознаки запалення слизової оболонки задніх комірок решітчастої кістки. Через яке утворення носової порожнини стало можливим розповсюдження інфекції?

*** А) Через верхній носовий хід**

В) Через середній носовий хід.

С) Через нижній носовий хід.

Д) Через загальний носовий хід.

Е) Через хоани.

106. Під час операції у хворого порушен нерв, який інервує персне-щитоподібний м'яз. Який механізм голосоутворення при цьому постраждає?

*** А) Напруження голосової зв'язки.**

- В) Розслаблення голосової зв'язки.
- С) Розширення голосової щілини.
- Д) Звуження голосової щілини у міжперетинчастій частині.
- Е) Звуження голосової щілини у міжхрящової частині.

107. Хворий, 31 р., при переході вулиці в ожеледь упав, підкрутивши назовні ліву стопу. Доставлений у травматологічну клініку. При огляді визначається припухлість і різкий біль в ділянці бічної поверхні лівого надп'яtkово-гомількового суглоба. Про ушкодження якої кістки можна думати?

*** А) (Кісточка лівої малогомілкової кістки**

- В) Кісточка лівої великогомілкової кістки
- С) П'яtkова кістка
- Д) Надп'яtkова кістка
- Е) Човноподібна кістка

108. При обстежені чоловіка 45 років на електрокардіограмі було встановлено, що передсердя скорочуютьсч з частотою 70 ударів за хвилину, а шлуночки - 55. Яка частина провідної системи серця була порушена?

*** А) Синусно-передсердний вузол**

- В) Права ніжка передсердно-шлуночкового пучка
- С) Ліва ніжка передсердно-шлуночкового пучка
- Д) Передсердно-шлуночковий вузол
- Е) Синусно-передсердний та передсердно-шлуночковий вузли

109. Хворий, 31 р., при переході вулиці в ожеледь упав, підкрутивши ліву стопу всередину. Доставлений у травматологічну клініку. При огляді визначається припухлість і різкий біль в ділянці присередньої поверхні лівого надп'яtkово-гомілкового суглоба. Про ушкодження якої кістки можна думати?

*** А) (Кісточка лівої кістки великогомілкової**

В) Кісточка лівої малогомілкової кістки

С) П'яtkова кістка

Д) Надп'яtkова кістка

Е) Човноподібна кістка

110. Жінка 27 років при посадці в автобус ударилася правим коліном. Відзначає неможливість рухів у правому колінному суглобі, різку припухлість правої колінної області, біль при її обмацуванні. Про ушкодження якої кістки можна думати?

*** А) (Наколiнок**

В) Великомілкова кістка

С) Малоімілкова кістка

Д) Стегнова кістка

Е) Кульшова кістка

111. Хвора 80 років після падіння на праву половину грудної клітки відзначає біль при подиху й обмацуванні грудної клітки. Мається крововилив на правій половині грудної клітки. Про ушкодження яких кісток можна думати?

*** А) (Праві ребра**

В) Ліві ребра

С) Грудні хребці

Д) Груднина

Е) Ключиця

112. Хвора 80 років після падіння на ліву половину грудної клітки відзначає біль при подиху й обмацуванні грудної клітки. Мається крововилив на лівій половині грудної клітки. Про ушкодження яких кісток можна думати?

*** А) (Ліві ребра**

- В) Праві ребра
- С) Грудні хребці
- Д) Груднина
- Е) Ключиця

113. Хворий скаржиться на біль зліва від хребта, що виникає при його розгинанні та нахлонах вліво. Який м'яз вражений?

*** А) (М'яз - випрямляч хребта**

- В) Найширший м'яз спини
- С) Клубово-реберний м'яз
- Д) Остьовий м'яз
- Е) Найдовший м'яз

114. У хворого при обертанні тулубу вправо з'являється біль у правій бічній ділянці живота. Який м'яз вражений?

*** А) (Внутрішній косий м'яз живота**

- В) Зовнішній косий м'яз живота
- С) Поперечний м'яз живота
- Д) Прямий м'яз живота
- Е) Пірамідний м'яз

115. У хворого при обертанні тулубу вправо з'являється біль у лівій бічній ділянці живота. Який м'яз вражений?

*** А) (Зовнішній косий м'яз живота**

- В) Внутрішній косий м'яз живота
- С) Поперечний м'яз живота
- Д) Прямий м'яз живота
- Е) Пірамідний м'яз

116. Хворий поступив до хірургічного відділення з різаною раною на присередньому краї передпліччя. При операції визначено, що перерізані два м'язи - ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка та ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка. Які рухи не може виконувати хворий?

*** А) (Приведення кисті**

- В) Згинання кисті
- С) Розгинання кисті
- Д) Відведення кисті
- Е) Супінацію

117. Хворий поступив до хірургічного відділення з різаною раною на присередньому краї передпліччя. При операції визначено, що перерізані три м'язи - променевий м'яз-згинач зап'ястка та променеві м'язи-розгиначі зап'ястка. Які рухи не може виконувати хворий?

*** А) (Відведення кисті**

- В) Згинання кисті
- С) Розгинання кисті
- Д) Приведення кисті
- Е) Супінацію

118. Хворий доставлений в хірургичне відділення з різаною раною передньої поверхні плеча у нижній третині. В нього порушена функція сгинання в плечовому і ліктьовому суглобах. Про ушкодження якого м'яза у нього можна думати?

- * А) (Двоголовий м'яз плеча**
- В) Трьохголовий м'яз плеча
- С) Ліктьовий м'яз
- Д) Плечевий м'яз
- Е) Дзьобоподібно-плечевий м'яз

119. У хворого глибока різана рана на задній поверхні плеча в середній його третині. Про ушкодження якого м'яза у нього можна думати?

- * А) (Трьохголовий м'яз плеча**
- В) Двоголовий м'яз плеча
- С) Ліктьовий м'яз
- Д) Плечевий м'яз
- Е) Дзьобоподібно-плечевий м'яз

120. В автокатастрофі у хворого пошкоджено дельтоподібний м'яз. Який рух у плечовому суглобі в нього буде порушений?

- * А) (Відведення**
- В) Згинання
- С) Розгинання
- Д) Приведення
- Е) Обертання

121. У хворого різана рана в ділянці підостьової ямки. Який рух плечевого суглоба у нього буде порушений?

*** А) (Обертання назовні**

- В) Згинання
- С) Розгинання
- Д) Приведення
- Е) Відведення

122. У жінки 42 років, хворої на злоякісну пухлину молочної залози, лікар виявив збільшення регіонарних лімфатичних вузлів. Яка група вузлів підлягає ураженню при даній патології в першу чергу ?

*** А) Пахвові вузли;**

- В) Шийні вузли;
- С) Діафрагмальні вузли;
- Д) Пахвинні вузли
- Е) Ліктьові вузли;

123. У дитини 4 років при обстеженні виявлено одутловатість обличчя, розширення вен верхньої частини тулуба, на рентгенограмі - збільшення тіні органів середостіння. Ураження якого органу імуногенезу призвело до виникнення клінічних проявів захворювання ?

*** А) Тимус;**

- В) Кістковий мозок груднини;
- С) Задні середостінні лімфатичні вузли;
- Д) Передні середостінні лімфатичні вузли;
- Е) Діафрагмальні лімфатичні вузли;

124. У дитини 10 років при обстеженні виявлена наявність на правій кисті пошкоджень шкіри у вигляді смуг завдовжки 2-3 см та збільшення лімфатичних вузлів. Встановлено діагноз: Хвороба кошачих подряпин. Яка група лімфатичних вузлів реагує при даній патології в першу чергу ?

*** А) Ліктьові вузли;**

- В) Шийні вузли;
- С) Попідборідні вузли;
- Д) Діафрагмальні вузли;
- Е) Бронхопульмональні вузли;

125. Інфекційний мононуклеоз, виявлений у чоловіка 27 років, супроводжується симптомами апендициту, що пов'язано зі збільшенням лімфатичних вузлів черевної порожнини. Вкажіть групу лімфатичних вузлів, ураження якої призвело до виникнення больового синдрому.

*** А) Клубово-ободові вузли;**

- В) Сигмоподібні вузли;
- С) Ліві ободові вузли;
- Д) Ліві поперекові вузли;
- Е) Нижні діафрагмові вузли;

126. На рентгенограмі грудної порожнини хворого виявлене збільшення лімфатичних вузлів, розташованих нижче біфуркації трахеї. Вкажіть групу збільшених лімфатичних вузлів.

*** А) Нижні трахеобронхіальні вузли;**

- В) Верхні трахеобронхіальні вузли
- С) Бронхо-легеневі вузли;
- Д) Міжаорто-стравохідні вузли
- Е) Біляаортальні вузли;

127. Для з'ясування типу лейкоза хворому показане дослідження кісткового мозку. Пункцію якої кістки повинен виконати лікар ?

*** А) Груднина;**

- В) Діафіз плечової кістки;
- С) Діафіз стегнової кістки;
- Д) I шийний хребець;
- Е) Головка III ребра;

128. У хворого при визначенні меж серця знайдено розширення лівого кордону, що свідчить про гіпертрофію лівого шлуночка. Звуження якого отвору серця могло призвести до цього?

*** А) Отвору аорти**

- В) Отвору легеневого стовбура
- С) Лівого передсердно-шлуночкового
- Д) Правого передсердно-шлуночкового отвору
- Е) Отвору верхньої порожнистої вени

129. У хворого при визначенні меж серця знайдено розширення правого кордону. Звуження якого отвору серця могло призвести до цього?

*** А) Отвору легеневого стовбура**

- В) Отвору аорти
- С) Лівого передсердно-шлуночкового
- Д) Правого передсердно-шлуночкового отвору
- Е) Отвору верхньої порожнистої вени

130. До педіатра звернулась жінка зі скаргами на підвищену втомленість своєї 3 річної дитини та синюшність носо-губного трикутника, При обстеженні дитини виявилось неповне зарощення міжшлуночкової перетинки, звуження легеневого стовбура, а також збільшення правого шлуночка. Як називається така вада розвитку?

*** А) Тріада Фалло**

- В) Декстрапозиція аорти
- С) Декстрапозиція легеневого стовбура
- Д) Незрощення боталлова протока
- Е) Тетрада Фалло

131. У чоловіка 45 років після нервового збудження виник різкий біль у ділянці серця. Швидка допомога привезла хворого до лікарні. При обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда задньої стінки лівого шлуночка. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?

*** А) Правій вінцевій артерії**

- В) Лівій вінцевій артерії
- С) Огинаючій гілки лівої вінцевої артерії
- Д) Передній міжшлуночковій гілки лівої вінцевої артерії
- Е) Правій та лівій вінцевих артеріях

132. У чоловіка 45 років після нервового збудження виник різкий біль у ділянці серця. Швидка допомога привезла хворого до лікарні. При обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?

*** А) Лівій вінцевій артерії**

- В) Правій вінцевій артерії
- С) Огинаючій гілки лівої вінцевої артерії
- Д) Передній міжшлуночковій гілки лівої вінцевої артерії
- Е) Правій та лівій вінцевих артеріях

133. У чоловіка 45 років після нервового збудження виник різкий біль у ділянці серця. Швидка допомога привезла хворого до лікарні. При обстеженні виявлено порушення роботи вузлів провідної системи серця. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?

*** А) Правій вінцевій артерії**

- В) Лівій вінцевій артерії
- С) Огибаючій гілки лівої вінцевої артерії
- Д) Передній міжшлуночковій гілки лівої вінцевої артерії
- Е) Правій та лівій вінцевих артеріях

134. У чоловіка 45 років після нервового збудження виник різкий біль у ділянці серця. Швидка допомога привезла хворого до лікарні. При обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда правого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?

*** А) Правій вінцевій артерії**

- В) Лівій вінцевій артерії
- С) Огибаючій гілки лівої вінцевої артерії
- Д) Передній міжшлуночковій гілки лівої вінцевої артерії
- Е) Правій та лівій вінцевих артеріях

135. У чоловіка 45 років після нервового збудження виник різкий біль у ділянці серця. Швидка допомога привезла хворого до лікарні. При обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда передньої стінки правого шлуночка. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?

*** А) Лівій вінцевій артерії**

- В) Правій вінцевій артерії
- С) Огибаючій гілки лівої вінцевої артерії
- Д) Передній міжшлуночковій гілки лівої вінцевої артерії
- Е) Правій та лівій вінцевих артеріях

136. Підчас хірургічної операції на привушній слинній залозі у хворого почалась кровотеча. Порушення якої з артерій, топографічно пов(язаної з цією залозою, може викликати цю кровотечу?

*** А) Поверхневої скроневої**

- В) Висхідної глоткової
- С) Верхньощелепної
- Д) Лицевої
- Е) Задньої вушної

137. Підчас хірургічної операції на під(язиковій слинній залозі у хворого почалась кровотеча. Порушення якої з артерій, топографічно пов(язаної з цією залозою, може викликати цю кровотечу?

*** А) Язикової**

- В) Верхньої щитоподібної
- С) Верхньощелепної
- Д) Лицевої
- Е) Задньої вушної

138. Підчас хірургічної операції на піднижньощелепній слинній залозі у хворого почалась кровотеча. Порушення якої з артерій, топографічно пов(язаної з цією залозою, може викликати цю кровотечу?

*** А) Лицевої**

- В) Висхідної глоткової
- С) Верхньощелепної
- Д) Поверхневої скроневої
- Е) Задньої вушної

139. При черговому медичному обстеженні у жінки 35 років виявлена недостатність клапану аорти. У якій камері серця впершу чергу буде підвищений кров(яний тиск?

- * А) Лівому шлуночку**
- В) Правому шлуночку
- С) Лівому передсерді
- Д) Правому передсерді
- Е) В усіх камерах серця

140. При черговому медичному обстеженні у жінки 35 років виявлена недостатність клапану легеневого стовбура. У якій камері серця впершу чергу буде підвищений кров(яний тиск?

- * А) Правому шлуночку**
- В) Лівому шлуночку
- С) Лівому передсерді
- Д) Правому передсерді
- Е) В усіх камерах серця

141. У пацієнта на основі електрокардіографії виявлено, що правий шлуночок отримує імпульси дещо пізніше лівого. Про ураження якої частини провідної системи серця можна думати в такому випадку?

- * А) Правої ніжки Гіса**
- В) Синоатріального вузла
- С) Синоатріального пучка
- Д) Лівої ніжки Гіса
- Е) Атріовентрикулярного вузла

142. У пацієнта на основі електрокардіографії виявлено, що передсердя отримують імпульси з частотою 60-80 на хвилину, а шлуночки - 30-40. Про ураження якої частини провідної системи серця можна думати в такому випадку?

*** А) Синоатріального пучка**

- В) Лівої ніжки Гіса
- С) Правої ніжки Гіса
- Д) Атріовентрикулярного вузла
- Е) Синоатріального вузла

143. При обстеженні хворого виявлено, що верхівковий поштовх зміщений на 3,5 см вліво від лівої середньоключичної лінії. Які камери серця при цьому гіпертрофовані (збільшені)?

*** А) Лівий шлуночок**

- В) Правий шлуночок
- С) Праве передсердя
- Д) Ліве передсердя
- Е) Всі камери серця

144. У пацієнта при аускультатії серця прослуховується патологічний шум у місці верхівкового поштовху. Про ураження якого клапану можна думати?

*** А) Мітрального**

- В) Тристулкового
- С) Аортального
- Д) Легеневого
- Е) Патологічні шуми клапанів у цьому міжреберному проміжку не прослуховуються

145. У пацієнта при аускультації серця прослуховується патологічний шум у кінці грудини. Про ураження якого клапану можна думати?

*** А) Тристулкового**

В) Мітрального

С) Аортального

Д) Легеневого

Е) Патологічні шуми клапанів у цьому міжреберному проміжку не прослуховуються

146. У пацієнта при аускультації серця прослуховується патологічний шум у другому міжребер(ї зліва від грудини. Про ураження якого клапану можна думати?

*** А) Аортального**

В) Мітрального

С) Тристулкового

Д) Легеневого

Е) Патологічні шуми клапанів у цьому міжреберному проміжку не прослуховуються

147. У пацієнта при аускультації серця прослуховується патологічний шум у другому міжребер(ї справа від грудини. Про ураження якого клапану можна думати?

*** А) Аортального**

В) Легеневого

С) Мітрального

Д) Тристулкового

Е) Патологічні шуми клапанів у цьому міжреберному проміжку не прослуховуються

148. У хворого діагностовано ураження стулок правого передсердно-шлуночкового клапана. В результаті запального процесу якої анатомічної структури серця відбулись зміни стулок?

*** А) Ендокарду**

- В) Фіброзного перикарду
- С) Серозного перикарду
- Д) Міокарду
- Е) Епікарду

149. У хворого відсутня чутливість слизової оболонці щоки. Який нерв ушкоджено?

*** А) Щічний нерв нижньощелепного нерва**

- В) Жувальний нерв нижньощелепного нерва
- С) Язиковий нерв нижньощелепного нерва
- Д) Верхньощелепний нерв трійчастого нерва
- Е) Виличний нерв верхньощелепного нерва

150. У пацієнта виявлено інфаркт передньої стінки лівого шлуночка, передніх 2/3 міжшлуночкової перегородки та верхівки серця. Яка при цьому судина є найбільш ймовірно уражена патологічним процесом?

*** А) Передня міжшлуночкова гілка**

- В) Задня міжшлуночкова гілка
- С) Огинальна гілка
- Д) Права вінцева артерія
- Е) Ліва вінцева артерія

151. Після перенесеного звиху правого кульшового суглобу у пацієнта спостерігається асептичний некроз головки стегнової кістки. При пошкодженні якої зв'язки можливе дане ускладнення?

*** А) Зв'язки головки стегна**

- В) Клубово-стегнової зв'язки
- С) Сідничо-клубової зв'язки
- Д) Лобково-стегнової зв'язки
- Е) Поперечної зв'язки кульшової западини

152. У хворого після перелому променевої кістки розвинувся травматичний неврит, що проявляється стійким набряком кисті, обмеженням рухів у пальцях (згинання), парестезією, підвищеною пітливістю. Ураження якого нерва спостерігається при даній патології?

*** А) Серединного**

- В) Променевого
- С) Ліктьового
- Д) Пахвового
- Е) Переднього міжкісткового

153. У пацієнта діагностовано перелом ключиці зі зміщенням уламків. Положення периферичного уламка вперед і донизу. Дією яких м'язів зумовлене дане зміщення?

*** А) Дельтоподібного і великого грудного м'язів**

- В) Підключичного м'язу
- С) Малого грудного м'язу
- Д) Трапецієвидного м'язу
- Е) Грудинноключичнососцевидного м'язу

154. Мати хлопчика 4 років, звернулася до лікаря із скаргами на утруднене носове дихання її дитини. При обстеженні - гіпертрофія мигдалика, що і утруднює проходження повітря із носової порожнини до глотки. Який саме мигдалик гіпертрофовано?

*** А) Глотковий**

В) Носовий

С) Піднебінний

Д) Трубний

Е) Язичний

155. Юнаку 16 років зроблена рентгенограма плеча. В нижній третині плечової кістки видно поперечну щілину, що не є переломом. Ця щілина являється

А) Синдесмозом

*** В) Синхондрозом**

С) Синостозом

Д) Геміартрозом

Е) Діартрозом

156. З діагностичною ціллю хворому потрібно провести плевральну пункцію. По якому краю ребра потрібно робити цю маніпуляцію?

*** А) По верхньому краю**

В) По нижньому краю

С) По зовнішній поверхні

Д) По внутрішній поверхні

Е) По передньому кінцю

157. До “швидкої допомоги” звернувся батько дитини, що вдихнула сторонній предмет. Куди, ймовірноше всього, потрапив цей предмет?

*** А) Правий головний бронх**

- В) Лівий головний бронх.
- С) Гортань
- Д) Трахея
- Е) Стравохід

158. Чоловіка 45 років госпіталізовано з діагнозом плеврит. Для видалення гною із плевральної порожнини йому призначено плевральну пункцію. В якому синусі плевральної порожнини буде накопичуватися гній?

*** А) Реброво-діафрагмальний**

- В) Реброво-медіастінальний
- С) Діафрагмально-медіастінальний
- Д) Ребровий
- Е) Медіастінальний

159. Чоловік 45 років госпіталізований з діагнозом гломерулонефрит. В аналізі сечі виявлені формені елементи крові. Яка частина нефрона дістала ушкодження?

*** А) Ниркове тільце**

- В) Проксимальний звивистий каналець
- С) Проксимальний прямий каналець
- Д) Дистальний звивистий каналець
- Е) Дистальний прямий канадець

160. Чоловік 55 років госпіталізований з діагнозом паранефрит. Запалення якої оболонки нирки буде при цьому?

*** А) Жирова**

В) Фіброзна

С) Серозна

Д) Слизова

Е) М'язова

161. Чоловік 70 років, звернувся до лікарні зі скаргами на утруднене сечовиділення. Після обстеження встановлено діагноз - рак передміхурової залози. Яка частина сечового міхура також постраждала при цьому?

*** А) Шийка**

В) Тіло

С) Верхівка

Д) Дно

Е) Склепіння

162. У чоловіка з'явився біль, набряк та почервоніння шкіри у передньо-верхній частині стегна та великого пальця стопи. Які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували на запальний процес ?

*** А) поверхневі пахвинні**

В) глибокі пахвинні

С) внутрішні повздожні

Д) поверхневі повздожні

Е) загальні повздожні

163. Хворий скаржиться на постійну припухлість і біль нижньощелепних лімфатичних вузлів. Які утворення лімфатичних вузлів є причиною цього явища ?

*** А) фолікули лімфатичних вузлів**

В) оболонка лімфатичних вузлів

С) мозкова речовина лімфатичних вузлів

Д) ретикулярна строма лімфатичних вузлів

Е) крайові піхви лімфатичних вузлів

164. У хворого 40 років після травми голови виявлено крововилив у ділянці медіальної поверхні верхньої лобової звивини ті поясної звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться ?

*** А) Передньої мозкової артерії**

В) середньої мозкової артерії

С) основної артерії

Д) задньої мозкової артерії

Е) передньої сполучної артерії

165. Жінка скаржиться на відсутність чутливості шкіри задньої стінки зовнішнього слухового ходу. Ушкодження гілки якого нерва призвело до втрати чутливості?

*** А) r. auricularis n. vagus**

В) n. auriculotemporales anteriores n. trigeminus

С) n. auricularis magnus plexus cervicalis

Д) n. auricularis posterior n. facialis

166. Хворий не відчуває дотику до шкіри в ділянці передньої поверхні плеча до ліктьового суглоба після травми. Запалення якого нерва спостерігається у хворого ?

Шкірно присереднього нерва плеча

Шкірно приесереднього нерва перепліччя

Променевого нерва

Ліктьового нерва

Пахового нерва

*** A) Empty answer**

167. До лікаря звернувся хворий зі скаргою на утруднення щільного змикання щелеп при жуванні. Лікар установив атрофію жувальних м'язів, розташованих нижче виличної дуги. Гілки якого черепного нерва іннервують зазначену групу м'язів?

*** A) A =III-ї гілки трійчастого нерва**

B) II-ї гілки трійчастого нерва

C) Рухові гілки VII пари

D) I-ї гілки трійчастого нерва

E) Під'язикового нерва

168. У хворого опущене праве плече, права лопатка своїм нижнім кутом відведена від хребета назовні й вгору. Ушкодження якого нерва обумовлює таку клінічну картину?

*** A) A =Додаткового правого**

B) Підлопаткового правого

C) Пахового правого

D) Променевого правого

E) Надлопаткового правого

169. Унаслідок внутрішньомозкового крововиливу в хворої мова стала невиразної. Звукоутворення гортані й рухи нижньої щелепи збереглися. Ядра якого черепного нерва постраждали?

*** A) A= n. hypoglossus**

B) n. glossopharyngeus

C) n. Vagus

D) n. facialis

E) n. trigeminus

170. У хворої параліч мимічної мускулатури, розлад сприйняття смаку в ділянці передніх 2/3 язика, зменшення слиновиділення. Який з черепних нервів уражений?

*** A) n. facialis**

B) n. glossopharyngeus

C) n. hypoglossus

D) n. trigeminus

E) n. vagus

171. У чоловіка 25 років після черепно-мозкової травми виникла правобічна косоокість, що сходиться. Пошкодження якого черепно-мозкового нерва привело до таких наслідків?

*** A) n. abducens**

B) n. facialis

C) n. trigeminus

D) n. trochlearis

E) n. oculomotorius

172. У дитини 7 років запалення середнього вуха (отит) ускладнилося мастоїдитом. Через отвір у якій зі стінок барабанної порожнини запалення перейшло в соскоподібну печеру?

*** А) Задній**

- В) Нижній
- С) Верхній
- Д) Передній
- Е) Медіальний

173. У хворого 20 років у результаті баротравми ушкоджена барабанна перетинка у верхньому відділі. Яка частина барабанної перетинки ушкоджена?

*** А) Не натягнута**

- В) Натягнута
- С) Пупок
- Д) Увігнута
- Е) Опукла

174. У дитини 22 місяців є 18 зубів. Поява яких зубів слід очікувати найближчим часом?

*** А) 2-х молярів на верхній щелепі**

- В) 2-х молярів на нижній щелепі
- С) Іклів на верхній щелепі
- Д) Іклів на нижній щелепі
- Е) Латеральних різців на нижній щелепі

175. При обстеженні хворого нижня границя правої легені по linea axillaris media визначена на рівні VI ребра. Як зміщена ця границя?

*** А) на 2 ребра вгору**

В) на 1 ребро вгору

С) на 2 ребра вниз

Д) на 1 ребро вниз

Е) не зміщена

176. При обстеженні хворого нижня границя правої легені по linea scapularis визначена на рівні VII ребра. Як зміщена ця границя?

*** А) на 3 ребра вгору**

В) На 2 ребра вгору

С) На 1 ребро вгору

Д) на 2 ребра вниз

Е) на 1 ребро вниз

177. При проникаючому пораненні передньої черевної стінки раневий канал пройшов над малою кривиною шлунка. Яке утворення очеревини найімовірніше пошкоджене?

*** А) Ligamentum hepatogastricum**

В) Ligamentum gastrocolicum

С) Ligamentum hepatoduododenale

Д) Ligamentum hepatorenale

Е) Ligamentum triangulare sinistrum

178. У постраждалого в результаті травми медіального надвиростка плечової кістки сталося пошкодження ліктьового нерва. Функція якого з названих м'язів порушена?

*** A) M.opponens digiti minimi**

B) M.flexor carpi radialis

C) M.pronator teres

D) M.extensor digiti minimi

E) M. palmaris longus

179. У хворого на гепатит /запалення печінки/, що супроводжується збільшенням її об'єму й розтягненням фіброзної капсули, виявлено біль при натисканні на пупок. Яке утворення забезпечує виникнення цього симптому?

*** A) Ligamentum teres hepatis.**

B) Ligamentum venosum.

C) Ligamentum triangulare dextrum.

D) Ligamentum falciforme.

E) Ligamentum coronarium.

180. Больной 50 лет поступил в нефрологическое отделение с жалобами на боли в животе и поясничной области, гипертензией, мочевым синдромом, резко положительным симптомом Пастернацкого. Объективными методами исследования поставлен диагноз: тромбоз почечного сосуда, что подтверждено появлением систолического шума над брюшной аортой на уровне проекции отхождения главных почечных сосудов. На уровне какого поясничного позвонка выслушивается систолический шум?

*** A) Поясничный позвонок.**

B) XII грудной позвонок

C) III поясничный позвонок

D) IV поясничный позвонок

E) I поясничный позвонок

181. У больного 40 лет - стеноз аорты (сужение ostium аорты). Объективно: бледность кожи, цианоз, в области сердца - сердечный горб , видна пульсация левого желудочка в V -VI межреберье, левая граница сердца смещена влево. Основной признак стеноза аорты - грубый, интенсивный, скребущий систолический шум. Где лучше всего прослушивается этот шум?

*** А) II межреберье справа у грудины**

В) III межреберье слева у грудины

С) III ребро у грудины слева

Д) У мечевидного отростка

Е) Над яремной вырезкой

182. Больной, 35 лет, поступил в стационар с резко выраженным синдромом брюшной жабы (резкой болью в животе без определённой локализации, труднопереносимой, устойчивой к воздействию анальгетиков. При Ro-графии обнаружена паралетическая непроходимость кишечника, при аорто-артериографии - обнаружен тромб в месте отхождения от брюшной аорты а. mesenterica sup. На уровне какого позвонка обнаружен тромб?

*** А) I поясничного позвонка**

В) II поясничного позвонка

С) III поясничного позвонка

Д) XII грудного позвонка

Е) IV поясничного позвонка

183. У больного, 50 лет, опухоль поджелудочной железы. При хирургическом вмешательстве доступ проведен посредством вскрытия lig. gasf -colicum. При этом случайно травмирован сосуд, проходящий в данной связке. Кровотечение из каких сосудов был вынужден останавливать хирург?

*** A) a. gastroomentalis dexter**

- B) a. gastrica dexter
- C) a. gastrica sinister
- D) a. gastro - duodenalis
- E) a. pancreatico-duodenalis sup.

184. У хворого 40 років при Ro-дослідженні виявлено затемнення в ділянці пазухи твердої мозкової оболони, яка проходить від півнячого гребня решітчастої кістки до внутрішнього потиличного виступу потиличної кістки. В ділянці якої пазухи виявлені патологічні зміни?

*** A) Sinus sagittalis superior**

- B) Sinus sagittalis inferior
- C) Sinus transversus
- D) Sinus rectus
- E) Sinus sigmoideus

185. Під час виконання фізичних вправ (підтягування на перекладині) у 12 річного учня раптово виник біль в ділянці плечового суглоба. Травматолог виявив пошкодження сухожилка одного з м'язів, який розгинає плечо. Який це м'яз?

*** A) Найширший м'яз спини**

- B) Трапецієподібний м'яз
- C) М'яз-підіймач лопатки
- D) Великий грудний м'яз
- E) Двоголовий м'яз плеча

186. У хворого, 40 років, доставленого в травматологічне відділення, виявлено поранення правої кисті на долонній поверхні. При обстеженні травмований самостійно не може звести розведенні II, IV,V пальці. Які м'язи пошкоджені?

*** А) Долонні міжкісткові м'язи**

В) Тильні міжкісткові м'язи

С) Червоподібні м'язи

Д) Короткий долонний м'яз

Е) Довгий долонний м'яз

187. Невропатолог виявив, що у хворого втрачена чутливість присередньої ділянки долонної поверхні шкіри кисті та долонної поверхні V і половини IV пальців. З яким нервом пов'язане це порушення?

*** А) N. ulnari.**

В) N. radialis.

С) N. mediani.

Д) N. interosseo antebrachii anteriore.

Е) N. interosseo antebrachii posteriore.

188. Невропатолог виявив, що у хворого втрачена чутливість шкіри бічної поверхні стопи і V-того пальця. Який із перелічених нервів іннервує цю ділянку стопи? Це:

*** А) N. suralis.**

В) N. saphenus.

С) N. fibularis (peroneus) superficialis.

Д) N. fibularis (peroneus) profundus.

Е) N. cutaneus surae lateralis.

189. Лікар виявив у потерпілого розрив передньої схрещеної зв'язки колінного суглоба. Яка артерія розгалужується в схрещених зв'язках? Це:

*** A) media genus.**

B) superior medialis genus.

C) superior lateralis genus.

D) descendens genus.

E) inferior medialis genus.

190. Хворому було поставлено діагноз: "Гнойний отит". Через яку стінку найчастіше проникає інфекція до барабанної порожнини?

*** A) Paries caroticus**

B) Paries jugularis

C) Paries labyrinthicus

D) Paries mastoideus

E) Paries tegmentalis

191. У хворого парастезії в ділянки шкіри задньої частини вушної раковини та задньої стінки зовнішнього слухового проходу. Який нерв ушкоджено?

*** A) Вушна гілка блукаючого нерва**

B) Верхньощепленного нерва

C) Виличний нерв верхньощепленного нерва

D) Великий вушний нерв (шийне сплетення)

E) Передні вушні нерви вушно- скроневого нерву