

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Фармакологія - база тестів 2012 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2012 року**

Кількість запитань: **215**

1. В психіатричну клініку доставлений хворий 40 років у стані збудження, агресії, марення. Який препарат слід ввести хворому?

*** А) Аміназин.**

В) Амітриптилін

С) Настойку валеріани.

Д) Резерпін.

Е) Натрію бромід.

2. Хворому проведено апендектомію. Для хіміопрофілактики анаеробних ускладнень в післяопераційний період першочергово доцільно призначити:

*** А) Метронідазол**

В) Цефатоксим

С) Тетрациклін

Д) Ампіокс

Е) Бісептол

3. Чоловіку 70 років, який страждає на хронічний бронхіт, призначений протикашльовий препарат-гладцин. Який механізм забезпечує гальмування кашльового центру?

*** А) Центральний.**

В) Рефлекторний .

С) Конкурентний.

Д) Місцева дія.

Е) Периферична дія.

4. У хворого із сечокам'яною хворобою виникли нестерпні спастичні болі. Для попередження больового шоку йому ввели разом з атропіном наркотичний анальгетик, що не має спазмогенного ефекту. Який це був препарат?

*** А) Промедол**

- В) Трамадол
- С) Пірітрамід
- Д) Етилморфіну гідрохлорид
- Е) Морфіну гідрохлорид

5. Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?

*** А) Стимулює alpha -адренорецептори**

- В) Стимулює beta -адренорецептори
- С) Блокує alpha -адренорецептори
- Д) Блокує beta -адренорецептори
- Е) Стимулює alpha - beta -адренорецептори

6. Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?

*** А) Блокада адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС**

- В) Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС
- С) Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС
- Д) Блокада холінергічних процесів в ЦНС
- Е) Інгібування зворотнього нейронального захоплення МАО.

7. У чоловіка 52 років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечника, печінки, легень. Який препарат слід призначити?

*** А) Метронідазол**

- В) Хініофон
- С) Тетрациклін
- Д) Хінгамін
- Е) Ентеросептол

8. Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено?

*** А) Лідокаїн**

- В) Анестезин
- С) Верапаміл
- Д) Панангін
- Е) Анаприлін

9. Після лікування високоефективним протитуберкульозним засобом у жінки 40 років виникли явища невриту зорового нерва, порушення пам'яті, судоми. Який препарат приймала хвора?

*** А) Ізоніазид**

- В) Рифампіцин
- С) ПАСК
- Д) Тіоацетазон
- Е) Канаміцин

10. Дитині 13 років хворій на ангіну призначено комбінований сульфаніламідний препарат бактерицидного типу дії. Який препарат призначено?

*** А) Бісептол**

В) Ентеросептол

С) Сульфален

Д) Етазол

Е) Уросульфан

11. Хворий 60 років з діагнозом ревматоїдний поліартрит тривалий час застосовує нестероїдний протизапальний засіб діклофенак-натрій. Який механізм дії цього препарату?

*** А) Блокада ферменту циклооксигенази**

В) Блокада ферменту ацетилхолінестерази

С) Блокада ферменту фосфоліпази

Д) Блокада ферменту ліпооксигенази

Е) Блокада ферменту фосфодіестерази

12. Для проведення оперативного втручання необхідно використати метод загального охолодження. При застосуванні якого препарату у комбінації з фізичним охолодженням спостерігається виразна гіпотермія?

*** А) Аміназин**

В) Ацетилсаліцилова кислота

С) Морфін

Д) Дроперидол

Е) Галоперидол

13. До лікаря звернувся пацієнт з проханням замінити відсутній на даний момент в аптеці бронхолітик ізадрин на найбільш близький за дією препарат. Який з наведених нижче засобів можна рекомендувати хворому?

*** А) Сальбутамол**

- В) Еуфілін
- С) Адреналіну гідрохлорид
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Ефедрину гідрохлорид

14. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу бронхіальної астми. Як супутнє захворювання діагностовано гіпертонічну хворобу. Який з наведених препаратів протипоказаний у даному випадку?

*** А) Анаприлін**

- В) Папаверину гідрохлорид
- С) Атропіну сульфат
- Д) Сальбутамол
- Е) Ефедрину гідрохлорид

15. У інфікованого на СНІД виникла діарея бактеріального генезу. За результатами мікробіологічного дослідження йому був призначений ко-тримоксазол (бісептол, бактрим). Яким типом (характером) протимікробної дії володіє цей препарат?

*** А) Бактерицидним**

- В) Бактеріостатичним
- С) Фунгіцидним
- Д) Фунгістатичним
- Е) Вірулостатичним

16. У вагітної виник гострий трахеобронхіт. Для лікування цієї інфекції був призначений антибіотик з групи пеніцилінів. Визначте, який з наведених антибактеріальних засобів призначено вагітній хворій.

*** А) Амоксицилін**

- В) Гентаміцин
- С) Стрептоміцин
- Д) Тетрациклін
- Е) Фурацилін

17. Хворий на пневмонію отримує бензилпеніциліну натрієву сіль в дозі 500 000 ОД 6 разів на день. Після чергового введення лікарського засобу виникла пропасниця, втрата свідомості, судоми. Що розвинулось у хворого?

*** А) Анафілактичний шок**

- В) Ідіосинкразія
- С) Тахіфілаксія
- Д) Кумуляція
- Е) Толерантність

18. Хворому з тромбоемболією вен нижніх кінцівок призначено медикаментозне лікування. Через 2 доби на шкірі з'явились геморагії. Який препарат із нижчезгаданих викликає подібне ускладнення?

*** А) Гепарін**

- В) Курантіл
- С) Ацетилсаліцилова кислота
- Д) Неодікумарін
- Е) Фенілін

19. В дитини спостерігаються залишкові явища перенесеного поліомієліту. Який лікарський засіб йому можна призначити?

*** А) Галантаміна гідробромід**

- В) Пентамін
- С) Дімеколін
- Д) Атропіна сульфат
- Е) Пірроксан

20. До приймального відділення лікарні надійшла дитина 5 років у якої лікарем встановлені такі симптоми: сильне рухове збудження, марення, хриплий голос, розширені зіниці, які не реагують на світло, суху, гарячу, гіперемовану шкіру, тахікардію, тахіпное. Вказані симптоми виникли після споживання дитиною ягід красавки. Препарат якої з представлених фармакологічних груп ліків потрібно призначити?

*** А) Антихолінестеразні засоби**

- В) N-холінолітики
- С) N-холіноміметики
- Д) M-холіноміметики
- Е) Реактиватори холінестерази

21. У больного имеются явления психоза в виде психомоторного возбуждения, слуховых и зрительных галлюцинаций. Отметить препарат, показанный при описанном состоянии:

*** А) Аминазин**

- В) Бромид натрия
- С) Диазепам
- Д) Настойка валерианны
- Е) Хлордиазепоксид

22. При комбінованому наркозі у хворого, якому проведено резекцію шлунку, як міорелаксанти застосовано тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення його самостійного дихання?

- * А) Прозерин**
- В) Дитилін
- С) Цитітон
- Д) Етимізол
- Е) Бензогексоній

23. В результаті впливу на які елементи шкіри та слизових оболонок розвивається термінальна анестезія?

- * А) Чутливих нервових закінчень**
- В) Епідерміс
- С) Підшкірно-жирова клітковина
- Д) Стінки капілярів
- Е) Власне дерму

24. Вагітна жінка (20 тижнів вагітності) захворіла на пневмонію. Який препарат можна їй призначити без загрози для розвитку плода?

- * А) Бензілпеніцилін**
- В) Гентаміцин
- С) Сульфален
- Д) Левоміцетин
- Е) Офлоксацин

25. Хворий з діагнозом феохромоцитома страждає від підвищеного артеріального тиску, який переростає в гіпертонічні кризи. Яка група препаратів допоможе хворому в даній ситуації?

*** А) Альфа-адреноблокатори**

В) Бета-адреноблокатори

С) Гангліоблокатори

Д) Симпатолітики

Е) Блокатори кальцієвих каналів

26. -річний хворий страждає на бронхіальну астму протягом тривалого часу, а також тахікардією. Вкажіть найдоцільніший в даній ситуації препарат для усунення бронхоспазму:

*** А) Сальбутамол**

В) Ефедрину гідрохлорид

С) Атропіна сульфат

Д) Адреналіну гідрохлорид

Е) Ізадрин

27. Жінка 63 років одержувала ін'єкції галантаміну для відновлення функцій ЦНС після ішемічного інсульту мозку. Стан хворої значно покращився. Який механізм дії цього засобу?

*** А) Блокада ацетилхолінестерази**

В) Блокада холінорецепторів

С) Блокада катехол-орто-метилтрансферази

Д) Блокада дофамін-и бета-гідроксилази

Е) Блокада моноамінооксидази

28. Хворому, який скаржиться на хронічну серцеву недостатність, призначили дігітоксин. Однак, через тиждень після початку прийому препарату у хворого з'явилися признаки інтоксикації препаратом (брадикардія, нудота, екстрасистолія), хоч одноразова доза його не перевищувала терапевтичної і строк курсу лікування не вийшов. Як називається явище, що спостерігається.

*** А) Матеріальна кумуляція**

В) Функціональна кумуляція

С) Толерантність

Д) Тахіфілаксія

Е) Ідіосінкразія

29. Дитині 4 років треба призначити протимікробний засіб широкого спектру дії при кишковій інфекції. Який з наведених препаратів не призначається дітям у зв'язку із шкідливим впливом на розвиток кісткової тканини?

*** А) Доксидиклін**

В) Амоксицилін

С) Ампіцилін

Д) Левоміцетин

Е) Ко-тримоксазол (бісептол)

30. ступеню. Який препарат було призначено?

*** А) Анаприлін**

В) Празозин

С) Клофелін

Д) Мезатон

Е) Верапаміл

31. В тубдиспансері у хворого інфільтративною формою туберкульозу легень, який лікувався ізоніазидом, проявилися симптоми В6-гіповітамінозу. Чому ізоніазид призводить до цього явища?

- * А) Ізоніазид є антагоністом вітаміна В6**
- В) Сповільнюється всмоктування вітаміна
- С) Прискорюється елімінація
- Д) Утворюється міцний зв'язок з білками плазми крові
- Е) Прискорюється біотрансформація

32. Хворому 35 років для лікування хронічного бронхіту у фазі загострення лікар призначив бактрім. Який основний механізм дії препарату?

- * А) Гальмує 2 послідовних етапи метаболізму фолієвої кислоти**
- В) Діє на синтез клітинної стінки мікробу
- С) Гальмує синтез білка мікробної клітини
- Д) Пригнічує утворення цитолеми
- Е) Діє тільки на синтез фолієвої кислоти

33. Все нестероидные противовоспалительные средства могут повреждать слизистую желудка. Для поиска веществ, не вызывающих этого осложнения, необходимо знать, с чем оно связано. Влияние на какой молекулярный субстрат следует уменьшить, чтобы ослабить выраженность этого осложнения?

- * А) Циклооксигеназу 1**
- В) Циклооксигеназу 2
- С) Калликреин
- Д) Лизосомальные ферменты
- Е) Аденилатциклазу

34. Многие виды патологии (воспаление, отек легкого, шок разного происхождения) сопровождаются повышением проницаемости сосудов. Какое из названных веществ можно использовать для противодействия этому при любом из названных видов патологии?

*** А) Преднизолон**

- В) Ацетилсалициловая кислота
- С) Индометацин
- Д) Димедрол
- Е) Беклометазон

35. Больному для купирования кишечной колики назначен атропина сульфат. Какое из названных заболеваний может служить противопоказанием в этом случае?

*** А) Глаукома**

- В) Бронхиальная астма
- С) Синусовая брадикардия
- Д) Гипотония
- Е) Головокружение

36. Больному для лечения ишемической болезни сердца назначен анаприлин. Какое из имеющихся сопутствующих заболеваний может быть противопоказанием?

А) Глаукома

*** В) Бронхиальная астма**

- С) Тахикардия
- Д) Гипертоническая болезнь
- Е) Хронический запор

37. У животного вызван экспериментальный гипертензивный синдром систематическим введением дезоксикортикостерона. Какое из перечисленных гипотензивных веществ может специфически противодействовать его развитию?

*** А) Спиронолактон**

- В) Каптоприл
- С) Лозартан
- Д) Анаприлин
- Е) Гидрохлоротиазид

38. Хворій 65-ти років, що страждає на інсуліннезалежний цукровий діабет призначили всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату.

*** А) Стимулює виділення ендogenousного інсуліну бета-клітинами**

- В) Пригнічує глюконеогенез у печінці
- С) Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами
- Д) Пригнічує всмоктування глюкози у кишківнику
- Е) Пригнічує альфа-глюкозидазу і розпад полісахаридів

39. Основной способ купирования гипертонического криза - быстрое и существенное снижение сосудистого сопротивления. Инъекционные препараты какой группы адренонегативных средств пригодны для этого?

*** А) Альфа-адреноблокаторы**

- В) Неселективные бета-адреноблокаторы
- С) Кардиоселективные бета-адреноблокаторы
- Д) Симпатолитики
- Е) -

40. У больного атония желчного пузыря, осложненная желчно-каменной болезнью. Какое из предлагаемых средств следует использовать для усиления эвакуации желчи в кишечник в этих условиях?

*** А) Магния сульфат внутрь**

- В) Магния сульфат инъекционно
- С) Кислоту дегидрохоловую
- Д) Легалон
- Е) Но-шпу

41. У длительно болеющего туберкулезом выявлено внутриклеточное расположение микобактерий. Какой из перечисленных препаратов обязательно должен быть включен в комплексную терапию туберкулеза?

*** А) Изониазид**

- В) Рифампицин
- С) Этионамид
- Д) Натрия парааминосалицилат
- Е) Этамбутол

42. Указать препарат обезболивающего типа действия при миозите для больного с язвенной болезнью желудка и лейкопенией

*** А) Парацетамол**

- В) Кислота ацетилсалициловая
- С) Индометацин
- Д) Морфина гидрохлорид
- Е) Буталион

43. У больного, длительно принимавшего глюкокортикоиды, в результате отмены препарата возникло обострение имеющегося заболевания, понижение артериального давления, слабость. Эти явления можно связать с:

*** А) Возникновением недостаточности надпочечников**

- В) Привыканием к препарату
- С) Сенсибилизацией
- Д) Гиперпродукцией АКТГ
- Е) Кумуляцией

44. У больного сахарным диабетом после инъекции инсулина возникло понижение артериального давления, холодный пот, потеря сознания. Указать препарат, показанный для устранения этого явления.

*** А) Глюкоза**

- В) Преднизолон
- С) Кордиамин
- Д) Мезатон
- Е) Бутамид

45. Хворому бронхіальною астмою призначили інгаляції 0,5% розчину ізадрину. Бронхоспазм був усунутий, але пацієнт почав скаржитись на болі в серці та серцебиття. З чим це пов'язано?

*** А) Стимуляцією бета-1-адренорецепторів**

- В) Стимуляцією бета-2-адренорецепторів
- С) Активацією альфа-1-адренорецепторів
- Д) Активацією М-холінорецепторів
- Е) Пригніченням синтезу ацетилхоліну

46. Студент звернувся до лікаря з проханням допомогти йому перебороти страх перед стоматологічними маніпуляціями. Лікар порадив йому прийняти препарат:

*** А) Діазепам**

- В) Аміназин
- С) Дроперидол
- Д) Дімедрол
- Е) Пірацетам

47. Хворий перебував на лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу декомпенсованої хронічної серцевої недостатності. Йому був призначений дигітоксин в дозі 0,0001 г з першого дня перебування в стаціонарі, але покращення він відмітив тільки через тиждень. Повільне настання ефекту препарату лікар пояснив:

*** А) Стійким зв'язуванням дигітоксину з білками плазми крові**

- В) Недостатньою дозою дигітоксину
- С) Недостатнім всмоктуванням препарату в кишечнику
- Д) Посиленням діурезу
- Е) Недостатньою кількістю вуглеводів у дієті

48. У пацієнтки 46 років на фоні миготливої аритмії почався набряк легень. Який січогінний препарат необхідно ввести в першу чергу для виведення хворої з важкого стану?

*** А) Фуросемід**

- В) Тріамтерен
- С) Верошпірон
- Д) Амілорид
- Е) Еуфілін

49. Пацієнту, що хворіє на цукровий діабет та алергічний дерматит, лікар призначив фторований гормональний препарат в мазі. На питання хворого, про переваги призначеного препарату над маззю гідрокортизону лікар пояснив, що:

*** А) Призначений препарат практично немає резорбтивної дії**

- В) Посилює синтез інсуліну
- С) Діє короткочасно
- Д) Діє слабше
- Е) Коштує дешевше

50. Хворий 30 років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос і болі в животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,50С з ознобами. На передодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено бактеріологічно підтверджений діагноз: амевна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання.

*** А) Метронідазол**

- В) Левамизол
- С) Левоміцетин
- Д) Фталазол
- Е) -

51. Хворому з неоперабельним раком шлунку призначили промедол для зняття вираженого больового синдрому. З часом хворий відмітив зменшення знеболюючого ефекту та тривалості дії препарату, різке посилення болей у всьому тілі. Лікар пояснив це тим, що:

*** А) Розвинулось звикання**

- В) Виникла тахіфілаксія
- С) Розвинулась психічна залежність
- Д) Промедол здатний до кумуляції
- Е) Зменшилась реабсорбція промедолу в канальцях нирок

52. Допоможіть медичній сестрі визначити, який з названих протимікробних препаратів не належить до антибіотиків групи цефалоспоринів:

*** А) Ципрофлоксацин**

- В) Цефалорідин
- С) Цефпіром
- Д) Цефалексин
- Е) Цефокситин

53. Хворому 60 років, який довгий час хворіє на стенокардію разом з коронаролітиками лікар призначив ацетилсаліцилову кислоту для зменшення агрегації тромбоцитів. Який механізм антиагрегантної дії ацетилсаліцилової кислоти?

*** А) Знижує активність циклооксигенази**

- В) Знижує активність фосфодіестерази
- С) Підвищує активність аденілатциклази тромбоцитів
- Д) Підвищує синтез простогліцерину
- Е) Проявляє мембраностабілізуючу дію

54. Хвора К., 45 років, діагноз: Миготлива аритмія. Гіпертонічна хвороба II ст. Препарат вибору для припинення приступу?

*** А) Анаприлін**

- В) Сустанг-форте
- С) Калію хлорид
- Д) Строфантин
- Е) Лідокаїн

55. Хворому з маніакально-депресивним синдромом в стадії депресії, який скаржився на відчуття тривоги, страху, був призначений антидепресант із супутнім психоседативним ефектом. Який це був препарат?

*** А) Амітриптилін**

- В) Імізін (іміпрамін)
- С) Ніаламід
- Д) Сіднофен
- Е) Інказан

56. Хворому на ангіну, лікар призначив бісептол. В чому пріорітет бісептолу в порівнянні з іншими сульфаніламидами?

*** А) Триметоприм блокує, черговий етап перетворення фолієвої кислоти**

- В) Триметоприм підвищує імітацію сульфаніламідом ПАБК.
- С) Краще проникає в мікроорганізм
- Д) Знижує біотрансформацію сульфаніаміду
- Е) Зменшує зв'язок з білками крові

57. У хворого на сифіліс при лікуванні препаратами вісмуту з`явилися сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини та симптоми нефропатії. Який засіб використовують як антидот при отруєнні препаратами вісмуту?

*** А) Унітіол**

- В) Налорфін
- С) Бемегрид
- Д) Налоксон
- Е) Метиленовий синій

58. Сорокалітня жінка звирнулась до лікаря зі скаргою на болі в колінних суглобах. При огляді виявлено: припухлість, почервоніння, гіпертермію в ділянці цих суглобів. Лабораторне дослідження показало позитивні ревмопроби. Які препарати мають бути використані для лікування хворої?

*** А) Протизапальні засоби нестероїдної будови**

- В) Наркотичні анальгетики
- С) Антидепресанти
- Д) Антибіотики
- Е) Сульфаніламід

59. У приймальне відділення поступив хворий з гіпертонічним кризом. Що необхідно ввести хворому для нормалізації артеріального тиску?

*** А) Магнія сульфат внутрим'язово**

- В) Резерпін
- С) Еналаприл
- Д) Магнію сульфат всередину
- Е) Анаприлін всередину

60. В лікарню потрапила дитина 6 років з різко вираженими симптомами рухового і мовного збудження, сухістю в роті, утрудненим ковтанням, хриплим голосом. Шкіра суха, гаряча. Зіниці різко розширені, фотофобія, тахікардія. З анамнезу встановлено, що дитина з'їла якісь ягоди темно-фіолетового кольору. Вплив якої з токсичних речовин є причиною отруєння?

*** А) Атропін**

- В) Пірензепін
- С) Пілокарпін
- Д) Платифілін
- Е) Метацин

61. Для полегшення вправлення вивиху в плечевому суглобі з ціллю розслаблення м'язів хворому був введений міорелаксанти дитилін. При цьому настуило “апноє”. Що необхідно ввести хворому?

*** А) Свіжу цитратну кров**

- В) Галантаміну гідробромід
- С) Бемегрид
- Д) Дипіроксим
- Е) Ізонітрозин

62. Хворому виразковою хворобою шлунку на фоні підвищеної кислотності шлункового соку в стадії загострення [в анамнезі якого є глаукома] необхідно призначити М-холіноблокуючий засіб. Якому з наведених засобів надати перевагу, враховуючи супутні захворювання?

*** А) Пірензепін**

- В) Спазмолітин
- С) Атропін
- Д) Скополамін
- Е) Гоматропін

63. Хворий 18-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, що проявляється у важкому засипанні. В результаті цього він не висипається і на слідуєчий день відчуває втому, важко засвоює учбовий матеріал. Лікар встановив, що безсоння пов'язане з невротоподібним станом. Зробіть раціональний вибір снодійного засобу:

*** А) Нітразепам**

- В) Бромізовал
- С) Хлоралгідрат
- Д) Фенобарбітал
- Е) Етамінал-натрій

64. У стаціонар поступив хворий з діагнозом “Виразкова хвороба 12-палої кишки в фазі загострення.” Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної і кислотоутворюючої функції шлунку. Виберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунку за рахунок блокади H2-рецепторів.

*** А) Фамотидин**

В) Екстракт красавки сухий

С) Атропін

Д) Метацин

Е) Платифілін

65. У дівчинки, яка лікувалася антибіотиками з групи пеніцилінів з приводу гострого бронхіту, на 3-й день розвинувся алергічний дерматоз. Який препарат хворій треба призначити?

*** А) Лоратадин**

В) Кромолін-натрій

С) Беклометазон

Д) Ефедрин гідрохлорид

Е) Левамизол

66. У хворого з високою температурою, кашлем, задишкою після проведених обстежень встановлено діагноз стрептококова пневмонія. Який препарат залишається засобом вибору при цьому захворюванні ?

*** А) Бензилпеніцилін**

В) Гентаміцин

С) Ампіцилін

Д) Еритроміцин

Е) Тетрациклін.

67. Хворому було призначено препарат А. Через декілька діб дія препарату значно знизилась і для отримання початкового ефекту потрібно збільшити дозу речовини. Укажіть назву цього типу зміни дії лікарської речовини.

*** А) Звикання**

- В) Тахіфілаксія
- С) Лікарська залежність
- Д) Кумуляція
- Е) Ідіосинкразія

68. Після введення атропину у хворого прискорився ритм серцевої діяльності, відмічається сухість слизових оболонок, мідріаз. Що необхідно призначити хворому для нормалізації функцій організму?

*** А) Прозерин**

- В) Метацин
- С) Салбутамол
- Д) Ефідрину гідрохлорид
- Е) Строфантин

69. Жінка 28 років звернулася у поліклініку із скаргами на головний біль. Лікар запропонував їй парацетамол, взявши до уваги наявність соматичного захворювання. Яка супутня хвороба визначила призначення саме парацетамолу?

*** А) Виразкова хвороба шлунку**

- В) Ревматоїдний артрит
- С) Холецистит
- Д) Атеросклероз
- Е) Нефрит

70. Юнак 23 років з діагнозом виразкова хвороба шлунку надійшов до гастроентерологічного відділення в зв'язку з частими рецидивами і незадовільною дією попереднього лікування. Хворий одержував в(яжучі, холіно-, гістаміно- та Н+К+-АТФ-аза-блокатори. Яку групу препаратів найбільш доцільно ввести до комплексної терапії?

*** А) Антибіотики.**

В) Транквілізатори.

С) Сульфаніламід.

Д) Гормони.

Е) Вітаміни.

71. У хворого, що лікується з приводу ревматоїдного поліартриту, в анамнезі є виразкова хвороба шлунку. Який із зазначених препаратів найбільш небажано застосовувати?

*** А) Аспірин**

В) Дімедрол

С) Вольтарен

Д) Уродан

Е) Циклосерин

72. Для проведення термінового оперативного втручання хворому в хірургічне відділення викликали анестезіолога, який вирішив провести нейролептаналгезію. Яка з перелічених комбінацій препаратів використовується для цього?

*** А) Дроперідол + фентаніл**

В) Промедол + сібазон

С) Аналгін + діазепам

Д) Галоперидол + фентаніл

Е) Дроперідол + сібазон

73. В реанімаційному відділенні знаходиться хворий з отруєнням препаратом похідним барбітурової кислоти. Введений антидот. У якого з антидотів в механізмі дії закладений принцип прямого антагонізму із снотворними в дії на дихальний центр?

*** А) Бемегрід**

- В) ЕДТА (Трилон Б)
- С) Антивований вуголь
- Д) Унітіол
- Е) Тетацин-кальцій

74. До прийомного відділення доставлений хворий 25 років у непритомному стані: дихання періодичне, серцевий ритм сповільнений, рефлексі, крім колінного, пригнічені, зіниці вузькі. Поряд з хворим знайдено 15 ампул з-пі розчину морфіну. Які маніпуляції слід застосувати в першу чергу?

*** А) Промивання шлунку розчином перманганату калія.**

- В) Ввести протиарітмічний засіб.
- С) Зробити клізму.
- Д) Викликати блювотний рефлекс.
- Е) Ввести діуретик.

75. В токсикологічне відділення надійшла дитина - хлопчик 4 років, що отруївся ягодами беладонни, які містять М-холіноблокатор атропін. Який препарат слід призначити хворому в цьому стані?

*** А) Галантамін**

- В) Ацеклідін
- С) Лобелін
- Д) Цитітон
- Е) Платифілін

76. У дитини 7 років виник озноб, підвищилась температура до 39,2°C. Лікар діагностував гостру респіраторну вірусну інфекцію і призначив дитині ацетилсаліцилову кислоту. Реалізацію якого механізму дії цього препарату запропонував лікар?

*** А) Посилення тепловіддачі.**

- В) Знеження теплопродукції.
- С) Уповільнення серцебиття.
- Д) Уповільнення ритму дихання.
- Е) Загальна заспокійлива дія.

77. Хворий 40 років був доставлений у лікарню у стані гострого приступу печінкової коліки з скаргами на невтерпні болі у правому боці. Він знаходився у вимушеному положенні. Який препарат треба ввести в першу чергу для усунення больового приступу?

*** А) Атропін**

- В) Ацетилсаліцилова кислота.
- С) Анальгін.
- Д) Пентазоцин.
- Е) Морфін

78. Больной обратился к врачу с жалобами на ригидность мышц, скованность движений, постоянный тремор рук. На основании обследования врач поставил диагноз - болезнь Паркинсона. . Сделайте рациональный выбор препарата.

*** А) Леводопа**

- В) Дифенин
- С) Фенобарбитал
- Д) Сибазоп
- Е) Этосукцимид

79. Під час оперативного втручання із застосуванням міорелаксантів виникли розлади дихання. Введення прозерину викликало покращення стану. Яким терміном визначається ця взаємодія ліків?

*** А) Антагонізмом**

- В) Сінергізмом
- С) Несумісністю
- Д) Тахіфілаксією
- Е) Кумуляцією

80. У хворого стенокардією після прийому антиангінального препарату виник бронхоспазм. Який препарат міг його викликати?

*** А) Анаприлін**

- В) Нітрогліцерин
- С) Сустан
- Д) Ніфедипін
- Е) Дипиридамом

81. Після закінчення операції співставлення перелому стегна з використанням тубокурарину не відновилось дихання. Що треба ввести хворому для зняття релаксації?

*** А) Прозерін**

- В) Платифілін
- С) Циклодол
- Д) Атропін
- Е) Ацеклідін

82. У хворого після операції резекції шлунка на 2-3 день не відновилась перистальтика кишечника. Що потрібно призначити хворому для стимуляції функції шлунково-кишкового тракту?

*** А) Прозерін**

- В) Платифілін
- С) Циклодол
- Д) Атропін
- Е) Дитилін

83. Після закапування в око крапель у хворого розвинувся мідріаз і параліч акомодатії. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект?

*** А) М-холінолітики**

- В) М-холіноміметики
- С) Антихолінестеразні
- Д) Бета-адреноміметики
- Е) Альфа-адреноміметики

84. У хворого травма мозку. В післяопераційному періоді розвинулась загроза набряку мозку. Призначте препарат для усунення цього ускладнення

*** А) Фуросемід**

- В) Папаверину гідрохлорид
- С) Спіронолактон
- Д) Діхлотіазид
- Е) Дигоксин

85. Хворому з серцевою недостатністю та набряками призначили дигоксин. З чим пов'язаний кардіотонічний ефект серцевих глікозидів?

*** А) Блокада Na/K АТФ-ази**

- В) Стимулювання Na/K АТФ-ази
- С) Рефлекторним впливом на серце
- Д) Пригніченням провідності міокарду
- Е) Не прямою активацією адренорецепторів

86. У хворого по лабораторним даним визначили аскаридоз. Який засіб треба призначити?

*** А) Мебендазол**

- В) Фенасал
- С) Піперазин
- Д) Фуразолідон
- Е) Гентаміцин

87. Хворий довгий час вживав антибіотики широкого спектру, що викликали зниження апетиту, нудоту, проносну дію, випорожнення з гнилосним запахом, похудіння. Про яку побічну дію іде мова?

*** А) Дисбактеріоз**

- В) Алергічна реакція
- С) Пряма подразнююча дія
- Д) Гепатотоксична дія
- Е) Нефротоксична дія

88. У хворого з переломом стегнової кістки, для послаблення напруги поперечнополосатих м'язів при репозиції відломків кістки, треба призначити курареподібний засіб короткої дії. Який препарат доцільно призначити хворому?

*** А) Дітілін**

- В) Ардуан
- С) Тубокурарин
- Д) Декаметоній
- Е) Меліктин

89. У хворого Н., 40 років, виразка шлунку у стадії загострення із значним підвищенням кислотності шлункового соку, больовим та диспептичним синдромом. Виберіть відповідний засіб:

*** А) Фамотидін**

- В) Аллохол
- С) Папаверину гідрохлорид
- Д) Но-шпа
- Е) Платифіліну гідротартрат

90. Хвора Е., 63 роки., діагноз:інсуліннезалежний цукровий діабет. Ендокринолог почав лікування з призначення глібенкламід. Укажіть механізм дії цього засобу.

*** А) Активує бета-клітини островків Лангерганса**

- В) Зменшує всмоктування глюкози в кишечнику
- С) Гальмує транспорт глюкози в клітини
- Д) Підсилює руйнуванню білків
- Е) Стимулює гіпоталамічні центри

91. Хворий на епілепсію протягом довгого часу одержує фенобарбітал в добовій дозі 0,4. В останній час у нього стали частішими напади, спостерігається пригнічений настрій. Чим викликане погіршення стану хворого?

*** А) Індукція ферментів монооксигеназної системи печінки**

В) Пригнічення ферментів монооксигеназної системи печінки

С) Активація липолізу

Д) Активація глюконеогенезу

Е) Пригнічення гліколізу

92. У хворого, що проходить у стаціонарі курс лікування з приводу бронхіальної астми супутнім захворюванням є глаукома. Препарати якої групи в зв'язку з цим не рекомендується включати в терапію бронхіальної астми?

*** А) М-холіноблокатори**

В) Адреноміметики

С) Міотропні спазмолітики

Д) Глюкокортикоїди

Е) Адреноблокатори

93. Хворий з рематоїдним артритом на протязі декількох тижнів приймав препарати глюкокортикостероїдів, потім раптово припинив їх прийом. Яке ускладнення може виникнути в цьому випадку?

*** А) Сіндром відміни**

В) Підвищення артеріального тиску

С) Гіперглікемія

Д) Загострення хронічних інфекційних процесів

Е) Виразкування слизової оболонки шлунка і 12-ти палої кишки

94. У хворого з гострим гастроентероколітом після проведених бактеріологічних досліджень встановлено діагноз: холера. Який антибіотик є засобом вибору при цьому захворюванні?

*** А) Доксациклін**

- В) пеніцилін
- С) Оксацилін
- Д) Цефалексин
- Е) Ампіцилін

95. Хворому, який лікувався доксацикліном, лікар порадив не вживати молочних продуктів. Чому лікар дав таку рекомендацію?

*** А) Сповільнюється всмоктування антибіотика**

- В) Не засвоюються молочні продукти
- С) Збільшується ризик дисбактеріозу
- Д) Зростає токсичність антибіотика
- Е) Порушується процес перетравлення їжі

96. У реанімаційне відділення поступив хворий з ознаками гострого отруєння морфіном. Який засіб необхідно використати у даному випадку для промивання шлунка?

*** А) Калію перманганат**

- В) Натрію гідрокарбонат
- С) Фурацилін
- Д) Розчин натрія хлориду
- Е) Борну кислоту

97. У приймальне відділення лікарні поступив хворий зі скаргами на набряки, підвищення артеріального тиску. Що необхідно призначити хворому для зменшення набряків?

*** А) Дихлотіазид**

- В) Кордіамін
- С) Резерпін
- Д) Салбутамол
- Е) Анаприлін

98. У приймальне відділення поступив хворих зі скаргами на набряки, частий пульс, задишку, синюшність слизових оболонок. Поставлений діагноз: хронічна серцева недостатність. Що необхідно призначити хворому для покращення самопочуття?

*** А) Дигоксин**

- В) Папаверину гідрохлорид
- С) Мезатон
- Д) Кордіамін
- Е) Нітрогліцерин

99. У хворого з пневмонією відмічається надмірний кашель, що спричинює різкі болі у грудній порожнині. Що необхідно включити у комп-лексну терапію пневмонії для заспокоєння кашлю?

*** А) Глауцин**

- В) Настій трави термопсису
- С) Салбутамол
- Д) Камфору
- Е) Метацин

100. У больного с гипертонической болезнью при систематическом лечении антигипертензивным средством появился кашель. Какое из названных средств может быть причиной данного побочного эффекта?

*** А) Эналаприл**

В) Дихлотиазид

С) Празозин

Д) Клофелин

Е) Верапамил

101. При длительном использовании больным бронхиальной астмой фенотерола в качестве бронхорасширяющего средства его терапевтическая активность постепенно уменьшалась. Какова вероятная причина развития привыкания?

*** А) Уменьшение количества бета-адренорецепторов**

В) Ухудшение всасывания

С) Усиление связывания с альбуминами плазмы

Д) Усиление элиминации

Е) Уменьшение количества Gs белков

102. Хвора на глаукому звернулася до провізора аптеки з проханням видати їй очні краплі з атропіна сульфату, але їй пояснили, що цей препарат вживати не можна. Чому атропін протипоказаний при глаукомі?

*** А) Підвищує внутрішньоочний тиск.**

В) Викликає параліч акомодациї.

С) Розширює зіниці.

Д) Знижує відстань бачення.

Е) Пригнічує очні рефлекси.

103. Хворому на міастенію було призначено препарат, що викликав покращення м(язевої діяльності. Але поступово виявився ряд недоліків: підвищене виділення слини, поту, діарея, тошнота. Який засіб було вжито для лікування?

*** А) Прозерин.**

В) Аналгін.

С) Стрихнін.

Д) Кофеїн.

Е) Армин

104. Жінці 36 років, що страждає на ішемічну хворобу серця, лікар спочатку призначив анаприлін. Яле з'ясувавши наявність супутнього захворювання він вирішив замінити цей засіб атенололом. Яке захворювання призвело до відмови від анаприліну?

*** А) Бронхіальна астма.**

В) Артеріальна гіпертензія.

С) Виразкова хвороба 12-палої кишки.

Д) Міастенія.

Е) Холецистит.

105. В поліклініку звернулася за допомогою жінка із скаргами на поганий настрій, безсоння, болі в серці. Який засіб для лікування неврозу слід призначити хворій?

*** А) Діазепам**

В) Аміназин

С) Дроперидол

Д) Трифтазін

Е) Фенобарбітал

106. Чоловік 58 років звернувся до лікаря з приводу хвороби Паркінсона. Хворий страждає також на глаукому. Що треба йому призначити?

*** А) Леводопу.**

- В) Циклодол.
- С) Атропін.
- Д) Скополамін.
- Е) Метацин.

107. До прийомного відділення обласної лікарні надійшла жінка 40 років з діагнозом гострого панкреатиту. Що треба в першу чергу ввести хворій?

*** А) Контрікал**

- В) Платифілін.
- С) Атропін.
- Д) Метацин.
- Е) Пірензепін.

108. Хворий на серцеву недостатність II стадії з великими набряками, тахікардією, розладом травлення та сну потребує лікарську терапію. Яке із приведених серцевих глікозидів короткої дії стане найбільш ефективним у цьому випадку?

*** А) Дигоксин.**

- В) Дигітоксин.
- С) Адонізід.
- Д) кардіовален.
- Е) Целанід.

109. Жінка 50 років звернулась до поліклініки із скаргами на головний біль, нудоту. Обстеження виявило початкову стадію гіпертонічної хвороби. Інтерн намагався виписати їй резерпін, але лікар-консультант заперечив це, вказавши на наявність супутнього захворювання. Який патологічний процес є протипоказанням до призначення резерпіну?

*** А) Виразкова хвороба шлунку**

- В) Холецистит
- С) Нефрит
- Д) Міокардит
- Е) Панкреатит

110. Хвора на туляремію тривалий час приймала тетрациклін, що призвело до кандидозного генералізованого ураження вісцеральних органів. Який препарат треба їй призначити з метою найбільш ефективного лікування?

*** А) Ітраконазол**

- В) Ністатин
- С) Леворин
- Д) Гризеофульвін
- Е) Ципренол

111. При обстеженні чоловіка 40 років було встановлено діагноз: гіпохромна анемія. Який препарат треба призначити для лікування?

*** А) Ферковен**

- В) Ціанокобаламін
- С) Пентоксил
- Д) Гепарин
- Е) Вікасол

112. Хворому в післяопераційному періоді тривалий час вводили промедрол. Внаслідок відміни препарату у пацієнта виникли важкі психічні та соматичні порушення Як називається це явище?

*** А) Абстинентний синдром**

- В) Ідіосинкразія
- С) Тахіфілаксія
- Д) Синдром обкрадання
- Е) Синдром віддачі

113. Жінка 60 років, яка страждає на токсичний зоб скаржиться на збільшення частоти серцевих скорочень. Який з зазначених препаратів слід призначити для нормалізації серцевого ритму?

*** А) Анаприлін**

- В) Ізадрин
- С) Сальбутамол
- Д) Адреналін
- Е) Пентамін

114. До лікаря звернулась жінка 48 років, що тривало та безконтрольно приймала натрію бромід, зі скаргами на загальмованість, порушення пам'яті, нежить, кашель. Яка причина цього стану?

*** А) Кумуляція**

- В) Звикання
- С) Лікарська залежність
- Д) Ідіосинкразія
- Е) Тахіфілаксія

115. Хворому з глаукомою для зниження внутрішньочного тиску лікар призначив прозерин у вигляді очних крапель. Який механізм дії даного препарату?

*** А) Блокада ацетилхолінестерази**

- В) Блокада циклооксигенази
- С) Блокада ліпоксигенази
- Д) Блокада фосфодіестерази
- Е) Блокада фосфоліпази

116. У хворого 55 років виявлено гіпертонічну хворобу з підвищеним рівнем реніну в крові. Якому гіпотензивному препарату слід надати перевагу при лікуванні хворого?

*** А) Еналаприл**

- В) Клофелін
- С) Магнію сульфат
- Д) Папаверин
- Е) Празозин

117. Через 2-3 години після парентерального введення препарату у пацієнта розвинувся коматозний стан, спостерігається дихання типу Чейн-Стокса, зіниці різко звужені, колінний рефлекс збережений. Який препарат міг спричинити отруєння?

*** А) Морфін**

- В) Аміназин
- С) Сібазон
- Д) Спирт етиловий
- Е) Фенобарбітал

118. Хворому із перенесеним гострим інфарктом міокарду лікар рекомендував протягом 3-4 місяців приймати ацетилсаліцилову кислоту по 0,25 1 раз в 2-3 дні. На яку дію аспірину розраховував лікар?

- * А) Антиагрегантна**
- В) Протизапальна
- С) Жарознижуюча
- Д) Анальгезуюча
- Е) Судиннорозширююча

119. Хворому із гострою пневмонією було призначено препарат з протикашлевою дією, яка Пов'язана із виразним пригніченням кашлевого центру. Який препарат призначив лікар?

- * А) Глауцин**
- В) Лібексин
- С) Бромгексин
- Д) Терпінгідрат
- Е) Калію йодид

120. У чоловіка 36 років з черепно-мозковою травмою дихання послаблене, пульс ниткоподібний, рефлексів відсутні. Який шлях введення пірацетаму найбільше доцільний у данному випадку?

- * А) Внутрішньовенний.**
- В) Підшкірний.
- С) Пероральний.
- Д) Ректальний.
- Е) Інгаляційний.

121. Для попередження пологів вагітній жінці ввели розчин препарату, який ще відомий як протисудомний, гіпотензивний, жовчогінний та проносний засіб. Скорочення матки та болі припинились, проявився заспокійливий ефект. Який із вказаних препаратів застосував лікар?

*** А) Магнію сульфат**

- В) Окситоцин
- С) Партусистен
- Д) Ерготаміну гідротартрат
- Е) Сальбутамол

122. У хворого, що звернувся в лікарню із скаргами на пронос діагностували амебну дизентерію. В комплексне лікування був включений доксациклін. Назвати вид дії призначеного препарату.

*** А) Етіотропна дія**

- В) Пряма дія
- С) Рефлекторна дія
- Д) Основна дія
- Е) Незворотня дія

123. У хворого, який звернувся до лікаря діагностували анацидний гастрит. Для покращення роботи шлунку хворому призначили таблетки ацидин-пепсину. Який вид лікування був призначений хворому?

*** А) Замісна терапія**

- В) Симптоматична терапія
- С) Профілактичне застосування
- Д) Етіотропна терапія
- Е) Каузальна терапія

124. Хворий 37 років госпіталізований в венерологічне відділення з діагнозом сифіліс. Який із перелічених препаратів буде використовуватися для лікування хворого?

*** А) Бензилпеніцилін**

- В) Бісептол
- С) Нітроксолін
- Д) Левоміцетин
- Е) Тетрациклін

125. Хворому 45 років на гостру пневмонію був призначений антибіотик з групи пеніцилінів. При проведенні проби на індивідуальну переносимість до антибіотику виникла алергічна реакція. Яким із перелічених препаратів краще лікувати хворого?

*** А) Ципрофлоксацин**

- В) Бензилпеніцилін
- С) Феноксиметилпеніцилін
- Д) Біцилін – 5
- Е) Еритроміцин

126. Перед проведенням інфільтраційної анестезії хворому проведено пробу на чутливість до новокаїну, яка виявилась позитивною. Який з перерахованих препаратів можна використати для проведення знечулення в даному випадку?

*** А) Лідокаїн**

- В) Дикаїн
- С) Кокаїн
- Д) Анестезин
- Е) -

127. Для лікування хворого із запаленням легень призначено комбінований препарат з групи сульфаніламідів. Який препарат було призначено хворому?

*** А) Бактрим**

- В) Етазол
- С) Норсульфазол
- Д) Сульфален
- Е) Фталазол

128. В психіатричній клініці при тривалому лікуванні у хворого появились симптоми паркінсонізму. Який препарат вводили хворому?

*** А) Аміназин**

- В) Мезапам
- С) Натрію бромід
- Д) Літію карбонат
- Е) Ніаламід

129. У хворого із значними периферійними набряками почергове використання дихлотиазиду, етакринової кислоти і фуросеміду не призвело до значного діуретичного ефекту. Аналіз крові вказав значне підвищення кількості альдостерону. Вкажіть препарат вибору.

*** А) Спіронолактон**

- В) Маніт
- С) Клопамід
- Д) Сечовина
- Е) Амілорид

130. До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність по типу Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Поставлений діагноз: отруєння морфіном. Який препарат необхідно застосувати в якості антагоністу?

*** А) Налоксон**

В) Бемегрид

С) цититон

Д) Унітіол

Е) Тіосульфат натрію

131. До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіпіремійована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно застосувати?

*** А) Прозерин**

В) Діазепам

С) Пілокарпін

Д) Армін

Е) Діпіроксим

132. Хворий на гіпертонічну хворобу, який лікувався гіпотіазидом, скаржиться на загальну слабкість, втрату апетиту, серцебиття. Спостерігається гіпотонія м'язів, в'ялі паралічі, послаблення перистальтики кишечника. Що може бути причиною такого стану?

*** А) Гіпокаліємія**

В) Гіперурікемія

С) Гіпонатріємія

Д) Гіперкаліємія

Е) Гіперкальціємія

133. Хворий скаржиться на болі у шлунку, печію. При обстеженні шлункового соку виявлено підвищення кислотності шлункового соку. Що необхідно призначити хворому для нейтралізації кислотності шлункового соку?

*** А) Альмагель**

- В) Атропіну сульфат
- С) Папаверину гідрохлорид
- Д) Прозерин
- Е) Бензогексоній

134. Больной бесконтрольно принимал дигоксин, что вызвало нарушения деятельности сердца: снижение сократимости, брадикардию, желудочковую экстрасистолию. Какое из перечисленных веществ — препарат выбора для купирования возникших нарушений?

*** А) Калия хлорид**

- В) Анаприлин
- С) Этмозин
- Д) Новокаинамид
- Е) Верапамил

135. У хворого діагностовано гострий інфаркт міокарду, який супроводжується стійкими болями за грудиною. Неефективність попередньо введених препаратів дала підставу лікарю провести нейролептанальгезію. Який нейролептик використовується для цього виду знеболення?

*** А) Дроперидол**

- В) Метаперазин
- С) Галоперидол
- Д) Резерпин
- Е) Аміназин

136. Хворий на гіпотонію, відчувши погіршення загального стану: головокружіння, слабкість, шаткість при ході прийняв без контролю лікаря кілька таблеток ефедрину через короткі проміжки часу. Проте деяке покращання спостерігав тільки після використання першої таблетки. Яким явищем обумовлена така дія?

*** А) Тахіфілаксія**

- В) Сенсibiliзація
- С) Ідіосинкразія
- Д) Звикання
- Е) Кумуляція

137. При черговому нападі бронхіальної астми хворий за допомогою інгалятора вдихнув препарат, який у вигляді інгаляцій використовується як бронхолітик, а в ін'єкціях - в акушерській практиці для попередження викиднів. Який препарат був використаний хворим?

*** А) Фенотерол**

- В) Сальбутамол
- С) Адреналін
- Д) Ефедрин
- Е) Еуфілін

138. У роділлі 35 років виявляється больовий синдром, зв'язаний з затримкою першого періоду родів. Який препарат краще за все слід застосувати для зменшення болі?

*** А) Промедол.**

- В) Анальгін.
- С) Морфін.
- Д) Кодеїн.
- Е) Парацетамол.

139. До приймального відділення доставлений чоловік у непритомному стані. Об'єктивно: на зовнішні подразники хворий не реагує, дихання періодичне по типу Чейн-Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Бул встановлено, що дані симптоми обумовлені використанням морфіну. Назначити антидотну терапію.

*** А) Налоксон.**

В) Унітіол.

С) Апоморфіна гідрохлорід.

Д) Кальція хлорід.

Е) Протаміна сульфат.

140. /70 мм рт ст, Пульс 110/хв. На передозування якого препарату можуть вказувати наведені симптоми?

*** А) Атропіну**

В) Морфіну

С) Ефедріну

Д) Аміназіну

Е) Кофеїну

141. Чоловік 37 років надійшов до хірургічного відділення з явищами острого панкреатиту: блювота, понос, брадикардія, гіпотензія, слабкість, явища зневоднювання організму. Який препарат найбільш доцільно використати в першу чергу?

*** А) Контрикал.**

В) Но-шпу.

С) Платифілін.

Д) Етаперазин.

Е) Ефедрин.

142. Больной, с диагнозом сахарный диабет, утром натощак получил назначенную дозу инсулина пролонгированного действия. Пропустил очередной прием пищи и вскоре почувствовал слабость, головную боль, головокружение, потливость, дрожание тела, судороги, чувство голода, явления гипогликемии. Применение глюкозы состояние не облегчило. Какой препарат необходимо ввести для купирования данного состояния?

*** А) Адреналин**

В) Триамцинолон

С) Норадреналин

Д) Преднизолон

Е) Гидрокортизон

143. Хворий на ішемічну хворобу серця не повідомив лікаря, що у нього бувають напади бронхоспазму. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади стенокардії стали рідшими, але почастишали напади бронхоспазму. Укажіть, котрий препарат був призначений.

*** А) Анаприлін**

В) Атенолол

С) Верапаміл

Д) Дилтіазем

Е) Нітротросорбід

144. У хворого з хронічною серцево-судинною недостатністю з'явилися ознаки набряку легень. Що треба призначити хворому із сечогінних засобів для швидкого ліквідування цього ускладнення?

*** А) Фуросемід.**

В) Спіронолактон.

С) Клопамід.

Д) Діакарб.

Е) Триамптерен.

145. Після операції з використанням міорелаксанта тубокурарину хлорид у хворого не відновлюється дихання. Який препарат (антидот) необхідно ввести для відновлення дихання?

*** А) Прозерін**

- В) Атропіну сульфат
- С) Анаприлін
- Д) Бемегрід
- Е) Клофелін

146. В процесі лікування миготливої аритмії у хворого з'явився бронхообструктивний синдром - затруднення дихання, кашель. Який з протиаритмічних засобів здатний викликати таке ускладнення?

*** А) Анаприлін**

- В) Аймалін
- С) Ніфедипін
- Д) Верапаміл
- Е) Новокаїнамід

147. Після тривалого вживання одного з лікарських препаратів у хворого розвинулась підвищена чутливість до простудних захворювань. Який з вказаних нижче лікарських засобів міг сприяти зниженню імунітету ?

*** А) Преднізолон**

- В) Резерпін
- С) Сустан-форте
- Д) Настойка жень-шеня
- Е) Клофелін

148. Швидка допомога доставила в приймальне відділення хворого, в якого спостерігаються сонливість, ціаноз, рідке переривчасте дихання, різке звуження зіниць. Колінні рефлекс збережені. На руках виявлені сліди ін'єкцій. На отруєння якими препаратами вказують наведені симптоми?

- * А) Морфін**
- В) Атропін
- С) Прозерін
- Д) Фенобарбітал
- Е) Аміназін

149. Пацієнт тривалий час страждає на бронхіальну астму. В останній час у нього з'явилися приступи стенокардії. Який з перерахованих препаратів призначати йому протипоказано?

- * А) Анаприлін**
- В) Нітрогліцерін
- С) Сустан
- Д) Корінфар
- Е) Діпірідамол

150. До невропатолога звернувся чоловік 25 років із скаргами на слабкість у ногах та порушення ходи. Лікар діагностував міастенію і призначив хворому ін'єкції прозерину. Який механізм дії цього засобу?

- * А) Антихолінестеразна дія.**
- В) Холіноміметик прямої дії.
- С) Стимулятор метаболічних процесів.
- Д) Інгібітор тормозних процесів.
- Е) Активатор синтезу ацетилхоліну.

151. До прийомного відділення був доставлений хворий 30 років після автомобільної аварії з переломом кістки стегна. У хворого різко знижений АТ 70/40 мм рт.ст, слабкий пульс, посилена больова реакція на найменший дотик в області пошкодження. Що необхідно ввести хворому для профілактики травматичного шоку?

*** А) Морфін**

В) Парацетамол

С) Пентазоцин

Д) Анальгін.

Е) Паповерин

152. До чоловіка 22 років була викликана бригада швидкої допомоги з приводу приступу бронхіальної астми. Який шлях введення сальбутамолу найбільш доцільний у данному випадку?

*** А) Інгаляційний.**

В) Внутрішньовенний.

С) Внутрішньом'язовий.

Д) Підшкірний.

Е) Сублінгвальний.

153. Дитина 5 років після невдалого падіння з дивану скаржиться на різкий біль у шії, що виникає при найменших порухах. Огляд виявив припухлість, порушення цілості в області правої ключиці, крепітацію. Що слід ввести в перш чергу для швидкого усунення болі і заспокоєння дитини?

*** А) Промедол.**

В) Анальгін.

С) Діазепам.

Д) Парацетамол

Е) Кодеін.

154. В поліклініку за допомогою звернувся хворий 60 років зі скаргами на інтенсивні, періодичні головні болі. При огляді хворого порушень апарату кровообігу не виявлено, на комп'ютерній томографії органічних вражень ЦНС не знайдено. Однак, гастроентеролог виявив виразковий дефект в луковиці 12-палої кишки. Який препарат слід приписати хворому для усунення головної болі?

*** А) Анальгін**

В) Ацетилсаліцилову кислоту.

С) Індометацин.

Д) Діклофенак

Е) Промедол.

155. У хворого був діагностований іноперабельний бронхогенний рак легенів з метастазами в позвоночний стовбур. Для полегшення стану хворого необхідно ввести знеболюючий засіб. Який знеболюючий засіб необхідно ввести хворому ?

*** А) Морфін**

В) Папаверин

С) Парацетамол

Д) Кодеїн

Е) Анальгін

156. Хворий 38 років, що страждає на шизофренію, тривалий час знаходився на лікуванні психотропними засобами. Він звернувся до лікаря із скаргами на порушення координації рухів, тремор у руках, сонливість. Яка група препаратів можуть викликати такий симптомокомплекс?

*** А) Нейролептики.**

В) Аналгетики.

С) Антидепресанти.

Д) Психомоторні стимулятори.

Е) Адаптогени.

157. Хворому з порушеннями психоемоційної сфери та розладом сну був призначений діазепам. Що лежить в основі загальної дії діазепаму ?

*** А) Активація ГАМК-рецепторної системи.**

- В) Сниження АД.
- С) Гальмування лімбічної системи.
- Д) Збудження ретикулярної формації.
- Е) Збільшення часу рефлекторної реакції.

158. У жінки 53 років трапився інфаркт задньої стінки лівого шлуночка серця. Хвору бентежать сильні болі за грудиною, аритмія, задишка. Який препарат найбільш доцільно ввести у данному випадку для надання першої допомоги?

*** А) Нітрогліцерин.**

- В) Нітронг.
- С) Кордарон
- Д) Анаприлін.
- Е) Сустан

159. Юнак 15 років звернувся до невропатолога з приводу болів, пов'язаних з невритом. Він попросив дати знеболюючий засіб трамал. Однак лікар відмовився призначити трамал, мотивувавши це можливістю ускладнення. Які недоліки цього препарату перешкоджають його призначенню при невриті?

*** А) Можливість пристрасті.**

- В) Пригнічення дихання.
- С) Здатність до кумуляції.
- Д) Зниження АТ.
- Е) Явище обстигання.

160. У чоловіка 48 років розвилася гостра серцева недостатність. Інтерн запропонував вести хворому корглікон, але лікар швидкої допомоги, дізнавшись, що хворий тривалий час приймав дигоксин відхилив цю пропозицію. Яке явище могло виникнути при введенні корглікону?

*** А) Кумулятивний ефект.**

- В) Зниження активності.
- С) Порушення зору.
- Д) Погіршення дихання.
- Е) Послаблення елімінації.

161. У чоловіка 68 років з тремтінням рук, порушенням координації рухів діагностована хвороба Паркінсона. Який засіб доцільно призначити хворому?

*** А) Леводопа.**

- В) Фенобарбітал.
- С) Дифенін.
- Д) Фінлепсин.
- Е) Етосуксимід.

162. У дитини 5 років періодично з'являються судомні напади з втратою свідомості. Лікар діагностував епілепсію (великі судомні припадки). Який препарат доцільно призначити хворому?

*** А) Фенобарбітал.**

- В) Циклодол.
- С) Етосуксимід.
- Д) Леводопа.
- Е) Амізил.

163. Жінка 37 років звернулася до гінеколога з приводу запального процесу піхви, який супроводжується свербінням та пінистими виділеннями. Баканаліз встановив наявність трихомонадної інфекції. Який засіб найбільш ефективний у данному випадку?

*** А) Метронідазол.**

- В) Ністатин.
- С) Нітроксолін
- Д) Ампіцилін.
- Е) Еритроміцин.

164. Дитина 8 років готувалася до тонзилектомії. Аналіз крові показав, що час згортання збільшено (до 7 хвилин). Який препарат за 5 днів до операції слід включити до комплексу лікарських засобів підготовчого періоду в першу чергу?

*** А) Вікасол.**

- В) Кальцію хлорид.
- С) Амінокапронову кислоту.
- Д) Фібриноген.
- Е) Дицинон.

165. До лікаря поліклініки звернувся юнак 19 років із скаргами на біль в області серця. Виявилося, що він полюбляє каву і вживає до 8 склянок цього міцного напою. Чому кава, яка містить кофеїн, може погіршувати серцеву діяльність?

*** А) Викликає тахікардію, збільшує потребу міокарду в кисні.**

- В) Послабляє силу серцевих скорочень.
- С) Уповільнює провідність в серці.
- Д) Викликає звуження коронарних судин.
- Е) Порушує ритм серцевих скорочень.

166. Чоловік 60 років систематично приймав дигоксин. Його стан спочатку покращився, а потім став погіршуватись, розвилася брадикардія, аритмія. Яке явище полягає в основі цього процесу?

*** А) Кумуляція матеріальна.**

- В) Тахіфілаксія
- С) Алергія.
- Д) Зниження чутливості адренорецепторів.
- Е) Індукція ферментів.

167. В токсикологічне відділення привезли дитину яка отруїлася грибами, а саме - мухоморами. Який препарат слід використати для надання невідкладної допомоги в першу чергу?

*** А) Атропін.**

- В) Папаверин
- С) Унітіол
- Д) Тіосульфат натрію
- Е) Дипіроксим

168. Дівчина 25 років прийшла до токсикологічного відділення з явищами гострого отруєння морфіном. Який антидот слід вести хворій?

*** А) Налоксон**

- В) Унітіол
- С) Атропін.
- Д) Лобелін.
- Е) Етімізол.

169. Хворій з явищами гострої інтоксикації морфіном був введений налоксон, який швидко покращив її стан. Який переважний механізм дії цього препарату?

*** А) Конкурентна блокада мю-опіатних рецепторів.**

- В) Блокада ГАМК-рецепторів.
- С) Блокада серотонінових рецепторів.
- Д) Блокада бензодіазепінових рецепторів.
- Е) Блокада сигма-опіатних рецепторів.

170. Чоловік 50 років був прооперований з приводу раку шлунку. В комплексній анестезіологічній допомозі був застосований дитилін. Після закінчення операції дія дитиліну продовжувалась. Чому прозерин протипоказаний при передозіровці дитиліну?

*** А) Посилює деполяризацію синантичних мембран**

- В) Викликає кишкову коліку.
- С) Може викликати бронхоспазм.
- Д) Зменшує вплив ацетилхоліну.
- Е) Реактивує ацетилхолінестеразу.

171. Лікар швидкої допомоги був викликаний до жінки 40 років з приводу приступу бронхіальної астми з явищами стенокардії, лікар ввів хворій належний препарат. Який із препаратів найбільш ефективний для невідкладної допомоги?

*** А) Сальбутамол.**

- В) Ефедрин.
- С) Адреналін.
- Д) Атропін.
- Е) Платифілін.

172. Жінка 42 років надійшла до кардіологічного відділення з діагнозом стенокардія, ішемічна хвороба серця. Приступи виникають 1-2рази на день. Який препарат найбільш доцільно призначити хворій для лікування?

*** А) Ізосорбїду мононітрат.**

- В) Еуфілін.
- С) Діпіридамол.
- Д) Папаверин.
- Е) Но-шпа.

173. Выберите наиболее адекватное средство для систематического лечения больного с интенсивно выраженными продуктивными симптомами (бредом и галлюцинациями).

*** А) Трифтазин**

- В) Клозапин
- С) Мезапам
- Д) Буспирон
- Е) Амитриптилин

174. Какое вещество, вызывающее миоз, сохранит свое действие у животного с полностью денервированными гладкими мышцами радужной оболочки глаза?

*** А) Пилокарпин**

- В) Празозин
- С) Резерпин
- Д) Прозерин
- Е) Галантамин

175. У лабораторного щура визвано на задній лапці експериментальний набряк, який і без вимірювання об'єму лапки дуже виражений порівняно з контрольною лапкою. Застосувавши протизапальний препарат з групи "НПВС (нестероїдний протизапальний засіб), який критерій біохімічного механізму буде найбільш кращим?

*** А) Пригнічення продукції простагландинів та циклічних ендопероксидів**

- В) Зниження катаболічних процесів
- С) Вплив на мікроциркуляцію
- Д) Збільшення активності гіалуронідази
- Е) Активація основного обміну в місці запалення

176. Машиною швидкої допомоги доставлено до приймального відділення лікарні людину з гострим отруєнням морфіном. Який із найбільш специфічних антагоністів необхідно застосувати в цьому випадку?

*** А) Налоксон**

- В) Пентазоцин
- С) Метацин
- Д) Омнопон
- Е) Дипіроксім

177. Хворий прийшов на прийом до лікаря з метою обстеження свого здоров'я. У черзі під час чекання у нього виник приступ бронхіальної астми. Препарати якої групи доцільно застосувати для надання йому першої допомоги?

*** А) Бета-адреноміметики**

- В) Н-холіноміметики
- С) М- холіноміметики
- Д) Симпатолітики
- Е) Бета-адреноблокатори

178. До приймального відділення лікарні доставлено хворого з вираженими явищами гострої серцевої недостатності. Яким із зазначених препаратів можна йому терміново допомогти?

*** А) Коргликон**

В) Етазол

С) Дітілін

Д) Фізостигмін

Е) Дигитоксін

179. При обстеженні хворого з явищами гіпертензії з'ясувалось, що йому найбільш доцільно застосувати препарат, діючий на артеріальний тиск через систему ренін-ангіотензину. Який це засіб?

*** А) Лізиноприл**

В) Октадін

С) Дібазол

Д) Анапрілін

Е) Апресін

180. У хворого з інфарктом міокарду та явищами серцевої недостатності виникла шлуноч-кова аритмія. Який препарат є засобом вибору в цьому разі?

*** А) Лідокаїн**

В) Хінідін

С) Ніфединін

Д) Новокаїнамід

Е) Аймалін

181. В хірургічне відділення поступив хворий з абсцесом плеча. При додатковому дослідженні виявлено шлуночкову екстрасистолію. Яке знеболення і яким препаратом найбільш доцільне в даному випадку?

*** А) Місцева анестезія лідокаїном.**

- В) Спинномозкова анестезія совкаїном.
- С) Гексеналовий наркоз.
- Д) Ефірний наркоз.
- Е) Кетаміновий наркоз.

182. Який препарат треба призначити хворому, у якого безсоння з'явилося внаслідок появи висипань алергічного характеру з почервонінням, набряком, сильним свербінням.:

*** А) Дімедрол.**

- В) Фенобарбітал.
- С) Нітразепам.
- Д) Хлоралгідрат.
- Е) Натрію оксибутират

183. До лікарні доставили хворого з отруєнням морфіном. Відомо, що при гострому отруєнні морфіном використовується специфічний антагоніст налорексон. Який фактор являється основним у розвитку антагоністичної дії?

*** А) Конкуренція за зв'язування з "опіатними" рецепторами..**

- В) Пряме збудження дихального центру.
- С) Рефлекторне збудження дихального центру.
- Д) Різке прискорення метаболізму морфіну.
- Е) Зменшення чутливості організму до морфіну.

184. Хворий з гострим ринітом часто застосовував інтраназально 5% розчин ефедрину гідрохлориду . Ефективність препарату різко зменшилась, на 3-й день зникла повністю. Чим зумовлене швидке зниження ефективності (тахіфілаксія)?

*** А) Прогресивним зменшенням запасів норадреналіну в закінченнях симпатичних нервів**

- В) Порушенням синтезу норадреналіну в закінченнях симпатичних нервів
- С) Порушенням процесу звільнення медіатора із депо.
- Д) Збільшенням зворотнього захоплення медіатора.
- Е) Блокада адренорецепторів.

185. В стационар поступил больной с отравлением грибами, среди которых случайно оказался мухомор. Кроме промывания желудка, активированного угля и солевых слабительных внутрь, а также инфузионной дезинтоксикационной терапии, больному назначили инъекции атропина сульфата, в результате чего симптомы отравления значительно ослабились. Укажите тип взаимодействия мускарина (алкалоида мухомора) и атропина сульфата.

*** А) Прямой функциональный односторонний антагонизм;**

- В) Не прямой функциональный антагонизм.
- С) Косвенный функциональный антагонизм.
- Д) Химический антагонизм.
- Е) Физико-химический антагонизм (антидотизм).

186. В неврологической клинике находится больной, страдающий большими судорожными припадками (grand mal) с потерей сознания, непроизвольным мочеиспусканием и последующей амнезией. Какой лекарственный препарат является основным (или препаратом выбора) для лечения grand mal?

*** А) Фенобарбитал.**

В) Гексамидин.

С) Натрия вальпроат.

Д) Клоназепам.

Е) Етосуксимід

187. Больной, страдающий бронхиальной астмой с сопутствующей стенокардией напряжения был назначен препарат в ингаляциях. Во время очередной ингаляции больной почувствовал себя плохо; возникло сердцебиение, а затем давящие боли в области сердца с иррадиацией в левую лопатку и плечо. Какой из перечисленных препаратов мог вызвать эти побочные эффекты во время ингаляции?

*** А) Изадрин.**

В) Кромолин-натрий.

С) Еуфілін

Д) Фенотерол.

Е) Нафтизин

188. По поводу аллергической реакции больной принимал димедрол. На дне рождения у товарища, пренебрегая советом врача, принял обычную для себя дозу алкоголя. Вместо ожидаемой средней степени опьянения развилас алкогольная кома, в связи с чем больной госпитализирован в реанимационное отделение. Назовите характер описанного взаимодействия ЛВ и алкоголя.

*** А) Потенцирование.**

- В) Идиосинкразия.
- С) Тахифилаксия.
- Д) Суммирование.
- Е) Функциональный агонизм.

189. В хирургическое отделение поступил больной по поводу острого аппендицита. Ему было предложено произвести аппендектомию под местной анестезией. Однако из анамнеза выяснилось, что больной часто страдает аллергическим реакциями на лекарства. Выберите из указанных препаратов наиболее предпочтительный для инфильтрационной анестезии в данной ситуации.

*** А) Ксикаин (лидокаин).**

- В) Новокаин.
- С) Дикаин.
- Д) Анестезин.
- Е) Кокаин

190. Больному, страдающему гипертонической болезнью (АД - 200/110 мм рт. ст.), среди комплексной терапии врач назначил анаприлин (пропранолол). Через 2 недели от начала приема этого препарата он стал жаловаться на чувств удушья, затруднение дыхания. Объясните возможную причину осложнений и вашу тактику в данной ситуации.

*** А) Блокада бета2-адренорецепторов . Назначить селективный бета1-адреноблокатор.**

- В) Блокада бета1-адренорецепторов. Назначить селективный бета2-адреноблокатор
- С) Миотропное бронхоспастическое действие. Назначить эуфиллин.
- Д) Возбуждение М-холинорецепторов . Назначить атропин.
- Е) Аллергическая реакция. Препарат отменить, назначить антигистаминные средства.

191. На третій день після резекції шлунка виникла атонія кишечника. Який із препаратів необхідно застосувати?

*** А) Прозерин**

- В) Атропіну сульфат
- С) Бензогексоній
- Д) Но-шпу
- Е) Пірилен

192. У хворого при дослідженні калу виявлено яйця аскарид. Який засіб слід призначити ?

*** А) Мебендазол**

- В) Ністатин
- С) Левоміцетин
- Д) Тетрациклін
- Е) Фуразолідон

193. Хворому з запаленням легень лікар призначив сульфаніламідний препарат. Який механізм дії сульфаніламідів передбачає лікар ?

*** А) Конкурентні антагоністи параамінобензойної кислоти**

- В) Діють на оболонку мікроорганізмів
- С) Підвищують проникність мембран мікроорганізмів
- Д) Регулюють судинний тонус
- Е) Блокують сульфгідрильні групи ферментів

194. У хворого з запаленням легенів непериносимість до антибіотиків. Який з комбінованих сульфаніламідних препаратів слід призначити хворому ?

*** А) Бісептол**

- В) Етазол
- С) Сульфацил-натрію
- Д) Стрептоцид
- Е) Сульфадиметоксин

195. У хворого після резекції шлунка розвинулась мегалобластична анемія. Який препарат необхідно призначити хворому?

*** А) Вітамін В12**

- В) Заліза лактат
- С) Ферковен
- Д) Вітамін В6
- Е) Аскорбінова кислота

196. Дитина 2-х років випила очні краплі з домашньої аптечки. Стан важкий, значне пото- і слиновиділення, астматичне дихання, кашель, зіниці різко звужені, тони серця глухі, брадикардія Перистальтика кишечника посилена, пронос, артеріальний тиск знижений. Яким препаратом викликане отруєння?

*** А) Пілокарпіну гідрохлорид**

- В) Анаприлін
- С) Атропін
- Д) Платифіліну гідротартрат
- Е) Сульфацил-натрій

197. табл. 3 рази на день). Внаслідок значного покращання стану раптово припинила його прийом Розвиток якого ускладнення високо ймовірний у цьому випадку?

*** А) Синдрому відміни**

- В) Синдрому Іценко-Кушінга
- С) Шлункової кровотечі
- Д) Ожиріння верхньої половини тулуба
- Е) Гіпотонії

198. У хворого з виразковою хворобою шлунка виявлено *Helicobacter pylori*. Який з нижчеперерахованих препаратів доцільно використати у цьому випадку?

*** А) Метронідазол**

- В) Бісептол
- С) Ентеросептол
- Д) Левоміцетин
- Е) Сульфадиметоксин

199. У хворого з приступом бронхіальної астми супровідним захворюванням є стенокардія. Який бронхолітичний засіб потрібно призначати у такому випадку?

*** А) Сальбутамол**

- В) Адреналіну гідрохлорид
- С) Ізадрин
- Д) Еуфілін
- Е) Атропіну сульфат

200. Під час оперативного втручання на фоні використання гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск?

*** А) alpha-адреноміметики.**

- В) alpha-адреноблокатори.
- С) Гангліоблокатори.
- Д) М-холіноміметики.
- Е) Н-холіноміметики.

201. У хворого під часдо оперативного втручання з'явилися симптоми передозування дитиліну. Що зменшить явища інтоксикації?

*** А) Переливання крові.**

- В) Антихолінестеразні засоби.
- С) Гангліоблокатори.
- Д) М-холіноблокатори.
- Е) Н-холіноблокатори .

202. У хворого напади бронхіальної астми виникають звичайно вночі, супроводжуються брадикардією, спастичними болями в кишечнику, поносом. Препарати якої групи можуть усунути ці симптоми?

*** А) М-холіноблокатори.**

- В) Н-холіноблокатори, H₂-гістаміноблокатори
- С) Альфа-адреноблокатори
- Д) Бета-адреноблокатори
- Е) Симпатолітики.

203. Хворого з анемією лікують препаратами заліза. Чим потрібно посилити всмоктування препаратів заліза?

*** А) Аскорбіною кислотою**

- В) Трипсином
- С) Фесталом
- Д) Гастроцепіном
- Е) Альмагелем

204. У хворого непритомний стан, відчутний запах ацетону з рота. Діагноз: діабетична кома. Який засіб здатний зняти коматозний стан?

*** А) Інсулін**

- В) Бутамід
- С) Аскарбоза
- Д) Маніліл
- Е) Глібутід

205. У хворого після тривалого курсу лікування в'ялопротікаючої шизофренії виникли явища паркінсонізму. Який з нижчеперерахованих препаратів міг викликати дане ускладнення?

*** А) Аміназин**

- В) Сибазон
- С) Пірацетам
- Д) Літію карбонат
- Е) Галоперидол

206. Закрапування в ніс при риніті лікарського препарату з групи непрямих адреноміметиків на протязі декількох днів призвело до поступового зниження судиннозвужуючого ефекту. Як зветься це явище?

*** А) Тахіфілаксія**

- В) Ідіосінкразія
- С) Тератогенність
- Д) Алергія
- Е) Кумуляція

207. У приймальне відділення поступив хворий з пригніченням дихання. Препарати якої фармакологічної групи стимулюють дихання при його пригніченні?

*** А) Аналептики**

- В) Транквілізатори
- С) Нейролептики
- Д) Антидепресанти
- Е) Анальгетики

208. В терапевтичне відділення поступив хворий з підвищеним артеріальним тиском, який викликаний спазмом периферичних судин. Який гіпотензивний препарат з групи альфа-адреноблокаторів, найбільш доцільно призначити хворому?

*** А) Празозін**

В) Каптопріл

С) Аміназін

Д) Анаприлін

Е) Клофелін

209. Хворий на гострий інфаркт міокарду в складі комплексної терапії отримував гепарин. Через деякий час з'явилася гематурія. Який засіб (антидот) можна використовувати?

*** А) Протаміна сульфат**

В) Бемегрид

С) Унітіол

Д) Налоксон

Е) Вікасол

210. Хвора гіпертонічною хворобою тривалий час лікувалася гіпотензивними засобами. В останній час стан хворої погіршився. З'явилися нудота, набряк вік та губ, уртикарні висипи на шкірі, блювання, брадикардія, понос. Який препарат визиває ці явища?

*** А) Резерпін**

В) Клофелін

С) Бензогексоній

Д) Анаприлін

Е) Дибазол

211. У чоловіка 48 років виник приступ стенокардії. Лікар призначив йому таблетку нітрогліцерину, вказавши на необхідність покласти її під язик. Чому лікар вибрав сублінгвальний метод введення препарату?

*** А) Сублінгвальна дія розвивається скоріше.**

- В) Руйнується шлунковим соком.
- С) Погано всмоктується із кишок.
- Д) Активується слиною ротової порожнини.
- Е) Виключно шкідливий вплив на печінку.

212. До чоловіка 22 років була викликана бригада швидкої допомоги з приводу приступу бронхіальної астми. Який шлях введення сальбутамолу найбільш доцільний у данному випадку?

*** А) Інгаляційний.**

- В) Внутрішньовенний.
- С) Внутрішньом'язовий.
- Д) Підшкірний.
- Е) Сублінгвальний.

213. Жінка в період вагітності тривалий час безконтрольно приймала хіміотерапевтичний препарат. Через деякий час у неї погіршився апетит, з'явилися нудота, пронос. З часом виникла жовтяниця. У новонародженого відмічено порушення росту кісток. Який препарат з групи тетрацикліну приймала жінка?

*** А) Доксидиліну гідрохлорид**

- В) Бензилпеніциліну натрієву сіль
- С) Ципрофлоксацин
- Д) Азитроміцин
- Е) Бісептол

214. Працівник соціальної служби після тривалого спілкування з людиною без визначеного місця проживання захворів на туберкульоз. До складу комплексного лікування було включено напівсинтетичний антибіотик широкого спектру дії. Вкажіть препарат:

*** А) Рифампіцин**

В) Ампіцилін

С) Цефотаксим

Д) Еритроміцин

Е) Лінкоміцин

215. У 12-летнего ребенка непереносимость ряда пищевых продуктов. Их употребление вызывает аллергическую реакцию в виде зудящих высыпаний на коже. Какое противогистаминное средство следует назначить, чтобы не мешать школьным занятиям ребенка?

*** А) Лоратадин**

В) Димедрол

С) Диклофенак

Д) Эуфиллин

Е) Эфедрин