

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Принципи діагностики алергічних захворювань

Категорія: **Алергологія**

Кількість запитань: **59**

1. Які основні розділи включає в себе діагностика алергічних захворювань?

- * А) Семіотика і методи діагностичного обстеження хворого**
- * В) Методологічні основи діагностики**
- * С) Методи діагностичного обстеження**

2. Зазначте методи клінічного обстеження хворих алергічними захворюваннями?

- * А) Збір анамнезу**
- * В) Збір анамнезу, пальпація й аускультация**
- * С) Огляд, перкусія й аускультация**
- * D) Збір анамнезу, огляд, пальпація, аускультация, клінічна лабораторна діагностика**
- Е) Аналіз сечі, харкотиння

3. Які основні задачі діагностики алергічних захворювань?

- * А) Встановлення етіології захворювань**
- * В) Встановлення патогенезу захворювань**
- * С) Диференціальна діагностика з псевдоалергічними захворюваннями**
- D) Лікування супутніх захворювань

4. Які дані містить у собі алергологічний анамнез?

- * А) З'ясування скарг, типових для алергічних захворювань**
- * В) З'ясування спадкової схильності до алергічних захворювань**
- * С) Дані про реакцію хворого на медикаменти, сироватки і вакцини**
- D) Огляд хворого, перкуторне дослідження, аускультация

5. Ефективність яких методів терапії з'ясовують при зборі алергологічного анамнезу?

- * А) Гіпосенсибілізації**
- * В) Антибактеріальної терапії**
- * С) Імуномодуючої терапії**
- * D) Глюкокортикоїдної терапії**
- Е) Ефективність лікувальної фізкультури

6. Яким чином вводиться алерген при постановці аплікаційних алергічних проб?

- * А) На шкіру**
- В) Підшкірно
- С) Внутрішньошкірно
- Д) Внутрішньом'язово
- Е) Парентерально

7. Зазначте, яким чином виконуються пасивні шкіряні алергологічні проби?

- * А) Сироватка хворого вводиться здоровій людині, потім ставлять шкіряні проби з алергеном**
- В) Сироватка здорового вводиться хворому, потім ставлять шкіряні проби з алергеном
- С) Ставлять шкіряну пробу з алергеном без попереднього введення сироватки

8. У якій фазі захворювання можна проводити алергологічні шкіряні проби?

- А) Значного загострення
- В) Нестійкої ремісії
- * С) Стійкої ремісії**
- Д) Згасаючого загострення
- Е) В жодній із фаз перебігу захворювання

9. За який час до проведення шкіряних алергічних проб необхідно скасувати антигістамінні препарати?

A) За 2 години

B) За 6 годин

C) За 12 годин

*** D) За 24 години**

E) Всі перераховані відповіді не вірні

10. При яких алергічних захворюваннях частіше використовують аплікаційні шкіряні проби?

A) Інфекційнозалежна бронхіальна астма

*** B) Алергічному контактному дерматиті**

C) Полінозі

D) Харчовій алергії

E) При жодному з перерахованих захворювань

11. Через який час оцінюються результати аплікаційних шкіряних проб?

*** A) Через 20 хвилин**

*** B) Через 5-6 годин**

*** C) Через 1-2 доби**

D) Ні через один із перерахованих проміжків години

12. Зазначте, який клас антитіл можна виявити при проведенні реакції Праустніца-Кюстнера?

A) Імуноглобулін класу A

*** B) Імуноглобулін класу E**

*** C) Імуноглобулін класу G4**

D) Імуноглобулін класу M

E) Імуноглобулін класу D

13. Для діагностики яких алергічних захворювань застосовують реакцію Праустніца-Кюстнера?

- * А) Реагінового типу**
- В) Уповільненого типу
- С) Захворювання обох типів
- Д) Ні для якого захворювання

14. Зазначте час, через який враховуються скарифікаційні шкіряні проби при полінозі?

- * А) Через 15-20 хв,**
- В) Через 12 годин
- С) Через 24 години
- Д) Через 48 годин
- Е) Ні через один із перерахованих проміжків часу

15. Зазначте, який тип алергічної реакції можна виявити при проведенні скарифікаційних шкіряних проб при полінозі?

- А) Клітинний
- В) Імунокомплексний
- С) Цитотоксичний
- * Д) Реагіновий**
- Е) Жодний із перерахованих типів

16. Зазначте, для визначення сенсibilізації до яких алергенів можна проводити внутрішньошкіряні проби?

- * А) Бактеріальних**
- * В) Харчових**
- * С) Пилкових**
- * Д) Побутових**
- Е) До жодних з перерахованих алергенів

17. Зазначте основну ознаку, по якій оцінюють внутрішньошкіряні проби з бактеріальними алергенами?

A) Розмір пухиря

*** B) Розмір папули**

C) Наявність гіперемії

D) Наявність інфільтрату

E) Біль у місці ін'єкції

18. С якими алергенами проводяться кон'юнктивальні провокаційні алергічні тести?

*** A) З алергенами, що викликають гіперчутливість негайного типу**

B) З алергенами, що викликають гіперчутливість уповільненого типу

C) З тими й іншими алергенами

D) З жодним із перерахованих алергенів

19. С якими алергенами проводять назальні провокаційні алергічні проби?

A) Бактеріальними

B) Грибковими

*** C) Пилковими**

D) Харчовими

E) З жодним із перерахованих алергенів

20. Які проби використовуються для визначення гіперчутливості до фізичних чинників?

*** A) Теплові і холодові аплікаційні**

B) Підшкірні

C) Внутрішньошкіряні

D) Інгаляційні

21. У якому періоді захворювання проводяться елімінаційні алергічні проби?

*** А) У фазі загострення**

В) У фазі ремісії

С) В обох фазах

Д) В жодній із перерахованих фаз

22. Зазначте частоту виявлення при диференціальній діагностиці atopічних захворювань псевдопозитивної алергічної реакції:

А) Часто

*** В) Рідко**

С) Не зустрічається

23. Яка кількість алергену викликає псевдоалергічну реакцію?

А) Мінімальна

*** В) Відносно велика**

С) І те й інше

24. Чи існує залежність між дозою алергену і виразністю псевдопозитивної алергічної реакції?

А) Ні

*** В) Так**

25. Вміст загального імуноглобуліну Е в сироватці крові при псевдопозитивних алергічних реакціях:

А) Підвищений

В) Знижений

*** С) У межах норми**

26. Зазначте, чи виявляється специфічний імуноглобулін Е при псевдопозитивних реакціях:

А) Так

*** В) Ні**

27. Яка виразність реакції Праустніца-Кюстнера при псевдопозитивних реакціях?

*** А) Негативна**

В) Позитивна

28. Яким методом можна визначити антитіла, що відносяться до імуноглобуліну Е?

*** А) РАСТ (радіоалергосорбентний тест)**

В) РБТЛ

С) Е-РУК

Д) ЕАС-РУК

Е) НСТ-тест

29. Який метод застосовується для виявлення сенсibilізованих клітин при алергічній діагностиці "in vitro"?

*** А) РБТЛ**

В) РАСТ

С) Е-РУК

Д) ЕАС-РУК

Е) НСТ-тест

30. Задачами специфічної алергологічної діагностики є:

- * А) Встановлення природи захворювання**
- * В) Виявлення причини захворювання**
- * С) Виявлення патогенезу захворювання**
- D) Прогнозування алергічних ускладнень

31. Основними етапами специфічної алергологічної діагностики є:

- * А) Алергологічний анамнез**
- * В) Специфічна алергологічна діагностика in vivo (шкірні провокаційні проби)**
- * С) Інгаляційні провокаційні тести**
- * D) Лабораторні тести**
- * Е) Елімінаційні тести**
- F) Фіброгастродуоденоскопія

32. Специфічна алергологічна діагностика складається з:

- A) Дослідження коагулограми
- * В) Алергологічного анамнезу**
- * С) Специфічної алергологічної діагностики in vivo (шкірні провокаційні проби)**
- * D) Інгаляційних провокаційних тестів**
- * Е) Елімінаційних тестів**

33. Метою алергологічного анамнезу є:

- * А) Встановити спадкову схильність**
- * В) Виявити зв'язок між навколишнім середовищем і розвитком захворювання**
- * С) Визначити групи алергенів, що можуть обумовити захворювання**
- D) Виявити здатність алергічних захворювань передаватися оточуючим

34. Шкіряні проби при специфічній алергологічній діагностиці можуть бути:

- * А) Якісні**
- * В) Кількісні**
- * С) Прямі**
- * D) Пасивні**

Е) Всі перераховані, за винятком якісних і кількісних

35. Якісна проба дозволяє відповісти на запитання:

- * А) Є сенсibilізація**
- * В) Немає сенсibilізації**
- С) Ступінь сенсibilізації
- * D) Чим сенсibilізована людина**

36. Кількісна алергічна проба дозволяє відповісти на запитання:

- * А) У якій мірі виражена сенсibilізація**
- В) Які генетичні порушення в людини
- С) У якій мірі порушена функція ампліфієрів

37. При прямих шкіряних алергічних пробах:

- А) Алерген не вводять хворому
- В) Попередньо вводять сироватку здоровій людині
- С) Алерген вводять здоровій людині після введення досліджуваної сироватки
- * D) Алерген вводять хворому**

38. При пасивних шкіряних алергічних пробах

- А) Алерген не вводять хворому
- * В) Попередньо вводять сироватку крові здоровій людині**
- * С) Алерген вводять здоровій людині після введення досліджуваної сироватки крові**
- Д) Алерген вводять хворому

39. Для проведення специфічної алергологічної діагностики використовуються:

A) Толерогени

B) Алергоїди

*** C) Алергени**

40. Алергени - це тільки:

A) Жири

B) Вуглеводи

*** C) Білки**

D) Метали

*** E) Різноманітні речовини, спроможні сенсibilізувати організм**

41. Час прояву шкіряних реакцій при специфічній алергологічній діагностиці залежить від:

*** A) Типу алергічних реакцій**

*** B) Кількості алергену**

*** C) Місця введення алергену**

*** D) Засобу введення алергену**

E) Всього перерахованого, крім типу алергічних реакцій

42. При реагіновому типі алергічні реакції виявляються через:

A) 48 годин

B) 12годин

*** C) 10-30 хвилин**

D) 2 доби

43. При імунотоксичному типі алергічної реакції виявляються через:

- A) 2 доби
- B) 48 годин
- C) 20 хвилин
- D) 1-2 хвилини

*** E) 4-6 годин**

44. При клітинному типі алергічної реакції виявляються через:

*** A) 2 доби**

*** B) 24-72 години**

- C) 5-8 доби
- D) 1-2 хвилини
- E) 4-6 годин

45. По техніці виконання шкіряні проби діляться на:

*** A) Скарифікаційні**

*** B) Аплікаційні**

*** C) Внутрішньошкіряні**

*** D) Праустніца-Кюстнера**

*** E) Прік-тест**

F) Всі перераховані, крім аплікаційних і внутрішньошкіряних

46. Провокаційні тести це:

- A) Спосіб патохімічної діагностики
- B) Спосіб патофізіологічної діагностики

*** C) Спосіб етіологічної діагностики**

47. Провокаційні тести діляться по:

- * **A) Способу нанесення алергену**
- * **B) Місцю нанесення алергену**
- C) Кількості нанесеного алергену
- D) Часу нанесення алергену

48. Виділяють такі види провокаційних тестів

- * **A) Під'язичні**
- * **B) Кон'юнктивальні**
- * **C) Назальні**
- * **D) Інгаляційні**
- E) Уретральні

49. Провокаційні тести можуть бути:

- * **A) Холодові**
- * **B) Теплові**
- * **C) Лейкоцитопенічні**
- * **D) Тромбоцитопенічні**
- * **E) Експозиційні**

50. Елімінаційні тести - це:

- A) Засіб патогенетичної діагностики
- * **B) Засіб етіологічної діагностики**
- C) Засіб біохімічної діагностики
- D) Засіб патохімічної діагностики

51. Елімінаційні тести необхідно враховувати максимум через:

- A) 20 хвилин
- B) 4-6 годин
- C) 12-24 години
- * D) 24-48 годин**
- * E) 2-3 тижні**

52. Лабораторні методи специфічної алергологічної діагностики:

- A) Небезпечні для пацієнта
- * B) Безпечні для пацієнта**
- C) До пацієнта не мають ніякого відношення

53. Лабораторні методи несуть інформацію:

- * A) Про наявність або відсутність сенсibilізації**
- B) Про те, якої сили алергічна реакція розвинеться на даний алерген

54. При проведенні лабораторного обстеження необхідно:

- A) Застосовувати один універсальний метод
- * B) Застосовувати декілька методів**
- C) Звернутися до екстрасенса

55. При оцінці скарифікаційних проб із побутовими, епідермальними і пилковими алергенами враховується:

- * A) Розмір пухиря і зони еритеми**
- B) Тільки розмір псевдоподій
- C) Тільки розмір пухиря

56. При оцінці скарифікаційних проб із побутовими, епідермальними і пилковими алергенами реакція:

*** А) Негативна, () при діаметрі пухиря до 5 мм**

В) Негативна при діаметрі пухиря 20-25 мм

С) Пухир не є критерієм оцінки

57. При оцінці скарифікаційних проб із побутовими, епідермальними і пилковими алергенами реакція:

*** А) Слабопозитивна, (+) пухир 6-8 мм**

В) Слабопозитивна, (+) пухир 20 мм

С) Пухир не є критерієм оцінки

58. При оцінці скарифікаційних проб із побутовими, епідермальними і пилковими алергенами реакція:

*** А) Позитивна, (++), пухир 9-11 мм**

В) Позитивна, (++), пухир 20 мм

С) Пухир не є критерієм оцінки

59. При оцінці скарифікаційних проб із побутовими, епідермальними і пилковими алергенами реакція:

*** А) Різко позитивна, (+++), при наявності пухиря діаметром 12-15 мм**

В) Пухир не є критерієм оцінки