

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

# Принципи лікування алергічних захворювань

---

Категорія: **Алергологія**

Кількість запитань: **29**

**1. Лікування хворих з алергічними захворюваннями повинно бути:**

- \* А) Етіотропним**
- \* В) Патогенетичним**
- \* С) Симптоматичним**
- \* D) Комплексним**
- \* Е) Поетапним**
- \* F) Індивідуалізованим**

G) Не повинно включати зазначені принципи терапії

**2. Спектр лікувальних і профілактичних заходів при алергічних захворюваннях повинен формуватися з урахуванням:**

- \* А) Періоду захворювання (гострий період і період ремісії)**
- \* В) Виразності клінічних проявів захворювання**
- \* С) Наявності ускладнень**

D) Без урахування перерахованих чинників

**3. Відзначте класичний для алергології засіб терапії і профілактики:**

- \* А) Антигістамінна терапія**
- \* В) Специфічна гіпосенсибілізація**

C) Пасивна імунотерапія

- \* D) Неспецифічна імунотерапія**

**4. Етіотропна терапія алергічних захворювань передбачає:**

- \* А) Попередження контакту з алергеном**
- \* В) Припинення контакту з алергеном**
- \* С) Елімінацію алергену**

D) Жодний з перерахованих заходів

**5. Патогенетична терапія алергічних захворювань передбачає:**

- \* **A) Лікувальні заходи в імунологічній стадії розвитку захворювання**
- \* **B) Лікувальні заходи в патохімічній стадії розвитку захворювання**
- \* **C) Лікувальні заходи в патофізіологічній стадії розвитку захворювання**
- D) Не передбачає лікувальних заходів на зазначених стадіях розвитку алергічних захворювань

**6. Особливе значення при проведенні патогенетичної терапії в імунологічній стадії розвитку алергічного захворювання має:**

- \* **A) Активна неспецифічна імунотерапія**
- \* **B) Пасивна специфічна імунотерапія**
- \* **C) Активна специфічна імунотерапія**
- \* **D) Пасивна специфічна імунотерапія**
- E) Жодний із зазначених варіантів імунотерапії

**7. Імунотерапія алергічних захворювань може бути:**

- \* **A) Системною**
- \* **B) Регіонарною**
- \* **C) Стимулюючою**
- \* **D) Імунодепресивною**
- E) Імунотерапія при алергічних захворюваннях не застосовується
- \* **F) Немедикаментозною**

**8. Специфічна гіпосенсибілізація вперше була запропонована:**

- \* **A) NOON**
- B) Freeman
- C) Feinberg
- D) Sheppegrell
- E) Blamoutier

**9. Специфічна гіпосенсибілізація містить у собі варіанти:**

- \* А) Класичний, передсезонний (Noon,1911)**
- \* В) Круглорічний, безупинний (Feinberg,1946)**
- \* С) Прискорений (Sheppegrell,1964)**
- \* D) Сезонний, "шкіряних квадратів "(Blamoutier,1959)**
- \* Е) Блискавичний (Freeman,1930)**
- \* F) SСOСK-метод (Bray,1958)**

**10. Найбільш ефективними засобами специфічного лікування алергічних захворювань є:**

- \* А) Специфічна гіпосенсибілізація**
  - В) Неспецифічна імунотерапія
- \* С) Глюкокортикостероїдна терапія**
  - D) Застосування антигістамінних препаратів
- \* Е) Елімінація алергену**

**11. Механізм гіпосенсибілізації обумовлений /згідно основних гіпотез/:**

- \* А) Інгібіцією продукції Ig Еантитіл**
- \* В) Стимуляцією специфічних Т-хелперів-2**
- \* С) Придушенням активації Т-хелперів-1**
- \* D) Активацією утворення антиідиотипічних антитіл**
- \* Е) Активацією синтезу гомоцитотропних блокуючих антитіл**

**12. Найбільш ефективна специфічна гіпосенсибілізація при лікуванні:**

- \* А) Пилковими алергенами**
- \* В) Побутовими алергенами**
- \* С) Епідермальними алергенами**
- \* D) Бактеріальними алергенами**
- \* Е) Харчовими алергенами**

**13. Існуючі схеми специфічної гіпосенсибілізації суворо забороняють застосування інших методів лікування алергічних захворювань:**

A) Так

**\* B) Ні**

**14. Специфічна гіпосенсибілізація показана в тих випадках:**

**\* A) Коли доведена алергічна природа захворювання**

**\* B) Коли виявлений "винний" алерген**

**\* C) Коли відсутні протипоказання до специфічній гіпосенсибілізації**

D) У гострому періоді захворювання

**15. Специфічна гіпосенсибілізація протипоказана при:**

**\* A) Вагітності**

**\* B) Загостренні вогнищевих інфекцій**

**\* C) Загостренні ревматизму**

**\* D) Важких захворюваннях нервової та ендокринної систем**

**\* E) Тривалому попередньому застосуванні глюкокортикоїдів**

F) Протипоказань для специфічної гіпосенсибілізації немає

**16. При полівалентній алергізації специфічну гіпосенсибілізацію проводять:**

A) Сумішшю усіх видів алергенів

**\* B) Сумішшю "винних" видів алергенів**

**\* C) Окремо кожним алергеном**

**17. При полівалентній алергії до пилових алергенів, що включає амброзію і полин, гіпосенсибілізацію проводять:**

A) Сумішшю всіх алергенів

**\* B) Пилком амброзії окремо від інших алергенів**

C) Сумішшю обох алергенів

**18. При проведенні класичної специфічної гіпосенсибілізації алергени вводять:**

- A) Внутрішньовенно
- B) Внутрішньом'язово
- C) Усередину суглобів

**\* D) Підшкірно**

- E) Per rectum

**19. Розроблені засоби гіпосенсибілізації шляхом введення алергену:**

**\* A) Аплікаційно на мигдалики**

**\* B) Інгаляційно в дихальні шляхи**

- C) Аплікаційно на підгрудинну залозу
- D) Внутрішньоартеріально

**\* E) Аплікаційно, інгаляційно, per os**

**20. Специфічну гіпосенсибілізацію починають проводити використовуючи:**

- A) Суцільний алерген

**\* B) Розведення алергену 1:1000 000 000**

- C) Розведення алергену 1:10

**\* D) Розведення, визначеного алергометричним титруванням**

**21. Алергометричне титрування проводять для:**

**\* A) Визначення мінімальної концентрації алергену, що викликає алергічну реакцію in vivo**

- B) Визначення місця введення алергену
- C) Визначення засобу введення алергену

**22. Специфічну гіпосенсибілізацію можна проводити:**

- A) У будь-якому помешканні
- B) У будь-якому маніпуляційному кабінеті

**\* C) У спеціально обладнаному кабінеті**

**23. Специфічну гіпосенсибілізацію можуть проводити:**

- A) Будь-яка людина
- B) Будь-який медичний працівник
- C) Лікар
- \* D) Лікар-алерголог**
- \* E) Спеціально підготовлена медсестра**

**24. Для проведення специфічної гіпосенсибілізації використовуються:**

- \* A) Толерогени**
- \* B) Алергоїди**
- C) Індиферентні речовини
- D) Імуномодулятори
- \* E) Різноманітні модифікації алергенів**

**25. Час прояву шкіряних реакцій при специфічній гіпосенсибілізації залежить від:**

- \* A) Типу алергічної реакції, що переважає у пацієнта**
- \* B) Кількості алергену**
- \* C) Місця введення алергену**
- \* D) Засобу введення алергену**
- E) Не залежить від вищезазначених чинників

**26. При реагіновому типі алергічні реакції виявляються через:**

- A) 48 годин
- \* B) 12 годин**
- \* C) 5-20 хвилин**
- D) 2 доби

**27. При імунотоксичному типі алергічної реакції виявляються через:**

- A) 2 доби
- B) 48 годин
- C) 20 хвилин
- D) 12 хвилини

**\* E) 46 годин**

**28. При клітинному типі алергічної реакції виявляються через:**

- A) 12 діб
- \* B) 2472 години**
- C) 12 хвилини
- D) 46 годин

**29. Елімінаційна терапія це:**

- \* A) Засіб патогенетичної терапії**
- \* B) Засіб етіотропної терапії**
- C) Засіб біохімічної терапії
- D) Засіб патохімічної терапії