

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Поліноз.

Категорія: **Алергологія**

Кількість запитань: **43**

1. Зазначте найбільш часті клінічні прояви полінозу:

*** А) Рино-кон'юнктивальний синдром**

В) Еозинофільний легеневий інфільтрат

С) Кропивниця і набряк Квінке

Д) Алергічний арахноенцефаліт

Е) Жодний із перерахованих синдромів

2. Зазначте синоніми полінозу:

*** А) Сінна лихоманка**

*** В) Весняний катар**

*** С) Сінна нежить**

3. Яка можлива поширеність полінозу в різних регіонах світу?

А) Менше 0,1%

*** В) 0,15%**

С) 20%

Д) 30%50%

Е) Більш 50%

4. Які з перерахованих мікрочастинок, що знаходяться в повітряному середовищі, викликають поліноз?

А) Сапрофіти

В) Облігатні паразити

С) Віруси

*** Д) Пилки рослин**

Е) Всі перераховані

5. Які властивості повинен мати пилок рослин, що викликає поліноз?

- * А) Належати до вітрозапилюваних рослин**
- * В) Продукуватися в достатньо великих кількостях**
- С) Повинен перевищувати 100 мкм у діаметрі
- * D) Повинен мати значні алергенні властивості**

6. Зазначте правильне визначення пилку рослин:

- А) Спорангії
- В) Мікроспори
- С) Пилкове зерно
- * D) Сукупність пилкових зерен**
- Е) Частка рослин

7. Зазначте, які оболонки має пилкове зерно:

- * А) Внутрішню оболонку (інтиму)**
- * В) Зовнішню оболонку (екзиму)**
- С) Середню оболонку

8. Які морфологічні утворення дозволяють ідентифікувати пилок:

- * А) Кількість ядер у клітині**
- * В) Будова зовнішньої оболонки**
- * С) Наявність боріздок**
- * D) Наявність пор (апертур)**
- Е) Жодне з перерахованих утворень

9. Зазначте алергенні компоненти пилку рослин:

- * А) Білки**
- * В) Вуглеводи**
- * С) Пігменти**
- Д) Жодний із вказаних компонентів

10. Які розміри повинен мати пилок рослин, що викликає поліноз?

- A) Менше 10 мкм
- * B) 1050 мкм**
- C) 50100 мкм
- D) Більш 100 мкм
- E) Не має значення

11. Зазначте основні властивості пилкових алергенів:

- * A) Стійкі до нагрівання**
- * B) Стійкі до дії протеолітичних ферментів**
- * C) Руйнуються під впливом лужного середовища**
- D) Стійкі до кислот

12. Де локалізуються алергени в пилових зернах?

- A) У ядрі
- * B) У цитоплазмі**
- * C) У складній оболонці**
- D) У ядрі і цитоплазмі

13. Які методи використовуються для підрахунку пилку в повітрі?

- * A) Гравіметричний**
- * B) Волюметричний**
- C) Жодний із перерахованих методів

14. Зазначте можливі природні шляхи проникнення алергену в організм при полінозі:

- * A) Респіраторний**
- * B) Пероральний**
- * C) Через шкіру**
- D) Жодний із перерахованих

15. Як пилок рослин попадає в організм через граничні тканини?

A) Активно

*** B) Пасивно**

16. Зазначте найважливіші умови розвитку полінозу:

*** A) Висока алергенність пилку**

*** B) Висока концентрація пилку в повітрі**

*** C) Спадкова схильність до гіперпродукції реактивів**

D) Жодна з перерахованих умов

17. Відзначте чинники, що сприяють розвитку полінозу?

A) Медикаментозна алергія в анамнезі

B) Харчова алергія в анамнезі

*** C) Вегето-судинна дистонія**

*** D) Спадкова схильність**

*** E) Вегето-судинна дистонія, спадкова схильність**

18. У який час доби клінічні прояви полінозу найбільше виражені:

*** A) Ранком**

*** B) Вдень**

*** C) Ввечері**

*** D) Вночі**

*** E) В залежності від концентрації пилку в повітрі**

F) Немає істотного розходження

19. Зазначте метеорологічні умови, найбільше сприятливі для розвитку симптомів полінозу:

*** A) Суха погода**

B) Похмура погода

C) Дощова погода

20. У якому віці частіше розвивається поліноз?

- A) До 5 років
- B) 610 років
- * C) 1140 років**
- D) Старше 40 років

21. Всі перераховані симптоми характерні для пилкового кон'юнктивіту, крім:

- A) Свербіння слизових оболонок очей
- B) Почервоніння слизових оболонок очей
- C) Набряку верхньої та нижньої повік
- * D) Болі**

22. Які симптоми характерні для пилкового риніту?

- * A) Свербіння в порожнині носа і носової частини глотки**
- * B) Напади чхання із значними виділеннями з носу**
- * C) Відчуття закладеності носу**
- D) Жодний із перерахованих симптомів

23. Якими клінічними проявами може супроводжуватись пилковий риніт?

- * A) Гострим синуситом**
- * B) Євстахіїтом**
- * C) Поразкою слизової оболонки носоглотки**
- D) Жодним із перерахованих проявів

24. Які особливості перебігу пилкової бронхіальної астми?

- * A) Строга сезонність загострень**
- * B) Сполучення з рино-кон'юнктивальним синдромом**
- * C) Погіршення самопочуття в суху і вітряну погоду**
- * D) Поліпшення самопочуття після дощу**
- E) Перераховані особливості не мають значення для перебігу пилкової бронхіальної астми

25. Якими загальними симптомами виявляється поліноз у період загострення?

- * А) Головна біль**
- * В) Пітливість**
- * С) Слабкість**
- D) Жодним з перерахованих симптомів

26. Який тип алергічних реакцій переважає в патогенезі полінозу?

- * А) Реагіновий тип**
- B) Цитотоксичний тип
- C) Імунокомплексний тип
- D) Уповільнений тип

27. Які з імунокомпетентних клітин відіграють роль у патогенезі полінозу?

- * А) В лімфоцити**
- * В) Т-хелпери-1**
- * С) Т-хелпери-2**
- * D) Клітини пам'яті**

28. До якого класу імуноглобулінів належать антитіла, що відіграють головну роль у реалізації імунологічної стадії патогенезу полінозів?

- A) Ig A
- B) Ig G
- * C) Ig E**
- D) Ig M
- * E) Ig D**

29. Які зміни у формулі крові відзначаються при полінозі?

- A) Еритроцитопенія
- * В) Еозинофілія**
- C) Тромбоцитопенія
- D) Зміни кольорового показника
- E) Лейкоцитоз

30. Які з алергічних діагностичних проб застосовують при специфічній діагностиці полінозу ?

- * А) Шкіряні проби**
- * В) Провокаційні проби**
- * С) Всі перераховані проби**
- D) Ні одна з перерахованих проб

31. С якими захворюваннями варто проводити диференціальну діагностику полінозу ?

- * А) З аденовірусними хворобами**
- * В) Вазомоторним ринітом**
- * С) Кон'юнктивітом вірусним**

32. Які види терапії застосовуються при лікуванні полінозу ?

- * А) Елімінаційна терапія**
- * В) Гіпосенсибілізуюча терапія**
- * С) Терапія антигістамінними препаратами**
- D) Жоден із перерахованих видів терапії

33. Які із антигістамінних препаратів більш ефективні при лікуванні полінозу?

- * **A) Препарати першого покоління (супрастин, діазолін, тавегіл, фенкарол)**
- * **B) Препарати другого покоління (кларитин, астемізол, акривастин)**
- * **C) Препарати місцевої дії (алергодил)**
- * **D) Фенкарол**
- * **E) Тавегіл**

34. На який із перерахованих симптомів алергічного риніту істотно не впливають антигістамінні препарати?

- A) Свербіння
- B) Чхання
- C) Ринорея
- * **D) Закладеність носу**

35. Які з перерахованих класів препаратів більш ефективні при лікуванні полінозу, ніж антагоністи H1-рецепторів?

- A) Кромони
- * **B) Глюокортикоїди**
- C) Симпатоміметики
- D) Антихолінергічні препарати

36. Який із низькомолекулярних тимічних препаратів найбільше ефективний при лікуванні полінозу ?

- A) Т-активін
- * **B) Вілозен**
- C) Тималін
- D) Тимоген
- E) Тимоптіл

37. З якими з перерахованих препаратів доцільно використовувати вілозен при полінозі ?

- * А) Блокаторами H1 гістамінових рецепторів**
- * В) Стабілізаторами мембран опасистих клітин та базофілів**
- С) З антибіотиками

38. Вміст секреторного Ig А у назальному секреті в хворих полінозом частіше усього:

- * А) Знижений**
- В) Підвищений
- С) Не змінений

39. Про порушення якої ланки імунітету свідчить зміна рівня секреторного Ig А у назальному секреті в хворих полінозом?

- А) Клітинного
- * В) Гуморального**
- * С) Місцевого**
- Д) Загального

40. Зазначте, як часто зустрічається поразка печінки і жовчогінних шляхів у хворих на поліноз?

- * А) У 50% хворих**
- * В) У 30% хворих**
- С) Зустрічається рідко
- Д) Не зустрічається взагалі

41. Зазначте одну з основних функцій печінки, що частіше усього порушується при тривалому захворюванні полінозом:

- * А) Гомеостатична**
- * В) Метаболічна**
- * С) Екскреторна**
- * D) Дезінтоксикаційна**
- Е) Депонуюча

42. Як часто в хворих на поліноз розвивається пилкова бронхіальна астма?

- * А) 510% хворих**
- * В) 1350% хворих**
- * С) 7080% хворих**
- D) 9095% хворих

43. Як часто пилкова бронхіальна астма супроводжується симптомами алергічного риніту і кон'юнктивіту?

- А) Рідко
- В) Ніколи не супроводжується симптомами алергічного риніту
- * С) Часто супроводжується**