

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

10 Клінічна бактеріологія

Категорія: **Бактеріологія**

Кількість запитань: **29**

1. Який термін видачі заключної негативної відповіді при дослідженні крові на стерильність?

- A) На 21-у добу
- B) На 25-ту добу

*** C) На 11-ту добу**

2. Які з приведених ознак характерні для госпітальних штамів мікроорганізмів?

- A) Кислотостійкість
- B) Фагорезистентність

*** C) Полірезистентність до антибіотиків**

3. Який з перерахованих мікроорганізмів не входить до складу облігатної мікрофлори слизової оболонки носа?

- A) *Staphylococcus saprophyticus*
- B) *Streptococcus viridans*

*** C) *Streptococcus pyogenes***

- D) Непатогенні нейсерії

4. Який термін видачі заключної негативної відповіді при дослідженні крові на стерильність?

- A) 0"На 25-ту добу
- B) На 21-у добу

*** C) На 11 добу**

5. Вкажіть ознаки, притаманні госпітальним штамам мікроорганізмів:

- A) Кислоторезистентність
- B) Фагорезистентність

*** C) Полірезистентність до антибіотиків**

6. Вкажіть мікроорганізми, що не входять до облігатної резидентної мікрофлори слизової носа:

- A) St. saprophyticus
- B) Str. viridans
- C) Непатогенні нейсерії

*** D) Str. Pyogenes**

7. Вкажіть співвідношення аеробної і анаеробної мікрофлори, характерне для нормобіоценозу кишечника людини:

- A) 1:1
- B) 10:1

*** C) 1:100**

8. Які з приведених анаеробних мікроорганізмів переважають в нормомікробіоценозі кишечника людини?

- A) Фузобактерії
- B) Клостридії

*** C) Біфідобактерії**

9. Які з приведених факультативно-анаеробних мікроорганізмів переважають в нормомікробіоценозі кишечника людини?

*** A) Escherichia**

- B) Staphylococcus
- C) Citrobacter
- D) Candida

10. Яка з приведених концентрацій біфідобактерій (кількість мікробних клітин в 1 кубічному сантиметрі) розцінюється як нижня межа норми їх вмісту у фекаліях?

A) 10 в ступені 4

B) 10 в ступені 5

*** C) 10 в ступені 7**

D) 10 в ступені 10

11. Який рівень Н-антитіл є діагностичним при підозрі на інфікування нирок протеями?

A) 1:40

B) 1:80

*** C) 1:200**

12. Який з наведених клінічних матеріалів підлягає бактеріологічному дослідженню на мікоплазми?

A) Виділення з рани

B) Кров

*** C) Мокротиння**

13. З яким видом протеїв найчастіше пов'язані урологічні інфекції?

A) *P.vulgaris*

B) *P.mixofaciens*

*** C) *P.mirabilis***

14. Яке середовище використовують для виділення протеїв з клінічного матеріалу?

A) Ендо

B) 5 % кров'яний агар

*** C) Плоскирєва**

15. Вкажіть, яка мінімальна кількість мікробних клітин *Str.pneumoniae* та *H.influenzae* в 1 мл відділяемого верхніх дихальних шляхів має діагностичне значення при бактеріологічному дослідженні:

- A) 10 в ступені 8
- B) 10 в ступені 10

*** C) 10 в ступені 6**

16. Вкажіть поживні середовища, на які роблять засів донорської крові при контролі на стерильність:

- A) Цукровий бульйон
- * B) Тіогліколеве середовище**
- C) Середовище Сабуро
- D) Бульйон Хоттінгера

17. Вкажіть родину, до якої належать гриби роду *Candida*:

- A) Родини не визначено
- B) *Brucellaceae*

*** C) *Cryptococcaceae***

18. Які властивості використовують з метою диференціювання грибів роду *Candida* від інших грибів?

- A) Біохімічні
- B) Серологічні
- * C) Морфологічні**
- D) Культуральні

19. За якими ознаками диференціюють гриби роду *Candida* на види?

- A) Серологічними
- * B) Біохімічними**
- C) Культуральними

20. Яке з наведених середовищ використовують для виділення грибів роду *Candida*?

A) Ендо

B) Плоскиреєва

*** C) Сабуро**

D) Жовточно-сольовий агар

21. Як ви вважаєте, чи досить факту виявлення грибів *Candida albicans* для встановлення діагнозу "кандидоз"?

A) Так

*** B) Ні**

22. Який з наведених вуглеводів входить до складу середовища Сабуро?

A) Лактоза

B) Маніт

*** C) Глюкоза**

23. Який індикатор входить до складу середовища Сабуро?

A) Основний фуксин

B) Нейтральний фуксин

*** C) Середовище без індикатора**

24. Які з наведених властивостей притаманні мікроорганізмам роду *Campylobacter*?

A) Утворення індолу

B) Продукція гемолізинів

*** C) Розщеплення сечовини**

25. Яка з наведених клостридій є збудником газової гангрени?

*** А) Cl.perfringens**

В) Cl.botulinum

С) Cl.tetani

Д) Cl.difficile

26. До якої з перерахованих груп відносяться збудники ГКЗ (гострі кишкові захворювання) з роду Campylobacter?

А) Психрофіли

В) Мезофіли

*** С) Термофіли**

27. Який метод діагностики кампілобактеріоза є більш достовірним?

А) Серологічний

*** В) Бактеріологічний**

С) Бактеріоскопічний

28. Які з наведених ознак непритаманні мікроорганізмам роду Campylobacter?

*** А) Наявність двополярних джгутиків**

В) Гвинтоподібний рух

С) Швидка деградація культури на штучних поживних середовищах

29. Який з перерахованих патологічних матеріалів не підлягає бактеріологічному дослідженню на мікроорганізми роду Campylobacter?

А) Нативні випорожнення

В) Вміст прямої кишки

*** С) Жовч**