

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Патології ротової порожнини та стравоходу

Категорія: **Гастроентерологія**

Кількість запитань: **81**

1. Ценкерівські дивертикули стравоходу виявляються:

- A) На передній стінці грудного відділу стравоходу
- * B) На задній стінці глотки та стравоходу**
- C) Під діафрагмою
- D) На рівні біфуркації аорти

2. Найчастіше зустрічаються дивертикули стравоходу:

- A) Абдомінальні (піддіафрагмальні)
- B) Ценкерівські
- * C) Біфуркаційні**

3. Справжні дивертикули стравоходу:

- * A) Зберігають структуру стравоходу**
- B) Позбавлені м'язової оболонки
- C) Складаються лише із слизової оболонки

4. Який із перелічених ферментів не виділяється в складі слини:

- A) Альфа-амілаза
- B) Лізоцим
- C) Калікреїн
- * D) Лактаза**

5. Яку з наступних функцій НЕ виконує слина:

- A) Приймає участь у формуванні харчового клубка
- B) Забезпечує смакову рецепцію, сприяючи розчиненню харчових речовин
- C) Має протимікробну дію
- * D) Сприяє підготовці до засвоєння вітаміну А та каротину**

6. Які органи виробляють інсулін:

- * А) Підшлункова залоза**
- В) Печінка
- С) Щитовидна залоза
- Д) Нирки

7. Які стани можуть сприяти гіперсалівації:

- * А) Нудота та блювання**
- * В) Токсикоз вагітності**
- * С) Гельмінтози**
- * D) Все перераховане**

8. Які стани сприяють гіпосалівації

- * А) Інфекційні стани та лихоманка**
- * В) Зневоднювання організму**
- * С) Синдром Шьєгрена**
- * D) Використання холінолітичних препаратів**
- * Е) Все перераховане**

9. Яка із ознак не є характерною для синдрому Шьєгрена?

- А) Ксеростомія
- В) Ксерофтальмія
- * С) Поліпоз товстої кишки**

10. У ротовій порожнині здійснюються наступні процеси:

- * А) Початкові стадії процесу травлення**
- * В) Імунологічний захист**
- * С) Участь у гормональному гомеостазі**
- * D) Все перераховане вірно**

11. Стосовно топографії стравоходу є вірним:

- * А) Шийний відділ знаходиться позаду трахеї
- * В) Грудний відділ лежить зліва від трахеї
- * С) Спереду стравохід перехрещується з дугою аорти
- * D) Черевний відділ стравоходу прилягає до лівої долі печінки
- * Е) Все перераховане вірно

12. Стравохід має відділи:

- * А) Стравохідний
- * В) Грудний
- * С) Наддіафрагмальний
- * D) Піддіафрагмальний
- * Е) Всі 4 перелічені відділи

13. Стінки стравоходу складаються з оболонок:

- * А) Слизової
- * В) Підслизової
- * С) М'язової
- * D) Всіх перелічених

14. Верхню дисфагію викликають захворювання:

- * А) Стравоходу
- * В) Щитовидної залози
- * С) Лімфатичних вузлів
- * D) Все перераховане вірно,

15. НАЙБІЛЬШ поширені симптоми при захворюваннях стравоходу:

- * А) Дисфагія**
- * В) Печія**
- * С) Болі за грудиною**
- * D) Регургітація**
- * Е) Все перераховане вірно**

16. Парадоксальна дисфагія частіше буває при:

- А) Раковому стенозі
- В) Дивертикулах стравоходу
- * С) Ахалазії кардії**

17. Болі при захворюваннях стравоходу:

- * А) Посилюються у горизонтальному положенні хворого**
- * В) Бувають при гіпермоторній дискінезії**
- * С) Послабляються після прийому нітратів**
- * D) Все перераховане вірно**

18. Болі після прийому їжі є характерними для:

- * А) Рефлюкс-езофагіту**
- * В) Гриж стравохідного отвору діафрагми**
- * С) Ахалазії кардії**
- * D) Все перераховане вірно**

19. Характерним для стравохідного блювання є

- * А) Раптове виверження повним ротом без попередньої нудоти**
- В) Участь м'язів черевної порожнини
- С) Домішок великої кількості жовчі

20. Какосмія (поганий запах з рота) буває при:

- * А) Дивертикулі стравоходу**
- В) Гіпертонічній дискінезії стравоходу
- * С) Ахалазії кардії**

21. Ікавка частіше спостерігається при:

- * А) Раковому захворюванні стравоходу**
- В) Дивертикулі стравоходу
- * С) Ахалазії кардії**

22. Клінічні прояви гіпертонічної дискінезії:

- * А) Спастичні болі під час їжі, поза прийомом їжі**
- * В) Болі треба диференціювати від стенокардії**
- * С) Послаблення болі вночі**
- * D) Все перераховане вірно**

23. Відчуття клубка у горлі найбільш характерне для:

- * А) Гіпертонічної дискінезії стравоходу**
- В) Ахалазії кардії
- С) Рефлюкс-езофагіту
- Д) Дивертикула стравоходу

24. Найбільш інформативний метод діагностики функціональних захворювань стравоходу є:

- * А) Рентгенологічне обстеження**
- В) Ендоскопічне обстеження
- С) Внутрішньостравохідна рН-метрія

25. Головним у лікуванні первинних дискінезій є:

А) Призначення антацидів

В) Призначення вітамінів

*** С) Призначення спазмолітичних та седативних препаратів**

26. Гіпотонічні дискінезії стравоходу частіше є

*** А) Вторинними**

В) Первинними

27. До пізніх ознак раку стравоходу відносяться:

*** А) Регургітація**

*** В) Дисфагія**

*** С) Стравохідне блювання**

*** D) Нічний кашель**

*** Е) Все перераховане вірно**

28. Клінічними проявами гіпотонічної дискінезії стравоходу є:

*** А) Дисфагія**

*** В) Болі за грудиною**

*** С) Зригування**

*** D) Все перераховане вірно**

29. Рентгенологічні ознаки гіпокінезії стравоходу є:

*** А) Розширення просвіту стравоходу більше 3 см, затримання контрасту**

В) Наявність дефектів заповнення

С) Наявність додаткової тіні

30. Лікування гіпотонічної дискінезії стравоходу включає:

- * А) Відповідну дієту**
- * В) Вітаміни**
- * С) Прокінетики**
- * D) Все перераховане вірно**

31. До етіологічних факторів грижі стравохідного отвору діафрагми відносять:

- * А) Слабкість сполучно-тканинних структур**
- * В) Підвищення серединночеревного тиску**
- * С) Дискінезії стравоходу**
- * D) Все перераховане вірно**

32. Серед гриж стравохідного отвору діафрагми частіше зустрічаються:

- * А) Аксиальні грижі**
- В) Параезофагеальні
- С) Все перераховане вірно

33. Найбільш характерними скаргами при грижі стравохідного отвору діафрагми являються:

- * А) Болі за грудиною**
- * В) Печія**
- * С) Дисфагія**
- * D) Все перераховане вірно**

34. Найбільш поширеною клінічною формою гриж стравохідного отвору діафрагми є:

- * А) Безсимптомні грижі**
- В) Без синдрому недостатності кардії
- * С) З синдромом недостатності кардії**

35. При грижі стравохідного отвору діафрагми зустрічаються наступні симптоми:

- * А) Диспепсичний**
- * В) Бронхостравохідний**
- * С) Псевдостенокардитичний**
- * D) Анемічний**
- * Е) Все перераховане вірно**

36. Патогенетичне значення для розвитку анемії при грижі стравохідного отвору діафрагми мають:

- * А) Наявність хронічного гастриту**
- * В) Часті стравохідні кровотечі**
- * С) Наявність ерозивного рефлюкс-езофагіту**
- * D) Все перераховане має значення**

37. До основних симптомів бронхостравохідного синдрому відносять:

- * А) Приступи нічного кашлю**
- * В) Симптом "мокрої подушки"**
- * С) Приступи задишки вночі**
- * D) Все перераховане вірно**

38. Ускладнення грижі стравохідного отвору діафрагми:

- * А) Рефлюкс-езофагіт**
- * В) Стравохідна кровотеча**
- * С) Защемлення грижі**
- * D) Все перераховане вірно**

39. До основних методів діагностики грижі стравохідного отвору діафрагми відносять:

- * А) Контрастне багатоплощинне рентгенобстеження**
- * В) Фіброезофагогастроскопію**
- * С) Обзорне безконтрастне рентгенологічне обстеження**
- * D) Все перераховане вірно**

40. До рентгенологічних ознак грижі стравохідного отвору діафрагми відносять:

- * А) Зглаженість або відсутність кута Гіса**
- * В) Зміна форми газового міхура шлунка**
- * С) Відхилення стравоходу та діафрагми від хребетного стовпа**
- * D) Все перераховане вірно**

41. Основною ендоскопічною ознакою грижі стравохідного отвору діафрагми являється:

- * А) Наявність гризової порожнини**
- * В) Зіяння кардії або неповне її змикання**
- * С) Рефлюкс-езофагіт**
- * D) Все перераховане вірно**

42. Консервативне лікування грижі стравохідного отвору діафрагми включає:

- * А) Антацидні препарати**
- * В) Загальні рекомендації по режиму та дієті**
- * С) Антисекреторні препарати**
- * D) Прокінетики**
- * E) Все перераховане вірно**

43. Раціональний режим праці, харчування та засобу життя у хворих килою стравохідного отвору діафрагми вимагає:

- * А) Уникати підйому важких речей, нахилів тулуба, особливо після їжі**
- * В) Дотримуватись відповідної дієти, не переїдати**
- * С) Уникати прийому їжі на ніч**
- * D) Спати з підвищеним головним кінцем**
- * Е) Все перераховане вірно**

44. Для ценкеровських (глотошно-стравохідних) дивертикулів 1-стадії характерним являється:

- * А) Неспецифічні проявивідчуття першіння та шкрябання**
- * В) Відчуття підкочування до горла клубка**
- * С) Симптом Поттенджера-напруга та болючість жувальних м'язів**
- * D) Все перераховане вірно**

45. Для ценкеровських (глотошно-стравохідних) дивертикулів 2 та 3-стадії характерним являється:

- * А) Дисфагія, регургітація**
- * В) Какосмія (поганий запах з роту)**
- * С) Кашель, задишка, асфіксія**
- * D) Дисфонія**
- * Е) Все перераховане вірно**

46. Для біфуркаційних дивертикулів вірно:

- * А) Болі за грудиною**
- * В) Дисфагія**
- * С) Какосмія**
- * D) Все перераховане вірно**

47. Для епіфренальних (наддіафрагмальних) дивертикулів вірно:

- * А) Можуть бути безсимптомними**
- * В) Дисфагія, відчуття зупинки їжі за грудиною**
- * С) Какосмія**
- * D) Все перераховане вірно**

48. Рентгенологічні признаки дивертикулів стравоходу:

- * А) Вибухання у вигляді булави, мішка**
- * В) Деформація контурів слизової оболонки**
- * С) Симптом комірця слизової оболонки**
- * D) Все перераховане вірно**

49. Лікування дивертикулів стравоходу включає:

- * А) Щадячу дієту**
- * В) Промивання порожнини антисептиком**
- * С) Все перераховане вірно**

50. Можливі ускладнення дивертикулів стравоходу:

- * А) Дивертикуліти, езофагіти**
- * В) Розвиток злоякісної пухлини стравоходу**
- * С) Захворювання легень**
- * D) Все перераховане вірно**

51. До найбільш важливих етіологічних факторів ахалазії кардії відносяться:

- * А) Спадкова схильність**
- * В) Підвищення тонуусу симпатичної нервової системи над парасимпатичною**
- * С) Психічна лабільність, депресія**
- * D) Все перераховане вірно**

52. До ахалазії кардії 1-стадії характерно:

*** А) Функціональний спазм кардії**

В) Стабільний спазм кардії без різкого розширення стравоходу

С) Рубцеві зміни м'язового слою кардії з розширенням стравоходу

Д) Різко виражений стеноз кардії, ділятація стравоходу, явища застійного езофагіту

53. До ахалазії кардії 2-стадії характерно:

А) Функціональний спазм кардії

*** В) Стабільний спазм кардії без різкого розширення стравоходу**

С) Рубцеві зміни м'язового слою кардії з розширенням стравоходу

Д) Різко виражений стеноз кардії, ділятація стравоходу, явища застійного езофагіту

54. До ахалазії кардії 3-стадії характерно:

А) Функціональний спазм кардії

В) Стабільний спазм кардії без різкого розширення стравоходу

*** С) Рубцеві зміни м'язового слою кардії з розширенням стравоходу**

Д) Різко виражений стеноз кардії, ділятація стравоходу, явища застійного езофагіту

55. До ахалазії кардії 4-стадії характерно:

А) Функціональний спазм кардії

В) Стабільний спазм кардії без різкого розширення стравоходу

С) Рубцеві зміни м'язового слою кардії з розширенням стравоходу

*** Д) Різко виражений стеноз кардії, ділятація стравоходу, явища застійного езофагіту**

56. Найбільш характерні клінічні симптоми ахалазії кардії:

*** А) Дисфагія**

*** В) Регургітація**

*** С) Біль**

*** Д) Все перераховане**

57. Рентгенологічні ознаки ахалазії кардії:

- * А) Звуження стравоходу в дистальному відділі та розширення проксимального відділу**
- * В) Відсутність газового міхура шлунка**
- * С) Зниження тонуусу та перистальтики стравоходу**
- * D) Все перераховане**

58. Для 1-стадії ахалазії кардії характерно:

- * А) Позитивна проба з нітрогліцериним**
- * В) Дисфагія та за груди́нні болі**
- * С) Регургітація**
- * D) Все перераховане**

59. Консервативне лікування хворих ахалазією кардії включає:

- * А) Щадячу дієту**
- * В) Психологічний комфорт**
- * С) Місцеві анестетики, прийом нітропрепаратів**
- * D) Кардіоділятація**
- * E) Все перераховане вірно**

60. До основних факторів патогенезу шлунково-стравохідної рефлюксної хвороби відносять:

- * А) Первинне зниження тиску в нижньому стравохідному сфінктері**
- * В) Пошкоджуюча дія шлункового та дуоденального вмісту на слизову оболонку стравоходу**
- * С) Зниження стравохідного кліренса**
- * D) Зниження резистентності слизової оболонки стравоходу**
- * E) Все перераховане**

61. До етіологічних факторів шлунково-стравохідної рефлюксної хвороби відносять:

- * А) Фактори харчування (жири, шоколад, кофе, алкоголь)**
- * В) Ожиріння, вагітність**
- * С) Стрес**
- * D) Прийом медикаментозних препаратів (антагоністів кальцію, бета-блокаторів, антихолінергічних препаратів та інших)**
- * E) Все перераховане вірно**

62. Для шлунково-стравохідної рефлюксної хвороби характерно:

- * А) Ретростернальний біль**
- * В) Печія за грудиною, в епігастральній області**
- * С) Кисла відрижка**
- * D) Все перераховане вірно**

63. Консервативне лікування шлунково-стравохідної рефлюксної хвороби включає:

- * А) Раціональний режим праці, харчування та засобу життя**
- * В) Призначення антацидів**
- * С) Призначення антисекреторних препаратів**
- * D) Призначення прокінетиків**
- * E) Все перераховане вірно**

64. До групи прокінетиків відносять:

- * А) Метоклопрамід (церукал, реглан)**
- * В) Мотіліум (домперідон)**
- * С) Цизапрід (препульсид)**
- * D) Все перераховане вірно**

65. Хірургічне лікування при шлунково-стравохідний рефлюксній хворобі показано при:

- * А) Неефективності консервативного лікування**
- * В) Ускладнення**
- * С) Частих аспіраційних пневмоніях**
- * D) Стравоході Баррета**
- * Е) Все перераховане вірно**

66. В більшості випадків езофагіти:

- А) Первинні**
- * В) Вторинні**

67. Найбільш надійні методи діагностики рефлюкс-езофагіту:

- * А) Клінічне обстеження**
- * В) Рентгенологічне обстеження**
- * С) Ендоскопічний метод**
- * D) Все перераховане вірно**

68. Ерозивний езофагіт частіше зустрічається при:

- * А) Інфекційних захворюваннях**
- * В) Алергічних процесах**
- * С) Грибкових захворюваннях**
- * D) Все перераховане правильно,**

69. При езофагіті найчастіше використовуються групи препаратів:

- * А) Анестетики, спазмолітики**
- * В) Седативні препарати**
- * С) Антациди, адсорбенти**
- * D) Антисекреторні препарати**
- * Е) Все перераховане**

70. Для лікування кислого рефлюкс-езофагіту не рекомендується мінеральна вода:

- A) Лужанська
- B) Боржомі
- C) Поляна Квасова
- * D) Миргородська**

71. Анемії частіше зустрічаються при:

- * A) Аксіальній грижі**
- * B) Параезофагеальній грижі**
- * C) Рефлюкс-езофагіті**
- * D) Все перераховане вірно**

72. Що з нижчепереліченого рекомендується для лікування рефлюкс-езофагіту:

- * A) Відповідна дієта**
- * B) Антацидні препарати**
- * C) Зменшення маси при ожирінні**
- * D) Прокінетики**
- * E) Все перераховане вірно**

73. Факторами, що сприяють розвитку раку стравоходу являються:

- * A) Куріння**
- * B) Гарячі напої**
- * C) Груба, гостра їжа**
- * D) Все перераховане вірно**

74. До передракових захворювань стравоходу відносять:

- * А) Дивертикули стравоходу
- * В) Рубцева стриктура стравоходу після хімічних опіків
- * С) Ахалазія кардії 3-4 стадії
- * D) Стравохід Баррета
- * Е) Все перераховане вірно

75. Частіше рак стравоходу локалізується в:

- А) Верхній треті стравоходу
- * В) Нижній треті стравоходу
- * С) Середній треті стравоходу

76. Рак стравоходу дає метастази:

- * А) Лимфогенно
- * В) Гематогенно
- * С) Проростає ближні органи (аорту, бронхи)
- * D) Все перераховане вірно

77. Найчастіше рак стравоходу проявляється:

- * А) Дисфагією
- * В) Відчуттям кому та болем за грудиною
- * С) Посиленною слинотечією
- * D) Все перераховане вірно

78. До ранніх ознак раку стравоходу відносять:

- * А) Посилена слинотечія
- * В) Дисфагія
- С) Регургітація
- D) Стравохідне блювання

79. До передракових захворювань стравоходу відносять:

- * А) Дивертикули стравоходу**
- * В) Доброякісні пухлини стравоходу**
- * С) Довго незаживаючі виразки стравоходу**
- * D) Все перелічене**

80. До атипових форм раку стравоходу відносять:

- * А) Кардіальну**
- * В) Гастритну**
- * С) Ларинготрахеальну**
- * D) Плевропульмональну**
- * E) Все перелічене**

81. Доброякісними пухлинами стравоходу являються:

- * А) Лейоміома**
- * В) Гемангіома**
- * С) Папілома**
- * D) Все перелічене**