

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Гастроінтестинальні інфекції

Категорія: **Гастроентерологія**

Кількість запитань: **35**

1. НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до харчових токсикоінфекцій:

- A) Сальмонельоз
- B) Ботулізм
- * C) Стронгілоїдоз**
- D) Харчові токсикоінфекції "протейної етіології"
- E) Стафілококові харчові інтоксикації

2. Найбільш інформативним при постанові діагнозу сальмонельозу є:

- * A) Об'єктивне дослідження**
- * B) Ректороманоскопічне дослідження**
- C) Загальний аналіз крові
- D) Загальний аналіз сечі
- * E) Бактеріологічне дослідження калу**

3. Для інтестинальної форми сальмонельозу характерно:

- * A) Болі в животі**
- * B) Рідкий стілець**
- * C) Все перераховане**
- * D) Нудота**
- * E) Блювання**

4. Найбільш поширена в наш час форма сальмонельозу:

- * A) Гастроінтестинальна**
- B) Замаскована
- C) Тифоїдна
- D) Септична
- E) Грипоподібна

5. НЕ характерна для сальмонел властивість:

- A) Стійкість до дії низьких температур
- * B) Швидко гинуть при низьких температурах**
- C) Стійкі до висушування
- D) Залишаються довгий час життєздатними у ґрунті
- E) Довго зберігаються при кімнатній температурі

6. Інформативно для диференційної діагностики тифоїдної форми сальмонельозу та черевного тифу:

- * A) Посів крові на гемокультуру**
- * B) Об'єктивне дослідження**
- * C) Клінічна картина захворювання**
- D) Загальний аналіз сечі
- E) Біохімічне дослідження функціонального стану печінки

7. Який із перерахованих методів обробки їжі протидіє виникненню харчової токсикоінфекції:

- A) Приготування м'ясного студню із м'яса бичка, у якого був пронос
- B) Розтин сирого та вареного м'яса на одній і тій же дошці
- C) Зберігання студню при кімнатній температурі на протязі 48 годин
- * D) Обробка сирих овочів окріпом перед вживанням**
- E) Зберігання сирих продуктів із вже обробленими

8. НЕ характерно для харчової токсикоінфекції, викликаної стафілококами:

- A) Загальна слабкість
- B) Лихоманка
- C) Головний біль
- D) Нудота, блювання, рідкий стілець
- * E) Різка збільшення печінки та селезінки**

9. Ентеропатогенні кишечні палички чутливі:

- * **A) До сульфаніламідів**
- * **B) До тетрацикліну**
- * **C) До неоміцину**
- * **D) До левоміцетину**
- * **E) Все перераховане вірно**

10. Метод лікування при сальмонельозі:

- * **A) Виведення із організму токсичних продуктів**
- * **B) Нормалізація водно-сольового обміну**
- * **C) Нормалізація діяльності серцево-судинної системи**
- * **D) Застосування вітамінних препаратів**
- * **E) Всі перераховані**

11. Протей швидко гине:

- A) В м'ясі, вареному великим шматком
- * **B) Якщо довго кип'ятити рідкі продукти**
- C) В жареній рибі
- D) В продуктах з високим вмістом білка
- E) В продуктах, що довго зберігаються при кімнатній температурі

12. Звичайно НЕ викликає стафілококові токсикоінфекції:

- A) М'ясний фарш, паштет
- B) Молоко
- C) Заварний крем
- * **D) Квашена капуста**

13. НЕ типово для стафілококової токсикоінфекції:

- A) Інкубаційний період частіше знаходиться у межах 2-4 годин
- * В) Інкубаційний період частіше знаходиться у межах 36-48 годин**
- C) Нудота, блювання
- D) Різкі болі в епігастральній області
- E) Ознаки інтоксикації у вигляді головного болю, головокружіння

14. Протей найбільш чутливий:

- A) До пеніциліну
- B) До тетрацикліну
- * C) До нітрофуранових препаратів (фурагін, фурадонін)**
- D) До еритроміцину

15. НЕ бувають причиною зараження ботулізмом:

- A) В'ялена риба
- B) М'ясні консерви
- C) Овочеві консерви
- D) Рибні консерви
- * E) Кондитерські вироби з високим вмістом цукру**

16. НЕ типовий для ботулізму синдром:

- A) Офтальмоплегічний
- * B) Профузний пронос**
- C) Фагоназоглосоневрологічний
- D) Загальної міоневроплегії
- E) Фоноларінгоневрологічний

17. Найбільш ефективно при ботулізмі:

- * **A) Внутрішньовенне введення плазми**
- * **B) Введення вітамінів**
- * **C) Застосування інгібіторів холінестерази**
- * **D) Введення антитоксичної специфічної сироватки**

18. До пробіотиків відносяться:

- * **A) Йогурт**
- * **B) Лінекс**
- * **C) Біфіформ**
- * **D) Колібактерин**
- * **E) Все перераховане**

19. Найбільш небезпечними у відношенні розповсюдження холери є:

- * **A) Овочі та фрукти**
- * **B) М'ясні продукти**
- C) Курячі яйця
- * **D) Вода**

20. НЕ діють згубно на холерний вібріон:

- A) Кип'ятіння при температурі 1000
- * **B) Витримування при температурі 2-40 на протязі доби**
- C) Висушування на сонці
- D) Обробка спиртом
- E) Кисле середовище

21. НЕ слід призначати хворому холерою:

- A) Протихолерний бактеріофаг
- B) Антибіотики, сульфаніламідні препарати
- C) Внутрішньовенне вливання фізіологічного та гіпертонічного розчинів

*** D) Діуретики**

22. При гострій дизентерії переважно уражається:

- A) Стравохід
- B) Шлунок
- C) Тонка кишка

*** D) Товста кишка**

23. Патоморфологічні зміни слизової оболонки товстої кишки при гострій дизентерії:

- * A) Судинні та секреторні порушення**
- * B) Інтенсивна лімфоцитарно-плазмоцитарна інфільтрація**
- * C) Утворення мікроерозій**
- * D) Все перераховане**

24. Типові прояви дизентерії:

- * A) Понос**
- * B) Біль у череві**
- * C) Лихоманка, головний біль**
- * D) Все перераховане**

25. Ускладненнями гострої дизентерії може бути:

- * A) Інфекційно-токсичний шок**
- * B) Гостра недостатність кори наднирників**
- * C) Прободіння товстої кишки та перитоніт**
- * D) Все перераховане**

26. В організмі людини розвиток патологічного процесу викликають:

- * А) Рикетсії
- * В) Патогенні бактерії
- * С) Гельмінти
- * D) Все перераховане

27. Гельмінтози, що протікають з міграцією личиночної форми паразитів по кровоносним та лімфатичним судинам:

- А) Опісторхоз, дифілоботріоз
- * В) Аскаридоз, ехінококоз

28. Для лікування опісторхоза застосовують:

- А) Декаріс
- В) Фенасал
- * С) Празіквантель, хлоксил
- D) Вермокс

29. При яких гельмінтозах необхідно дослідити мокроту:

- * А) Парагонімозі (легенева двоустка)
- * В) Ехінококкозі легень
- * С) Аскаридозі
- * D) Анкілостомідозі
- * Е) При всіх перерахованих

30. При яких гельмінтозах необхідно дослідити дуоденальний вміст:

- * А) Опісторхозі (двоустка котяча)
- * В) Фасциольоз (двоустка печінкова)
- * С) Дикроцеліоз "(двоустка ланцетовидна)
- * D) Клонорхоз "(двоустка китайська)
- * Е) При всіх перерахованих

31. При яких гельмінтозах необхідно дослідити перианальний зскрібок:

*** А) Ентеробіозі**

- В) Ехінококозі
- С) Опісторхозі
- Д) Фасциольозі
- Е) При всіх перерахованих

32. В якому матеріалі виявляються яйця при опісторхозі:

А) В сечі

*** В) В калі та дуоденальному вмісті**

- С) В мокроті
- Д) В крові
- Е) В усіх перерахованих

33. На чому базується лабораторна діагностика трихінельозу:

А) На виявленні яєць в мокроті

*** В) На результатах імунологічних реакцій та дослідження біопсійного матеріалу м'язів**

- С) На знаходженні яєць в калі
- Д) На знаходженні яєць у дуоденальному вмісті
- Е) На знаходженні яєць у перианальному зскрібку

34. Можуть активно проникати через шкіру та слизові оболонки інвазивні личинки:

А) Власоглава

*** В) Анкілостоми, трихінели**

- С) двоустки котячої
- Д) Аскариди

35. Найбільш ефективний для лікування трихоцефальозу:

- * А) Вермокс**
- * В) Дифезил**
- * С) Нафтамол**