

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Харчова алергія

Категорія: **Гастроентерологія**

Кількість запитань: **18**

1. НЕ мають антигенних властивостей наступні компоненти молока:

A) Альфа-лактоальбумін

B) Бета-лактоглобулін

*** C) Лактоза**

D) Казеїн

2. В значній мірі знижуються антигенні властивості при кип'ятінні:

*** A) Альфа-лактоальбуміна**

B) Бета-лактоглобуліна

C) Казеїна

D) Ліпопротеїдів

E) Суміші альбумози та пептонів

3. Клітини слизової оболонки кишки, що виробляють антитіла-імуноглобуліни:

A) Ентероцити

B) Бокаловидні клітини

*** C) Плазматичні клітини**

D) Тучні клітини

E) Клітини Панета

4. НЕ можна застосовувати при анафілактичному шоці:

A) Кортикостероїдні гормони

B) Ефедрин

C) Адреналін, норадреналін

D) Блокатори H1-гістамінорецепторів

*** E) Адельфан**

5. НЕ відповідають гіпосенсибілізуючій дієті:

*** А) Надмірна кількість цукру, меду, варення**

- В) Обмеження повареної солі
- С) Обмеження екстрактивних речовин
- Д) Виключення алкогольних напоїв
- Е) Обмеження прянощів, гострих страв

6. НЕ сприяють профілактиці харчової алергії:

- А) Правильне харчування вагітних
- В) У ранньому дитинстві обмеження вживання продуктів з високою сенсибілізуючою дією

*** С) Регулярне вживання невеликих доз алкоголю**

- Д) Раннє та систематичне лікування гострих та хронічних захворювань органів травлення
- Е) Дегельмінтизація

7. Харчову алергію до молока слід диференціювати з :

*** А) Недостатністю лактази**

- В) Недостатністю мальтази та ізомальтази
- С) Недостатністю сахарази
- Д) Недостатністю трегалази

8. За виключенням харчової алергії, непереносимість злакових може бути при:

- А) Дисахаридазній недостатності

*** В) Глютеновій ентеропатії**

- С) Синдромі Жильбера
- Д) Гіперфенілаланінемії
- Е) Жовчокам'яній хворобі

9. Всмоктування в кров не повністю розщеплених білкових продуктів, що викликають харчову алергію, НЕ пов'язано з :

- A) Порушенням порожнинного травлення в тонкій кишці
- B) Зниженням ферментативної активності шлунка та підшлункової залози
- * C) Активною регенерацією ентероцитів**
- D) Збільшеною проникливістю кишково-печінкового бар'єру при запальних та дистрофічних захворюваннях
- E) Дефіцитом імуноглобуліна

10. НЕ приймає участі у розвитку клінічної симптоматики харчової алергії:

- A) Брадикінін
- B) Повільно реагуюча субстанція
- C) Гістамін
- * D) Сечова кислота**

11. НЕ "суттєво для діагностики харчової алергії:

- A) Радіоалергосорбентний тест
- B) Реакція лізісу лейкоцитів
- C) Тест деструкції тучних клітин
- * D) Реакція Васермана**
- E) Базофільний тест по Шеллі

12. Лікувальна дія глюкокортикостероїдних гормонів при алергічній реакції НЕ пов'язана з механізмами:

- A) Зменшення проникливості мембран клітин
- * B) Стимулювання "продукції соляної кислоти**
- C) Гальмування утворення набряку
- D) Підвищення артеріального тиску
- E) Пригнічення функції тучних клітин

13. НЕ являється яєчним алергеном:

- A) Кональбумін
- B) Овомукоїд
- C) Овальбумін
- D) Лізоцим

*** E) Глютен**

14. Лікувальні засоби, що НЕ впливають на імунологічну стадію алергічної реакції:

- A) Виключення антигену
- B) Денатурація антигену

*** C) Призначення протигістамінних препаратів**

- D) Зменшення поступлення антигену в організм
- E) Утворення захисних блокуючих антитіл

15. Харчова алергія НЕ може викликати:

- A) Гингівіт
- B) Езофагіт
- C) Гострий гастрит

*** D) Інтестинальний поліпоз**

- E) Синдром подразненої кишки

16. Для виявлення харчової алергії НЕ являється суттєвим:

- A) Збір алергічного анамнезу

*** B) Визначення лужної фосфатази у крові**

- C) Ведення харчового щоденника
- D) Елімінаційні проби
- E) Провокуючі проби

17. Елімінаційна дієта з виключенням хлібних злаків може містити:

- * А) Картоплю**
- * В) Гов'ядину**
- * С) Все перераховане**
- * D) Моркву**
- * Е) Соево-картопляне печиво**

18. Після проведення провокаційної проби / прийняття продукту-алергена/ в крові хворих на харчову алергію "відбуваються зміни:

- А) Збільшення кількості тромбоцитів
- В) Кількість тромбоцитів не міняється
- * С) Знижується кількість тромбоцитів**