

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

7 ЗАХВОРЮВАННЯ КРОВІ

Категорія: **Геріатрія**

Кількість запитань: **47**

1. При якому захворюванні в пунктаті лімфовузлів виявляють клітини Березовского-Штернберга?

- A) лімфолейкоз
- B) лімфосаркома
- C) туберкульозний лімфаденіт
- * D) лімфогрануломатоз**
- E) метастази раку

2. При якому лейкозі може бути масивна протеїнурія?

- A) еритремія
- B) гострий лейкоз
- C) хронічний лімфолейкоз
- * D) мієломна хвороба**
- E) хронічний мієлолейкоз

3. Який із перерахованих методів найбільш достовірний при діагностиці лейкозів?

- * A) загальний аналіз крові**
- * B) мієлограма**
- C) пунктат селезінки
- * D) пунктат лімфовузлів**
- * E) цитохімічні методи**

4. Де створюються клітини крові?

- A) у печінці
- * B) у селезінці**
- * C) у кістковому мозку**
- * D) у лімфатичних вузлах**
- * E) в тимусі**

5. Яка клітина є родоначальною клітиною крові?

- A) макрофаг
- B) лімфоцит
- * C) стовбурна клітина**
- D) мієлоцит
- E) гемоцитобласт

6. Периферичними органами імунітету є:

- A) вилочкова залоза
- * B) лімфотичні вузли**
- C) Сумка Фабрициуса
- D) кістковий мозок
- E) печінка

7. При якому лейкозі в мазку крові тіні Боткіна-Гумпрехта?

- A) гострий лімфобластний лейкоз
- B) хронічний еритромієлоз
- * C) хронічний лімфолейкоз**
- D) хронічний мієлолейкоз
- E) еритремія

8. Який симптом найбільше частий при хронічному лейкозі?

- * A) гепатомегалія**
- B) лихоманка
- * C) анемія**
- * D) лімфаденопатія**
- * E) збільшення селезінки**

9. Скарга, найбільш типова для дефіцита заліза:

- A) втрата тактильної чутливості
- * B) посивіння волосся**
- * C) підвищення ламкості нігтів**
- * D) койлоніхії**
- * E) перекручення смаку**

10. Основні показання для парентерального введення препаратів заліза:

- * A) порушення кишкового усмоктування заліза при ентеритах**
- * B) після великих резекцій тонкої кишки**
- * C) загострення виразки шлунка або 12палої кишки**
- D) осиплість голосу
- * E) диспептичний синдром при пероральному прийомі препаратів заліза**

11. Який препарат поліпшує мікроциркуляцію?

- A) бутамід
- * B) нітрогліцерин**
- * C) курантіл**
- * D) трентал**
- E) гіпотіазид

12. Який орган найчастіше уражається при лімфогрануломатозі?

- A) нирки
- B) селезінка
- * C) лімфовузли**
- D) печінка
- E) шлунок

13. При якому захворюванні відзначається найбільш високе прискорення ШЗЕ?

A) еритмія

B) анемія

*** C) гострий лейкоз**

D) гемофілія

*** E) мієломна хвороба**

14. Яка клітина є представником мононуклеарної системи?

A) мієлоцит

B) мегакаріоцит

C) лімфоцит

D) ретикулоцит

*** E) макрофаг**

15. Який симптом при хронічному мієлолейкозі найбільш частий?

*** A) збільшення печінки**

*** B) геморагічний симптом**

C) лімфаденопатія

D) збільшення селезінки

*** E) анемія**

16. Які зміни периферичної крові при хронічному мієлолейкозі найбільш характерні?

*** A) гіперлейкоцитоз**

B) гіпертромбоцитоз

C) бластні клітини

*** D) мієлоцити, метамієлоцити**

*** E) анемія**

17. Тактика лікаря при вираженій гемолітичній анемії у хворого хронічним лімфолейкозом:

- A) призначення нового цитостатика
- B) антибіотики
- * C) переливання крові**
- * D) гормональна терапія**
- E) спленектомія

18. У людей похилого віку спостерігаються переважно наступні зміни клітинного складу крові:

- A) збільшення кількості нейтрофілів
- * B) зменшення кількості нейтрофілів**
- * C) зниження абсолютного числа лімфоцитів**
- D) підвищення абсолютного числа лімфоцитів
- E) тромбоцитопенія

19. Нормальні показники часу кровотечі в літніх:

- A) 1-2 хвилини
- B) 2-3 хвилини
- * C) 3-6 хвилин**
- D) 4-7 хвилин
- E) 5-8 хвилин

20. Гематологічні реакції у людей похилого віку на лікарські засоби, зв'язані з нормальною фармакологічною активністю препарату:

- * A) нормальна, але посилена**
- B) нова і незвичайна
- C) залежність від дози існує
- D) частота реакції низька
- E) передбачуваність подальшої реакції неможлива

21. Неприятливі гематологічні зрушення у старих частіше усього спостерігаються при лікуванні:

- A) серцевими глікозидами
- * B) бутадіоном**
- C) антагоністами кальцію
- D) снодійними
- E) антидіабетичними засобами

22. Кровотворна тканина кісток у віці від 30 до 70 років складає:

- A) 70%
- B) 60%
- * C) 50%**
- * D) 40%**
- E) 30%

23. Кровотворна тканина кісток у віці після 70 років складає:

- A) 70%
- B) 60%
- C) 50%
- * D) 40%**
- * E) 30%**

24. Характерні для людей старечого віку зміни лейкопоеза:

- A) збільшення кількості малодиференційованих клітин
- * B) уповільнення дозрівання клітин**
- * C) число лейкоцитів в периферичній крові зменшується**
- D) число лейкоцитів у периферичній крові збільшується
- * E) тенденція до зменшення числа еозинофілів і палочкоядерних нейтрофілів**

25. Характерні для літнього і старечого віку зміни еритроцитарного паростка:

*** А) зменшення кількості еритроцитів**

В) збільшення кількості еритроцитів

*** С) нормоцитоз**

Д) мікроцитоз

Е) макроцитоз

26. Вікові зміни у функціональних системах, що приводять до розвитку залізодефіцитних анемій:

*** А) гіпохлоргідрія**

*** В) зниження активності ферментів шлунка, кишечника**

*** С) зниження синтезу апоферитана**

*** Д) зниження синтезу трансферина**

Е) зниження рівня кровотока в кістковому мозку

27. Найбільш важливий механізм еритроцитоза при тривалому кисневому голодуванні у хворих з бронхолегеневим захворюванням:

А) надходження в кров еритроцитів із кров'яних депо

В) перерозподіл кров'яної маси

С) сгущення крові

*** Д) посилення кісткомозкового еритроцитоза**

Е) посилення еритропоетичної функції нирок

28. Які клітини гранулоцитарного ряду є зрілими і у нормі виходять у кров'яне річище?

*** А) юні**

*** В) палочкоядерні**

С) мієлоцити

Д) промієлоцити

Е) метамієлоцити

29. Яка клітина 4 класу є попередницею нейтрофілів?

- A) плазмобласт
- B) лімфобласт
- * C) мієлобласт**
- D) мегакарібласт
- E) монобласт

30. Який препарат найбільш часто викликає тромбоцитопенію?

- * A) ортофен**
- * B) плаквеніл**
- C) рибоксин
- D) букарбан
- E) верошпірон

31. При якому захворюванні лейкомоїдна реакція лімфоцитарного типу нагадує хронічний лімфолейкоз?

- A) імунобластний лімфаденіт
- * B) хвороба котячої подряпини**
- * C) інфекційний лімфоцитоз**
- * D) інфекційний мононуклеоз**
- E) вітряна віспа

32. Яка доза цианокобаламіна при перніціозній комі:

- A) 200 мкг на добу
- * B) 1000 мкг на добу**
- C) 300 мкг на добу
- D) 150 мкг на добу
- E) 100 мкг на добу

33. Чим характеризується лейкограма при хронічному мієлолейкозі?

- * А) лімфоцитопенією**
- * В) базофільно-еозинофільною асоціацією**
- * С) зрушенням уліво мієлоцитів**
- D) лімфоцитозом
- E) моноцитозом

34. Яка діагностична тріада характерна для системного червоного вовчка?

- A) дерматит, діарея, деменція
- B) дерматит, лімфаденопатія, нефрит
- * С) дерматит, артрит, полісерозит**
- * D) дерматит, поліневрит, нефрит**
- E) дерматит, гіпертензія, артрит

35. Який синдром указує на підвищення проникності капілярів?

- * А) визначення кількості тромбоцитів**
- B) синдром іпкі
- C) прискорена ШОЕ
- * D) симптом Кончаловського-Румпель-Леєде**
- * Е) збільшення кількості лейкоцитів**

36. Ціаноз розвивається внаслідок:

- A) підвищення рівня гемоглобіну
- B) зниження рівня гемоглобіну
- C) підвищення рівня меланіну
- * D) зниження рівня оксигемоглобіну**
- E) зниження рівня каротину

37. Яка основна клінічна ознака при гострій постгеморагічній анемії важкого ступеня:

- * А) болі в області серця**
- * В) колапс, непритомність**
- * С) запаморочення**
- * D) блідість шкірних покривів**
- Е) підвищений артеріальний тиск

38. Коли після крововтрати в крові з'являється ретикулоцитоз:

- А) через 1 день
- В) через 12 годин
- С) через 2 дні
- * D) через 45 днів**
- Е) через 3 дні

39. В якому випадку відзначається уповільнення ШОЕ?

- А) при злоякісних пухлинах
- В) при інфаркті міокарда
- * С) при виражених явищах недостатності кровообігу**
- Д) при анемії
- Е) при гемобластозе

40. При якому з перерахованих захворювань кольоровий показник завищений?

- А) хронічна постгеморагічна анемія
- В) гостра постгеморагічна анемія
- * С) В-12дефіцитна анемія**
- Д) хвороба Макіафава-Мікелі
- Е) талассемії

41. Для якого захворювання характерна базофільно-еозинофільна асоціація?

- A) гострий лімфобластний лейкоз
- B) гемолітична анемія
- C) сивороточна хвороба
- * D) хронічний мієлолейкоз**
- E) меланосаркома

42. Де частіше робиться пункційна біопсія кісткового мозку?

- A) стегнова кістка
- * B) грудина**
- C) кістки черепа
- D) підвздошна кістка
- E) ребра

43. Для якого лейкоза характерна базофільно-еозинофільна асоціація?

- * A) гострий лейкоз**
- * B) ерітремія**
- * C) хронічний мієлолейкоз**
- D) хронічний лімфолейкоз
- E) мієломна хвороба

44. Що варто призначати хворим хронічним лімфолейкозом у I стадії?

- A) малі дози цитостатиків
- B) антибіотики
- C) глюкокортикоїди
- * D) вітамінотерапія**
- E) поліхіміотерапія

45. Основний метод лікування залізодефіцитної анемії:

- A) переливання крові
- * B) прийом харчового заліза з продуктами харчування**
- * C) застосування сольових препаратів заліза**
- * D) прийом вітамінів**
- E) фітотерапія

46. Яка група препаратів може викликати депресію кровотворення?

14901,40"сульфаніламід

- * A) антиметаболіти**
- B) серцеві глікозиди
- C) бетаадреноблокатори
- D) інсулін

47. Картина периферичної крові при лімфогрануломатозі на пізніх етапах:

- A) помірний нейтрофільний лейкоцитоз
- B) абсолютний лейкоцитоз
- C) еозінофілія
- * D) анемія**
- * E) лімфопенія**