

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

8 ЗАХВОРЮВАННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Категорія: **Геріатрія**

Кількість запитань: **60**

1. Основним моментом у розвитку вікових змін опорнорухового апарата є:

- * А) кістковохрящові розростання країв тіл хребців**
- * В) кістковохрящові розростання країв тіл дисків**
- * С) дистрофічно-деструктивні порушення з переважанням остеопороза**
- * D) зміна форми хребців**
- Е) зміна форми дисків

2. Віковий остеопороз це:

- * А) порушення співвідношення органічної і мінеральної речовини в кістці**
- В) відсутність порушень співвідношення мінералів і органічних речовин
- * С) виступає як патологічне явище**
- * D) біологічно обумовлене розрідження кісткової тканини без порушення співвідношення мінералів і органічних речовин**

3. При наявності помірного болю в хребті на тлі остеопороза першочерговим лікувальним заходом буде:

- * А) комплекс рухових вправ**
- * В) короткочасна іммобілізація з використанням щита**
- * С) короткочасна іммобілізація без використання щита**
- Д) ходіння за допомогою милиць
- * Е) призначення анаболічних стероїдів**

4. Первинні зміни при остеохондрозі хребта розвиваються:

- * А) переважно в пульпозному ядрі**
- * В) у міжпозвонковому**
- С) в кістковій тканині тіл хребта
- * D) в кістковій тканині суглобів**
- Е) в хрящовій тканині

5. Для якої локалізації остеохондроза характерний розвиток брахіалгії з болями в області передпліччя, кісті і онімінням:

- * А) шийний відділ**
- * В) верхньогрудний**
- С) поясничний
- Д) нижньогрудний
- * Е) сполучення змін у шийному і грудному відділах**

6. Найчастіші причини кардіалгій, пов'язаних із захворюванням серця в літньому віці:

- * А) нейроциркуляторна дистонія**
- * В) хронічне легеневе серце**
- * С) гіпертрофія міокарда**
- Д) перикардит
- Е) міокардит

7. Найчастіші причини кардіалгій у літньому і старечому віці, пов'язаних із патологією бронхолегеневого апарата:

- * А) ураження парієтальної плеври**
- * В) гостра пневмонія**
- * С) пухлини бронхів**
- * Д) медіастинальний плеврит**
- Е) гострий бронхіт

8. При остеохондрозі шийного відділу хребта частіше усього розвиваються наступні синдроми:

- * А) синдром передньої грудної стінки**
- * В) скаленус-синдром**
- С) ксифондія
- Д) синдром Титце
- Е) м'язовофасціальний

9. Причиною виникнення аорталгії є:

- А) атеросклероз вінцевих артерій
- В) нейроциркуляторна дістонія
- * С) шийний остеохондроз**
- * Д) атеросклероз аорти**
- * Е) сифілітичний аортит**

10. У людей похилого віку в порівнянні з молодими відбуваються наступні зміни в кістковій тканині:

- * А) зменшення щільності кісткової тканини на 10-20%**
- * В) зменшення щільності кісткової тканини на 30-40%**
- * С) збільшення щільності кісткової тканини на 10-20%**
- Д) збільшення щільності кісткової тканини на 30-40%
- Е) змін у кістковій тканині не відбувається

11. вміст якого мікроелемента знижується в кістковій тканині з віком:

- А) кремній
- В) стронцій
- С) свинець
- Д) магній
- * Е) мідь**

12. Захворюваність яким артритом підвищується в старості:

A) ревматоїдний

*** B) деформуючий**

C) вівчаночний (при СЧВ)

D) бруцельозний

E) туберкульозний

13. Який продукт харчування обмежують хворим на подагру:

*** A) риба**

B) молоко

C) гречана каша

D) сир

*** E) білокачанна капуста**

14. Основний клінічний симптом дефартроза:

*** A) біль**

B) субфебрилитет

C) гіперемія шкіри в ділянці суглоба

D) внутрисуглобовий хрускіт

E) набряк

15. З яким захворюванням необхідно диференціювати остеохондроз грудного відділу хребта:

*** A) стенокардія**

*** B) гіпертонічний криз**

*** C) плеврит**

D) туберкульоз легенів

*** E) перикардит**

16. Тракційна терапія більш показана при:

- A) плечелопаточний періартрит
- B) остеохондроз шийного відділу хребта
- C) артроз колінного суглоба
- * D) остеохондроз поясничного відділу хребта**
- E) ревматоїдний артрит

17. Якому препарату слід віддати перевагу при лікуванні хворого на подагру:

- * A) ортофен**
- * B) бруфен**
- * C) індометацин**
- * D) алопуринол**
- * E) реопірин**

18. Тазостегновий суглоб частіше уражається при:

- A) ревматодному артриті
- B) подагрі
- * C) деформуючому артриті**
- D) бруцельозі
- E) туберкульозі

19. При якому захворюванні опорнорухового апарата лікувальне харчування грає велике значення:

- A) остеохондроз хребта
- B) деформуючий артроз
- C) ревматоїдний артрит
- * D) подагра**
- E) туберкульозний артрит

20. Характерний симптом для остеохондроза грудного відділу хребта:

*** А) запаморочення**

В) шум у вухах

С) хиткість ходи

*** D) кардіалгія**

Е) безсоння

21. Ревматоїдний артрит серед літніх і старих людей складає від кількості усіх випадків захворювання:

А) 5%

В) 10%

С) 20%

*** D) 30%**

Е) 50%

22. Для ревматоїдного поліартрита характерним є:

А) біль у суглобах у спокої і при русі

В) ранкова скутість

С) регіональна м'язова атрофія

Д) дефігурація суглобів

*** Е) усі перераховані ознаки**

23. Суглобововісцеральна форма ревматоїдного поліартрита протікає у вигляді:

А) суглобовосерцевої форми

В) суглобоволегенової форми

С) суглобовониркової форми

Д) суглобовоочної форми

*** Е) однаково часто у вигляді названих форм**

24. Для синдрому "ревматоїдного серця" характерний:

*** А) міокардит, міокардитичний кардіосклероз**

В) митральний порок

С) аортальний порок

Д) перикардит

Е) коронарит

25. Доброякісна форма ревматоїдного поліартрита у літніх характеризується:

А) переважно ураженням суглобів

В) повільним прогресуванням

С) рідкими загостреннями і тривалими ремісіями

Д) низькою активністю запального процесу

*** Е) усіма перерахованими ознаками**

26. Яка ознака відрізняє первинний деформуючий остеоартроз у літніх хворих від ревматоїдного поліартрита?

А) ураження найбільш функціонально навантажених великих суглобів

В) больовий синдром чітко зв'язаний із фізичним навантаженням

С) рухи у великих суглобах мало обмежені навіть при значних деформаціях

Д) при поразці дрібних суглобів страждають дистальні, а не проксимальні суглоби

*** Е) усі перераховані ознаки**

27. При первинному деформуючому остеоартрозі у літніх на відміну від ревматоїдного артрити рідше зустрічаються:

А) збільшення ШЗЕ

*** В) нормо- або гіпохромна анемія**

С) С-реактивний білок

Д) гіперглобулінемія

Е) збільшення вмісту сіалових кислот

28. Лікування ревматоїдного артрит без системних проявів починають із призначення:

- A) кортикостероїдів
- B) імунодепресантів
- * C) нестероїдних протизапальних препаратів**
- D) пеніциліна
- E) препаратів золота

29. Пізня рентгенологічна ознака остеоартроза:

- * A) нерівномірність ширини суглобної щілини**
- * B) деформація суглобних кінців**
- * C) остеофітоз**
- D) перебудова внутрішньої структури кісткової тканини
- * E) кістковий анкілоз**

30. Які знімки варто призначати для рентгендіагностики ранньої стадії РА?

- A) черепа
- * B) суглобів кисті і стіп**
- C) ілеосакрального зчленування
- D) пліснефалангового суглоба
- E) колінних суглобів

31. Назвіть тип деформації кісті при ревматоїдному артриті:

- * A) шия лебедя**
- B) бухтоподібні дефекти
- C) дископодібна дефігурація пальців
- * D) вузлики Гебердена**
- E) тофуси

32. Назвіть клінічний симптом ревматоїдного артрит у літніх хворих:

- A) ексудативний плеврит
- * B) скутість вранці**
- * C) остеопороз кісток**
- D) переважне ураження великих суглобів
- E) метелик на щоках

33. Назвіть клінічну ознаку подагри:

- A) скутість у суглобах
- B) частіше хворіють жінки
- C) анемія
- D) симетричне ураження великих суглобів
- * E) артрит I плюснефалангового суглоба**

34. З яким захворюванням найбільш часто сполучається подагра?

- A) бронхіальна астма
- * B) ожиріння**
- * C) жирова дистрофія печінки**
- D) цукровий діабет
- * E) атеросклероз**

35. Ознака класичного гострого нападу при подагрі:

- * A) припухлість та гіперемія шкіри**
- B) лихоманка
- C) озноб
- * D) раптова поява різкого болю у I плюснефаланговому суглобі**
- E) тромбоцитоз

36. Захворювання з котрим найбільш часто диференціюють подагру:

- A) акромегалія
- B) цукровий діабет
- * C) ревматоїдний артрит**
- * D) ревматизм**
- * E) алергічний поліартрит**

37. Для визначення функції якого відділу хребта перевіряють симптом Шобера?

- A) шийного відділу хребта
- B) верхньо грудного відділу
- C) нижньогрудного відділу
- * D) пояснично го відділу**
- E) крижового відділу

38. Який діагностичний тест відбиває ступінь м'язової деструкції при запаленні?

- A) сечова кислота
- B) діастаза
- C) трансаміназа
- D) креатинурія
- * E) креатинфосфокіназа**

39. Пізня рентгенологічна ознака остеоартроза:

- * A) нерівномірність ширини суглобної щілини**
- B) деформація суглобних кінців
- * C) остеофітоз**
- D) перебудова внутрішньої структури кісткової тканини
- * E) кістковий анкілоз**

40. З допомогою якого методу можна вивчити внутрішню порожнину суглоба?

- A) рентгенографія кісток
- * B) артроскопія**
- C) теплобачення
- D) радіоізотопне дослідження
- E) міоманометрія

41. Для визначення функції якого відділу хребта перевіряють симптом Шобера?

- A) шийного відділу хребта
- B) верхньо грудного відділу
- C) нижньогрудного відділу
- * D) пояснично го відділу**
- E) крижового відділу

42. Назвіть клінічну ознаку подагри:

- A) скутість у суглобах
- * B) частіше хворіють жінки**
- C) анемія
- D) симетрична поразка великих суглобів
- * E) артрит I плюснефалангового суглоба**

43. З яким захворюванням найбільш часто поєднується подагра?

- A) бронхіальна астма
- * B) ожиріння**
- C) жирова дистрофія печінки
- D) цукровий діабет
- E) атеросклероз

44. Захворювання, з яким найбільш часто диференціюють подагру:

- A) акромегалія
- B) цукровий діабет
- * C) ревматоїдний артрит**
- * D) ревматизм**
- * E) алергічний поліартрит**

45. Який урикозуричний засіб найчастіше застосовується?

- A) бенемід
- B) антуран
- C) етамід
- D) кетазан
- * E) ацетілсаліцилова кислота**

46. Який діагностичний тест відбиває ступінь м'язової деструкції при запаленні?

- A) сечова кислота
- B) діастаза
- C) трансаміназа
- D) креатинурія
- * E) креатинфосфокіназа**

47. Пізня рентгенологічна ознака остеоартроза:

- * A) нерівномірність ширини суглобної щілини**
- B) деформація суглобних кінців
- * C) остеофітоз**
- D) перебудова внутрішньої структури кісткової тканини
- * E) кістковий анкілоз**

48. З допомогою якого методу можна вивчити внутрішню порожнину суглоба?

A) рентгенографія кісток

*** B) артроскопія**

C) теплобачення

D) радіоізотопне дослідження

E) міоманометрія

49. Назвіть клінічну ознаку подагри:

A) скутість у суглобах

*** B) частіше хворіють жінки**

C) анемія

D) симетрична поразка великих суглобів

*** E) артрит I плюснефалангового суглоба**

50. З яким захворюванням найбільш часто поєднується подагра?

A) бронхіальна астма

*** B) ожиріння**

C) жирова дистрофія печінки

D) цукровий діабет

E) атеросклероз

51. Захворювання, з яким найбільш часто диференціюють подагру:

A) акромегалія

B) цукровий діабет

*** C) ревматоїдний артрит**

*** D) ревматизм**

*** E) алергічний поліартрит**

52. Які прояви легкого ступеня зміни суглобів, що виявляються при зовнішньому огляді?

- A) деформація
- B) анкілоз
- C) дефігурація
- D) припухлість

*** E) сглаженість контуру суглоба**

53. Яким методом визначається вільна рідина в суглобі?

- A) методом стиску (двопальцевим)
- B) сгинання суглоба
- C) розгибання суглоба
- D) доторку

*** E) бімануально (двома долонями)**

54. З яким захворюванням часто сполучається ревматоїдний артрит?

- A) геморагічний васкуліт
- B) нецукровий діабет
- C) ішемічна хвороба серця
- D) акромегалія

*** E) деформуючий остеоартроз**

55. Назвіть клінічний симптом ревматоїдного артрити:

- A) перикардит
- B) еритеми

*** C) остеопороз кісток**

- D) дефігурація суглобів
- E) слабкість м'язів

56. Який урикозуричний засіб найчастіше застосовується?

- A) бенемід
- B) антуран
- C) етамід
- D) кетазан

*** E) ацетілсаліцилова кислота**

57. Які прояви змін суглобів легкого ступеня, що виявляються при зовнішньому огляді?

- A) деформація
- B) анкілоз
- C) дефігурація

*** D) припухлість**

*** E) сглаженість контуру суглоба**

58. Що характеризує симптом Отта?

- A) рухливість шийного відділу хребта
- B) поясничного відділу
- C) крижового відділу
- D) поясничного відділу

*** E) рухливість грудного відділу хребта**

59. Рання рентгенологічна ознака при коксоартрозі?

- A) остеопороз кісток
- B) деформація суглобових кінців

*** C) загострення краю вертлужної западини**

- D) остеофітоз
- E) кістковий анкілоз

60. Що виявляє сцинтиграма при остеоартрозі?

- A) звуження суглобної щілини
- B) остеофітоз
- * C) вогнища скупчення радіоізопа**
- D) остеопороз кістки
- E) порушення порожнини суглоба