

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

9 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

Категорія: **Геріатрія**

Кількість запитань: **10**

1. Якому з лікарських засобів Ви віддасте перевагу при лікуванні атеросклеротичної енцефалопатії:

- * А) теофілін**
- В) теобромін
- * С) кавінтон**
- Д) папаверин
- * Е) антагоністи кальцію**

2. Причиною перехідних порушень мозкового кровообігу у віці 60-69 років частіше усього є:

- * А) гіпертонічна хвороба**
- * В) атеросклеротична гіпертензія**
- С) атеросклероз судин головного мозку
- * Д) сполучення атеросклерозу мозкових судин і гіпертонічної хвороби**
- * Е) гіпертензивний криз**

3. При розвитку ішемічного інсульту основним лікувальним заходом є:

- А) заходи щодо посилення серцевої діяльності
- * В) застосування седативних засобів**
- * С) використання антикоагулянтів**
- * Д) заходи щодо нормалізації артеріального тиску**
- * Е) заходи щодо зниження набряку мозку**

4. Перемежована кульгавість клінічно проявляється:

- А) періодичним болем однієї з нижніх кінцівок
- В) періодичним болем в обох нижніх кінцівках
- * С) раптово наступаюча слабкість однієї з нижніх кінцівок**
- Д) повільно наступаюча слабкість однієї з нижніх кінцівок
- * Е) раптово наступаюча слабкість обох ніг із парестезіями, болями корінцевого характеру**

5. Частіше усього дискогенний біль у віці старіше 60 років з'являється при поразці:

- A) шийного відділу хребта
- * B) поясничного відділу хребта**
- * C) верхньогрудного відділу хребта**
- D) нижньогрудного відділу хребта
- * E) поєднаного ураження грудного і поясничного відділу хребта**

6. Зазначте найважливіші вікові зміни вищої нервової діяльності

- A) збільшення врівноваженості основних нервових процесів
- * B) зниження сили, рухливості нервових процесів**
- C) емоційна стомленість
- D) стабільність мнестичних функцій
- E) посилення проявів цілеспрямованої поведінки

7. Атеросклеротична енцефалопатія - це:

- A) клінічні прояви локальних функціональних і структурних змін головного мозку
- * B) клінічні прояви переважно функціональних змін головного мозку**
- * C) клінічні прояви дифузних функціональних і структурних змін головного мозку, викликані недостатністю мозкового кровообігу**
- * D) симптоматика ураження кори мозку**

8. Основна клінічна ознака початкової енцефалопатії атеросклеротичної:

- * A) частий головний біль**
- * B) запаморочення**
- * C) астеничний синдром з динамічністю його проявів**
- * D) астеничний синдром з торпідністю його проявів**
- * E) відчуття шуму у вухах**

9. Об'єктивним и критеріями початкової атеросклеротичної енцефалопатії є:

- A) підвищення сухожильних рефлексів
- B) зниження сухожильних рефлексів
- * C) рефлексии орального автоматизму**
- D) часті минущі розлади мозкового кровообігу
- E) ознаки осередкових змін у головному мозку

10. Основна клінічна ознака помірної атеросклеротичної енцефалопатії:

- * A) посилення виразності астеничного синдрому**
- B) підкреслюються риси характеру
- * C) змінюються риси характеру**
- * D) уповільнення темпу руху з розладом координації**
- E) гіперкінези