

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Епідеміологія і профілактика гострих кишкових інфекцій

Категорія: **Гігієна харчування**

Кількість запитань: **20**

1. Домінуючим механізмом передачі збудників кишкових інфекцій є:

*** А) Фекально-оральний**

- В) Крапельний
- С) Трансмісивний
- Д) Контактний
- Е) Усі перелічені

2. При кишкових інфекціях кінцевими чинниками передачі найчастіше бувають:

*** А) Вода та харчові продукти**

- В) Предмети навколишнього середовища
- С) Крапельки слизу з поверхні дихальних шляхів
- Д) Пил та аерозоль
- Е) Комахи

3. Який із перелічених чинників не є обов'язковим для можливості виникнення гострої кишкової інфекції аліментарного походження?

- А) Наявність джерела інфекції
- В) Контамінація збудником харчового продукту

*** С) Накопичення збудника у харчовому продукті**

- Д) Вживання у їжу контамінованого продукту
- Е) Сприйнятливість організму людини до збудника

4. Для яких із перелічених захворювань аліментарний механізм передачі не є основним?

- А) Дизентерія, холера
- В) Черевний тиф, паратифи А і В
- С) Вірусний гепатит
- Д) Кишковий амебіоз

*** Е) Скарлатина, дифтерія**

5. Який шлях поширення дизентерії є основним?

- * А) Побутовий**
- * В) Водний**
- * С) Харчовий**
- D) Мушиний
- E) Аерозольний

6. В сучасних умовах в Україні основними збудниками дизентерії з харчовим фактором передачі є шигели:

- A) Григор'єва-Шига
- * В) Флекснера**
- * С) Зонне**

7. Серед харчових продуктів найбільше значення у розповсюдженні дизентерії мають:

- A) М'ясо і м'ясопродукти
- B) Риба і рибопродукти
- * С) Молоко і молочні продукти**
- D) Сирі овочі і фрукти
- E) Кондитерські вироби

8. Молочні спалахи дизентерії від водяних не відрізняються тільки:

- A) Меншою масовістю
- B) Моноетіологічністю
- C) Виникненням спалахів частіше влітку або ранньої осені
- D) Гострим початком і меншою тривалістю епідемії
- * Е) Частою появою 'ендемічного хвоста'**

9. Найнебезпечнішим джерелом інфекції при дизентерії є:

- A) Хворі на гостру форму хвороби
- B) Хворі на хронічну форму
- * C) Хворі на легку форму хвороби**
- * D) Хворі на стерті форми хвороби**
- * E) Бактеріоносії**

10. Найбільш оперативно виявити шляхи та чинники поширення збудника дизентерії і своєчасно вжити дійових профілактичних заходів найкраще допоможуть:

- * A) Розроблені в СЕС карти-схеми забезпечення окремих об'єктів різними харчовими продуктами**
- * B) Виділення контрольних ділянок із ізольованим водопостачанням**
- C) Збирання епіданамнезу у потерпілих в кожному осередку
- D) Дані лабораторних досліджень якості води і харчових продуктів
- E) Результати бактеріологічних обстежень працівників харчових об'єктів

11. Провідними протиепідемічними заходами по відношенню до дизентерії, не дивлячись на труднощі у їх практичній реалізації, залишаються:

- * A) Санітарно-гігієнічні заходи соціального характеру, які забезпечують захист харчових продуктів, води від контамінації збудником**
- * B) Епідеміологічний нагляд**
- C) Розробка полівалентних вакцин
- D) Застосування бактеріофагів
- E) Санітарно-просвітна робота

12. Основним джерелом інфекції при сальмонельозі є:

- A) Хвора на сальмонельоз людина
- B) Бактеріоносії
- * C) Різноманітні тварини і птахи**
- D) Риба

13. Найважливішими чинниками передачі збудника при сальмонельозі є:

- * А) М'ясо та м'ясні продукти**
- * В) Яйця та яйцепродукти**
- * С) Риба та рибопродукти**
- * D) Кондитерські вироби, компоти**
- Е) Ягоди
- Ф) Готові страви

14. На відміну від харчових отруєнь, інфекційна захворюваність на зоонозний сальмонельоз зумовлюється:

- * А) Центральним джерелом постачання м'ясних продуктів м'ясокомбінатом чи птахофабрикою**
- В) Локальним забрудненням харчових продуктів на об'єктах постачання дитячих закладах, школах, їдальнях тощо
- С) Станом профілактики і додержання правил особистої гігієни на харчових об'єктах

15. З якою службою або відомством СЕС слід в першу чергу погоджувати питання і дії щодо профілактики зоонозного сальмонельозу?

- А) З міністерством торгівлі
- В) З керівниками підприємств харчової промисловості
- * С) З ветеринарною службою**
- Д) З відомчою санітарною службою
- Е) Із службами і відомствами, які контролюють якість харчових продуктів

16. Осіб з числа декретованих, які перехворіли на сальмонельоз, виписують із стаціонару тільки після отримання:

- А) Одноразового негативного результату бактеріологічного дослідження
- В) Дворазового негативного результату
- * С) Трикратного негативного результату**

17. Який шлях нині є провідним у поширенні холери?

A) Через питну воду

*** B) Через воду відкритих водоймищ**

C) Побутовий

18. Які харчові продукти нині стали найбільш небезпечним чинником передачі збудників холери?

A) М'ясо і м'ясопродукти

*** B) Риба і рибопродукти**

C) Молоко і молокопродукти

D) Овочі, фрукти

E) Кондитерські вироби

19. Провідним напрямком протиепідемічних заходів по відношенню до холери в останні роки стали:

*** A) Заходи, що передбачають розрив механізму передачі збудника холери**

*** B) Заходи, що націлені на нейтралізацію джерела інфекції**

C) Санітарна охорона кордонів від завезення інфекції ззовні

D) Вакцинація населення

20. Що означає комплексність протиепідемічних заходів?

A) Участь у проведенні протиепідемічних заходів усіх підрозділів СЕС

B) Участь в проведенні протиепідемічних заходів різних служб району (міста)

*** C) Одночасний вплив на джерело, механізм передачі збудника і сприйнятливість організму**