

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Методи обстеження в неврології

Категорія: **Неврологія (спеціаліст)**

Кількість запитань: **34**

1. Ліквор при туберкульозному менінгіті:

- * **A) Ліквор прозорий, переважають лімфоцити. Рівень глюкози знижений**
- В) Ліквор прозорий і безбарвний, переважають лімфоцити. Рівень глюкози нормальний
- С) Ліквор ксантохромний. Рівень глюкози нормальний

2. Біназальна геміанопсія:

- * **A) Випадіння внутрішніх половин поля зору**
- В) Випадіння зовнішніх половин поля зору

3. Гетеронімна геміанопсія:

- * **A) Випадіння обох внутрішніх або обох зовнішніх половин поля зору**
- В) Випадіння обох правих, верхніх або нижніх половин поля зору кожного ока

4. Гомонімна геміанопсія:

- А) Випадіння обох внутрішніх або обох зовнішніх половин поля зору
- * **В) Випадіння обох правих, верхніх або нижніх половин поля зору кожного ока**
- * **С) Випадіння обох правих або лівих половин поля зору**
- Д) Все перераховане вірно

5. Кіркові розлади мови:

- А) Скандована вимова
- В) Дизартрія
- * **С) Афазія**
- * **Д) Заїкуватість**

6. При ураженні лобової частки виникає:

- А) Сенсорна афазія
- В) Амнестична афазія
- * **С) Моторна афазія**

7. При ураженні скроневої частки виникає:

- A) Моторна афазія
- * B) Сенсорна афазія**
- * C) Амнестична афазія**

8. Амнестична афазія виникає при ураженні:

- A) Лобової частки
- B) Потиличної частки
- * C) Скроневої частки**

9. Метод визначення амнестичної афазії:

- A) Запропонувати пацієнту вимовити складні слова
- * B) Запропонувати пацієнту назвати предмети**

10. Астереогноз виникає при ураженні:

- A) Скроневої частки
- B) Потиличної частки
- C) Лобової частки
- * D) Тім'яної частки**

11. Метод визначення астереогнозу:

- * A) Запропонувати пацієнту впізнати предмети при обмацуванні їх із закритими очима**
- B) Запропонувати пацієнту назвати предмети

12. Методи, що використовуються для визначення праксису:

- A) Виконання пальце-носової проби
- * B) Виконання елементарних дій із реальними предметами**

13. Ехо-ЕГ застосовується для:

- * А) Визначення внутрішньочерепних об'ємних процесів, лікворної гіпертензії**
- * В) Визначення наявності лікворної гіпертензії**
- С) Визначення об'ємного кровотоку
- Д) Визначення стану судин мозку

14. Серединне ехо зміщується:

- А) У бік ураженої півкулі
- * В) У бік неуразованої півкулі**

15. КТ застосовується для:

- А) Оцінки стану судин головного мозку
- В) Оцінки лінійного мозкового кровотоку
- * С) Визначення об'ємних процесів головного мозку**

16. ЕЕГ застосовується для:

- А) Оцінки лінійного мозкового кровотоку
- * В) Оцінки біоелектричної активності мозку**

17. РЕГ застосовується для:

- * А) Оцінки стану судин головного мозку**
- В) Оцінки об'ємного мозкового кровотоку
- С) Оцінки біоелектричної активності мозку

18. При внутрішній гіпертензії /пухлина, абсцес, гематома, гідроцефалія і т.д./, характерні зміни:

- * А) Посилення пальцевих вдавлень**
- * В) Розширення діплоетичних вен**
- * С) Порозність деталей турецького сідла**
- * D) Посилення судинного малюнку**
- * Е) Все перераховане**

19. При невриномії слухового нерва характерні зміни кісток черепа:

- * А) Деструкція піраміди скроневої кістки**
- * В) Розширення внутрішнього слухового проходу**
- С) Порозність деталей турецького сідла

20. Наявність фотом /мерехтіння перед очима іскор, точок, що світяться / вказує на наявність осередків:

- * А) Ділянці шпорної бороди**
- * В) Зорового нерва**
- * С) Хіазми**
- * D) Зорового тракту**
- Е) Все перераховане
- ґ) Поля 18 і 19
- Г) Все перераховане невірно

21. Наявність зорових галюцинацій указує на наявність вогнища в:

- * А) Полі 18 і 19**
- В) Первинному зоровому центрі

22. Ліквор при запальних захворюваннях оболонок головного мозку:

- * А) Клітково-білкова дисоціація**
- В) Білкова-клітинна дисоціація

23. Ліквор при менінгококовому менінгіті:

*** А) Ліквор каламутний. Виражений цитоз, переважають полінуклеари. У лікворі визначаються менінгококи**

В) Ліквор каламутний. Виражений цитоз, переважають нейтрофіли

24. При ураженні звукопровідного апарату:

*** А) Проба Рінне негативна**

В) Проба Рінне позитивна

25. При ураженні звукопровідного апарату:

А) Проба Веберазвук краще чутний здоровим вухом

*** В) Проба Веберазвук краще чутний на хворій стороні**

26. При ураженні звукопровідного апарату:

*** А) Проба Швабахакісткова провідність подовжена**

В) Проба Швабахакісткова провідність укорочена

27. При ураженні звукосприймаючого апарату:

*** А) Проба Рінне позитивна**

В) Проба Рінне негативна

28. При ураженні звукосприймаючого апарату:

*** А) Проба Веберазвук краще чутний здоровим вухом**

В) Проба Веберазвук краще чутний на хворій стороні

29. При ураженні звукосприймаючого апарату:

*** А) Проба Швабахакісткова провідність укорочена**

В) Проба Швабахакісткова провідність подовжена

30. При ураженні звукосприймаючого апарату:

А) Проба Рінне негативна

В) Проба Веберазвук краще чутний на хворій стороні

*** С) Проба Швабахакісткова провідність укорочена**

31. При РЕГ дослідженні: амплітуда основної хвилі зменшується:

*** А) При підвищенні тонусу мозкових судин**

В) При зниженні тонусу мозкових судин

32. При РЕГ дослідженні амплітуда основної хвилі зростає:

*** А) При зниженні тонусу мозкових судин**

В) При підвищенні тонусу мозкових судин

33. Застійний сосок зорового нерва виникає при захворюваннях головного мозку:

*** А) Пухлинах, абсцесах, гідроцефалії**

В) Менінгітах, енцефалітах

34. Бітемпоральна геміанопсія:

*** А) Зруйновані перехресні в волокнах хіазми**

В) Зруйновані волокна, що не перехрещуються в хіазмі