

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Особливості лікування неврологічних хворих

Категорія: **Неврологія (спеціаліст)**

Кількість запитань: **52**

1. Комплексне лікування - це:

- A) Застосування патогенетичних засобів
- B) Застосування фармакологічних засобів
- C) Застосування фармакологічних і фізіотерапевтичних засобів
- * D) Застосування етіо-патогенетичних засобів, максимально індивідуалізованих**

2. Патогенетична терапія спрямована на:

- A) Усунення причини виникнення захворювання
- * B) Усунення наслідків, викликаних етіологічними чинниками**
- C) Усунення окремих симптомів захворювання
- D) Корекція біохімічних процесів із відновленням гемодинамічних зсувів

3. Симптоматична терапія - це:

- * A) Вплив на окремі прояви захворювання**
- B) Усунення причини захворювання
- C) Вплив на процес, викликаний етіологічним чинником

4. Етіологічне лікування - це:

- A) Застосування засобів, що коригують імунітет
- B) Застосування засобів із бактерицидною і бактеріостатичною дією
- * C) Застосування засобів з однозначним впливом на причинний чинник**
- D) Застосування засобів, що корегують біохімічні порушення

5. Гепарин хімічно не сумісний із усіма перерахованими препаратами, за винятком:

- A) Кортизону
- * B) Урокінази**
- C) Пеніциліну
- D) Папаверину
- E) Коліміцину

6. З якими лікарськими препаратами не сумісний вольтарені

- A) Валокордин
- B) Бісептол
- * C) Антикоагулянти**
- D) Стрептоміцин
- E) Карсил

7. Яке лікування обов'язково проводиться у важких випадках еклампсії?

- * A) В/в сірчанокисла магнезія**
- * B) В/в лазикс**
- C) Аміназин
- * D) Дибазол в/м**
- * E) Люмбальна пункція**

8. Пряма дія лікарської речовини - це:

- * A) Безпосередній вплив на тканини**
- * B) Безпосередній вплив на рецептори органу**
- C) Безпосередній вплив на біохімічні процеси
- * D) Безпосередній вплив на рецептори органу або тканини**

9. Повторна дія лікарської речовини - це:

- * A) Дія, що не є домінуючою у лікувальному плані при даній патології**
- B) Безпосередній вплив на рецептори органу або тканини
- C) Дія, що домінує при даній патології
- D) Небажана дія лікарської речовини

10. Головна дія лікарської речовини - це:

- * A) Дія, що є домінуючою у лікувальному плані при даній патології**
- B) Дія, обумовлена безпосереднім впливом на рецептори тканини
- C) Дія, обумовлена безпосереднім впливом на рецептори органу

11. Побічна дія лікарської речовини:

*** А) Небажана дія**

- В) Дія, що покращує роботу зміненого органу або тканини
- С) Вибірча дія на певні органи або системи

12. Найбільш ефективні засоби патогенетичної спрямованості, що застосовуються при гепатолентикулярній дистрофії:

*** А) Пеніцилламін, унітіол**

- В) Бійохінол, прозерин
- С) Біостимулятори, антиагреганти
- Д) Антибіотики, вітаміни

13. Патогенетичний принцип фармакологічного лікування периаksonального неврити:

*** А) Біостимулятори, вітаміни, дезінтоксикаційні, десенсибілізуючі засоби, антихолінергічні препарати**

- В) Аналгетики, протисудомні, біостимулятори, вітаміни
- С) Антибактеріальні, протисудомні, антихолінергічні препарати

14. Патогенетичний принцип фармакологічного лікування паренхіматозного неврити:

*** А) Біостимулятори, вітаміни, антихолінергічні препарати, засоби, що покращують гемодинаміку, дегідратаційні, дезінтоксикаційні засоби**

- В) Біостимулятори, антихолінергічні препарати, аналгетики, протисудомні засоби, міорелаксанти

15. Фармакологічні засоби, що відносяться до психотропних:

- А) Нейролептичні, транквілізатори, адреноблокатори, холінолітики

*** В) Седативні, снотворні, нейролептики, транквілізатори, психостимулюючі, антидепресанти, наркотичні**

- С) Седативні, снотворні, місцевоанестезуючі, транквілізатори, протисудомні

16. Фармакологічні засоби, що відносяться до нейровегетотропних:

А) Антигістамінні, транквілізатори, симпатоміметики, парасимпатоміметики, протисудомні

*** В) Аналептики, ноотропи, симпатоміметики, адреноблокатори, симпатолітики, парасимпатоміметики, холінолітики**

С) Аналгетики, симпатоміметики, адреноблокатори, седативні, психостимулюючі

17. Вкажіть, що відноситься до імуномодуляторів:

*** А) Пірогенал, тималін, Т-активін, декаріс**

В) Церебролізін, гумізоль, мідокалм, пірогенал

18. Умовою для призначення ЛФК і масажу в гострому періоді ГПМК є:

*** А) Нормалізація серцевої діяльності і дихання**

В) Нормалізація сечовипускання і дефекації

С) Нормалізація показників дослідження крові

19. Аналептичні засоби:

А) Камфора, кордіамін, галантамін, оксазил, лобелін

*** В) Камфора, коразол, кордіамін, цитітон, лобелін, пантокрин**

С) Цитітон, лобелін, пілокарпін, прозерин, кордіамін, оксазил

20. Симпатоміметичні засоби:

*** А) Адреналін, норадреналін, мезатон, ефедрин**

В) Прозерин, пірроксан, адреналін, ефедрин

С) Адреналін, норадреналін, анаприлін, пентамін

21. Адреноблокатори - це:

А) Анаприлін, адреналін, прозерин, галантамін

В) Цитітон, лобелін, карбахолін, мезатон, ефедрин

*** С) Октадин, фентоламін, пірроксан, анаприлін**

22. Холіноміметики - це:

- * А) Карбохолін, пілокарпін, ацеклідін**
- В) Пілокарпін, фенталамин, пірроксан
- С) Карбохолін, прозерин, галантамін, оксазил

23. Антихолінестеразні засоби:

- А) Прозерин, галантамін, цитітон, лобелін
- В) Фосфакол, ефедрин, пілокарпін, ацеклідін
- * С) Прозерин, галантамін, оксазил, фізостигмін, фосфакол**

24. Холінолітичні засоби:

- А) Атропін, беладонна, оксазил, ефедрин
- В) Оксазил, фізостигмін, анаприлін, ефедрин
- * С) Атропін, беладонна, аерон, платифілін, скополамін**

25. До групи міорелаксантів відносяться:

- * А) Дитилін, баклофен, мідокалм, тубокурарин**
- В) Тубокурарин, беладонна, оксазил, мідокалм
- С) L-ДОФА, ефедрин, фізостигмін, скополамін

26. Для поліпшення церебральної гемодинаміки при ГПМК передбачається головним чином:

- * А) Усунення явищ гіпоксії**
- * В) Усунення набряку мозку**
- * С) Нормалізація водно-електролітного балансу**
- * D) Всі положення правильні**

27. Препарати, що впливають на дофамінергічну систему мозку:

А) Циклодол, адреналін, наком

В) Мадопар, атропін, адреналін

*** С) Леводопа, мадопар, мідантан, наком**

28. Антигістамінні засоби:

А) Димедрол, атропін, беладонна, діазолін

В) Супрастин, оксазил, диплацин, тавегіл

*** С) Димедрол, супрастин, діазолін, тавегіл**

29. Протисудомні засоби:

А) Парацетамол, норакін, оксазил

В) Дифенін, фенацетин, парацетамол

*** С) Бензонал, глюферал, тегретол, люмінал**

30. Гормони гіпофізу:

А) Дексаметазон, кортин, кортизон, адиурекрин

В) Кортикотропін, кортизон, преднізолон, тиреотропін

С) Тиреотропін, преднізолон, дексаметазон, кортин

*** D) Кортикотропін, адиурекрин, тиреотропін, соматотропін**

31. Гормони кори наднирників:

А) Преднізолон, синетрол, прогестерон

В) Кортизон, адиурекрин, пітуїтрин, кортикотропін

*** С) Кортизон, преднізолон, деперзолон, дексаметазон**

32. Гормони, що стимулюють функцію щитовидної залози:

A) Тиреоїдин, метилурацил

*** B) Тиреоїдин, трийодтиронін**

C) Дийодтирозин, метилурацил

D) Метилурацил, трийодтиронін

33. Гормони, що пригнічують функцію щитовидної залози:

A) Дийодтирозин, тиреоїдин

B) Тиреоїдин, трийодтиронін

*** C) Метилурацил, мікроройод**

34. Жіночі статеві гормони:

A) Тестенат, пітуїтрин, кортизон

B) Естрон, тестостерон, тестенат

C) Синестрол, преднізолон, кортизон

*** D) Естрон, естрадіол, синестрол, диместрол**

35. Андрогени - це:

A) Тестенат, синестрол, кортин

B) Тестерон, естерон, деперзолон

*** C) Тестостерон, тестенат, тестобромлецит**

36. Анаболічні стероїдні речовини:

A) Тестерон, кортин, синестрол

B) Ретаболіл, синестрол, кортизон

*** C) Метандростенолон, феноболін, ретаболіл**

37. Група пеніциліну:

- A) Біцилін, пантоміцин, тетрациклін
- B) Цефамізін, морфоциклін, еритроміцин

*** C) Ампіцилін, біцилін, оксацилін, метицилін**

38. Антибіотики групи аміноглікозидів:

- A) Неоміцин, біцилін, оксацилін
- B) Біцилін, оксацилін, канаміцин

*** C) Мономіцин, неоміцин, гентаміцин**

39. Група ноотропів:

- A) Серміон, баклофен, ноотропіл
- B) Аміналон, трентал, серміон

*** C) Ноотропіл, аміналон, енцефабол**

40. Сульфаніламід - це:

- A) Ентеросептол, фуразолін, морфоциклін
- B) Норсульфазол, фуразолідон, ентеросептол
- C) Стрептоцид, сульфазін, фуразолін, фурагін

*** D) Стрептоцид, норсульфазол, сульфазін, бісептол, етазол, фталазол**

41. Біогенні стимулятори:

- A) Гумізоль, колагеназа, лідаза, торфот
- B) Алое, торфот, трасилол, абомін, плазмол

*** C) Алое, гумізоль, препарати плаценти, плазмол, склоподібне тіло**

42. Група амінокислот:

- A) Аміналон, ацесоль, гідролізін

*** B) Глютамінова кислота, метионін, гістидін, аміналон, церебролізін, цистеїн**

- C) Метионін, ацесоль, гемодез, реополіглюкін

43. Осмотичні дегідратанти:

*** А) Манітол, сорбітол, сечовина**

В) Фуросемід, бринальдикс, аллацил

С) Манітол, фуросемід, бринальдикс

44. Салуретичні дегідратанти:

А) Фуросемід, манітол

В) Дихлотіазид, сорбітол

С) Манітол, сорбітол, сечовина

*** D) Фуросемід, бринальдикс, дихлотіазид, етакринова кислота**

45. При міотонії Томсена приносять полегшення:

*** А) Тільки легкі фізичні вправи**

В) Тільки інтенсивне навантаження до стомлення

46. При міастенії основною групою препаратів є:

А) Прозерин

В) Міорелаксанти

С) Вітаміни

Д) Біостимулятори

*** Е) Антихолінестеразні**

47. При захворюваннях периферичної нервової системи в гострій стадії не використовують такий метод фізіотерапії:

А) УФО

В) Синусоїдальні модульовані токи

С) Ультразвук в імпульсному режимі

Д) Електрофорез новокаїну

*** Е) Діатермію**

48. При якому менінгіті можна застосовувати введення ендолюмбально 30-50 тис. од. бензилпеніциліна натрієвої солі

- * А) Гнійному**
- В) Вірусному
- С) Туберкульозному

49. При якому захворюванні можна рекомендувати субарахноїдальне введення повітря з лікувальною метою

- А) Туберкульозному менінгіті
- В) Абсцесі головного мозку
- * С) Церебральному арахноїдиті**

50. Патогенетичний вплив при лейкоенцефалітах має:

- * А) Преднізолон, дексаметазон, калій хлорид, циклофосфатан**
- В) Стрептоміцин, тетрациклін, преднізолон, кортизон

51. При епілептичному статусі препаратом вибору є:

- * А) Фінлепсин**
- * В) Магнію сульфат**
- * С) Седуксен**
- Д) Морфін
- Е) Пармідин

52. Через який період часу після введення наркотику розвивається у наркоманів синдром абстиненції

- * А) Все перераховане вірно**
- * В) Морфінчерез 4-6 годин**
- * С) Метадончерез 12 годин**
- * Д) Меперидин через 3 час**
- * Е) Барбітурати через 16 годин**