

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Захворювання периферичної нервової системи

Категорія: **Неврологія (спеціаліст)**

Кількість запитань: **165**

1. Спінальний нерв утворюється:

А) З волокон заднього корінця, переднього корінця

*** В) З переднього корінця, волокон периферичного відрізка міжхребцевого ганглію**

2. Спінальний нерв ділиться:

*** А) На задню, передню, менінгеальну, білу з'єднувальну гілки**

В) На задню, передню, менінгеальну, сіру з'єднувальну гілки

3. Функція білої з'єднувальної гілки:

*** А) Вегетативна**

В) Соматична

4. Розлади при ураженні нерва кінцівки:

*** А) Рухові, вегетативні, чуттєві**

В) Вісцеральні, вегетативні, чуттєві

5. До утворень периферичної нервової системи відносяться:

*** А) Черепні нерви**

*** В) Задні корінці**

*** С) Передні корінці**

*** D) Спінальні нерви**

*** E) Нервові сплетіння**

*** F) Спинномозкові вузли**

*** G) Вузли черепних нервів**

*** H) Всі перераховані утворення**

-) Всі перераховані утворення, крім спінальних нервів

6. З яких гілок спінального нерва утвориться сплетіння?

А) Задніх гілок

*** В) Передніх гілок**

7. Функція задніх гілок спінальних нервів:

*** А) Змішана, інервація задньої поверхні тулуба (чутєва, рухова)**

В) Утворення сплетінь

8. Не утворюють сплетіння:

*** А) Передні грудні гілки**

В) Передні шийні гілки

С) Передні поперекові гілки

9. Передні гілки спінальних нервів утворюють такі сплетіння, крім:

А) Шийного

В) Плечового

*** С) Сонячного**

Д) Поперекового

Е) Крижового

ґ) Куприкового

10. Вкажіть симптоми, характерні для випадіння функції рухових волокон нервів, сплетінь:

А) Гіпертонія, підвищення механічної збуджуваності

*** В) Атонія, атрофія, параліч м'язів**

*** С) Атрофія, гіпотрофія**

*** Д) Параліч або парез м'язів**

*** Е) Підвищення механічної збуджуваності, атонія, атрофія**

11. Характерні симптоми при подразненні рухових волокон:

*** А) Конкратура, фасцикулярні посмикування**

В) Парез, фібрілярні посмикування

12. Характерні розлади для подразнення чутливих волокон нерва, сплетіння:

*** А) Болі, парестезії, гіперестезія в зоні інервації**

В) Анестезія в автономній зоні, пальпаторна болючість нерва, сплетіння

13. Вкажіть симптоми, характерні для випадіння функції чутливих волокон нерва, сплетіння:

А) Парестезія, гіперестезія в зоні нерва, сплетіння

*** В) Анестезія, гіпестезія, гіперпатія в зоні нерва, сплетіння**

14. Вегетативні порушення при ураженні нерва, сплетіння:

*** А) Трофічні, секреторні, вазомоторні**

В) Випадіння рефлексів, чутливості, вазомоторні порушення

15. Вкажіть судинні розлади, не характерні для уражень нерва, сплетіння:

А) Позитивний симптом білої плями

*** В) Відсутність пульсу на дистальних судинах**

С) Ціаноз у зоні інервації нерва, сплетіння

Д) Гіперемія в зоні інервації нерва, сплетіння

Е) Блідість у зоні інервації нерва, сплетіння

Ф) Зміна температури шкіри в зоні інервації нерва, сплетіння

16. Секреторні зміни при ураженні нерва або сплетіння:

*** А) Ангідроз і гіпергідроз у зоні інервації**

В) Сальність шкірних покривів у зоні інервації, гіпертрихоз

17. Трофічні розлади при ураженні нерва або сплетіння:

- * **A) Гіпертрихоз**
- * **B) Атрофія шкіри**
- * **C) Гіперкератоз**
- * **D) Трофічні виразки**
- * **E) Остеопороз кісток**
- * **F) Втрата блиску нігтів, їх ламкість**
- * **G) Всі відповіді вірні**

18. Шийне сплетіння утвориться:

- A) Задніми гілками C1-C4 спінальних нервів
- * **B) Передніми гілками C1-C4 спінальних нервів**

19. Шийне сплетіння варто пальпувати:

- * **A) Біля заднього краю середини грудинно-ключично-сосцевидного м'язу**
- B) Біля переднього краю середини грудинно-ключично-сосцевидного м'язу
- C) Над ключицею

20. Нерви шийного сплетіння іннервують:

- * **A) Діафрагму і глибокі м'язи шиї**
- B) Задні м'язи шиї і переднього зубчатого м'язу

21. Самий довгий нерв шийного сплетіння:

- * **A) Діафрагмальний**
- B) Довгий грудний нерв

22. Діафрагмальний нерв іннервує:

- * **A) Плевру, перикард, діафрагму, частково очеревину**
- * **B) Перикард, капсулу печінки, частково очеревину**
- C) Селезінку, діафрагму, плевру, перикард

23. До симптомів ураження діафрагмального нерва відносяться:

А) Порушення перистальтики, порушення дихання

*** В) Високе стояння діафрагми, порушення та утруднення дихання, утруднення кашльових рухів**

24. До симптомів подразнення діафрагмального нерва відноситься:

*** А) Гикавка, задишка, біль в області шиї**

В) Біль в області серця, порушення сечовипускання

25. До чуттєвих розладів при ураженні шийного сплетіння відносяться:

А) Болі, зниження або випадіння чутливості в області плеча і шиї

*** В) Болі, зниження або випадіння поверхневих видів чутливості в передньолатеральній області шиї**

26. Нерви, утворені з задніх гілок шийних спінальних нервів:

*** А) Потиличний, великий потиличний**

В) Малий потиличний, діафрагмальний

27. Гілки спинномозкових нервів, що беруть участь в утворенні плечового сплетіння:

А) Задні, С5-Д1 спинномозкових нервів

*** В) Передні, С5-Д1 спинномозкових нервів**

28. Первинні пучки плечового сплетіння:

*** А) Середній продовження С7, нижній із з'єднання С8Д1, верхній із з'єднання С5-С6**

В) Нижній із з'єднання Д3-Д4

С) Верхній із з'єднання С5-С7

29. Первинні пучки плечового сплетіння проходять:

А) Між грудинно-ключично-сосцевидним м'язом

*** В) Між передніми і середніми скаленусами**

30. Первинні пучки плечового сплетіння діляться на гілки:

*** А) Під ключицею**

В) Над ключицею

31. Первинні пучки плечового сплетіння діляться на гілки:

*** А) На передню і задню**

В) На зовнішню і внутрішню

32. Вторинні пучки плечового сплетіння розташовуються навколо:

*** А) Аксилярної артерії**

В) Підключичної артерії

33. Вегетативні волокна, що входять у плечове сплетіння:

А) Білі з'єднувальні волокна

*** В) Сірі з'єднувальні волокна**

34. Плечове сплетіння ділиться на частини:

А) На підреберну і надключичну

*** В) На надключичну і підключичну**

35. Короткі гілки плечового сплетіння відходять:

*** А) Від надключичної частини**

В) Від підключичної частини

36. Короткі гілки плечового сплетіння іннервують:

*** А) М'язи шиї і плечового поясу**

В) Трапецієподібний м'яз, грудинно-ключично-сосцевидний м'яз

37. Довгі гілки плечового сплетіння відходять:

А) Від надключичної частини

*** В) Від підключичної частини**

38. Короткі нерви, що відходять від надключичної частини плечового сплетіння:

- * А) Задні грудні, передні грудні**
- В) Додатковий і діафрагмальний нерви

39. Задні грудні гілки плечового сплетіння утворюють:

- А) Променевий, серединний нерв, довгий грудний нерв
- * В) Надлопатковий, тильний нерв лопатки, довгий грудний нерв**

40. Короткі гілки плечового сплетіння забезпечують:

- * А) Приведення плеча**
- * В) Обертання плеча усередину**
- * С) Обертання плеча назовні**
- * D) Піднімання плечового поясу**
- * Е) Підйом руки вище горизонталі**
- * F) Рухи плечового поясу вперед**
- * G) Все перераховане вірно**

41. Від підключичної частини плечового сплетіння починається:

- * А) Променевий, ліктьовий, серединний, аксілярний, шкірно-м'язовий нерви**
- В) Серединні, довгі грудні, ліктьові, променевий нерви
- С) Обидві відповіді вірні

42. Аксілярний нерв інервує:

- А) Ромбовидний, дельтоподібний м'язи, шкіру зовнішньої поверхні передпліччя
- * В) Дельтоподібний, малий круглий м'яз, шкіру плеча над дельтоподібним м'язом**
- * С) Шкіру плеча над дельтоподібним м'язом**

43. Симптоми ураження коротких гілок плечового сплетіння:

- * **A) Неможливо звести лопатки**
- * **B) Обмежене обертання плеча**
- * **C) Атрофія м'язів плечового поясу**
- * **D) Неможливість приведення плеча**
- * **E) Все перераховане вірно**
- * **F) Атрофія малого і великого грудних м'язів**
- * **G) Випадіння лопатно-плечового рефлексу**
- * **H) Лопатка не фіксована до грудної клітини**
- * **-) Неможливість підняття руки вище горизонталі**

44. Симптоми при ураженні аксілярного нерва:

- * **A) Атрофія дельтоподібного м'язу, розлад чутливості шкіри над дельтоподібним м'язом, обмежене відведення руки до горизонталі**

В) Неможливе підняття руки вище горизонталі, атрофія дельтоподібного м'язу, розлад чутливості внутрішньої поверхні плеча

45. Відведення руки до горизонтального рівня і вище забезпечують:

- * **A) Аксілярний і довгий грудний нерв**

В) М'язово-шкірний і ліктьовий нерв

46. М'язово-шкірний нерв плеча інервує:

- * **A) Плечовий, клювовидно-плечовий, двоголовий м'язи плеча**

- * **B) Клювовидно-плечовий, плечовий м'язи**

С) Двоголові, триглаві, плечові м'язи

47. М'язово-шкірний нерв плеча забезпечує:

- * **A) Згинально-ліктьовий рефлекс**

В) Розгинально-ліктьовий рефлекс

48. М'язово-шкірний нерв плеча забезпечує:

А) Розгинання в ліктьовому суглобі, приведення плеча

*** В) Піднімання плеча вперед, згинання в ліктьовому суглобі**

49. Внутрішній шкірний нерв плеча інервує:

А) Шкіру зовнішньої поверхні плеча

*** В) Шкіру медіальної поверхні плеча до ліктьового суглоба**

50. Ліктьовий нерв забезпечує:

*** А) Зведення 1-5 пальців**

*** В) Розведення 2-5 пальця**

С) Відведення великого пальця

*** D) Екстензію середньої і кінцевої фаланги 4-5 пальця**

*** Е) Згинання в карпорадіальному суглобі (спільно із серединним)**

*** F) Згинання в основних фалангах 2-5 пальця (спільно із серединним)**

*** G) Всі відповіді вірні, крім відведення великого пальця**

Н) Всі відповіді вірні, крім екстензії середньої і кінцевої фаланги 4-5 пальця. # 3, 4, 5, 6, 20, 28, 32, 41, 44, 46, 47, 52

51. До автономної зони чутливості ліктьового нерва відноситься:

*** А) Шкіра ліктьового краю кисті, шкіра мізинця**

В) Шкіра кінцевих фаланг 2-3 пальців, ліктьового краю кисті

52. Ліктьовий нерв може ущемлятися:

*** А) У кубітальному тунелі, у каналі Гюйона**

В) У тунелі зап'ясного каналу, аркаді Фрозе

53. До симптомів ураження ліктьового нерва відносяться всі перераховані, за винятком:

- A) Трофічних розладів
- B) Рухових розладів
- C) Вазомоторних розладів
- * D) Випадіння згинально-ліктьового рефлексу**
- E) Чуттєвих розладів у зоні інервації ліктьового нерва

54. До рухових порушень при ураженні ліктьового нерва відноситься:

- * A) Неможливість приведення всіх п'яťох пальців і розведення 2-5 пальців**
- B) Обмежене згинання кінцевої фаланги 1 пальця
- * C) Обмежене згинання основних фаланг 2-5 пальця**

55. Пучки плечового сплетіння, що утворюють серединний нерв:

- A) Первинні
- * B) Вторинні**
- C) Третинні

56. Переважна функція серединного нерва:

- * A) Чутлива**
- B) Вегетативно-трофічна
- C) Рухова
- D) Все перераховане вірно

57. Компресія серединного нерва можлива:

- A) У каналі Гюйона
- * B) У зап'ясному каналі**
- C) У обох випадках

58. Серединний нерв забезпечує такі функції, крім:

- * А) Приведення великого пальця**
- В) Згинання, розгинання 2, 3 пальця
- С) Згинання кінцевої фаланги 1 пальця
- Д) Протиставлення 1 пальця іншим пальцям
- Е) Згинання в карпорадіальному суглобі (разом із ліктьовим нервом)
- Ф) Згинання основних фаланг 2-5 пальця (разом із ліктьовим нервом)

59. До основних симптомів ураження серединного нерва відносяться:

- * А) Пекучі, інтенсивні болі в руці, виражені вегетативно-трофічні зміни кисті**
- * В) Розлад чутливості в зоні інервації**
- С) Випадіння розгинально-ліктьового рефлексу
- * Д) Рухові зміни периферичний параліч або парез іннервованих м'язів**
- * Е) Все перераховане вірно, крім випадіння розгинально-ліктьового рефлексу**

60. Зона автономної чутливості серединного нерва:

- А) Шкіра великого пальця і мізинця
- * В) Шкіра кінцевих фаланг 2, 3 пальця, м'язово-суглобна чутливість кінцевої фаланги 2 пальця**

61. До рухових порушень при ураженні серединного нерва відноситься:

- * А) Обмежене згинання, розгинання 2, 3 пальця**
- * В) Обмежене згинання в карпорадіальному суглобі**
- * С) Обмеження згинання кінцевої фаланги 1 пальця**
- * Д) Неможливість протиставлення великого пальця**
- * Е) Обмежене згинання 2-5 пальця в основних фалангах**
- * Ф) Все перераховане вірно**
- Г) Все перераховане вірно, крім неможливості протиставлення великого пальця

62. Форма кисті при ураженні серединного нерва:

А) Пазуриста кисть

*** В) Мавп'яча кисть**

63. У променевому нерві переважає:

*** А) Рухова функція**

В) Вегетативно-трофічна функція

С) Чутлива функція

64. Променевий нерв забезпечує такі функції, крім:

А) Відведення 1 пальця

*** В) Приведення 1-5 пальців**

С) Супінації передпліччя і кисті

Д) Розгинання в ліктьовому суглобі

Е) Розгинання в карпорадіальному суглобі

Ф) Розгинання 2-5 пальців в основних фалангах

Г) Розгинання основної і кінцевої фаланги першого пальця

65. Автономна зона чутливості променевого нерва:

*** А) Шкіра основної фаланги 1 пальця, шкіра проміжку кисті між 1 і 2 пальцями**

В) Шкіра кінцевих фаланг 2, 3 пальця, і шкіра анатомічної табакерки

66. М'язи, що піднімають надпліччя іннервуються:

*** А) Додатковим нервом**

В) Довгим грудним нервом

С) Обидві відповіді правильні

67. До характерних рівнів можливого здавлення променевого нерва - тунельні синдроми - відносяться:

- * А) Спіральний канал**
- * В) Плече-підпиховий кут**
- * С) Зовнішньої міжм'язової перегородки плеча**
- * D) Радіальний тунельний синдром**
- * Е) Синдром супінаторарівень аркади Фрозе**
- * F) Все перераховане вірно**

68. До ознак тотального ураження плечового сплетіння відносяться:

- А) Трофічні виразки, периферичний параліч руки
- * В) Анестезія шкіри руки, периферичний параліч руки, вегетативно-трофічні порушення руки**
- * С) Анестезія шкіри, периферичний параліч руки**

69. До симптомів ураження верхнього первинного пучка плечового сплетіння відносяться такі, за винятком:

- * А) Атрофії м'язів кисті**
- В) Зниження карпорадіального рефлексу
- С) Випадіння згинально-ліктьового рефлексу
- Д) Неможливості відвести і повернути назовні руку
- Е) Атрофії м'язів проксимального відділу руки
- Ф) Неможливості підняти руку вище горизонталі
- Г) Неможливості зігнути руку в ліктьовому суглобі
- Н) Помірної гіпестезії в області надпліччя і плеча

70. До ознак ураження середнього первинного пучка плечового сплетіння відноситься:

- * А) Зникнення розгинально-ліктьового рефлексу, утруднене розгинання кисті і пальців**
- В) Зникнення розгинально-ліктьового рефлексу, неможливість розгинання в ліктьовому суглобі
- С) Обидві відповіді вірні

71. До ознак ураження нижнього первинного пучка плечового сплетіння відносяться:

- * А) Периферичний параліч кисті і пальців**
- В) Утруднене розгинання в ліктьовому суглобі, відсутність згинально-ліктьового рефлексу
- * С) Порушення чутливості на внутрішній поверхні плеча, передпліччя, кисті**

72. Параліч, що виникає при ураженні верхнього первинного пучка плечового сплетіння:

- * А) Ерба-Дюшенна**
- В) Дежерин-Клюмпке
- С) Тотальний

73. Параліч, що виникає при ураженні нижнього первинного пучка плечового сплетіння:

- А) Ерба-Дюшенна
- * В) Дежерин-Клюмпке**
- С) Тотальний

74. Міжреберний нерв - це:

- А) Продовження задньої гілки спінального нерва
- * В) Продовження передньої гілки спінального нерва**

75. Які гілки, яких спінальних нервів беруть участь в утворенні поперекового сплетіння

*** А) Передні гілки, L1, L2, L3, L4, частково L5, D12**

В) Задні гілки, L1, L2, L3, L4, частково L5, D12

С) Передні гілки L3, L4, L5

76. До нервів, що утворюються з поперекового сплетіння відносяться:

*** А) Стегновий**

*** В) Обтураторіус**

*** С) Стегново-статевий**

*** D) Підвздошно-паховий**

*** Е) Підвздошно-підчеревний**

*** F) Латеральний шкірний нерв стегна**

G) Задній шкірний нерв стегна

*** Н) Всі перераховані нерви, крім заднього шкірного нерва стегна**

-) Всі перераховані нерви, крім латерального шкірного нерва стегна

77. Шкіру медіальної поверхні стегна інervують:

*** А) Статевостегновий нерв**

В) Задній шкірний нерв стегна, сідничний нерв

С) Стегновий, підвздошно-паховий нерв

78. Нерв, що є частиною рефлекторної дуги кремастерного рефлексу:

А) Обтураторіус

*** В) Стегново-статевий**

С) Стегновий

79. Нерв, що забезпечує закидання ноги на ногу:

A) Стегновий

*** B) Обтураторіус**

C) Підвздошно-паховий

80. Волокна, що переважають у стегновому нерві:

*** A) Рухові**

B) Вегетативні

C) Чутливі

81. Стегновий нерв здійснює такі функції, за винятком:

*** A) Відведення ноги**

B) Розгинання в колінному суглобі

C) Згинання в тазостегновому суглобі

D) Учасі в згинанні в колінному суглобі

82. Зона чутливості стегового нерва:

*** A) Коліно, передня поверхня стегна, внутрішня поверхня верхніх 2/3 гомілки**

B) Зовнішня поверхня гомілки, задня поверхня стегна

C) Внутрішня поверхня стегна

83. Колінний рефлекс забезпечує:

*** A) Стегновий нерв**

B) Стегово-статевий нерв

C) Обтураторіус

84. До ознак ураження стегового нерва відносяться:

- * А) Відсутність колінного рефлексу**
- * В) Атрофія м'язів передньої поверхні стегна**
- * С) Неможливість розгинання в колінному суглобі**
- * D) Обмежене згинання в тазостегновому суглобі**
- Е) Неможливість розгинання в тазостегновому суглобі
- * F) Порушення чутливості на передній поверхні стегна і внутрішній поверхні гомілки**
- * G) Пальпаторна болючість по ходу стегового нерва**
- * Н) Все перераховане вірно, крім неможливості розгинання в тазостегновому суглобі**

85. Стегновий нерв не страждає:

- А) При діабеті
- * В) При тромбофлебіті**
- С) При паховому лімфаденіті
- Д) У вагітної після пологів
- Е) При патологічних процесах у паху
- Ф) При травматичних або спонтанних гематомах по ходу нерва

86. Для якого захворювання характерні сегментарні розлади чутливості в сполученні з дизрафічним статусомі

- * А) Сирінгомієлії**
- В) Фунікулярного мієлозу
- С) Розсіяного склерозу
- Д) БАС

87. Зовнішній шкірний нерв стегна переважно складається:

- A) З вегетативних волокон
- * B) З чутливих волокон**
- C) З рухових волокон

88. Найбільш часте здавлення зовнішнього шкірного нерва стегна можливе:

- A) На абдомінальному рівні
- * B) На рівні пахової зв'язки**

89. До причин ураження зовнішнього шкірного нерва стегна відносяться:

- * A) Малярія**
- * B) Авітаміноз**
- * C) Черевний тиф**
- * D) Цукровий діабет**
- * E) Поперековий остеохондроз**
- * F) Все перераховане вірно**
- * G) Здавлення нерва на рівні пахової зв'язки**
- * H) Носіння тугого поясу, корсету, тісної нижньої білизни**

90. До симптомів захворювання зовнішнього шкірного нерва стегна відносяться:

- * A) Шкірна гіперестезія або гіпестезія, парестезія, рідше анестезія по передньозовнішній поверхні стегна**
- B) Ослаблене згинання в тазостегновому суглобі
- C) Випадіння колінного рефлексу
- * D) Можливо стоншення шкіри, гіпергідроз у зоні інервації нерва**

91. Захворювання зовнішнього шкірного нерва стегна - це:

- A) Хвороба Катуніо
- * B) Мералгія парестетика, хвороба Рота-Бернгардта**

92. У утворенні крижового сплетіння беруть участь:

A) Обидві відповіді вірні

*** B) Передні гілки спінальних нервів**

C) Задні гілки спінальних нервів

93. Спинно-мозкові нерви, що беруть участь в утворенні крижового сплетіння:

*** A) L5, S1-S2, частково L4, S3**

B) S4-S5, частково S3, S2

94. Крижове сплетіння ділиться на гілки:

*** A) Довгі і короткі**

B) Передні і задні

C) Довгі і задні

95. Короткі гілки крижового сплетіння іннервують:

*** A) М'язи таза, що відводять, сідничні м'язи**

B) М'язи гомілки, сідничні м'язи

C) Сідничні м'язи, м'язи стегна

96. Короткі гілки крижового сплетіння іннервують:

*** A) Чутливість задньої поверхні стегна**

B) Чутливість зовнішніх статевих органів

97. Довгі гілки крижового сплетіння:

*** A) Сідничний нерв**

B) Нижній сідничний нерв

C) Стегновий нерв

98. Нижній сідничний нерв складається з:

*** А) Рухових волокон**

В) Чутливих волокон

99. При ураженні нижнього сідничного нерва не утруднене:

А) Біг, стрибки

*** В) Розгинання гомілки**

С) Піднімання по сходах

Д) Вставання з положення сидячи

Е) Розгинання в тазостегновому суглобі

Ф) У положенні стоячивипрямлення нахиленого тулуба

100. При ураженні верхнього сідничного нерва з однієї сторони утруднене:

*** А) Відведення ноги в тазостегновому суглобі**

В) Приведення ноги в тазостегновому суглобі

С) Утруднені обидві зазначені функції

101. Хо́да при двосторонньому паралічі верхнього сідничного нерва:

*** А) "Качина" хо́да**

В) "Півняча" хо́да

102. Найбільша кількість вегетативних волокон входить у:

*** А) Сідничний нерв**

В) Стегновий нерв

С) Зовнішній шкірний нерв стегна

103. Кінцеві гілки сідничного нерва:

*** А) Малогомілковий і великогомілковий нерви**

В) Задній і зовнішній шкірні нерви стегна

С) Передній і задній шкірні нерви гомілки

104. Соромітний нерв інервує:

- * **A) Бульбокавернозний м'яз**
- * **B) Шкіру навколо заднього проходу**
- * **C) Шкіру статевого члена (клітора)**
- * **D) Поперечний м'яз промежини**
- * **E) М'яз, що стискує анальний отвір**
- * **F) М'яз, що стискує частину сечівника**
- * **G) Все перераховане вірно**

105. Розлад сечовипускання, дефекації і статевої діяльності настає при ураженні:

- * **A) Соромітного нерва і куприкового сплетіння**
- B) Крижового сплетіння, стегново-статевого нерва

106. Анальний рефлекс випадає при ураженні:

- * **A) Соромітного нерва, куприкового сплетіння**
- B) Верхнього сідничного нерва, заднього шкірного нерва стегна

107. Задній шкірний нерв стегна переважно складається:

- A) З рухових волокон
- * **B) З чутливих волокон**
- C) З вегетативних волокон

108. Задній шкірний нерв стегна відходить:

- A) Від поперекового сплетіння
- * **B) Від крижового сплетіння**
- C) Від куприкового сплетіння

109. Шкіра стегна не інервується:

- A) Стегновим нервом
- * B) Сідничним нервом**
- C) Замикальним нервом
- D) Стегново-статевим нервом
- E) Заднім шкірним нервом стегна
- F) Зовнішнім шкірним нервом стегна

110. Шкіра гомілки інервується:

- A) Соромітним, замикальним нервами
- * B) Стегновими, сідничним нервами**

111. Основні ознаки, що лежать в основі класифікації захворювань периферичної нервової системи:

- * A) Топічні**
- * B) Етіологічні**
- * C) Патоморфологічні**
- D) Патогенетичні, топічні

112. Причини невропатій:

- * A) Імунні**
- * B) Тунельні**
- * C) Токсичні**
- * D) Ішемічні**
- * E) Метаболічні**
- * F) Спадкові**
- * G) Вертероброгенні**
- * H) Всі відповіді вірні**

113. Патоморфологічні зміни при невропатіях:

- * **A) Змішані**
- * **B) Аксональні**
- * **C) Периаксональні**
- * **D) Всі відповіді вірні**

114. Класифікація невропатій по переважних ознаках:

- * **A) Змішані**
- * **B) Рухові**
- * **C) Вегетативні**
- * **D) Чутливі**
- * **E) Всі відповіді вірні**

115. Основні прояви поліневропатій:

- * **A) Дистальність, симетричність, ураження рук і ніг**
- В) Проксимальність, ураження тулуба, рук і ніг

116. Ураження хребта, що часто супроводжуються неврологічними проявами:

- A) Спондильоз, спондилоартроз
- * **B) Остеохондроз, спондилоартроз**

117. Характерні риси хребцевого остеохондрозу:

- A) Деструкція тіл хребців, спондильоз
- * **B) Дегенеративно-дистрофічні ураження міжхребцевого диску, реактивні зміни суміжних тіл хребців і суглобів**

118. У розвитку остеохондрозу первинно:

- * **A) Ураження пульпозного ядра**
- В) Реактивні зміни в суміжних тілах хребців

119. Характерні рентгенологічні ознаки остеохондрозу:

- * А) Всі відповіді вірні**
- * В) Зплюснення дискузменшення висоти міжхребцевої щілини**
- * С) Зсув суміжних тіл хребців при розгинанні**
- * D) Деформація замикаючих платівок тіл хребців, крайові розростання**
- * Е) Зміна конфігурації хребтамісцевий кифоз замість лордоза**

120. Головні синдроми, що складають класифікацію неврологічних проявів остеохондрозу (і.П.Антонова):

- * А) Рефлекторні, компресійні**
- В) Провідникові, рефлекторні

121. При грижі диска здавлюються:

- * А) Судина, корінець, спинний мозок**
- В) Сплетення і судина

122. Виникнення рефлекторних синдромів при остеохондрозі обумовлено:

- А) Впливом на корінці й оболонки мозку
- * В) Впливом змінених хребцевих структур на рецепторизакінчення синувтертебральних нервів Люшка**

123. Рефлекторні синдроми при остеохондрозі:

- * А) Вазомоторні, дистрофічні, м'язово-тонічні**
- В) Паралітичні, корінцеві, вазомоторні

124. Подразнення від рецепторів грижі диска, кісткових розростань, що обумовлюють рефлекторні синдроми не поширюється:

- A) До м'язів
- B) До судин
- C) По задньому рогу
- D) По передньому рогу
- * E) До передніх стовпів**
- F) По задньому корінцю
- G) По передньому корінцю
- H) По синуверебральному нерву

125. У натягнутому і придушеному корінці виникає:

- * A) набряк, венозний застій, асептичне запалення**
- B) Атрофія, асептичне запалення, венозний застій

126. Клінічні прояви компресії заднього корінця:

- A) Центральний парез, анестезія у відповідному дерматомі
- * B) Подразнення і випадіння чутливості у відповідному дерматомі**

127. Виникнення болей, рефлекторних синдромів зумовлює подразнення таких рецепторів тканин, крім:

- A) Жовтої зв'язки
- * B) Пульпозного ядра**
- C) Фіброзного кільця
- D) Епідуральної клітковини
- E) Задньої подовжньої зв'язки

128. Рівні вертеброгенних поразок:

- * **A) Шийний**
- * **B) Грудний**
- * **C) Попереково-крижовий**
- * **D) Всі відповіді правильні**

129. До вертеброгенних рефлекторних синдромів шийного рівня відносяться:

- * **A) Цервікалгія, цервікокраніалгія, цервікобрахіалгія, плечелопатковий периартроз**
- B) Цервікобрахіалгія, цервікалгія, радикулоішемія
- C) Обидві відповіді вірні

130. Вертеброгенні рефлекторні синдроми попереково-крижового рівня:

- * **A) Люмбаго**
- * **B) Люмбалгія**
- * **C) Підколінний**
- * **D) Люмбоішіалгія**
- * **E) Грушоподібного м'язу**
- * **F) Всі відповіді вірні**

131. Рівні найбільше частих і виражених дегенеративно-дистрофічних змін хребта:

- * **A) Шийний, поперековий, попереково-крижовий**
- B) Крижовий, куприковий, грудний

132. Корінці, що часто піддаються компресії, на шийному рівні при остеохондрозі:

- A) C3C4
- * **B) C5C8**

133. Корінці, що часто ушкоджуються, на попереково-крижовому рівні при остеохондрозі:

*** A) S1, L5**

B) S2, S3

C) L2, L3

134. Дефанс на патологічну імпульсацію міжхребцевого диска шийного відділу, унковертебрального суглоба виникає в:

*** A) Малому грудному м'язі**

B) Трапецієподібному м'язі

*** C) Великому круглому м'язі**

*** D) Великому грудному м'язі**

*** E) Передньо сходовому м'язі**

*** F) Нижньому косому м'язі голови**

*** G) Піднімаючому лопатку м'язі**

*** H) В усіх перерахованих м'язах, крім трапецієподібного**

-) В усіх перерахованих м'язах, крім великого грудного

135. Після перебув.на протязі у хворі з'явилися болі в заушн.обл., через добу перестало закрив.лів. око, рот перетягнуло праворуч, рідка їжа стала вилит.з рота. Надуті щоки і свиснути не може. Сльозотеча з лів.ока. Рівень ураження:

A) У внутрішньому слуховому проході

*** B) У області шилососцевидного отвору**

C) У області зовнішнього коліна лицьового нерва

D) Корінець лицьового нерва в мостомозочковому куті

E) Корінець в області внутрішнього коліна лицьового нерва

136. Короткочасні приступи інтенсивного болю в лівій половині обличчя, що тривають декілька хвилин або секунд, провокуються жуванням, розмовою. Ймовірний діагноз?

A) Синдром Слудера зліва

*** B) Невралгія лівого трійчастого нерва**

137. У хворого голова звисає, утруднені її рухи у сторони. Атрофія задніх м'язів шиї, трапецієподібних, грудинно-ключично-сосцевидних м'язів по обидва боки. Уражено:

A) Шийне сплетіння

B) Плечові сплетіння

*** C) Переднього рогу C1-C4**

D) Переднього рогу C8-D2

138. У хв. розвинулась слабк. прав. кисті, кисть звисає, неможливе відвед. вел. пальця, розгин. його кінц. фаланги. Зниження больової чутливості 2 фаланги великого пальця. При даній симптоматиці уражені:

*** A) Променевий нерв**

B) Серединний нерв

C) М'язово-шкірний нерв

D) Плечове сплетіння

E) Передні і задні корінці C7-C8 справа

139. У післярод. період у жінки з'явил. утрудн. розгин. стопи, стопа звисає, вираж. гіпотон. м'язів на передн.-зовн. поверх. гомілки. Поруш. поверх. види чутлив. на зовн. поверх. гомілки і тильн. поверх. стопи. Хода "півняча".

Уражений:

A) Сідничний нерв

*** B) Малогомілковий нерв**

C) Великогомілковий нерв

D) Крижове сплетіння

E) Передні і задні корінці L4-S1

140. Кисть набрякла, синюшна. Область узвишшя великого пальця гіпотрофічна, неможливо протиставлення 1 пальця. Хворий скаржиться на пекучі болі в дистальному відділі руки. Уражений:

A) Ліктьовий нерв

B) Променевий нерв

*** C) Серединний нерв**

D) Плечове сплетіння

E) Передні і задні роги C5-C6 справа

141. У хворого із травмою після автомоб. катастрофи виникли слабкість у правій руці, плече опущене, активні рухи в плечовому суглобі відсутні, у лікт. суглобі - обмежене згинання. Рухи кисті в повному обсязі. Правильний діагн.:

A) Параліч Дежерин-Клюмпке

*** B) Плечовий плексит, параліч Ерба-Дюшенна**

C) Травматичне ураження аксілярного нерва

D) Травматичне ураження довгого грудного нерва

142. У хворого опущене праве плече, утруднений поворот голови вліво, грудинно-ключично-сосковидний і трапецієподібний м'язи атрофовані. Уражені:

*** А) Додатковий нерв**

В) Під'язичний нерв

С) Задні роги сегментів C1-C5 справа

143. Черепні нерви довгастого мозку, що мають односторонню коркову інервацію:

*** А) Під'язичний**

В) Блукаючий

С) Додатковий

Д) Язикоглотковий

144. У хворого язик при висовуванні відхилений вліво, у лівій половині язика фібрилярні посмикування, ліва половина язика атрофічна, стоншена. Уражені:

А) Обопільне ядро справа

В) Додатковий нерв справа

С) Під'язичний нерв зліва

Д) Язикоглотковий нерв зліва

*** Е) Ядро під'язичного нерва зліва**

145. У результаті пухлинного процесу виявилися ураженими всі нерви, що проходять через яремний отвір. Які?

А) Особовий, языкоглотковий і під'язичний

*** В) Додатковий, блукаючий, языкоглотковий**

146. Слабкість м'язів усієї правої половини супроводжується гіперакузисом, слюзотечею і зниженням смаку на передніх 2/3 язика справа.

Осередок ураження:

*** А) Фаллопіїв канал справа**

- В) Правий мостомозочковий ріг
- С) Правий шилососковидний отвір
- Д) Внутрішній слуховий прохід справа
- Е) Межа варолієва моста і довгастого мозку справа

147. У хворого виявляється внутрішній отит справа, невралгія І-ї гілки правого трійчастого нерва, диплопія, косоокість правого ока до середини. Ймовірний синдром:

А) Ханта

*** В) Граденіго**

- С) Толоса-Ханта
- Д) Кавернозного синуса
- Е) Верхньої очноямкової щілини

148. У хворого вертикальна косоокість параліч погляду нагору, двосторонній полуптоз, млявість зіничних реакцій. Локалізація ураження:

- А) Хіазма
- В) Ніжки мозку на рівні нижніх горбів

*** С) Ніжки мозку на рівні верхніх горбів**

- Д) Ромбовидна ямка на рівні варолієва моста
- Е) Ромбовидна ямка на рівні довгастого мозку

149. У хворого птоз, мідріаз, екзофтальм, комбінована офтальмоплегія справа.

Уражений нерв:

- A) Особовий
- B) Абдуценс
- C) Блоковидний

*** D) Окоруховий**

- E) Волокна від спінального центру Будге

150. У хворого, що страждає цукровим діабетом, виникло двоїння при погляді вправо. При огляді: збіжна косоокість за рахунок правого ока, око не може відвести назовні. Уражений нерв:

- A) Лівий абдуценс

*** B) Правий абдуценс**

- C) Правий блоковидний
- D) Лівий окоруховий
- E) Правий окоруховий

151. Згинально-ліктьовий рефлекс втрачається при ураженні:

- A) Променевого нерва
- B) Ліктьового нерва
- C) Серединного нерва

*** D) М'язово-шкірного нерва**

- E) Довгого грудного нерва

152. Анестезія в області кінцевих фаланг 2, 3 пальців руки, порушення м'язово-суглобної чутливості в кінцевої фаланзі 2 пальця. Уражений нерв:

A) Променевий

B) Ліктьовий

*** C) Серединний**

D) Підкрильцевий

E) Шкірно-м'язовий

153. У хворого "пазуриста кисть", неможливо розведення 2-5 пальців і приведення 1-5 пальців, порушена чутливість у мізинці і ульнарному краї кисті. Уражені:

A) Променевий нерв

*** B) Ліктьовий нерв**

C) Серединний нерв

D) Плечове сплетіння

E) Шкірно-м'язовий нерв

154. Протягом міс. у хвор. - оніміння, терпкість і болі по передн.-зовн. поверх. стегна, що посил. в полож. стоячи. Ділянка зниження больової чутлив. по зовн.-передн. поверх.стегна. Період. ці прояви посилюються. Уражені:

A) Стегновий нерв

B) Підвздошно-паховий

C) Поперекове сплетіння

D) Підвздошно-підчеревний нерв

*** E) Зовнішній шкірний нерв стегна**

155. У хворого при ходьбі стала підкошуватися права нога, виникнули болі по передній поверхні стегна. Ослаблено згинання в тазостегновому суглобі і розгинання гомілки. Знижений колінний рефлекс справа. Уражені:

*** А) Стегновий нерв**

- В) Обтураторіус
- С) Задні корінці L3-L4
- Д) Поперекове сплетіння
- Е) Крижове сплетіння

156. У хворої після пологів виникла слабкість у нозі, не могла покласти ногу на ногу, різко ослаблене приведення. Знижено болючу чутливість у нижній третині внутрішньої поверхні стегна. Уражені:

- А) Стегновий нерв
- В) Сідничний нерв

*** С) Обтураторіус**

- Д) Поперекове сплетіння
- Е) Крижове сплетіння

157. У Б. болі по задн. поверх. стегна, гомілки, слабк. розгин. і відвед. в тазобедр. суглобі, стопі, пальцях. Зниж. больов. чутлив. по задн. поверх. стегна, передній, зовн. і задн. поверх. гомілки, стопи. Не виклик. ахілів р-с. Уражено:

- А) Стегновий нерв

*** В) Крижове сплетіння**

- С) Задні корінці L1-S2
- Д) Передні корінці L1-S2

158. Оніміння по зовн. поверх. прав.гомілки, болі в ягодич.обл., звис.стопа, слаб. згинач. і розгинач. пальців, немає ахіл. р-са, поруш. чутлив. по задн.-зовн. поверх. гомілки і стопи. Поруш. суглоб.-м'яз. чутл. в пальцях ноги. Уражений:

*** А) Сідничний нерв**

- В) Малогомілковий нерв
- С) Великогомілковий нерв
- Д) Задні корінці L5-S2
- Е) Передні корінці L5-S2

159. У хворого стопа звисає, хода типу "степаж", розлад чутливості на тильній стороні стопи. Уражені:

- А) Стегновий нерв
- В) Сідничний нерв

*** С) Малогомілковий нерв**

- Д) Великогомілковий нерв
- Е) Задній корінець L5-S1

160. У хворого болі по задній поверхні стегна і гомілки. Порушення поверхневої чутливості по задній поверхні гомілки і підшовної-стопи. Ахілів рефлекс утрачений. Слабість згиначів пальців і стопи. Уражені:

- А) Корінець L5

*** В) Корінець S1**

- С) Сідничний нерв
- Д) Малогомілковий нерв
- Е) Великогомілковий нерв

161. У хворого болі по зовнішній поверхні стегна, гомілки і стопи. Розлад чутливості на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи. Слабість розгинання великого пальця ноги. Уражені:

*** А) Корінець L5**

В) Корінець S1

С) Малогомілковий нерв

Д) Сідничний нерв

Е) Великогомілковий нерв

162. У хворого "стріляючі" болі в ногах, більше по задній поверхні, гіпестезія поверхневих видів чутливості по задньобоківій поверхні ніг різноманітної інтенсивності. Периферичний парез ніг. істинне нетримання сечі. Уражені:

*** А) Кінський хвіст**

В) Мозковий конус

С) Сідничні нерви

Д) Задні роги L1-S2

Е) Передні роги L1-S2

163. Причиною корінцевого синдрому НЕ є:

*** А) Інтрамедулярна пухлина**

В) Туберкульозний спондиліт

С) Екстрамедулярна пухлина

Д) Остеохондроз хребта

164. Односторонню аносмію можна спостерігати при ураженні:

А) Сосковидного тіла, прозорої перегородки

*** В) Нюхового тракту і цибулини**

165. У Б. болі в попереку з ірад. по перед.поверх.стегна. Хворіє 3 міс. Поперек. лордоз зглаж., обмеж.рухів в попереку.відділі+с-м Васерм., гіпестезія по внутр.поверх. стегна. Зниж. колін. р-с. Болюча перкусія L2-L3. імов. синдроми:

А) Пірамідний, корінцевий L5-S1

*** В) Вертеброгенний, корінцевий L2-L4**