

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Судинні захворювання нервової системи

Категорія: **Неврологія (спеціаліст)**

Кількість запитань: **100**

1. Джерела кровопостачання головного мозку:

- * А) Хребцеві артерії**
- В) Зовнішні сонні артерії
- * С) Внутрішні сонні артерії**
- * D) Хребцеві і внутрішні сонні артерії**

2. Кінцеві гілки внутрішньої сонної артерії:

- * А) Офтальмічна артерія**
- В) Задня мозкова артерія
- * С) Середня мозкова артерія**
- * D) Передня мозкова артерія**
- * Е) Передня ворсинчата артерія**
- * F) Задня з'єднувальна артерія**

3. До кінцевих гілок внутрішньої сонної артерії не відносяться:

- А) Офтальмічна артерія
- * В) Задня мозкова артерія**
- С) Передня мозкова артерія
- Д) Задня з'єднувальна артерія

4. Передні мозкові артерії з'єднуються за допомогою:

- А) Передньої ворсинчатої артерії
- * В) Передньої з'єднувальної артерії**
- С) Середньої мозкової артерії

5. Кіркові гілки передньої мозкової артерії кровопостачають такі утворення, за винятком:

- A) Медіальної поверхні лобової і тім'яної долей
- B) Орбітальної поверхні лобової частки
- C) Зовнішньої поверхні і лобової звивини
- D) Верхньої частини центральних звивин і верхньої тім'яної звивини
- E) Мозолистого тіла
- F) Нюхової цибулини

*** G) Внутрішньої капсули**

6. Ділянки головного мозку, що кровопостачаються передньою мозковою артерією:

A) Очне яблуко

*** B) Мозолисте тіло**

*** C) Нюхова цибулина**

*** D) Ядра основи півкулі мозку /базальні ганглії/**

*** E) Променистий віденець /частково/**

*** F) Медіальні відділи лобової і тім'яної долей півкуль**

*** G) Верхня частина центральних і верхньої тім'яної звивини**

7. Середня мозкова артерія проходить у:

A) Центральній борозні мозку

*** B) Латеральній борозні мозку**

C) Подовжній щілині мозку

8. Передня мозкова артерія проходить у:

A) Центральній борозні мозку

B) Латеральній борозні мозку

*** C) Подовжній щілині мозку**

9. Ділянки васкуляризацій середньої мозкової артерії:

- A) Міст
- B) Мозочок
- * C) Острівець**
- * D) Вузли основи мозку**
- * E) Дорзо-латеральна поверхня лобової, скроневої, тім'яної долей великого мозку**

10. Глибокі гілки передньої мозкової артерії кровопостачають:

- * A) Голівку хвостатого ядра**
- * B) Передню частину шкарлупи**
- C) Заднє стегно внутрішньої капсули
- * D) Переднє стегно внутрішньої капсули**

11. Кількість гілок передньої мозкової артерії, що направляються до ядер основи півкуль мозку:

- A) 1 -2
- * B) 3 -4**
- C) 10 -12

12. Кількість гілок середньої мозкової артерії, що направляються до ядер підстави півкуль мозку:

- A) 1 -2
- * B) 10 -12**
- C) 3 -4

13. Глибокі гілки середньої мозкової артерії кровопостачають:

- * А) Внутрішню капсулу /коліно і заднє стегно/**
- * В) Частина хвостатого ядра**
- * С) Частина зорового горба**
- * D) Сочевичне ядро**
- Е) Ньюхову цибулину

14. Поворотна артерія Геибнера частіше відходить від:

- А) Задньої мозкової артерії
- В) Середньої мозкової артерії
- * С) Передньої мозкової артерії**

15. Медіальна група глибоких гілок середньої мозкової артерії васкуляризує:

- * А) Блідий шар, внутрішню капсулу і частину зорового горба**
- В) Шкарлупу, внутрішню капсулу і хвостате ядро

16. Латеральна група глибоких гілок середньої мозкової артерії постачає кров'ю:

- А) Блідий шар, внутрішню капсулу і частину зорового горба
- * В) Шкарлупу, внутрішню капсулу і хвостате ядро**

17. Медулярна гілка середньої мозкової артерії, що дає частіше всього крововиливи:

- А) Таламо-колінчата артерія
- * В) Лентикуло-стріарна артерія**
- С) Таламо-перфоруюча артерія

18. Особливості глибоких гілок середньої мозкової артерії - як причина крововиливів:

- * А) Під прямим кутом від широкого русла СМА відходять тонкі гілки всередину мозку**
- * В) Не мають розвинутої еластичної мембрани /"буфера"/, 90 "Не мають анастомозів**
- * С) Все перераховане вірно**
- D) Ніщо з перерахованого

19. Кіркові проекційні області, васкуляризовані середньою мозковою артерією:

- * А) Рухова /предцентральна звивина/**
- * В) Чутлива /постцентральна звивина/**
- * С) Мовні /центри Верніке і Брока/**
- * D) Все перераховане**
- E) Ніщо з перерахованого

20. До зон васкуляризації середньої мозкової артерії не відносяться:

- * А) Стовбур мозку**
- B) Лобова частка
- C) Тім'яна частка

21. Область васкуляризації передньої ворсинчатої артерії:

- * А) Судинне сплетіння бічного шлуночка**
- * В) Задній відділ заднього стегна внутрішньої капсули**
- * С) Латеральне ядро і ядро подушки зорового горба**
- * D) Зовнішнє колінчасте тіло**
- E) Півкулі мозочка

22. Хребцева артерія проходить через:

- A) Кавернозний синус
- * В) Великий потиличний отвір**

23. Внутрішня сонна артерія проходить через:

- * А) Кавернозний синус**
- В) Великий потиличний отвір

24. Гілки хребцевої артерії:

- * А) Спінальні гілки**
- * В) Передня і задня спинномозкова артерія**
- * С) Задня нижня мозочкова артерія**
- Д) Задня мозкова артерія

25. Область васкуляризації хребцевої артерії:

- * А) Мозочок, довгастий мозок**
- * В) Спинний мозок**
- * С) Потилична частка головного мозку**
- Д) Лобова частка головного мозку

26. Основна артерія утворюється при злитті:

- А) Двох сонних артерій
- В) Двох задніх з'єднувальних артерій
- * С) Двох хребцевих артерій**

27. Основна артерія розташовується:

- А) У хребцевому каналі
- * В) На схилі потиличної кістки**
- С) У кавернозному синусі

28. Гілки основної артерії:

- A) Задня з'єднувальна артерія
- * B) Задня мозкова артерія
- * C) Артерія лабіринту
- * D) Верхня мозочкова артерія
- * E) Гілки до варолієва моста
- * F) Передня нижня мозочкова артерія

29. Область васкуляризації основної артерії /ї її гілок/:

- A) Острівець
- * B) Мозочок
- * C) Стовбур мозку
- * D) Основа скроневих долей
- * E) Задня частина таламуса і гіпоталамуса

30. Основні зони колатерального кровообігу:

- * A) Велізієве коло
- * B) Анастомоз між гілками внутрішньої і зовнішньої сонних артерій
- * C) Анастомози між гілками передньої, середньої і задньої мозкових артерій

31. Велізієве артеріальне коло розташовується:

- * A) Біля перехрестя зорових нервів
- * B) Біля сосцевидних тіл
- * C) Біля нижнього придатка мозку

32. Велізієве коло утворене:

- * А) Правою і лівою передніми мозковими артеріями
- * В) Передньою сполучною артерією
- * С) Правою і лівою задніми мозковими артеріями
- * D) Правою і лівою задніми сполучними артеріями
- * Е) Правою і лівою середніми мозковими артеріями
- * F) Все перераховане вірно

33. Зони васкуляризації задньої мозкової артерії:

- * А) Поліус і Медіобазальна частина скроневої частки
- * В) Шпорна борозна внутрішня і нижня поверхня потиличної частки
- * С) Мозолисте тіло
- * D) Задні відділи гіпофізу, гіпоталамуса, таламуса
- Е) Центр Брока

34. Раптово хворий відчув запаморочення, з'являється блювота й утруднення ковтання, при огляді - синдром Горнера, альтернуюча гемігіпестезія больової і температурної чутливості. імовірно у нього:

- А) Тромбоз передньої або середньої мозкової артерії
- * В) Тромбоз задньої нижньої мозочкової або хребцевої артерії
- С) Крововилив у внутрішній капсулі
- D) Емболія задньої мозкової артерії
- Е) Закупорка однієї із сонних артерій

35. Синдром Валенберга-Захарченко не зустрічається:

- * А) При крововиливі в довгастий мозок
- В) При тромбозі задньої нижньої мозочкової артерії
- С) При тромбозі хребцевої артерії

36. Розлади при ішемічному ураженні шийного потовщення спинного мозку:

- * А) Млявий параліч рук, спастичний параліч ніг**
- * В) Спастичний параліч ніг**
- С) Відсутність рухових порушень
- * D) Розлад чутливості провідникового і сегментарного типу**

37. Гострий параліч лівої нижньої кінцівки з меншим ураженням верхньої лівої кінцівки найбільше імовірно стався внаслідок оклюзії:

- * А) Передньої мозкової артерії**
- В) Середньої мозкової артерії
- С) Задньої мозкової артерії
- Д) Задньої нижньої мозочкової артерії
- Е) Хребцевої артерії

38. Характерні ознаки інфаркту спинного мозку:

- А) Наявність гною в лікворі
- * В) Відсутність змін в лікворі**
- * С) Ознаки атеросклерозу судин інших областей**
- * D) Раптовий розвиток синдрому ураження поперечника спинного мозку**

39. Якщо в хворого гомонімна геміанопсія є найбільше вираженим симптомом, артеріальна оклюзія уразила:

- А) Лентикулостріарну артерію
- В) Артерію Гейбнера
- * С) Задню мозкову артерію**
- Д) Верхню мозочкову артерію
- Е) Ніщо з перерахованого

40. Ністагм, запаморочення, розвиток "drop-attacks", кіркової сліпоти і двосторонньої пірамідної недостатності частіше усього буває при ураженні:

A) Внутрішньої сонної артерії

*** B) У вертебро-базиллярному басейні**

C) Передньої мозкової артерії

D) Однаково часто буває у всіх перерахованих випадках

E) Ніщо з перерахованого

41. Одностороння мінуща амбліопія з контрлатеральним геміпарезом і гемігіпестезією частіше усього виникають при ураженні:

*** A) Внутрішньої сонної артерії**

B) У вертебро-базиллярному басейні

C) Передньої мозкової артерії

D) Все перераховане правильно

E) Ніщо з перерахованого

42. Моторна афазія частіше усього спостерігається при ураженні:

*** A) Лівої середньої мозкової артерії**

B) Лівої передньої мозкової артерії

C) Лівої задньої мозкової артерії

D) Правої середньої мозкової артерії

43. Анозогнозія частіше усього спостерігається при ураженні:

A) Лівої середньої мозкової артерії

B) Лівої передньої мозкової артерії

C) Лівої задньої мозкової артерії

*** D) Правої середньої мозкової артерії**

44. Синдром Дежерина-Руссі розвивається при ураженні:

- A) Передньої мозкової артерії
- * B) Середньої мозкової артерії**
- * C) Таламоколінчатої артерії**
- * D) Задньої мозкової артерії**

45. Найбільш часта причина ішемічного інсульту:

- * A) Атеросклероз**
- B) Хвороби крові
- C) Хвороба Такаясі
- D) Інфекції, інтоксикації

46. Найчастіше причина тромбозу мозкових судин це:

- A) Вузлуватий периартеріїт
- * B) Атеросклероз**
- C) Червоний вовчок
- D) Поліцитемія
- E) Ніщо з перерахованого

47. Емболія мозкових судин може розвинутиися при:

- * A) Хворобі серця /ваді серця/**
- * B) Атеросклерозі**
- * C) Тромбофлебіті**
- * D) Вторинних жирових емболах при переломах**
- * E) Повітряній емболії**
- F) Гіпертонічній хворобі

48. Оклюзія внутрішньої сонної артерії:

- A) Звичайно викликає ністагм
- * B) Може не викликати симптомів**
- C) Може викликати синдром Броун-Секара
- D) Все вказане правильно
- E) Ніщо з перерахованого

49. При підключичному "steal" - синдромі:

- * A) Симптоми можуть бути викликані при рухах руками**
- B) "Шийний" шум звичайно виявляється на протилежній стороні з низьким кров'яним тиском
- C) Спостерігається звуження дистальної ділянки хребцевої артерії
- D) Все зазначене правильно
- E) Ніщо з перерахованого

50. Зв'язок із захворюванням серця при церебро-васкулярному ураженні:

- A) Рідко
- B) Невідомий
- C) Буває зрідка
- * D) Буває часто**

51. При церебро-васкулярному ураженні можна виявити:

- * A) Облітеруючий тромбангіт**
- * B) Вузелковий периартеріт**
- * C) Скроневий артеріт**
- * D) Все перераховане можливо**
- E) Ніщо з перерахованого

52. Симптоми, що нерідко передують розвитку ішемічного інсульту:

- A) Нижня параплегія
- * B) Короткочасні парези кінцівок
- * C) Короткочасні порушення мови
- * D) Короткочасне порушення координації
- * E) Гіпертонічні церебральні кризи з вираженими загальномозовими симптомами

53. Ознаки тромбозу екстракраніального відділу хребцевої артерії:

- A) Сенсорна афазія
- * B) Альтернуючі синдроми
- * C) Болі в області шиї і потилиці
- * D) Численні двосторонні стовбурові симптоми
- * E) Синдром ураження шийного відділу спинного мозку

54. Оптико-пірамідний синдром розвивається при ураженні:

- A) Основної артерії
- B) Передньої мозкової артерії
- * C) Середньої мозкової артерії
- * D) Внутрішньої сонної артерії

55. Діагностичні ознаки оклюзії сонної артерії:

- * A) Зниження ретинального тиску
- * B) Наявність судинного шуму
- C) Підвищення артеріального тиску
- * D) Зникнення або ослаблення пульсації ураженої артерії

56. Ознаки тромбозу інтракраніального відділу хребцевої артерії:

- A) Афазія
- B) Апраксія
- * C) Альтернуючі синдроми**
- * D) Головний біль у тім'яно-потиличній області з іррадіацією в орбіту**
- * E) Симптоми, що свідчать про недостатність кровообігу у вертебро-базилярній системі**

57. Для часткової оклюзії внутрішньої сонної артерії характерно:

- A) Розвиток тетрапарезу
- * B) Транзиторні ішемічні атаки**
- C) Приступи системного запаморочення

58. Найбільше характерні симптоми ішемічного інсульту:

- * A) Осередкові**
- * B) Вегетативні**
- C) Менінгеальні
- * D) Виражені загально мозкові**

59. Виражені загально мозкові симптоми при ішемічному інсульті спостерігаються при:

- * A) Тромбозі основної артерії**
- B) Тромбозі передньої мозкової артерії
- * C) Тромбозі задньої нижньої мозочкової артерії**

60. Синдром Валєнберга-Захарченко розвивається при ураженні:

- A) Передньої мозкової артерії
- B) Середньої мозкової артерії
- * C) Нижньої задньої мозочкової і хребцевої артерії**

61. Основні прояви синдрому Валенберга-Захарченко:

- A) Тетраплегія
- * B) Порушення ковтання і мови**
- * C) Геміатаксія на стороні вогнища**
- * D) Синдром Горнера на стороні вогнища**
- * E) Дисоційований розлад чутливості в зонах Зельдера на стороні вогнища**
- * F) Втрата больової і температурної чутливості на протилежній вогнищу стороні**

62. Для ураження парацентральної артерії /гілка передньої мозкової артерії/ характерно:

- A) Геміплегія
- * B) Монопарез стопи**
- C) Моторна афазія
- D) Апраксія

63. Сенсорна афазія розвивається при ураженні:

- A) Хребцевої артерії
- * B) Середньої мозкової артерії**
- C) Задньої з'єднувальної артерії
- D) Передньої мозкової артерії

64. Брахіофасціальний тип паралічу розвивається при ураженні:

- A) Гілок основної артерії
- B) Задніх гілок середньої мозкової артерії
- C) Глибоких гілок передньої мозкової артерії
- * D) Передніх кіркових гілок середньої мозкової артерії**

65. Локалізація процесу при альтернуючому паралічі:

- A) Мозочок
- B) Лобова частка
- * C) Стовбур головного мозку**
- D) Підкіркові вузли

66. Дані додаткових методів дослідження, характерні для ішемічного інсульту:

- * A) Осередки зниженої щільності в головному мозку за даними комп'ютерної томографії**
- * B) Локальні порушення електричної активності мозку на ЕЕГ**
- C) Зсув М-Ехо більш ніж на 5 мм при ехоенцефалографії
- * D) Незаповнення судинної мережі в басейні ураженої судини при церебральній ангиографії**

67. Симптоми порушення мозкового кровообігу в басейні середньої мозкової артерії:

- * A) Геміплегія**
- * B) Гемігіпестезія**
- * C) Моторна афазія**
- D) Нижній парапарез

68. Для інсульту в результаті емболії характерно:

- * A) Раптовий початок без провісників**
- * B) Короткочасна втрата свідомості**
- C) Крововилив на очному дні
- * D) Швидкий розвиток осередкових симптомів**
- * E) Частіше молодий вік хворих, що страждають ендокардитом**

69. Ознаки інфаркту мозку:

- * А) Відсутність артеріальної гіпертонії**
- * В) Наявність кардіосклерозу, інфаркту міокарду в анамнезі**
- * С) Збереження свідомості при масивній осередковій симптоматиці**
- D) Високий артеріальний тиск, гіпертонічні кризи в анамнезі
- * Е) Наявність "провісників" головні болі, запаморочення**
- * F) Характерно "мерехтіння" симптомів**

70. Синдром Валлеберга-Захарченко розвивається при ураженні:

- A) Ніжок мозку
- B) Варолієва моста
- C) Передніх відділів довгастого мозку
- * D) Латеральних відділів довгастого мозку**

71. Синдром Вебера виникає при локалізації інфаркту:

- A) У мозочку
- B) У довгастому мозку
- * C) У основі ніжок мозку**

72. Причини ураження сонної артерії:

- * А) Гігантоклітинний артеріїт**
- * В) Атеросклеротична оклюзія**
- * С) Аневризми**
- * D) Каротидно-кавернозні фістули**
- * Е) Здавлення лімфатичними вузлами**
- F) Здавлення бічним відростком атланта
- G) Симптоматична гіпертензія

73. Перемежований шум над оком вислуховується при:

А) Стенозі основної артерії

*** В) Стенозі сонної артерії**

74. При тромбозі сонної артерії на очному дні визначається:

*** А) Атрофія зорового нерва**

*** В) Різке звуження судин**

С) Свіжі крововиливи на очному дні

Д) набряк сітківки і застійні соски

75. Зміни очного дна при геморагічному інсульті:

А) Блідість скроневих половин соска зорового нерва

В) Атрофія зорового нерва

*** С) набряк сітківки і застійні соски**

*** Д) Свіжі крововиливи на очному дні**

*** Е) Звуження судин сітківки, нерівномірність калібру судин, розширення вен, с. Салюса**

76. Для тромбозу хребцевої артерії характерно:

*** А) Системне запаморочення**

*** В) Хиткість при ходьбі**

*** С) Неухильне прогресування захворювання, ністагм**

*** Д) Ністагм**

*** Е) Зниження слуху, шум у вусі**

*** F) Приступи падіння**

*** G) Порушення зору, диплопія**

*** Н) Дизартрія**

-) Моторна афазія

77. Причини геморагічного інсульту:

- A) Ревматизм
- B) Хвороба Такаясі
- C) Атеросклероз
- * D) Гіпертонічна хвороба**
- * E) Розрив аневризми**
- * F) Хвороби крові**

78. Характерні ознаки глибокої коми:

- * A) М'язова атонія**
- B) Автоматизована жестикуляція
- * C) Арефлексія**
- * D) Глибокий розлад вітальних функцій**
- * E) Втрата зіничних реакцій**

79. Ознаки прориву крові в шлуночки мозку:

- * A) Ознобоподібне дригіння**
- * B) Горметонічні судоми**
- C) Оглушення
- * D) Наростання симптомів здавлення і зсуви стовбура**

80. Причини пароксизмальності ранньої м'язової гіпертонії /горметонії/:

- * A) набряк мозку**
- * B) Мінливі умови гемодинаміки, ліквороциркуляції**
- * C) Мінливі умови ліквороциркуляції**

81. Горметонія розвивається:

- * A) При прориві крові в шлуночки**
- B) При невеличких півкульних гематомах

82. Геморагічний інсульт виникає:

- * А) При наявності розриву судини**
- * В) У результаті еритродіapedеза**
- С) При гіперкоагуляційному синдромі

83. До найбільше характерних ознак геморагічного інсульту відносяться:

- * А) Раптова втрата свідомості /після хвилювання або різкої напруги/**
- * В) Апоплексична кома /з атонією, арефлексією/**
- * С) Повторна блювота**
- * D) Ціаноз і гіперемія обличчя**
- * Е) Голосне стерторозне дихання**
- * F) Анізокорія /міоз, мідріаз/**
- * G) Виражений менінг. синдром**
- * Н) Кров'янистий ліквор**
-) Блідість шкірних покривів

84. Дані додаткових методів дослідження, характерні для геморагічного інсульту:

- * А) Кров'янистий або ксантохромний ліквор**
- * В) Лейкоцитоз у периф. крові зі зсувом формули вліво**
- * С) Зсув М-Ехо більш 3 мм**
- * D) Підвищення кількості цукру в крові**
- Е) Зниження артеріального тиску

85. Додаткові методи обстеження хворих для діагностики внутрішньомозкової гематоми:

- А) Електроміографія
- * В) Ехоенцефалографія**
- * С) Дослідження ліквора**
- * D) Комп'ютерна томографія**

86. Причини тромбозу вен мозку і венозних пазух:

- * А) Травми черепа**
- В) Гіпертонічна хвороба
- * С) Мігруючий тромбофлебіт, отит**
- * D) Запалення пазух носа і середнього вуха**

87. Крововилив у мозочок характеризується:

- * А) Різким болем у потилиці**
- * В) Синдромом Брунса**
- * С) Ністагмом, атаксією, атонією**
- * D) Ригідністю потиличних м'язів при помірно вираженому с. Керніга і Брудзинського**
- * Е) Важким станом хворого з наростаючим розладом стовбурових функцій**
- Ф) Нижнім парапарезом

88. Крововилив у стовбур головного мозку характеризується:

- * А) Різким міозом, порушенням вітальних функцій**
- * В) Плаваючими рухами очних яблук**
- * С) Порушенням дихання /типу Чейн-Стокса/, пневмонією, набряком легень**
- * D) Порушенням серцевої діяльності**
- * Е) Комою**
- * F) Гіпертермією, гіперглікемією, лейкоцитозом**
- * G) Ураженням черепних нервів**
- Н) Горметонічними судомами
- * -) Децеребраційною ригідністю**

89. У випадку геморагічного інсульту ліквор прозорий:

- A) При прориві крові в 4 шлуночок мозку
- B) При прориві крові в 3 шлуночок мозку
- * C) При латеральних гематомах**
- D) При медіальних гематомах

90. Для субарахноїдального крововиливу характерно:

- * A) Апоплектіформний початок**
- * B) Психомоторні порушення**
- * C) Епілептиформні напади**
- * D) Головний біль /"удар у голову"/, блювота**
- * E) Ранній розвиток менінгеальних симптомів**
- * F) Окорухові порушення**
- * G) Домішка свіжої крові в лікворі**
- * H) Гіперемія обличчя, гіпертермія**
-) Моторна афазія

91. Основні принципи недиференційованого лікування при гострих порушеннях мозкового кровообігу:

- * A) Попередження і лікування порушень дихання і серцево-судинної діяльності**
- B) Антикоагулянтна і тромболітична терапія
- * C) Підтримка гомеостазу**
- * D) Боротьба з набряком мозку і внутрішньочерепною гіпертензією**

92. Синдром паралітичного ішіасу може розвинутиися при ураженні:

- A) Нижньогрудного відділу спинного мозку
- B) Средньогрудного відділу спинного мозку
- C) Верхньопоперекового відділу спинного мозку
- * D) Епіконусу і корінців кінського хвоста спинного мозку**

93. Причини судинних уражень спинного мозку:

- * А) Атеросклероз**
- В) Пухлини спинного мозку
- С) Запальні захворювання спинного мозку

94. Зміни в спинномозковій рідині при гострих ішемічних ураженнях спинного мозку:

- А) Виражений плеоцитоз
- * В) Ліквор частіше нормальний**
- С) Зменшення кількості цукру
- Д) Значне підвищення кількості білку

95. Диференційована терапія при геморагічному інсульті спрямована на:

- * А) Припинення кровотечі**
- * В) Боротьбу з набрякомнабряканням мозку**
- * С) Забезпечення життєво важливих функцій**
- * Д) Запобігання ускладнень**
- Е) Введення антиагрегантів

96. Для припинення кровотечі при геморагічному інсульті використовують:

- А) Курантил, бромкамфору
- * В) Рауседил, клофелін**
- * С) Вікасол, кальцію глюконат**
- * Д) Аскорбінову кислоту, аскорутин**
- * Е) Амінокапронову кислоту, дицинон**
- * F) Желатин, гемофобін**
- * G) Контрикал, трасилол**
- * Н) Фуросемід, лазикс, верошпирон**
- * -) Аміназин, сибазон, галоперидол**

97. У комплексі лікування геморагічного інсульту використовують:

- A) Курантил, бромкамфору
- * B) Вікасол, аскорбінову кислоту**
- * C) Амінокапронову кислоту, дицинон**
- * D) Лазикс, урегін**
- * E) Антибіотики**
- * F) Канаміцин, цинаризин**
- * G) Корглікон, строфантин**
- * H) Аміназин, сибазон**

98. У лікуванні ішемічного інсульту застосовують:

- * A) Строфантин, корглікон, панангін, кокарбоксилазу**
- B) Вікасол
- * C) Рауседил, дибазол**
- * D) Кавінтон, еуфілін, трентал**
- * E) Реополіглюкін**
- * F) Манітол, лазикс, гліцерин**
- * G) Аспірин, курантил, камфору, гепарин**
- * H) Оксидутират натрію, сибазон**
- * -) Церебралізін, пірацетам, аміналон**

99. Для лікування гіпертонічного кризу застосовують:

- * A) Аміназин, клофелін**
- * B) Лазікс, дибазол, сульфат магнію**
- * C) Анаприлін, резерпін, сибазон**
- * D) Нітропрусид натрію**
- E) Папаверина гідрохлорид
- * F) Кавінтон, еуфілін, фуросемід**

100. При тромбозі вен мозку і венозних синусів застосовують:

- * А) Строфантин, кофеїн**
- * В) Маніт, гліцерин, фуросемід, панангін**
- * С) Кокарбоксилазу, гливенол, галідор**
- * D) П'явки, гепарин, пелентан**
- Е) Антибіотики, сульфаніламід
- Ф) Вікасол, дицинон