

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Будова та захворювання вегетативної нервової системи

Категорія: **Неврологія (спеціаліст)**

Кількість запитань: **148**

1. Синонімами вегетативної нервової системи є всі перераховані, за винятком:

- A) Автономної
- B) Висцеральної
- * C) Соматичної**
- D) Симпатичної
- E) Парасимпатичної

2. Фізіологічна сутність вегетативної нервової системи:

- * A) Підтримка трофіки тканин**
- * B) Енергозабезпечення всіх систем**
- * C) Регуляція функцій внутрішніх процесів**
- * D) Забезпечення сталості внутрішнього середовища організму**
- * E) Всі відповіді вірні**

3. Анатомо-функціональний розподіл ВНС на відділи:

- * A) Сегментарний**
- * B) Надсегментарний**
- * C) Всі відповіді вірні**

4. Сегментарна вегетативна нервова система складається з відділів:

- * A) Симпатичного**
- * B) Парасимпатичного**
- * C) Обидві відповіді вірні**

5. Рівень спинного мозку, на якому розміщуються бокові роги:

- * A) C8-L1**
- B) C3-C5
- C) C3-S5

6. До утворень периферичної частини симпатичної нервової системи відносяться:

А) Передні роги, бокові роги, постгангліонарні волокна

*** В) Паравертебральні вузли, прегангліонарні і постгангліонарні волокна**

7. Сегментарні утворення парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи знаходяться:

*** А) У стовбурі і каудальному відділі спинного мозку**

В) У проміжному мозку і корі головного мозку

8. Ядра парасимпатичної нервової системи в середньому мозку:

А) Ядра блокового нерва, крупноклітинне ядро окорухового нерва

*** В) Дрібноклітинне ядро Перліа (непарне) третього черепного нерва, дрібноклітинне ядро Вестфаль-Едінгера-Якубовича третього черепного нерва (парні)**

9. Ядра парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи в мосту і довгастому мозку:

А) Ядро сірого крила, ядро Бехтєрева, Дейтерса

*** В) Верхнє і нижнє слиновидільні ядра, дорзальне ядро блукаючого нерва**

10. Крижовий відділ парасимпатичної нервової системи розташовується:

*** А) У сегментах S3S5**

В) У сегментах L1L2

11. Назви парасимпатичних гілок, що відходять від сегментарних утворень:

*** А) Прегангліонарні**

В) Постгангліонарні

12. Місця розташування парасимпатичних вузлів:

*** А) Інтрамурально, за ходом трійчастого нерва**

В) Паравертебрально і превертебрально

13. Прегангліонарні парасимпатичні волокна закінчуються:

*** А) У вушному, війчастому, основнопіднебінному, інтрамуральних вузлах**

В) У зірчастому вузлі, превертебральних, паравертебральних вузлах

14. Білі сполучні гілки починаються:

А) У задніх рогах

*** В) У бічних рогах**

15. Білі сполучні гілки проходять:

А) У складі заднього корінця

*** В) У складі переднього корінця**

16. Білі сполучні гілки закінчуються:

А) У інтрамуральних і паравертебральних вузлах

*** В) У превертебральних і паравертебральних вузлах**

17. Симпатичні вузли у функціональному відношенні є:

*** А) "Трансформаторами" швидких імпульсів у повільні, другим нейроном еферентної симпатичної передачі імпульсу**

В) "Трансформаторами" повільних імпульсів у швидкі, першим нейроном еферентної симпатичної передачі імпульсу

18. Волокно, більш швидко проведе імпульс і має більш товсту мієлінову оболонку :

*** А) Прегангліонарне**

В) Постгангліонарне

19. Особливості периферичного шляху вегетативної нервової системи:

*** А) Складається з двох нейронів**

В) Складається з одного нейрона

20. Основні принципи класифікації вегетативних нервових порушень:

*** А) Топічний**

*** В) Первинний**

*** С) Вторинний**

*** D) Всі відповіді вірні**

21. Вегетативні порушення частіше є:

*** А) Вторинними**

В) Первинними

22. Кількість вузлів кожного відділу симпатичного стовбура (зазначте неправильну відповідь):

*** А) Шийний 7**

В) Шийний 2-3

С) Грудний 10-12

Д) Куприковий 2

Е) Поперековий 4-5

Ф) Крижовий 4-5

23. Сірі сполучні гілки починаються:

*** А) Від превертебральних і паравертебральних вузлів**

В) Від передніх і бокових рогів спинного мозку

24. Сегменти спинного мозку, що забезпечують симпатичну інервацію голови і шиї:

*** A) C8-D3**

B) C5-D6

25. Сегменти спинного мозку, що забезпечують симпатичну інервацію рук:

*** A) D4-D7**

B) C3-D1

26. Сегменти спинного мозку, що забезпечують симпатичну інервацію тулуба:

*** A) D8-D9**

B) D12-L4

27. Сегменти спинного мозку, що забезпечують симпатичну інервацію ніг:

*** A) D10-L2**

B) L3-S5

28. Чи співпадають зони соматичної і симпатичної інервації?

A) Так

*** B) Ні**

29. Аксон-рефлекс - це:

A) Відповідна реакція, здійснювана проведенням імпульсу за участю нервової клітини

*** B) Місцева відповідна реакція, здійснювана проведенням імпульсу без участі тіла нервової клітини**

30. Симпатичні волокна, що йдуть від спинномозкового нерва до симпатичного вузла - це:

*** A) Білі сполучні гілки**

B) Сірі сполучні гілки

31. Симпатичні волокна, що йдуть від спинномозкового нерва до симпатичного вузла, починаються:

*** А) Від клітин бічних рогів**

В) Від клітин передніх рогів

32. Симпатичні волокна, що йдуть від симпатичного вузла - це:

*** А) Сірі сполучні гілки**

В) Білі сполучні гілки

33. Симпатичні волокна, що йдуть від симпатичного вузла закінчуються:

*** А) У робочому органі**

В) У передніх рогах

34. Верхній шийний симпатичний вузол розташований:

*** А) На рівні 2-3 шийних хребців**

В) На рівні 4-5 шийних хребців

35. Від верхнього шийного симпатичного вузла відокремлюються такі утворення, за винятком:

А) Верхнього серцевого нерва

В) Міжвузлових гілок до середнього або до нижнього шийних вузлів

С) Гілок до C1-C4 спинномозкових нервів

*** D) Гілок до C5-C8 спинномозкових нервів**

36. Гілки внутрішнього сонного сплетіння направляються:

*** А) До черепних нервів, до війчастого вузла, у барабанну порожнину**

В) До спинальних нервів, під'язикового нерва

37. Зовнішній сонний нерв утворює:

*** А) Зовнішнє сонне сплетіння**

В) Внутрішнє сонне сплетіння

38. Зовнішній сонний нерв супроводжує:

*** А) Гілки зовнішньої сонної артерії**

В) Гілки внутрішньої сонної артерії

39. Зовнішній сонний нерв іннервує:

А) Органи шиї, що кровозабезпечує підключична артерія

*** В) Органи обличчя, що кровозабезпечує зовнішня сонна артерія**

40. Гілки середнього шийного симпатичного вузла:

А) Діафрагмальний нерв, блукаючий нерв

*** В) Середній серцевий нерв, міжгангліонарні гілки, сполучні гілки до C5-C8 спинальних нервів**

41. Нижній шийний симпатичний вузол розташовується:

*** А) За підключичною артерією**

В) Біля тіла сьомого шийного хребця

42. Волокна, що відходять від ціліоспінального центру, направляються:

А) У орбіту

*** В) У шийні симпатичні вузли**

43. Розташування сегментарного ціліоспінального центру:

*** А) C8D1**

В) C5C6

44. Сірі сполучні гілки в орбіту проходять:

*** А) Через війчастий вузол**

В) Через крилопіднебінний вузол

45. Шлях волокон від ціліоспінального центру до шийних симпатичних вузлів проходить:

А) Через задній корінець, спинальний нерв

*** В) Через передній корінець, білу з'єднувальну гілку, спинальний нерв**

46. Шлях проходження постгангліонарних волокон верхнього шийного симпатичного вузла:

*** А) Сплетення навколо очноямкової артерії**

*** В) Сплетення навколо кавернозного синуса**

*** С) Сплетення навколо внутрішньої сонної артерії**

*** D) Всі відповіді вірні**

47. М'язи, що інервуються ціліоспинальним центром Будге:

*** А) Гладкі, орбітальна, розширювальна зіниці, хрящовий м'яз верхнього повіка**

В) Звужувальну зіницю, поперековосмугасті, війчаста

48. Синдром Горнера-Клода-Бернара:

*** А) Звуження очної щілини, зіниці (міоз), западіння очного яблука**

В) Розширення зіниці (мідріаз), повний птоз

49. Синдром ураження ціліоспінального центру або волокон, що виходять від нього до м'язів - це:

А) Синдром Ханта

*** В) Синдром Горнера-Клода-Бернара**

50. Гілки, утворені від нижнього шийного симпатичного вузла:

*** А) Міжгангліонарні, сірі сполучні, нижній серцевий нерв**

В) Білі сполучні, міжгангліонарні, верхній серцевий нерв

51. Грудний відділ симпатичного стовбура розташовується:

*** А) Перед голівки ребер**

В) На передній поверхні тіл грудних хребців

52. До гілок, що відходять від грудного відділу симпатичного стовбура, відносяться всі перераховані, за винятком:

А) Гілок до легень

В) Нервів до серця

С) Міжгангліонарних гілок

Д) До нервів тулуба

Е) Малого черевного нерва

Ф) Великого черевного нерва

Г) До плечового сплетіння

*** Н) До крижового сплетіння**

-) Сірих з'єднувальних до міжреберних нервів

53. Гілки, що утворюють великий черевний нерв, відходять:

*** А) Від D7D9 симпатичних вузлів**

В) Від D10D11 симпатичних вузлів

54. Гілки, що утворюють малий черевний нерв, відходять:

А) Від восьмого і дев'ятого грудних вузлів

*** В) Від десятого й одинадцятого грудних вузлів**

55. Черевні нерви направляються:

*** А) У черевну порожнину**

В) У грудну порожнину

56. Черевні нерви утворюють:

А) Верхнє підчеревне сплетіння

*** В) Черевне (сонячне) сплетіння**

57. Поперековий відділ симпатичного стовбура розташовується:

А) На поперекових відростках поперекових хребців

*** В) Уздовж медіального краю великого поперекового м'язу, на передній поверхні тіл поперекових хребців**

58. Крижові і куприкові симпатичні вузли розташовуються:

А) Посередині хрестця і куприка

*** В) На передній поверхні хрестця, медіально від передніх крижових отворів**

59. До вегетативних сплетінь черевної порожнини відносяться:

*** А) Сонячне**

*** В) Аортальне, абдомінальне**

*** С) Верхнє підчеревне**

*** D) Нижнє підчеревне ліве, праве**

*** Е) Тазове**

Ф) Попереково-крижове

*** G) Всі перераховані, крім попереково-крижового**

Н) Всі перераховані, крім тазового

60. Волокна, що беруть участь в утворенні вегетативних сплетінь черевної порожнини:

*** А) Симпатичні, парасимпатичні**

В) Парасимпатичні, білі сполучні

61. Сонячне сплетіння оточує:

*** А) Початок черевної артерії, корінь верхньої брижової артерії**

В) Підключичну артерію, сонну артерію

62. Тільки симпатичну інервацію мають:

*** А) Мозковий прошарок наднирників, потові залози, кровоносні судини**

В) Сальні залози, кровоносні судини, сечовий міхур

63. До функцій симпатичної нервової системи відносяться всі перераховані, за винятком:

*** А) Опорожнення сечового міхура**

В) Підвищення працездатності м'язів

С) Прискорення і посилення роботи серця

Д) Перерозподілу крові сильним звуженням одних і розширенням інших судин

Е) Підтримки температури тіла при загрозі охолодження

Ф) Збільшення згортання крові при загрозі кровотечі

64. Війчастий вузол розташовується:

*** А) У орбіті**

В) У порожнині черепа

65. М'язи, що інервуються постгангліонарними парасимпатичними волокнами війчастого вузла:

*** А) Гладкі, циліарна, що звужує зіницю**

В) Поперечносмугасті, орбітальна, розширювальна зіниці

66. Основнопіднебінний вузол розташовується:

*** А) У крилопіднебінній ямці**

В) У круглому отворі

67. Прегангліонарну частину основнопіднебінного вузла складають волокна:

- * А) Проміжного нерва**
- В) Язикоглоткового нерва

68. Постгангліонарні волокна від основнопіднебінного вузла інервують:

- А) Слинні залози
- * В) Слизуваті залози піднебіння, порожнини носа і верхнього відділу глотки**

69. Вушний парасимпатичний вузол розташовується:

- * А) Поза порожниною черепа, під овальним отвором, за ходом третьої гілки трійчастого нерва**
- В) Поза порожниною черепа, під овальним отвором, за ходом другої гілки трійчастого нерва

70. Прегангліонарні парасимпатичні волокна до вушного вузла відходять:

- А) Від проміжного нерва
- * В) Від языкоглоткового нерва**

71. Постгангліонарні волокна від вушного вузла інервують:

- * А) Привушну залозу**
- В) Під'язичну залозу

72. Нижньощелепний парасимпатичний вузлик знаходиться:

- А) По ходу трійчастого нерва
- * В) По ходу під'язичного нерва**

73. Нижньощелепний парасимпатичний вузлик інервує:

- А) Привушну і підщелепну слинні залози
- * В) Під'язичну і підщелепну слинні залози**

74. Чутливі волокна до війчастого вузла відходять:

A) Від другої гілки трійчастого нерва

*** B) Від першої гілки трійчастого нерва**

75. Чутливі волокна до основопіднебінного вузла відходять:

*** A) Від другої гілки трійчастого нерва**

B) Від третьої гілки трійчастого нерва

76. Чутливі волокна до вушного вузла відходять:

A) Від першої гілки трійчастого нерва

*** B) Від третьої гілки трійчастого нерва**

77. Парасимпатичні прегангліонарні волокна, що йдуть від крижового відділу спинного мозку, утворюють:

*** A) Тазовий нерв**

B) Соромітний нерв

78. Парасимпатичні прегангліонарні волокна від крижового відділу спинного мозку йдуть у складі:

*** A) Передніх корінців**

B) Задніх корінців

79. Ортостатичний синкопальний стан - це:

*** A) Короткочасна втрата свідомості при переході хворого з горизонтального положення у вертикальне**

B) Втрата свідомості при переході хворого з вертикального положення в горизонтальне

80. Пароксизмальним вегетативним розладам властиве:

- * А) Короткочасність вегетативних симптомів**
- * В) Стереотипність**
- * С) Залучення однієї або двох функціональних систем**
- * D) Розширення або звуження зіниць**
- * Е) Почервоніння або збліднення обличчя**
- * F) Все перераховане вірно**

81. Переважання тону симпатичного відділу повертає до:

- * А) Синдрому Рейно, гіпертонічної хвороби**
- В) Бронхіальної астми, виразкової і жовчокам'яної хвороби

82. Особливості ходу і передачі імпульсів постгангліонарних парасимпатичних волокон:

- * А) Дуже коротка післядія, постгангліонарні парасимпатичні волокна короткі**
- В) Імпульси проходять дуже повільно, постгангліонарні парасимпатичні волокна довгі

83. Особливість поширення парасимпатичного подразнення:

- А) Дифузне, генералізоване
- * В) Менш глобальне, більш локальне**

84. Функція вегетативної нервової системи здійснюється:

- А) За принципом переважання парасимпатичної системи
- В) За принципом переважання симпатичної системи
- * С) У тісній взаємодії симпатичної і парасимпатичної систем**

85. Дія симпатичної системи на серце:

- * А) Прискорює і посилює діяльність серця**
- В) Уповільнює і послаблює діяльність серця

86. Дія симпатичної системи на дихальну функцію:

А) Посилює спазм бронхіального дерева, погіршує подих

*** В) Покращує подих, знімає спазм бронхіального дерева**

87. Дія симпатичної системи на функцію кишечника:

А) Прискорює перистальтику кишечника

*** В) Уповільнює перистальтику кишечника**

С) Не впливає на перистальтику

88. Вплив симпатичної нервової системи на функції тазових органів:

*** А) Забезпечує ерекцію й утримання сечі**

В) Забезпечує виділення сечі і кала

89. Дія парасимпатичної нервової системи на функцію тазових органів:

*** А) Забезпечує еякуляцію, виділення сечі, акт дефекації**

В) Забезпечує затримку кала і сечі

90. Спінальні симпатичні центри для інервації тазових органів розташовуються:

*** А) У бічних рогах L1 L2 спинного мозку**

В) У бічних рогах S1 S2 S3 спинного мозку

91. Спінальні парасимпатичні центри для інервації тазових органів розташовуються:

*** А) У сегментах S3 S4 S5**

В) У сегментах S1 S2 S3

92. Кіркові центри сечовипускання розташовуються:

А) У нижній тім'яній часточці

*** В) У парацентральных часточках**

93. Засіб зв'язку коркового центру зі спинальним центром сечовипускання:

*** А) За допомогою пірамідних шляхів, зв'язок двосторонній**

В) За допомогою пірамідних шляхів, зв'язок односторонній

94. До надсегментарних утворень вегетативної нервової системи відноситься:

А) Хвостате ядро, зоровий горб, бліда куля

*** В) Лимбічна система, ретикулярна формація, гіпоталамічна область**

95. Найвищі вегетативні центри локалізуються:

*** А) У корі головного мозку**

В) У підкіркових утвореннях

96. Тонус симпатичного відділу переважає:

*** А) Під час активного стану організму, сприяє пристосуванню до навантажень**

В) Під час відпочинку і сну

97. Вплив надсегментарної вегетативної системи:

А) Чутливе і рухове

*** В) Ерготропне і трофотропне**

98. Система, що переважно забезпечує ерготропну функцію:

*** А) Симпатична**

В) Парасимпатична

99. Система, що переважно забезпечує трофотропну функцію:

А) Симпатична

*** В) Парасимпатична**

100. До симптомів ураження вегетативної нервової системи при органічних захворюваннях нервової системи не відносяться:

- A) Гіпертрихоз, гіперкератоз, синдром Горнера
- B) Розлад секреції слини при паркінсонізмі
- C) Ламкість кісток, артропатії при сирингомієлії
- D) Пролежні при мієлітах
- E) Кризи при спинній сухотці

*** F) Паралічі при поліневритах**

- G) Акроціаноз, гіперемія, блідість шкірних покривів

101. Що є причиною ураження симпатичних вузліві

*** A) Травми, інфекції, пухлини і їх метастази, захворювання хребта**

- B) Процеси в середостінні, метастази, арахноїдит головного мозку
- C) Все перераховане вірно

102. Вкажіть симптоми, що відносяться до уражень периферичного відділу симпатичної нервової системи:

- A) Периферичні паралічі, болі локальні, прострілюючі, судинні порушення

*** B) Трофічні, судинні порушення**

*** C) Болі пекучі, тривалі, дифузні, трофічні, судинні порушення**

103. Ознаки ураження шийного відділу симпатичного стовбура:

*** A) Синдром Горнера, геміатрофія обличчя, трофічні порушення в тканинах голови, шиї, обличчя**

- B) Параліч м'язів обличчя, синдром Горнера, геміатрофія обличчя, трофічні порушення в зоні інервації

*** C) Симпатичні болі, що локалізуються в тканинах голови, обличчя, шиї, що іррадіюють у плечовий пояс і верхню кінцівку, синдром Горнера**

104. Трофічні порушення в тканинах голови, обличчя і шиї при ураженні верхнього шийного вузла:

- * А) Облисіння**
- * В) Сухість шкіри**
- * С) Посилений ріст волосся**
- * D) Порушення потовиділення**
- * Е) Всі відповіді вірні**

105. До судинних розладів при ураженні верхнього шийного симпатичного вузла відносяться:

- * А) Всі перераховані ознаки**
- * В) Почервоніння кон`юнктиви ока, роговиці**
- * С) Гіперемія половини обличчя, вушної раковини**
- * D) Підвищення або зниження артеріального тиску**
- * Е) Підвищення температури відповідної половини обличчя**

106. Найбільш часті ознаки ураження верхніх грудних симпатичних вузлів:

- * А) Парестезії в 1-5 пальцях кисті**
- * В) Порушення потовиділення в 1-5 пальцях кисті**
- * С) Розлад дихання у виді астматичних ознак**
- * D) Псевдодисоційований розлад чутливості в зонах Д4-Д6, що супроводжується псевдостенокардією**
- * Е) Порушення судинних реакцій у 1-5 пальцях кисті**

107. Ознаками синдрому псевдостенокардії є всі перераховані, за винятком:

А) Тривалого нападу болю

*** В) Відповідних стенокардії змін на ЕКГ**

С) Болю в області серця з ірадіацією в область шиї, голови, лівого плеча, лівої руки

Д) Болю, що супроводжується почуттям страху, туги, страху смерті

Е) Болю, що починається в області спини, лопатки, руки, а потім серця

Ф) Болю, що супроводжуються дисоційованим розладом чутливості, який зникає паралельно зі зниклими болями

108. Ознаки, характерні для ураження середніх і нижніх грудних симпатичних вузлів:

А) Параліч ніг, розлад діяльності сечового міхура

*** В) Різноманітні розлади в діяльності органів черевної порожнини (жовчного міхура, шлунка, кишечника, підшлункової залози)**

109. Симптоми ураження поперекового відділу симпатичного стовбура:

А) Паралічі ніг, парестезії, судинні порушення в ногах

*** В) Похолодання ніг, парестезії, пекучі болі, гіпергідроз (ангідроз) ніг**

110. Патологія, що призводить до ураження поперекового відділу симпатичного стовбура:

А) Бічний аміотрофічний склероз

*** В) Запалення, новоутворення у зачеревному просторі**

С) Обидві відповіді вірні

111. Патологічні стани, що симулюють солярит:

*** А) Холецистит, панкреатит**

*** В) Все перераховане вірно**

*** С) Виразка шлунку і 12-палої кишки**

112. Основні причини розвитку солярита:

*** А) Психогенні травми, травми центральної частини живота (удар кулаком, м'ячем і ін.)**

В) Компресійний перелом шийного відділу хребта

113. Прояви, що не спостерігаються в міжнападному періоді при ураженні сонячного сплетіння:

А) Метеоризм

В) Пілороспазм

*** С) Парестезії в ногах**

Д) Гіперестезія в зонах Д7-Д12

Е) Порушення шлункової секреції

114. Симптоми розпізнання солярита (зазначте неправильну відповідь):

А) При пальпації верхньої третини лінії від мечоподібного відростка до пупка розширення зіниць

В) При пальпації верхньої третини лінії від мечоподібного відростка до пупка запаморочення

*** С) При пальпації верхньої третини лінії від мечоподібного відростка до пупка поява патологічних стопних рефлексів**

Д) Хворобливість при пальпації верхньої третини лінії від мечоподібного відростка до пупка

115. Вплив симпатичної нервової системи на рефлекторну сферу:

*** А) Підвищення сухожильних рефлексів, відсутність патологічних рефлексів, підвищення м'язового тону при іризації**

В) Поява патологічних рефлексів, паралічі

116. До синонімів симпаталгії хребцевої артерії відносяться такі, за винятком:

- A) Шийної мігрені
- B) Синдрому Барре-Л'єу
- C) Невриту хребцевого нерва
- D) Заднього шийного симпатичного синдрому

*** E) Синдрому Хортона**

117. Хребцеве симпатичне сплетіння утворюється:

- A) Прегангліонарними гілками від центру Будге

*** B) Постгангліонарними гілками зірчастого вузла**

118. До симптомів заднього шийного симпатичного синдрому відносяться:

*** A) Шум, "закладання" у вухах, фотопсії, синкопальні стани, вегетативні пароксизми**

- B) Слабкість у руках, фотопсії, синкопальні стани, вегетативні пароксизми

119. Симптоми синкопального хребцевого синдрому:

*** A) М'язова гіпотонія в кінцівках, раптова втрата свідомості після різкого повороту голови**

- B) Пірамідна недостатність, м'язова гіпертонія в кінцівках

120. Задній шийний симпатичний синдром не варто диференціювати:

- A) З потиличною невралгією
- B) З гіпертонічними кризами
- C) З пухлиною 8 черепного нерва

*** D) З невралгією трійчастого нерва**

- E) З патологією задньої черепної ямки

121. Симптоми невралгії Барре-Массона, її етіологія:

А) Біль в області грудей, трофічна виразка великого пальця

*** В) Різкий біль пекучого характеру в пальці, що ірадіює у всю руку, пухлина типу ангіоневроми в дистальних відділах пальців руки**

122. До основних ознак невралгії язикоглоткового нерва відноситься:

А) Іррадіація болю у щоку

В) Куркові болюблясть обличчя, іррадіація в око

*** С) Болі, що провокуються їжею, розмовою, тривалість 3-4 сек.1 хв**

*** D) Куркові зоникорінь язика, мигдалини, ірадіація болю у шию**

123. Діагноз невралгії язикоглоткового нерва диференціюють:

*** А) З невралгією трійчастого нерва**

В) З невралгією потиличного нерва

124. До симптомів, характерних для невралгії Слудера, відносяться такі, крім:

А) Більш частого виникнення болю уночі

В) Нежиті, слъозотечі, світлобоязні

*** С) Анестезії в зоні 2 гілки трійчастого нерва**

Д) Наявності приступів тривалістю 20-60 хвилин

Е) Болю, що ірадіює в ділянку потилиці, у пальці рук

Ф) Пекучі болі в області кореня носа, в оці, зубах верхньої щелепи, піднебінні, горлі

125. Який симптом не характерний для синдрому Шарленаі

А) Виразковий кератит

В) Виділення з носа

С) Можуть бути висипання на шкірі носа і чола

Д) Різкі, нападоподібні болі в оці, у внутрішньому рогові ока, крилах носа

*** Е) Анестезія в зоні 1 гілки трійчастого нерва**

126. Болючі пальпаторні точки синдрому Шарлена:

А) Зовнішній ріг орбіти

*** В) Внутрішній ріг орбіти**

127. Основні функції гіпоталамічної області:

*** А) Сон і пильнування, забезпечення сталості внутрішнього середовища**

В) Забезпечення активних рухів у кінцівках

128. Гіпоталамічна область регулює:

*** А) Всі обмінні функції**

*** В) Артеріальний тиск**

*** С) Діяльність органів дихання**

*** D) Діяльність видільної системи**

*** E) Діяльність травної системи**

*** F) Всі відповіді вірні**

129. Анатомо-функціональні особливості гіпоталамусу:

*** А) Нейрокринія**

*** В) Багата васкуляризація**

*** С) Неспецифічна еферентація**

*** D) Неспецифічна аферентація**

*** E) Пароксизмальність діяльності**

*** F) Підвищена проникність стінки судин**

*** G) Всі відповіді вірні**

130. Найбільше часті причини ураження гіпоталамічної області:

- * А) Інтоксикації
- * В) Судинні порушення
- * С) Інфекційні захворювання
- * D) Травма черепа і головного мозку
- * Е) Всі відповіді вірні

131. До ознак ураження гіпоталамічної області відносяться:

- * А) Набряки, тетанія, атонія
- * В) Порушення сну
- * С) Виразки за ходом ШТК, порушення функцій травної системи
- * D) Патологічна спрага, патологічний голод
- * Е) Приступи гіпоталамічної епілепсії
- * F) Все перераховане вірно

132. Чинники, що викликають синдром ВСД:

- * А) Конституціональний
- * В) Ендокринна перебудова організму
- * С) Ураження вісцеральних органів
- * D) Первинні захворювання ендокринних залоз
- * Е) Алергія
- * F) Патологія сегментарної вегетативної нервової системи
- * G) Органічні ураження нервової системи
- * H) Неврози
- * -) Всі відповіді вірні

133. Основні симптоми гіпоталамічної епілепсії:

- * **A) Тахікардія, запаморочення, порушення потовиділення**
- * **B) Загальне рухове занепокоєння, блідість, що змінюється гіперемією обличчя**
- * **C) Тонічні судоми, задишка, дивгіння, слинотеча, порушення свідомості**
- D) Клонічні судоми, розлад функції ШКТ

134. Типи перебігу вегетативних розладів при ВСД:

- A) Постійний
- * **B) Перманентно-пароксизмальний**
- C) Прогредієнтний

135. Вегетативні кризи протікають:

- * **A) За змішаним типом**
- * **B) За симпатичним типом**
- * **C) За парасимпатичним типом**
- * **D) Всі відповіді вірні**

136. Вегетосудинна дистонія є:

- A) Нозологічною одиницею
- * **B) Синдромом**

137. Форми мігрені, що спостерігаються в клініці:

- * **A) Шийна**
- * **B) Звичайна**
- * **C) Абдомінальна**
- * **D) Вестибулярна**
- * **E) Геміплегічна**
- * **F) Асоційована**
- * **G) Офтальмічна**
- * **H) Всі відповіді вірні**

138. Основні критерії діагнозу "мігрень":

- * А) Наявність ознак ВСД, нападоподібний головний біль односторонній, гарне самопочуття в міжнападному періоді**
- В) Наявність ознак органічної ураження нервової системи
- * С) Вказівка на спадково-сімейний характер захворювання**
- * D) Початок захворювання в пубертатному або юнацькому віці**
- * Е) Відсутність симптомів органічного ураження нервової системи**

139. Чи існують радикальні засоби лікування мігрені

- * А) Ні**
- В) Так

140. Періоди в лікуванні мігрені:

- * А) Лікування нападу, лікування в міжнападному періоді**
- В) Безсистемне лікування, тільки медикаментозне

141. Найбільше ефективне лікування мігрені:

- * А) Комплексне**
- В) Хірургічне
- * С) Медикаментозне**
- * D) Фізіотерапевтичне**

142. Складові симптоми синдрому Толоса-Ханта:

- А) Порушення функції лицьового, язикового, глоткового нервів, відсутність ефекту від глюкокортикоїдів
- * В) Невралгія 1 гілки трійчастого нерва, ураження очорухового, відвідного нервів, виражений ефект від застосування глюкокортикоїдів**

143. Форми мігрені, що підлягають стаціонарному обстеженню:

- А) Шийна, звичайна, психогенна
- * В) Геміплегічна, офтальмоплегічна**

144. Синдроми, що складають групу ангіотрофоневрозів:

- * А) Рейно
- * В) "Мертвої руки"
- * С) Акропарестезії Нотнагеля
- * D) Еритромелалгія Вейр-Мітчела
- * Е) Акропарестезіїформа Шульца
- * F) Всі відповіді вірні

145. До ознак несахарного діабету відносяться:

- * А) Поліурія, низька відносна щільність сечі, частіше виникає в чоловіків
- * В) Підвищена спрага, частіше виникає в чоловіків
- С) Висока питома вага сечі, поліурія, частіше виникає в жінок

146. Основні критерії синдрому Пархона:

- * А) Олігоурія, олігодипсія, наявність набряків, відсутність ниркового захворювання
- * В) Частіше зустрічається в жінок, часто супроводжується порушенням менструального циклу
- С) Наявність ниркового захворювання, відсутність серцевого захворювання

147. Гіпоталамічні синдроми, що характеризуються пароксизмальною гиперсомнією:

- * А) Нарколепсія, Піквікський синдром, синдром періодичної сплячки
- В) Істерична сплячка, синдром періодичної сплячки, Піквікський синдром

148. До проявів синдрому Клейне-Левіна належать:

- * А) Періодичність**
- * В) Підвищений апетит**
- * С) Непереборна сонливість**
- * D) Агресивність, злостивість**
- * Е) Частіше виникає в юнаків**
- * F) Все перераховане вірно**
- * G) Тривалість пароксизму від декількох годин до декількох тижнів**