

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Фармакологія - база тестів 2003 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2003 року**

Кількість запитань: **98**

1. Під час проведення стоматологічної лікувальної процедури у пацієнта виник гострий біль в ділянці серця, який віддавав в ліву лопатку, відчуття страху.

Надання допомоги такому пацієнту слід розпочати з призначення:

*** А) Коронаролітиків швидкої дії (нітрогліцерин та його аналоги).**

- В) Кардіостимулятора.
- С) Стимулятора дихального центру.
- Д) Коронаролітиків пролонгованої дії.
- Е) Гіпотензивних засобів.

2. Хворому 68 років для екстракції зуба була проведена провідникова місцева анестезія новокаїном. Через 5-7 хвилин появились ознаки зниження АТ. Що потрібно негайно ввести для нормалізації тиску?

*** А) Мезатон**

- В) Корвалол
- С) Валокормід
- Д) Строфантин
- Е) Сульфокамфокаїн

3. В процесі хіміотерапії злоякісної пухлини у хворого погіршилися показники імунних реакцій. Який з вказаних засобів слід призначити при такому стані?

*** А) Тималін**

- В) Ціанокобаламіг
- С) Препарати заліза
- Д) Преднізолон
- Е) Кислоту ацетилсаліцилову

4. Після вживання ацетилсаліцилової кислоти у пацієнта з'явився біль в ділянці шлунка як наслідок загострення виразкової хвороби. Що лежить в основі ульцерогенності вказаного препарату?

*** А) Антипростагандинова дія**

- В) Спазм судин
- С) Імунодепресивний ефект
- Д) Жовчогінна дія
- Е) Посилення секреції соляної кислоти

5. Хворий тривалий час безконтрольно приймав левоміцетин. Після проведеного обстеження виявлено пригнічення лейкопоезу. Який препарат призначити для корекції імунопоезу?

*** А) Пентоксил**

- В) Метотрексат
- С) Меркаптопурин
- Д) Цианокобаламін
- Е) Преднізолон

6. У хворого гіпертонічна хвороба з брадіаритмією. Призначьте кардіоселективний бета-блокатор з внутрішньою симпатоміметичною активністю:

*** А) Талінолол (Корданум)**

- В) Атенолол (Тенормін)
- С) Піндолол (Віскен)
- Д) Пропранолол (Анаприлін)
- Е) Надолол (Коргард)

7. Хворому з артритом скронево-щелепного суглоба було призначено курсове лікування таблетками бутадіону. Через 2 тижні лікування від відчув біль в порожнині рота. При огляді стоматолог виявив виразково-некротичний гінгівіт. З чим пов'язане виникнення цієї побічної дії?

*** А) Пригніченням синтезу простагландинів і порушенням синтезу білка клітин слизової оболонки**

- В) Місцевим подразненням слизової оболонки
- С) Пригніченням функції наднирників
- Д) Активацією лізосомальних ферментів
- Е) Активацією окислювального фосфорилування

8. Під час видалення зуба у пацієнта виник колаптоїдний стан, хворий знепритомнів. Препарати якої групи необхідно використати для швидкого виведення пацієнта з цього стану?

*** А) Аналептики**

- В) Анальгетики
- С) Анестетики
- Д) Антидепресанти
- Е) Адаптогени

9. Під час видалення зуба у пацієнта виник колаптоїдний стан, хворий знепритомнів. Який препарат необхідно використати для швидкого виведення пацієнта з цього стану?

*** А) Кордіамін**

- В) Новокаїн
- С) Анальгін
- Д) Амітриптилін
- Е) Папаверин

10. Нестероїдні протизапальні засоби призначаються при болях в черепно-лицевій ділянці, за винятком:

*** А) Переломи (травми) щелеп**

- В) Артрит скронево-щелепного суглобу
- С) Неврит n. trigeminus
- Д) Головний біль
- Е) Зубний біль при пульпіті

11. Обстежуючи жінку віком 65 років стоматолог звернув увагу на підвищену кровоточивість ясен. Кількість тромбоцитів в крові жінки була в нормі, але при розпитуванні було з'ясовано, що вона тривалий час приймала нестероїдні протизапальні препарати. Який розлад повинен враховувати стоматолог при поданні допомоги хворій?

*** А) Тромбоцитопатію.**

- В) Тромбоцитопенію.
- С) Агранулоцитоз.
- Д) Тромбоцитоз.
- Е) Тромбоз.

12. Больному с болями в животе поставлен диагноз почечная колика. Какое вещество из перечисленных пригодно для ее купирования?

*** А) Папаверин**

- В) Пиридостигмин
- С) Прозерин
- Д) Пилокарпин
- Е) Празозин

13. У больного приступ стенокардии. Какое миотропное средство резорбтивного действия можно использовать для его купирования?

*** А) Нитроглицерин**

В) Нитросорбид

С) Анаприлин

Д) Валидол

Е) Ментол

14. У больного тяжелая послеоперационная псевдомонадная инфекция. Какое из перечисленных веществ показано?

*** А) Гентамицин**

В) Бензилпенициллин

С) Цефазолин

Д) Эритромицин

Е) Доксициклин

15. У больного с пониженным слухом тяжелая бациллярная инфекция. Какая из групп антибиотиков противопоказана в этом случае?

*** А) Аминогликозиды**

В) Пенициллины

С) Цефалоспорины

Д) Тетрациклины

Е) Рифамицины

16. При многих заболеваниях сердечно-сосудистой системы возникает необходимость в использовании средств, понижающих тонус сосудов. При каком из перечисленных заболеваний применяют обладающий такими свойствами нитроглицерин?

*** А) Приступ стенокардии**

- В) Хроническая сердечная недостаточность
- С) Гипертоническая болезнь
- Д) Гипертонический криз
- Е) Болезнь Рейно

17. У больного крапивница, которую лечили димедролом. С действием на какой из перечисленных элементов патогенеза связан терапевтический эффект димедролла?

*** А) Взаимодействие гистамина с органами**

- В) Высвобождение гистамина
- С) Образование комплекса антиген-антитело
- Д) Синтез иммуноглобулинов
- Е) Активацию В-лимфоцитов

18. При предоперационном обследовании больного выявлен дефицит протромбина. Какое вещество необходимо назначить предварительно для уменьшения кровопотери при операции?

*** А) Викасол**

- В) Тромбин
- С) Кислоту аминапроповую
- Д) Фенилин
- Е) Контрикал

19. Больному с мерцательной аритмией назначен дигитоксин. С каким действием вещества связана его противоаритмическая активность?

- * А) Повышением тонуса блуждающего нерва**
- В) Повышением концентрации калия в миокардиоцитах
- С) Уменьшением симпатических влияний
- Д) Уменьшением кальциевой проводимости мембраны
- Е) Уменьшением натриевой проводимости мембраны

20. Який із названих антигіпертензивних препаратів має пригнічуючий вплив на центральну нервову систему, а застосовують його і для лікування гіпертонічної хвороби і для зняття гіпертензивного кризу

- * А) Клофелін**
- В) Резерпін
- С) Анаприлін
- Д) Празозин
- Е) Лабеталол

21. Для прискорення кальцинації при переломі нижньої щелепи, лікар призначив анаболічний стероїдний препарат всередину по 1 таблетці 2 рази на день. Який саме препарат було призначено?

- * А) Метандростенолон**
- В) Феноболін
- С) Ретаболіл
- Д) Тестостерону енантат
- Е) Рибоксин

22. Для попередження відторгнення імплантованої шкіри на обличчі хірург-стоматолог призначив всередину імуносупресор з групи глюкокортикоїдів. Який препарат на вашу думку найбільш доцільно застосувати у цій ситуації?

*** А) Метилпреднізолон**

- В) Беклометазону дипропіонат
- С) Флуоцинолону ацетонід
- Д) Флуметазону півалат
- Е) Тестенат

23. У пацієнта під час відвідування стоматолога виникла різка гіпотензія. Який із препаратів, що впливають на адренергічну іннервацію ви запропонуєте використати для нормалізації артеріального тиску?

*** А) Мезатон**

- В) Ксилометазолін
- С) Санорин
- Д) Доксазозин
- Е) Ерготамін

24. Перед прийомом у стоматолога у пацієнта 15 років раптово виникли болі за грудиною. Який з перерахованих засобів буде найефективнішим у даному випадку?

*** А) Валідол**

- В) Нітрогліцерин
- С) Сустан
- Д) Кордіамін
- Е) Аналгін

25. Для лікування хронічної серцевої недостатності призначають препарати кардіотоніки. Який із названих препаратів не має кардіотонічної дії?

*** А) Меридил**

- В) Дигоксин
- С) Амринон
- Д) Дофамін
- Е) Сульмазол

26. Хворому із складним переломом нижньої щелепи необхідно спів ставити уламки. Для цього з метою розслаблення м'язів довенно ввели міорелаксant, який викликав нервово-м'язеву блокаду. Для усунення блокади були використані ефедрин та кокарбоксилаза. Який міорелаксant був уведений?

*** А) Дитилін**

- В) Ардуан
- С) Диплацин
- Д) Панкуронію бромід
- Е) Меліктин

27. Стоматологічний препарат "Імудон", що містить компоненти зруйнованих клітин ряду бактерій і дріжджеподібних грибів роду Candida, випускається у вигляді льодяників для смоктання і призначається для лікування рецидивуючих кандідозних стоматитів. За рахунок чого проявляється лікувальна дія препарату?

*** А) Стимуляції вироблення специфічних проти збудника секреторних IgA.**

*** В) Стимуляції вироблення специфічних проти збудника IgM та IgG.**

*** С) Стимуляції вироблення специфічних проти збудника сироваткових IgA.**

- Д) Нейтралізації мікробних і грибкових токсинів.
- Е) Створення пасивного імунітету проти збудника.

28. У пацієнта стоматолог діагностував герпетичний стоматит. Що слід призначити в даному випадку для лікування?

*** А) Ацикловір.**

- В) Антибіотики широкого спектру дії.
- С) Клотримазол.
- Д) Лейкоцитарний інтерферон.
- Е) Сульфацил натрію.

29. Хворому на бактеріальну пневмонію призначили курс лікування еритроміцином. Відомо, що його антибактеріальні властивості зумовлені здатністю цього середника сполучатися з вільною 50S-субодиницею рибосоми. Який процес життєдіяльності бактерій блокує цей антибіотик.

*** А) Синтез білків**

- В) Синтез РНК
- С) Синтез ДНК
- Д) Синтез жирів
- Е) Синтез полісахаридів

30. Хворому на бактеріальну пневмонію призначили курс лікування пуроміцином. Відомо, що його антибактеріальні властивості зумовлені здатністю цього середника імітувати аміноацил-тРНК, оскільки при надходженні у клітину, цей антибіотик займає вільний А-сайт рибосоми. Метаболізм яких сполук буде порушений при цьому?

*** А) Білків**

- В) Жирів
- С) Вуглеводів
- Д) ДНК
- Е) РНК

31. Якщо хімічні речовини типу ціанідів пригнічують синтез АТФ, то який з механізмів транспорту через клітинну мембрану при цьому блокується?

*** А) активний транспорт**

- В) дифузія
- С) осмос
- Д) фільтрація
- Е) піноцитоз

32. Після застосування у пацієнта 24 років М-холіноблокатора атропіну з приводу спазму акомодатії ока у нього підвищились пороги смакової чутливості. Поясніть механізм.

*** А) зменшилось слиновиділення**

- В) погіршилось кровопстачання язика
- С) знизилась збудливість нейронів кіркового центру смакового аналізатора
- Д) збільшилось вироблення ендорфінів
- Е) погіршилась проникливість мембран смакових рецепторів для іонів Na⁺

33. У пацієнта 25 років після щелепно-лицевої травми тривалий час використовувалось парантеральне живлення, після чого в нього виникли ознаки дисбактеріозу. Яка основна причина розвитку вказаної патології?

*** А) порушення нормального поступлення харчових речовин в шлунково-кишковий тракт**

- В) зменшення секреції шлункового соку
- С) зменшення панкреатичної секреції
- Д) зменшення виділення жовчі
- Е) дефіцит в організмі вітамінів і мікроелементів

34. При терапии больного СПИДом применено противовирусное средство, принцип действия которого заключается в том, что оно, фосфорилируясь в клетках и превращаясь в трифосфат, ингибирует обратную транскриптазу вирионов, препятствуя образованию ДНК из вирусной РНК. Определите препарат.

*** А) Зидовудин**

В) Саквинавир

С) Идинавир

Д) Ритонавир

Е) Вирасепт

35. Больному ревматоидным артритом назначен антиметаболит с выраженным иммунодепрессивным эффектом при относительно меньшей токсичности. Является пролекарством, в организме из него образуется 6-меркаптопурин. Какой препарат назначен больному?

*** А) Азатиоприн**

В) Метотрексат

С) Меркаптопурин

Д) Циклофосфан

Е) Актиномиозин

36. При отеке мозга используется мочегонное и дегидратирующее средство, механизм действия которого заключается в том, что при попадании в просвет почечных канальцев оно создает высокое осмотическое давление, при этом снижая реабсорбцию воды и ионов Na. Действует в основном в проксимальных канальцах. Определите препарат.

*** А) Маннит**

В) Мочевина

С) Фуросемид

Д) Клопамид

Е) Спиронолактон

37. При гиперфункции щитовидной железы больному назначили антитиреоидный препарат, нарушающий синтез тироксина и трийодтиронина непосредственно в щитовидной железе. Какой препарат был назначен?

*** А) Мерказолил**

В) Дийодтиронин

С) Калия перхлорат

Д) Иод

Е) Радиоактивный иод-131

38. Малотоксичный антибиотик, относительно редко вызывает побочные эффекты. Относится к антибиотикам резерва из группы макролидов. Его механизм действия заключается в угнетении синтеза белка рибосомами бактерии в результате угнетения фермента пептидтранслоказы. Определите препарат.

*** А) Эритромицин**

В) Сигмамицин

С) Тетраолеван

Д) Азитромицин

Е) Тетрациклин

39. Під час видалення зуба у хворого відкрилась кровотеча. Лікар-стоматолог наклав тампон з лікарським засобом і кровотеча зменшилась. Який препарат використав лікар?

*** А) мезатон**

В) ізадрин

С) сальбутамол

Д) октадин

Е) празозин

40. При проведенні анестезії лікар-анестезіолог передозував дозу тубо курарину хлориду. Хворому призначили прозерин. На чому заснована дія цього препарату?

*** А) зменшення концентрації холінестерази**

В) підвищення концентрації холінестерази

С) блокада пресинаптичної мембрани

Д) активація М-холінорецепторів

Е) блокада адренорецепторів

41. До лікаря звернувся чоловік зі скаргами на зуд, гіперемію та набряк очей. З анамнезу відомо, що пацієнт проводить лікування глаукоми. Який з препаратів може викликати такий ефект?

*** А) галантаміну гідробромід**

В) прозерин

С) пілокарпін

Д) ацеклідін

Е) фізостигмін

42. На прийомі у стоматолога у пацієнта почався приступ бронхіальної астми. Лікар - стоматолог надав допомогу і приступ закінчився. Пацієнту дихати стало легше, але з'явилися тахікардія, головний біль, пітливість. Який препарат може викликати таку реакцію?

*** А) ізадрин**

В) мезатон

С) нафтизин

Д) прозерин

Е) пілокарпін

43. До стоматолога звернувся пацієнт з артритом щелепно-лицевого-суглоба. Лікар стоматолог призначив бутадіонову мазь. Який механізм дії цієї мазі?

*** А) пригнічення ЦОГ**

- В) пригнічення фосфоліпази
- С) активація опіатних рецепторів
- Д) блокада опіатних рецепторів
- Е) активація ЦОГ

44. Для лікування геміпаралічу, який пов'язаний з інсультом лікар призначив препарат (третинний амін) з групи антихолінестеразних засобів. Назвіть цей препарат.

*** А) галантаміну гідробромід**

- В) прозерін
- С) пілокарпін
- Д) скополамін
- Е) ацеклідін

45. Препарати з цієї групи лікарі-стоматологи використовують при операціях для зниження секреції слинних залоз, запобігання ларингоспазму, нудоти, брадикардії. Назвіть групу препаратів.

*** А) М-холіноблокатори**

- В) антихолінестеразні засоби
- С) міорелаксанти
- Д) М-холіноміметики
- Е) реактиватори холінестерази

46. До стоматологу звернувся чоловік зі скаргами на сухість порожнини рота, яка виникла після видалення мигдаликів. Лікар призначив ацеклідін. Якої з перерахованих властивостей препарат не має?

*** А) мідриаз**

- В) підвищення тонуусу гладких м'язів бронхів
- С) спазм акомодції
- Д) брадикардія
- Е) посилення потовиділення

47. Через декілька днів після постійного застосування препарату для профілактики нападів бронхіальної астми у пацієнта порушився сон. Який з препаратів є вірогідною причиною цього стану?

*** А) Ефедрин**

- В) Еуфілін
- С) Платифілін
- Д) Адреналін
- Е) Сальбутамол

48. Засобом вибору при застійному цирозі печінки, що супроводжується набряками є:

*** А) Спіронолактон**

- В) Фуросемід
- С) Сечовина
- Д) Гіпотіазид
- Е) Етакринова к-та

49. Зниження концентрації цукру в крові на введення інсуліну при цукровому діабеті обумовлене:

*** А) Підвищенням проникності клітинних мембран**

- В) Посиленням синтезу глюкагону
- С) Гальмування секреції глюкагону
- Д) Посиленням глюконеогенезу
- Е) Посиленням розпаду глікогену

50. До лікаря стоматолога звернулася вагітна жінка з діагнозом артриту висково-нижньощелепного суглобу. Яка група нестероїдних протизапальних препаратів має абсолютні протипокази до застосування у даної хворої?

*** А) Похідні саліцилової к-ти**

- В) Похідні піразолону
- С) Похідні індолоцтової к-ти
- Д) Похідні фенілоцтової к-ти
- Е) Похідні пропіонової к-ти

51. Який препарат, що володіє протиглистною дією, застосовують для стимуляції імунної системи організму при хронічному генералізованому парадонтиті?

*** А) Левамізол**

- В) Піперідину алипінат
- С) Насіння гарбуза
- Д) Пірантел
- Е) Хлоксил

52. Хворий страждає на алергічний хейліт і лікується преднізолоном (змащує червону облямівку і слизову губ). До якої групи антиалергічних засобів належить цей препарат?

*** А) Глюкокортикостероїди**

- В) Мембраностабілізатори
- С) Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
- Д) Блокатори гістамінових рецепторів
- Е) Блокатори серотонінових рецепторів

53. Чоловікові 52 років, який страждає на артроз висково-нижньощелепового суглоба лікар призначив преднізолон. Який метаболічний ефект неpritаманий цьому препарату ?

*** А) Пониження вмісту цукру у крові**

- В) Активація ферментів глюконеогенезу
- С) Посилення катаболізму білка
- Д) Активація ліполізу на кінцівках
- Е) Затримка нирками натрію та води

54. Який антибіотик групи пеніцилінів слід призначити хворому при інфекції синьогнійною паличкою?

*** А) Азлоцилін**

- В) Ампіцилін
- С) Оксацилін
- Д) Бензилпеніциліну калієва сіль
- Е) Біцилін-5

55. При щелепно-лицевій операції в стаціонарі, лікар-стоматолог для премедикації, з метою зменшення почуття жаху та для потенціювання дії анестетиків, хворому призначив транквілізатор – похідне бензодіазепіну. Який з перерахованих засобів призначив лікар ?

*** А) Діазепам**

В) Дроперідол

С) Атропін

Д) Сульпірид

Е) Аміназин

56. Лікар-стоматолог при ускладненому карієсі призначив сульфаніламідний препарат для місцевого застосування у вигляді пасти. Який препарат призначив лікар ?

*** А) Етазол**

В) Уросульфамід

С) Бактрим

Д) Сульфадіазин

Е) Бісептол

57. Хворий звернувся до стоматолога зі скаргою на кровоточивість з ясен. Йому поставлено діагноз цинга. Який з нижче перерахованих препаратів, застосовують для лікування цього захворювання ?

*** А) Кислота аскорбінова**

В) Кислота фолієва

С) Рибофлавін

Д) Кокарбоксилаза

Е) Кислота нікотинова

58. При проведенні лікарем стоматологом інфільтраційної анестезії новокаїном, у хворого розвинувся анафілактичний шок. Які заходи допомоги необхідно застосувати лікарю, з метою усунення шокового стану?

*** А) Внутрішньовенно ввести глюкокортикоїди, антигістамінні препарати та адреналіну гідрохлорид**

- В) Зробити промивання шлунку та дати адсорбенти
- С) Провести нейролептанальгезію
- Д) Ввести аналептичні засоби
- Е) Ввести внутрішньовенно розчин нітрогліцерину та фуросеміду

59. Лікар-стоматолог при артриті скроневощелепного суглобу призначив камфорну мазь, яка значно зменшила почуття болю. На чому заснований принцип дії камфори ?

*** А) Біль зникає в зв'язку з відволікаючим ефектом камфори за рахунок подразнюючої та відволікаючої дії.**

- В) Камфорна мазь пригнічує вивільнення медіаторів запалення.
- С) Біль зникає за рахунок протимікробної дії препарату.
- Д) Камфора пригнічує антиноцицептивну систему
- Е) Препарат покращує кровообіг у вогнищі запалення

60. Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі ?-лактамне кільце. Оберіть правильну відповідь:

*** А) Бензилпеніцилін**

- В) Рифампіцин
- С) Еритроміцин
- Д) Стрептоміцина сульфат
- Е) Левоміцетин

61. При артриті суглобу щелепи стоматолог призначив препарат, що належить як до групи ненаркотичних анальгетиків, так і до нестероїдних протизапальних засобів, переважно впливає на циклооксигеназу-2 і має помірний подразнюючий вплив на слизову оболонку травного каналу.

*** А) Мелоксикам**

- В) Індометацин
- С) Диклофенак-натрію
- Д) Кислота ацетилсаліцилова
- Е) Ібупрофен

62. Хворому, що страждає на ІХС, перед видаленням зуба, лікар порекомендував провести профілактичний курс лікування антиангінальним препаратом з групи адреноблокаторів. Який з препаратів було рекомендовано хворому ?

*** А) Метопролол**

- В) Верапаміл
- С) Пентоксифілін
- Д) Аміодарон
- Е) Но-шпа

63. У хворого після видалення зуба з'явився стійкий біль за грудиною. Після вживання під язик антиангінального засобу, біль за грудиною зник, але хворий поскаржився на головний біль і головокружіння. Який препарат використав хворий ?

*** А) Нітрогліцерин**

- В) Анаприлін
- С) Метопролол
- Д) Валідол
- Е) Верапаміл

64. У хворого на гіпертонічну хворобу після стоматологічних маніпуляцій розвинувся гіпертонічний криз. Які з нищеперерахованих препаратів треба призначити хворому ?

*** А) Магнію сульфат**

- В) Кордарон
- С) Апруесин
- Д) Метилдофа
- Е) Метагуанол

65. Після операції на яснах у хворого на фоні гіпертонічної хвороби розвинулась брадиаритмія. Який лікарський засіб йому доцільно призначити ?

*** А) Платифіліну гідротартат**

- В) Клофеллін
- С) Празозін
- Д) Но-шпа
- Е) Резерпін

66. Хворому на аскаридоз призначили лікарський засіб, який маже також вплив на імунну систему і використовується як імуномодулятор. Вкажіть цей препарат.

*** А) Левамізол**

- В) Пірантел
- С) Піперазину адипінат
- Д) Фенасол
- Е) Нафтфмон

67. Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що йому необхідно виїхати на тривалий час в тропічну країну. Який препарат повинен призначити лікар для особистої профілактики малярії ?

*** А) Примахін**

- В) Клотримазол
- С) Мебендазол
- Д) Фуразолідон
- Е) Фенасол

68. Під час прийому у стоматолога у хворої розвинувся приступ бронхоспазму, який був купірован введенням 5% розчину ефедрину гідрохлориду. Через 30 хв приступ повторився. Повторне введення ефедрину не мало ефекту у зв'язку з розвитком тахіфілаксії. Який механізм лежить в основі розвитку цього явища?

*** А) Виснаження депо медіатору в пресинаптичних закінченнях**

- В) Блокада адренорецепторів
- С) Активація адренорецепторів
- Д) Матеріальна кумуляція препарату
- Е) Індукція микросомальних ферментів печінки

69. Жінка 63 років приймала галантамін для відновлення функції ЦНС після ішемічного інсульту. Стан хворий значно покращився. Який механізм дії даного препарату?

*** А) Блокада ацетилхолінестерази**

- В) Блокада дофамін-гідроксилази
- С) Блокада холінацетилази
- Д) Блокада катехол-о-метилтрансферази
- Е) Блокада моноамінооксидази

70. У поліклініку звернувся хворий зі скаргами на болі за грудиною, задишку, серцебиття. Після обстеження лікар діагностував у хворого ІБС і призначив верапаміл. Який механізм дії даного препарату?

*** А) Блокує кальцієві канали**

В) Блокує (адренорецептори

С) Блокує (адренорецептори

Д) Блокує калієві канали

Е) Блокує натрієві канали

71. Для купірування гіпертонічного кризу лікар призначив клофелін. До якої групи відноситься зазначений лікарський засіб?

*** А) Центральних (адреноміметиків**

В) (адреноблокаторів

С) Неселективних (адреномиметиків

Д) Селективних (адреномиметиків

Е) Селективних (адреноблокаторів

72. Під час призначення лікарських препаратів лікар має пам'ятати про можливі побічні ефекти, інтенсивність яких, за звичай, є дозозалежною. Виразність яких побічних ефектів не залежить від дози?

*** А) Алергічних.**

В) Ушкоджуючих [токсичних].

С) Фармакодинамічних [прямої дії].

Д) Лікарської резистентності.

Е) Ефекту післядії.

73. При призначенні протипухлинних препаратів, як і багатьох інших засобів, можливі серйозні побічні ефекти. що не належить до можливих причин токсичної дії лікарських засобів?

*** А) Зниження чутливості тканин.**

- В) Мала широта терапевтичної дії.
- С) Генетично обумовлена ензимопатія.
- Д) Зміна фармакокінетики.
- Е) Підвищення чутливості тканин.

74. Під час підготовки хворого до операції резекції верхньої щелепи лікар одноразово призначив розчин морфіну гідрохлориду. Який ефект можна спостерігати у хворого під час одноразового використання морфіну?

*** А) Обстипація [запор]**

- В) Частішання дихання
- С) Залежність [пристрасть]
- Д) Толерантність [звикання]
- Е) Абстинентний синдром

75. До стоматолога звернувся хворий із скаргою на зубний біль. Під час попередньої розмови лікар дізнався, що хворий страждає на паркінсонізм і тому приймає М-холінолітик циклодол. Який небажаний ефект циклодолу у хворого може очікувати лікар-стоматолог?

*** А) Сухість у роті**

- В) Звуження зіниць
- С) Брадікардія
- Д) Бронхоспазм
- Е) Підвищена пітливість

76. До лікаря стоматолога звернулась жінка, працівниця кондитерського цеху. Пацієнтка звернула увагу на підвищену чутливість до карієсу. З метою ремінералізуючої терапії лікар призначив препарати фтору. Яка роль фтору в цій терапії?

*** А) Підвищення утворення фтор апатиту;**

- В) Збільшення проникності емалі;
- С) Пригнічення спиртового бродіння;
- Д) Зниження синтезу протеогліканів;
- Е) Активація протеаз слини.

77. = Кетононазол

*** А) Гентаміцин**

- В) Тетрациклін
- С) Цефран
- Д) Пеніцилін

78. Сердечные гликозиды уменьшают активность калий-натриевого насоса. Как при этом изменяется возбудимость сердечной мышцы ?

*** А) Уменьшается**

- В) Увеличивается
- С) Не изменяется
- Д) Значительно увеличивается
- Е) Исчезает

79. При использовании местных анестетиков в ротовой полости наблюдается сохранение тактильной чувствительности и исчезновение болевой. Какой из нижеперечисленных механизмов объясняет это явление ?

*** А) Повышение болевого порога, снижение порога к механическим стимулам**

В) Повышение болевого порога и порога механического раздражения

С) Снижение болевого порога, повышение порога механического раздражения

Д) Повышение болевого порога, неизменность порога механического раздражения

Е) Снижение болевого порога и порога механического раздражения

80. Кролю ввели препарат і через 1 год ректальна температура піднялась до 39,5°C. Який препарат було введено?

*** А) Пірогенал**

В) Фенілгідразин

С) Гіпо

Д) Аміназин

Е) Бензпірен

81. Хворому для лікування ІХС був призначений (-адреноблокатор, через деякий час у нього з'явився кашель, бронхоспазм. У якого з перелічених засобів є така побічна дія

*** А) Анаприлін**

В) Талінол

С) Атенолол

Д) Фенігидин

Е) Метопролол

82. Хворому на гіпертонічну хворобу лікар призначив комбінований засіб. Який це засіб?

*** А) Адельфан**

- В) Еналаприл
- С) Клофелін
- Д) Фенігидин
- Е) Метилдофа

83. Хворому з артритом тазостегневого суглоба лікар призначив протизапальний препарат - селективний інгібітор форманта циклооксигенази-2 (ЦОГ-2). Що це за препарат?

*** А) Мєлоксікам**

- В) Індометацин
- С) Вольт арен
- Д) Ібупрофен
- Е) Кислота мєфєнамова

84. Призначення хворому з гнійним остеомієлітом імуностимулятора тімаліна покращило його стан. який механізм його імуностимулюючої дії?

*** А) Регуляція кількості Т-В-лімфоцитів**

- В) Стимуляція утворення інтерферону
- С) Стимуляція лейкопоеза
- Д) Відновлення змінених форм Т-лімфоцити
- Е) Стимуляція гуморального імунітету

85. Хворому на гостру серцеву недостатність було введено серцевий глікозид швидкої дії. Який з перелічених засобів було введено?

*** А) Строфантин**

- В) Адонізид
- С) Дигітоксин
- Д) Целанід
- Е) Мілринон

86. Хворому для короточасного хірургічного втручання зробили нейролептанальгезію шляхом введення фентаніла і дроперидола. Що з перелічених явищ обґрунтовує досягнення обезболювання, достатнього для проведення операції?

*** А) Потенціювання**

- В) Кумуляція
- С) Сумація
- Д) Сенсibiliзація
- Е) Прямий синергізм

87. Хворому на гостру серцеву недостатність у якого виникла рефрактерність до серцевих глікозидів веден добутамін. Який механізм дії у цього препарату?

*** А) Стимулювання (1-адренорецепторів**

- В) Комплексоутворення з фосфоліпідами мембрани
- С) Блокада K^+ , Na^+ - АТФ-ази
- Д) Пригнічення активності фосфодіестерази
- Е) Підвищення тонуусу n.vagus

88. Хворому на мигливу аритмію, в анамнезі у котрого бронхіальна астма, треба призначити проти аритмічний засіб. Який препарат з цієї групи протипоказан хворому?

*** А) Анаприлін**

- В) Аймалін
- С) Верапаміл
- Д) Ніфедипін
- Е) Новокаїнамід

89. До щеленно-лицьового відділення доставили хворого з переломом нижньої щелепи. Було вирішено з'єднання кісток провести хірургічним методом під наркозом. Після внутрішньовенного введення міорелаксantu спостерігались короточасні фібрилярні скорочення м'язів обличчя хворого. Який міорелаксant було застосовано?

*** А) Дитилін**

- В) Тубокурарина хлорид
- С) Пипекуроній бромід
- Д) Діазепам
- Е) Меліктин

90. Призначаючи антибіотики групи тетрацикліну перорально хворого слід попередити про те, що не можна приймати препарат з молочними продуктами, тому, що вони:

*** А) Утворюють важкорозчинні комплекси з іонами кальцію**

- В) Посилюють токсичні ефекти тетрациклінів
- С) Руйнують конденсовану чотирициклічну систему, яка лежить в основі молекули тетрациклінів
- Д) Викликають розлади травлення
- Е) Сприяють кумуляції тетрациклінів в організмі

91. Хворий, який знаходиться на лікарняному листі з приводу загострення гіпертонічної хвороби, звернув-ся до стоматолога зі скаргами на біль у зубі, асимет-рію обличчя. Який засіб знеболення в комплексі з іншим препаратом необхідно запропонувати при видаленні зубу?

*** А) Лідокаїн з лінкоміцином**

- В) Новокаїн з адреналіном
- С) Анестезин з хлоргексидином
- Д) Дикаїн з адреналіном
- Е) Тримекаїн з атропіном

92. В комплексне лікування пародонтозу призначили вітамінний засіб з вираженою судиннорозширю-ючою та антиагрегантно-фібринолітичною діями. Визначити цей препарат?

*** А) Кислота ніотинова**

- В) Кислота аскорбінова
- С) Тіаміну хлорид
- Д) Піридоксину гідрохлорид
- Е) Ретинолу ацетат

93. Пацієнту з невритом лицьового нерву, який з анамнезу лікується протитуберкульозними препаратами, необхідно призначити засіб з вираженою етіопатогенетичною дією. Який це препарат з перелічених ?

*** А) Піридоксину гідрохлорид**

- В) Кислота ніотинова
- С) Кислота аскорбінова
- Д) Тіаміну хлорид
- Е) Ретинолу ацетат

94. Для лікування артрити нижньо-щелепного суглобу пацієнту призначили засіб, який викликає деполіме-ризацію гіалуронової кислоти, підвищує еластичність тканин. Визначити засіб.

*** А) Лідаза**

- В) Трипсин
- С) Індометацин
- Д) Рибонуклеаза
- Е) Преднізолон

95. Для лікування афтозного стоматиту аутоалергічного типу, який засіб патогенетичної дії найбільш вигідний в тривалому амбулаторному застосуванні?

*** А) Тавегил**

- В) Димедрол
- С) Супрастин
- Д) Діазолін
- Е) Дипразин

96. Для надання допомоги при анафілактичному шоці яким препаратом необхідно скористатися для судиннозвужуючої дії в протишоковій терапії ?

*** А) Дексаметазон**

- В) Атропін
- С) Димедрол
- Д) Ізадрин
- Е) Флуметазон

97. Який засіб протипоказаний при лікуванні гострого герпетичного стоматиту?

*** А) Преднізолон**

- В) Аспірин
- С) Анестезин
- Д) Тімалін
- Е) Метисазон

98. В комплексне лікування флюорозу призначили засіб, який в тривалому прийомі викликав: анорексію, артеріальну гіпертензію, світлобоязнь, загальну млявість м'язів, вторинний гідронефроз. Лікування яким засобом викликало ці побічні?

*** А) Передозування ергокальциферолу**

- В) Передозування ретинолу
- С) Передозування аскорбінової кислоти
- Д) Передозування препаратів кальцію
- Е) Передозування токоферолу