

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Патологічна анатомія - база тестів 2003 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2003 року**

Кількість запитань: **77**

1. Ознакою яких бронхоектазів є хаотичне розташування в їх стінці структурних елементів бронха?

*** А) Вроджених**

- В) Циліндричних
- С) Мішкоподібних
- Д) Набутих
- Е) Перифокальних

2. Як називається запалення нирок з переважним ураженням проміжної тканини з наступним втягуванням в процес всього нефрона?

*** А) Інтерстиційний нефрит**

- В) Гломерулонефрит
- С) Нефролітіаз
- Д) Нефроз
- Е) Амілоїдоз

3. У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабого кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Назвіть захворювання.

*** А) Мієломна хвороба**

- В) Хронічний мієлолейкоз
- С) Хронічний еритромієлоз
- Д) Гострий мієлолейкоз
- Е) Гострий недиференційований лейкоз

4. У хворого при огляді порожнини рота визначається атрофія слизової оболонки язика з червоними плямами (Гунтеровський глосит). Склери жовтуваті. В аналізі крові – кольоровий показник більше одиниці. Для якої анемії характерні ці зміни?

*** А) В-12-фолієводефіцитна**

- В) Залізодефіцитна
- С) Гостра постгеморагічна
- Д) Хронічна постгеморагічна
- Е) Гемолітична

5. У хворого 45 років поступово почали пропорційно збільшуватись в розмірах стопи, права кисть, ніс і губи. Яке захворювання можна запідозрити?

*** А) Акромегалія**

- В) Нанізм
- С) Хвороба Базєдова
- Д) Аддисонова хвороба
- Е) Цукровий діабет

6. У хворого при дослідженні головного і спинного мозку знайдено осередки демієлінізації, розростання глії з формуванням вогнищ склерозу. Про яке захворювання іде мова?

*** А) Розсіяний склероз**

- В) Боковий аміотрофічний склероз
- С) Хвороба Альцгеймера
- Д) Енцефаліт
- Е) Хвороба Піка

7. У хворого 58 р. при розтині в правій скроневій частці головного мозку знайдено великий осередок розм'якшеної сірої речовини кашцеподібної консистенції, блідо-сірого кольору. В артеріях основи мозку чисельні білувато-жовті потовщення інтими, які різко звужують просвіт. Ваш діагноз?

*** А) Ішемічний інсульт**

- В) Абсцес мозку
- С) Крововилив
- Д) Геморагічний інфаркт
- Е) набряк мозку

8. Визначте основний морфологічний прояв злоякісної форми гіпертонічної хвороби.

*** А) Артеріолонекроз нирок**

- В) Гломерулонефрит
- С) Гідрокалікоз
- Д) Пієлонефрит
- Е) Амілоїдоз

9. На внутрішній поверхні аорти знайдено велику кількість осередкових потовщень білясто-жовтого кольору, які підвищуються над поверхнею інтими. Ваш діагноз?

*** А) Атеросклероз**

- В) Ревматизм
- С) Системний червоний вовчак
- Д) Гранулематоз Вегенера
- Е) Хвороба Такаюсу

10. При гістологічному дослідженні слизової оболонки матки знайдено звивисті залози, пилко- та штопороподібні, подовжені, розростання стромы з гіперплазією її клітин. Ваш діагноз?

*** А) Залозиста гіперплазія ендометрія**

- В) Гострий ендометрит
- С) Лейоміома
- Д) Пухирний занос
- Е) Плацентарний поліп

11. У хворого 75 років, довгий час страждаючого на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії у правій тім'яно-скроневої ділянці головного мозку виявлено вогнище неправильної форми, дряблої консистенції, сірого кольору. Тромбоз правої середньої мозкової артерії. Встановити діагноз.

*** А) Ішемічний інфаркт**

- В) Геморагічний інсульт
- С) Аутоліз тім'яно-скроневої ділянки
- Д) Алергійний некроз
- Е) Абсцес

12. При огляді у хворого коронка 48 торкається виразкової поверхні слизової оболонки щоки, краї виразки щільні; дно вкрите зернистими грануляціями, які безболісні, трохи кровоточать. Якими морфологічними структурами зумовлена зерниста поверхня грануляцій?

*** А) Петлями капілярів**

- В) Наявністю волокон
- С) Зкопиченням клітин
- Д) Повнокров'ям судин
- Е) Основною речовиною

13. На слизовій оболонці кутів рота у курця виявлені неправильної форми з чіткими межами білі плями, котрі не знімаються при зшкрябуванні. Стоматолог встановив діагноз: лейкоплакія. Якими морфологічними змінами епітелію можна пояснити білий колір плям?

*** А) Гіперкератозом**

В) Паракератозом

С) Акантозом

Д) Дисплазією

Е) Гіперплазією

14. Хворому 39 років у зв'язку із лікуванням гнійного пульпіту була проведена інфільтраційна анестезія розчином ультракаїну з адреналіном. Після чого раптово виникли почервоніння, набряк шкіри з пухирцями та свербіж. Який тип гіперчутливості має місце у хворого?

*** А) Анафілактичний**

В) Цитотоксичний

С) Імунокомплексне пошкодження

Д) Гіперчутливість сповільненого типу

Е) Стимулюючий

15. У жінки 20 років при гістологічному дослідженні шийного лімфатичного вузла виявлені вузлики, які складаються з валів епітеліоїдних, лімфоїдних клітин та багатоядерних гігантських клітин Пірогова-Лангханса, розташованих між ними. У центрі вузликів визначається казеозний некроз. Який збудник потрібно виявити у зоні некрозу для встановлення остаточного діагнозу?

*** А) Мікобактерії Коха**

В) Мікобактерії лепри

С) Блідую трепонему

Д) Рикетсії

Е) Гриби

16. Чоловік скаржиться на свербіж та почервоніння шкіри у ділянці щоки, котре з'явилося після гоління. Об'єктивно: на ділянці гіперемованої шкіри щоки виявлені пухирці, заповненні прозорою рідиною. Який характер рідини у пухирцях?

*** А) Серозний ексудат**

- В) Трансудат
- С) Гнійний ексудат
- Д) Слизовий ексудат
- Е) Геморагічний ексудат

17. У дитини виявлена плямиста пігментація шкіри з гіперкератозом та набряком. Було встановлено: пігментна ксеродерма. Яка злоякісна пухлина може з'явитися на шкірі у цієї дитини при інсоляції?

*** А) Плоскоклітинний рак**

- В) Фібросаркома
- С) Ліпосаркома
- Д) Ангіосаркома
- Е) Папілома

18. На вентральній поверхні язика у чоловіка з протезом на нижній щелепі виявлена щільна сіра бляшка неправильної форми з нерівною поверхнею з чіткими межами. При гістологічному дослідженні утворення відмічається збережена структура багатошарового плоского епітелію, потовщення його за рахунок шипуватого та базального шарів, гіперкератозу, акантозу; лімфомacroфагальна інфільтрація підлеглої сполучної тканини. Встановити діагноз.

*** А) Лейкоплакія**

- В) Еритроплакія
- С) Папілома
- Д) Рак на місці
- Е) Конділома

19. Під шкірою піднижньощелепної ділянки у жінки 55 років виявлено з чіткими межами тістуватої консистенції рухоме утворення 1,0х0,7 см з повільним ростом. При гістологічному дослідженні утворення виявлені ліпоцити, які формують часточки різні за формою та розміром, розмежовані тонкими прошарками сполучної тканини із судинами. Встановити діагноз.

*** А) Ліпома**

В) Фіброма

С) Ангіома

Д) Ліпосаркома

Е) Фібросаркома

20. В доме ребенка при профосмотре у детей в возрасте 1-1,5 лет выявили очаговые утолщения в области рёбер, запястий, искривление ножек. Стоматолог указал на позднее прорезывание зубов, нарушение порядка прорезывания зубов, неравномерную минерализацию эмали и дентина, конфигурацию верхней челюсти в горизонтальном направлении в виде “высокого нёба”. Какое заболевание развилось у детей?

*** А) Рахит**

В) Дистрофическое обызвествление

С) Метаболическое обызвествление

Д) Метастатическое обызвествление

Е) Остеомаляция

21. Ребенок 4 лет пожаловался на боль в горле при глотании, плохое самочувствие. При осмотре в зеве и миндалинах на фоне умеренной отечности и гиперемии обнаружены серовато-беловатые пленчатые наложения, толщиной до 1 мм, плотно связанные с подлежащими тканями. О каком патологическом процессе свидетельствуют выявленные изменения?

*** А) Воспаление**

- В) Дистрофия
- С) Некроз
- Д) Метapлазия
- Е) Организация

22. На вскрытии умершего от менингита, мягкие мозговые оболочки утолщены, резко полнокровны, тусклые, отечные, пропитаны густым зеленовато-желтым экссудатом. О какой форме воспаления идет речь?

*** А) Гнойное**

- В) Серозное
- С) Фибринозное крупозное
- Д) Фибринозное дифтеритическое
- Е) Геморрагическое

23. У ребенка 7 лет повысилась температура тела до 39°C, появились насморк, конъюнктивит, кашель. На коже отмечались крупнопятнистые высыпания, при осмотре полости рта - беловатые высыпания на слизистой оболочке щек. Внезапно появилось тяжелое дыхание и наступила смерть при явлениях асфиксии. Какой наиболее вероятный диагноз?

*** А) Корь**

- В) Скарлатина
- С) Дифтерия
- Д) Менингококковой назофарингит
- Е) Грипп

24. У ребенка 4 лет появилась резкая боль при глотании, выраженный отек шеи, температура тела повысилась до 40°C. При осмотре на миндалинах определяются серовато-желтые пленки, которые снимаются с большим трудом, при удалении пленок под ними обнаруживаются кровоточащие язвы. Какой наиболее вероятный диагноз у больного?

*** А) Дифтерия**

В) Скарлатина

С) Корь

Д) Менингококковый назофарингит

Е) Грипп

25. Удалённый оперативно червеобразный отросток был утолщён, серозная оболочка его тусклая, полнокровная, с беловатыми рыхлыми плёнчатыми наложениями, в просвете мутная, беловато-желтоватая жидкость. При микроскопическом исследовании стенка отростка диффузно инфильтрирована нейтрофилами. О каком варианте аппендицита можно думать в этом случае?

*** А) Флегмонозном**

В) Гангренозном

С) Простом

Д) Поверхностном

Е) Хроническом

26. У ребенка 9 месяцев наблюдается запоздалое прорезывание зубов, нарушение порядка прорезывания, конфигурация верхней челюсти в горизонтальном направлении (“высокое” небо), микроскопически в зубах неравномерная минерализация эмали, сморщенные эмалевые призмы, некоторые вакуолизированы, расширение зоны преддентина, встречаются единичные дентиклы. Какое заболевание у ребенка?

*** А) Ранний рахит**

В) Поздний рахит

С) Остеомаляция

Д) Подагра

Е) Гипервитаминоз Д

27. У хворого спостерігається хронічний гіпертрофічний гінгівіт, утворення зубо-ясенної кишені, заповненої гнійним ексудатом. При рентгенологічному дослідженні виявлено резорбцію кісткової тканини стінок лунок. Яке захворювання має місце?

*** А) Пародонтит**

В) Гострий гнійний періодонтит

С) Хронічний періодонтит

Д) Фіброзна дисплазія

Е) Періостит

28. У хворого на слизовій оболонці щоки виразка овальної форми з припіднятими краями з хрящеподібним інфільтратом. Дно виразки м'ясисточервоного кольору, покрите сіруватим сальним налетом. При мікроскопічному дослідженні - лімфо-плазмоцитарний інфільтрат, переважно довкола дрібних судин. В останніх - проліферація ендотелію. Яке захворювання можна запідозрити?

*** А) Сифіліс**

- В) Травматична виразка
- С) Ерозивно-виразкова лейкоплакія
- Д) Виразка-рак
- Е) Виразково-некротичний стоматит Венсана

29. Хвора 46 років доставлена в клініку із спонтанним переломом нижньої щелепи в ділянці кута. В місці перелому кістка заміщена щільнуватою білісуватого кольору тканиною з бурими включеннями. При патогістологічному дослідженні виявлено острівці округлої форми, обмежені циліндричним і кубічним епітелієм. В центрі - полігональні, зірчасті, овальні клітини, які утворюють сітку. Як називається виявлена пухлина?

*** А) Амелобластома**

- В) Аденоматоїдна пухлина
- С) Одонтогенна карцинома
- Д) Комплексна одонтома
- Е) Одонтоамелобластома

30. У хворого в ділянці нижнього латерального різця справа виявлено вогнищеве розростання м'яких тканин, яке виступає над рівнем ясен, діаметром 6 мм на широкій ніжці. Мікроскопічно: поверня вкрита багатошаровим плоским епітелієм, подекуди звиразкованим. Спостерігаються хаотично розташовані пучки зрілої сполучної тканини, невелика кількість кровоносних і лімфатичних судин, периваскулярні плазмоцитарно-лімфоцитарні інфільтрати. На окремих ділянках - невеликі ділянки остеїдної речовини, оточені остеобластами. Як називається виявлений утвір?

*** А) Фіброзний епуліс**

В) Папілома

С) Ангіоматозний епуліс

Д) Фіброма

Е) Плоскоклітинний рак

31. У жінки 38 років в товщі привушної залози виявлено пухлину, яка складається з окремих вузликів, розділених прошарками сполучної тканини. Патогістологічно виявляються клітини епідермоїдного типу, які утворюють солідні структури. Слизоутворюючі клітини формують тяжі, що вистилають порожнини, заповнені слизом. Третім елементом пухлини є дрібні клітини з гіперхромним ядром. Про яку пухлину слід думати?

*** А) Мукоепідермоїдна пухлина**

В) Ациноклітинна пухлина

С) Папілярна цистаденома

Д) Аденолімфома

Е) Аденокістозна карцинома

32. При проведенні електроодонтометрії у пацієнта 46 років виявлено підвищення порогу чутливості 6-го верхнього зуба справа. Порушення функцій яких клітин пульпи може бути однією з причин вказаного явища?

*** А) одонтобластів**

- В) остеобластів
- С) фібробластів
- Д) плазматичних клітин
- Е) зірчастих клітин

33. У хворого ознаки пульпіту. При огляді виявляється, що порожнина зуба і каріозна порожнина, яка сполучається з нею, вивернені грануляційною тканиною, ядро-рожевого кольору, яка кровоточить. Визначте вид пульпіту по характеру запалення.

*** А) гіпертрофічний**

- В) гангренозний
- С) серозний
- Д) гнійний
- Е) фіброзний

34. При профілактичному огляді робітників, пов'язаних з виробництвом каменевугільних смол, у деяких виникали у ротовій порожнині ділянки стовщення і ороговіння слизової оболонки, переважно щік, білястого кольору, з шорсткою поверхнею, не хворобливі. Назвіть патологічний процес.

*** А) лейкоплакія**

- В) папіломатоз
- С) глосит
- Д) стоматит

35. У хворого, який помер від туберкульозу виявлено: в I сегменті правого легеня вогнище біло-сірого кольору, оточене капсулою, діаметром 3 см. Мікроскопічно: вогнище некрозу з капсулою, відсутність пері фокального запалення. Назвіть форму туберкульозу.

*** А) Туберкульома**

- В) Гострий кавернозний туберкульоз
- С) Фіброзно-кавернозний туберкульоз
- Д) Циротичний туберкульоз
- Е) Казеозна пневмонія

36. На розтині дитини 4 років, який помер при явищах менінгіту, встановлено: оболонки передніх півкуль головного мозку мутні, зеленувато-жовтого кольору, у вигляді “шапочки”. Тканина мозку повнокровна, набухла. Із тканин висіян *Neisseria meningitides*. Встановіть діагноз.

*** А) Менінгококова інфекція**

- В) Скарлатина
- С) Дифтерія
- Д) Коклюш
- Е) Кір

37. У хворого, який знаходиться у клініці з ознаками отруєння ртуттю, у нирках відмічаються наступні процеси: вогнищеві некротичні зміни канальців головних відділів, набряк, лейкоцитарна інфільтрація та геморагії інтерстицію, венозний застій. Який стан розвився у хворого?

*** А) Гостра ниркова недостатність**

- В) Гострий гломерулонефрит
- С) Хронічна ниркова недостатність
- Д) Гострий пієлонефрит
- Е) Хронічний пієлонефрит

38. У жінки спостерігається прогресуюче ожиріння по верхньому типу, артеріальна гіпертензія, стероїдний цукровий діабет та вторинна дисфункція яєчників. Який стан визвав перелічені зміни:.

*** А) Базофільна аденома гіпофізу**

- В) Еозинофільна аденома гіпофізу
- С) Метастази пухлини у надниркову залозу
- Д) Аденома (-клітин підшлункової залози
- Е) Вроджений недорозвиток гіпофізу

39. У хворого, який помер при явищах гострої коронарної недостатності на розтині встановлено: в стінці лівого шлуночка, в серединній частці серцевої м(язи вогнище біло-жовтого кольору з крововиливами по периферії. Встановіть причину смерті.

*** А) Інтрамуральний інфаркт міокарду**

- В) Субендокардіальний інфаркт міокарду
- С) Субепікардіальний інфаркт міокарду
- Д) Трансмуральний інфаркт міокарду
- Е) -

40. Під час огляду ротової порожнини стоматологом у дитини 12 років було виявлено, що мигдалики збільшені за розмірами і в правому мигдалику є виразковий дефект діаметром 12 мм і глибиною до 5 мм з нерівними краями, вкритими некротичними масами. В наступні дні розвинувся геморагічний синдром, на секції знайдено крововилив в головний мозок, який і був безпосередньою причиною смерті. Мікроскопово встановлено: кістковий мозок гіперцелюлярний з наявністю великої кількості бластних клітин, аналогічні клітини переважали і в клітинній популяції тканини мигдалика. Діагностуйте основне захворювання.

*** А) Гострий лейкоз**

- В) Хронічний лейкоз
- С) Некротична ангіна
- Д) Гнійна ангіна
- Е) Лімфогранулематоз

41. Під час огляду стоматологом хлопчика 16 років були знайдені збільшені підщелепові та шийні лімфатичні вузли. Була проведена біопсія. Мікроскопово в лімфатичних вузлах було знайдено: типова будова стерта, клітинна популяція гетерогенна, присутні великі клітини з багатолопасним ядром, множинні одноподібні клітини великого розміру, еозинофільні та нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, окрім того знайдені ділянки некрозу та вогнища склерозу. Діагностуйте захворювання.

*** А) Лімфогранулематоз**

- В) Гіперплазія лімфатичного вузла
- С) Гранулематозний лімфаденіт
- Д) Гнійний лімфаденіт
- Е) Неходжкінська лімфома

42. На розтині тіла чоловіка віком 58 років, який тривалий час вживав значну кількість алкоголю і помер вдома, було знайдено: макроскопово - права легеня щільна і збільшена в розмірах, тканина на розрізі сірувато коричнева однорідна, плевра вкрита сіруватими плівчастими нашаруваннями; мікроскопово - порожнини альвеол містять коагуляти фібрину, гемолізовані еритроцити. Діагностуйте захворювання.

*** А) Крупозна пневмонія**

- В) Вогнищева пневмонія
- С) Інтерстиційна пневмонія
- Д) Первинний туберкульоз легень
- Е) Вторинний туберкульоз легень

43. На розтині тіла чоловіка віком 19 років, який помер від гострої постгеморагічної анемії, що розвинулася внаслідок масивної легеневої кровотечі, було знайдено: макроскопово - верхівки обидвох легень деформовані, на розрізі містять множинні білувато-сірі осередки діаметром 10-15 мм та множинні патологічні порожнини діаметром до 15 мм зі щільними стінками; мікроскопово - в тканинах що оточують осередки та порожнини розміщується інфільтрат, якій складається з епітеліоїдних клітин, багатоядерних гігантів та лімфоцитів. Діагностуйте захворювання.

*** А) Вторинний фіброзно-кавернозний туберкульоз**

- В) Первинний туберкульоз без ознак прогресування
- С) Прогресуючий первинний туберкульозний комплекс
- Д) Гематогенно-дисемінований туберкульоз легень
- Е) Гематогенний міліарний туберкульоз легень

44. Під час розтину тіла жінки 45 років, що померла від хронічної ниркової недостатності, знайдено: склероз та гіаліноз дерми, великовогнищеві некрози кортикального шару нирок та нефросклероз, великовогнищевий кардіосклероз та базальний пневмосклероз. Діагностуйте захворювання.

*** А) Системна склеродермія**

- В) Вузликовий периартеріїт
- С) Дерматоміозит
- Д) Системний червоний вовчак
- Е) Ревматизм

45. Після видалення зуба, у хворого кровотеча. Який препарат Ви застосуєте внутрішньовенно, для зупинки кровотечі ?

*** А) Кальція хлорид**

- В) Тромбін
- С) Гепарин
- Д) Гірудин
- Е) Натрію цитрат

46. При розтині трупа чоловіка 47 років, спостерігається блідність шкіри, зменшена кількість крові в судинах та серці, виражена атрофія епітелія язика. Слизова оболонка шлунку в фундальній частині тонка, гладка з явищами склерозу. В кістковому мозку та периферичній крові багато мегалобластів. Який вид анемії спостерігається у хворого?

*** А) Перніціозна.**

- В) Залізодефіцитна.
- С) Гемолітична.
- Д) Гостра постгеморагічна.
- Е) Хронічна постгеморагічна.

47. У жінки 22 роки виявлені збільшені лімфатичні вузли. При гістологічному дослідженні в лімфатичному вузлі спостерігаються лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі та великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, поодинокі осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання характерні такі зміни?

A) Гострий лейкоз.

*** B) Лімфогранулематоз.**

C) Лімфосаркома.

D) Хронічний лейкоз.

E) Метастаз рака легень.

48. У молодій жінки в грудній порожнині виявлена пухлина у вигляді вузла до 2 см у діаметрі м'яко-еластичного, рожево-білого кольору, однорідна. Мікроскопічно пухлина являє собою пучки клітин з овальними або витягнутими ядрами. Клітинно-волокнисті пучки формують ритмічні, або „палісадні структури”, утворені паралельними рядами правильно орієнтованих клітин, розташованих у вигляді частоколу, між якими знаходиться безклітинна гомогенна зона. Такі структури одержали назву „тільця Верокая”. Ваш діагноз?

*** A) Невринома (шваннома).**

B) Злоякісна невринома.

C) Гангліоневрома.

D) Нейробластома.

E) Гангліонейробластома.

49. На розтині чоловіка 67 років, померлого при явищах гіпоглікемічної коми, в підшлунковій залозі спостерігаються ділянки розростання сполучної тканини та некротичні осередки, атрофія острівків Лангенгарса. Яке захворювання зумовило такі зміни в підшлунковій залозі?

*** А) Сахарний діабет.**

- В) Муковісцидоз.
- С) Гострий панкреатит.
- Д) Рак головки підшлункової залози.
- Е) Гіпоплазія підшлункової залози.

50. Померлій жінці було виставлено клінічний діагноз: хронічний абсцес легенів. При розтині виявлено порожнину в 2-гому сегменті правої легені розміром 5 см, округлої форми. Внутрішня поверхня порожнини була сформована казеозними масами, зовнішня – щільною тканиною легенів, піогенна мембрана відсутня. Як на вашу думку про який процес йде мова?

*** А) Гострий кавернозний туберкульоз.**

- В) Фіброзно-кавернозний туберкульоз.
- С) Гострий абсцес.
- Д) Хронічний абсцес.
- Е) Первинна легенева каверна.

51. Чоловік 67 років хворів на гіпертонічну хворобу. Помер від гострої мозкової недостатності. На розтині померлого в підкоркових ядрах правої півкулі головного мозку визначається порожнина неправильної форми 5 x 3,5 см, заповнена червоними згортками крові і розмякшеною тканиною мозку. Назвіть патологію, яка розвинулась у головному мозку.

*** А) Гематома.**

- В) Геморагічне просякнення.
- С) Ішемічний інфаркт.
- Д) Кіста.
- Е) Абсцес.

52. У чоловіка 46 років на шкірі визначалась пляма, яка вибухала і мала темний колір та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з'явилась біль, колір став чорно-коричневим і почав пальпуватися вузлик. На гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?

*** А) Меланома.**

В) Базаліома.

С) Гемангіома.

Д) Гематома.

Е) Карциноїд.

53. Хронічна ниркова недостатність спричинила смерть хворого. На розтині виявлено запалення легенів фібринозно-геморагічного характеру. Вкажіть назву пневмонії, яка розвинулась.

*** А) Уремічна.**

В) Аспіраційна.

С) Бензинова.

Д) Гіпостатична.

Е) Травматична.

54. У хворой 57 років з'явилися періодично виникаючі маточні кровотечі. З діагностичною ціллю проведено вишкрібання матки. В отриманому матеріалі серед елементів крові спостерігаються залозисті комплекси різних розмірів та форми, утворені атипічними клітинами з гіперхромними ядрами з численними мітозами (в тому числі неправильними). Ваш діагноз?

*** А) Рак тіла матки (аденокарцинома).**

В) Фіброміома матки.

С) Хоріонепітеліома.

Д) Залозиста гіперплазія ендометрію.

Е) Ендометрит.

55. При розтині тіла жінки 40 років, що померла від крововиливу у головний мозок під час гіпертонічного кризу, знайдено: ожиріння за верхнім типом, гіпертрихоз та гірсутизм, стрії шкіри, стегон та живота. В передній долі гіпофізу – базофільна аденома. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

*** А) Хвороба Іценко-Кушинга**

- В) Гіпертонічна хвороба
- С) Аліментарне ожиріння
- Д) Хвороба Сімондса
- Е) Церебральне ожиріння

56. При розтині тіла жінки 50 років, померлої від серцевої недостатності, знайдено дифузне збільшення щитовидної залози. Мікроскопічно в ній: перетворення призматичного епітелію фолікулів у циліндричний, проліферація епітелію з утворенням сосочків, розрідження колоїду та лімфоплазмочитарна інфільтрація строми; в серці – гіпертрофія лівого шлуночку, серозний набряк та лімфоїдна інфільтрація строми, в печінці – серозний набряк. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

*** А) Дифузний токсичний зоб**

- В) Ендемічний зоб
- С) Зоб Хасімото
- Д) Зоб Риделя
- Е) Гострий тиреоїдит

57. При гістологічному дослідженні серця померлого від гострої серцевої недостатності в міокарді лівого шлуночка виявлено ділянка омертвіння, відмежована від неушкодженої тканини зоною повнокровних судин, дрібних крововиливів та лейкоцитарною інфільтрацією. Який діагноз найбільш вірогідний?

*** А) Інфаркт міокарду**

- В) Ішемічна дистрофія міокарду
- С) Осередковий ексудативний міокардит
- Д) Дифузний ексудативний міокардит
- Е) Продуктивний міокардит

58. При розтині тіла померлого в гематологічному відділенні чоловіка виявлено: пілоїдний кістковий мозок з наявністю в ньому мієлоцитів, промієлоцитів та бластних клітин, спленомегалію (до 7 кг) з інфільтрацією мієлоцитами, гепатомегалію (до 6 кг) з дифузною лейкозною інфільтрацією синусоїдів. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

*** А) Хронічний мієлолейкоз**

- В) Гострий мієлолейкоз
- С) Гострий недиференційований лейкоз
- Д) Гострий лімфолейкоз
- Е) Хронічний лімфолейкоз

59. При мікроскопічному дослідженні нирок померлої від ниркової недостатності жінки 36 років, в клубочках виявлено проліферацію нефротелію капсули, подоцитів та макрофагів з утворенням “півмісяців”, некроз капілярних петель, фібринові тромби в їх просвітах, а також склероз та гіаліноз клубочків, атрофію канальців та фіброз строми нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

*** А) Підгострий гломерулонефрит**

- В) Гострий гломерулонефрит
- С) Хронічний гломерулонефрит
- Д) Фокальний сегментарний склероз
- Е) Мембранозна нефропатія

60. Хворий К., 75 років звернувся до хірурга зі скаргами на виразку гомілки буруватого кольору, що довго не загоюється. При біопсійному дослідженні: дифузне розростання поліморфних атипових клітин, в цитоплазмі яких знаходиться бурий пігмент. Реакція Перлса негативна. Багато патологічних мітозів та осередків некрозу тканини. Встановіть діагноз.

*** А) Меланома**

- В) Місцевий гемосидероз
- С) Внутрішньодермальний невус
- Д) Трофічна виразка
- Е) Рак шкіри

61. У хворого 55 років на 4-й день після холецистектомії з'явився ціаноз обличчя, шиї, задишка. Рентгенологічно - деформація кореня правої легені, на ЕКГ - ознаки гіпоксії міокарда. Через 2 тижня хворий помер від легеневої недостатності. На розтині геморагічний інфаркт. Яке порушення кровообігу могло стати?

*** А) Тромбоемболія легеневої артерії**

В) Тромбоз легеневої артерії

С) Інфаркт легені

Д) Інфаркт-пневмонія

Е) Тромбоз легеневої артерії

62. При мікроскопічному дослідженні легень, серця, печінки та нирок у померлого від хронічної ниркової недостатності в стінках артерій середнього та дрібного калібру виявлені ділянки ішемії та гомогенізації зі склерозом та вузликовими потовщеннями. Визначити захворювання, яке привело до вищенаведених змін.

*** А) Вузликовий пері артеріїт**

В) Артеріолосклероз

С) Облітеруючий тромбангіт

Д) Атеросклероз

Е) Системна склеродермія

63. При мікроскопічному дослідженні секційного матеріалу померлого с пухлиною нижньої щелепи та метастазами у внутрішні органи, виявлено: колагенові волокна, що переплітаються. Серед них знаходяться поліморфні атипові клітини з численними мітозами, острівці та тяжі одонтогенного епітелію, що утворює фолікулоподібні структури. Яка це пухлина ?

*** А) Одонтогенна саркома**

В) Остеобластокластома

С) Фолікулярна кіста

Д) Цементома

Е) Амелобластична фіброма

64. При мікроскопії біоптату з виразки порожнини рота виявленні осередки казеозного некрозу, оточені плазмоцитами, епітеліоїдними та лімфоїдними клітинами, зрідка гігантськими багатоядерними клітинами типу Пірогова-Лангганса, зустрічаються дрібні судини з ознаками ендо- та пері васкуліту. Вкажіть захворювання.

*** А) Сифіліс**

В) Туберкульоз

С) Лепра

Д) Риносклерома

Е) Сап

65. На розтині трупа дитини 5 міс. виявлені наступні зміни: верхні долі легень рожевого кольору, звичайної консистенції, нижні долі яскраво-червоного кольору, щільні, на розрізі повнокровні. При мікроскопічному дослідженні: вогнища запалення з переважанням в екссудаті еритроцитів, вогнища різного розміру, схильні до злиття. Визначте патологічний процес в легенях.

*** А) Бронхопневмонія**

- В) Крупозна пневмонія
- С) Інтерстиціальна пневмонія
- Д) Бронхоектази
- Е) Туберкульоз

66. На розтині трупа чоловіка 50 років виявлено наступні зміни: права легень помірно у всіх відділах щільна, на розрізі тканина безповітряна, мілко зерниста, сухувата. Вісцеральна плевра з відкладенням фібрину сіро-коричневого кольору. Визначте вид ураження легені та плеври.

*** А) Крупозна пневмонія**

- В) Туберкульоз
- С) Бронхопневмонія
- Д) Інтерстиціальна пневмонія
- Е) Пневмофіброз

67. У хворого на рентгенограмі легень виявлено затемнення. Під час діагностичної експрес-біопсії лімфатичного вузла бронха виявлено: сирний некроз, навколо якого розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні пласти з домішками багатоядерних гігантських клітин. Вкажіть на причину лімфаденіту.

*** А) Туберкульоз**

- В) Пневмонія
- С) Сифіліс
- Д) Метастази раку
- Е) Аденовірусна інфекція

68. При забарвленні по Бесту тканини нирки померлого хворого у вузькій частині петлі Генля виявлені частки глікогену. При якому захворюванні це відбувається?

*** А) Цукровий діабет**

В) Нецукровий діабет

С) Гломерулонефрит

Д) Пієлонефрит

Е) Амілоїдний нефроз

69. При дослідженні операційної біопсії щитовидної залози виявлено серед фолікулів, заповнених колоїдом, визначаються осередки рубцевої сполучної тканини. Поставте діагноз.

*** А) Зоб Риделя**

В) Ендемічний зоб

С) Спорадичний зоб

Д) Базедов зоб

Е) Зоб Хашимото

70. В операційній біопсії щитовидної залози гістологічно виявлені серед фолікулів, заповнених колоїдом, лімфоїдні структури із центрами росту. Яке захворювання у хворого?

*** А) Зоб Хашимото**

В) Ендемічний зоб

С) Спорадичний зоб

Д) Базедов зоб

Е) Зоб Риделя

71. У хворого виявлено збільшення кінцівок, передньої частини обличчя, язика. Про яке захворювання йде мова?

*** А) Акромегалія**

- В) Хвороба Іценко-Кушинга
- С) Базедова хвороба
- Д) Адисонова хвороба
- Е) Феохромоцитома

72. У померлого хворого на розтині виявлено бронзове забарвлення шкіри та слизових оболонок порожнини рота. В наднирниках визначались казеозні маси. Яким захворюванням страждала людина?

*** А) Адисонова хвороба**

- В) Синдром Іценко-Кушинга
- С) Базедова хвороба
- Д) Акромегалія
- Е) Феохромоцитома

73. Хворий помер при явищах уремії. На розтині нирки збільшені, в'ялі, кірковий шар широкий, набряклий, з червоним крапом, мозкова речовина темно-червона. Мікроскопічно в порожнині капсули клубочків виявлені "півмісяці", які стискають капіляри, дистрофія нефроцитів, набряк та інфільтрація строми. Яке захворювання у померлого?

*** А) Гломерулонефрит**

- В) Пієлонефрит
- С) Нефролітіаз
- Д) Нефротичний синдром
- Е) Амілоїдоз нирок

74. При біопсійному дослідженні видаленої нирки макроскопічно в ниркової місці виявлено вузол м'якої консистенції, пістрявий на розтині. Мікроскопічно: світлі полігональні та поліморфні клітини, що містять ліпіди, мітози. Клітини утворюють альвеоли, часточки, залозисті сосочкові структури. Яку пухлину нагадує вузол нирки?

*** А) Світло клітинний (гіпернефроїдний) рак**

В) Залозистий рак (аденокарцинома)

С) Нефробластома

Д) Ацидофільна аденома

Е) Гіпернефроїдна аденома

75. На розтині померлої дівчини 19 років знайдено бородавчастий ендокардит усіх клапанів, Осередкові крововиливи під ендокард. Виразковий стоматит. Виразки стравоходу. Пневмонія. Нефрит. Гіперплазія селезінки з периваскулярним склерозом. Васкуліт і некроз в ділянці зорового бугра Численні фурункули. Яке більш ймовірне захворювання?

*** А) Системний червоний вовчак**

В) Ревматизм

С) Септичний ендокардит

Д) Ішемічна хвороба серця

Е) Гіпертонічна хвороба

76. На розтині померлого з кардіосклерозом виявлено пристінковий тромбоз лівого шлуночка серця в ділянці аневризми. В легенях численні осередки масивних крововиливів клиноподібної форми, в нирках, селезінці інфаркти, серозний перитоніт. У венах нижніх кінцівок тромби не знайдені. Яка причина ураження легенів.

*** А) Тромбоемболії легеневих артерії**

- В) Тромбоз легеневої артерії
- С) Запалення артерії
- Д) Стеноз артерії
- Е) Розрив легеневої артерії

77. При розтині трупа хлопця 19 років виявили, що легені дещо здуті, пухкі, повнокровні, зовні та на розрізі усіяні безліччю просоподібних вогнищ сірого кольору. Гістологічно ці вогнища складались із лімфоїдних, епітеліоїдних, гігантських клітин Пірогова- Ланхганса. Про який патологічний процес іде мова?

*** А) Туберкульоз**

- В) Крупозна пневмонія
- С) Бронхопневмонія
- Д) Інтерстиціальна пневмонія
- Е) Бронхоектазія