

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Фармакологія - база тестів 2005 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2005 року**

Кількість запитань: **80**

1. Кислота ацетилсаліцилова може бути використана при:

*** А) Запальних захворюваннях.**

В) Гіпотермії

С) Катаракті

Д) Ішемічній хворобі серця

Е) Лікуванні морфінної абстиненції.

2. Якому вітамінному препарату притаманні антиоксидантні властивості?

*** А) Токоферол**

В) Ергокальціферол

С) Тіамін.

Д) Рутин.

Е) Кислота фолієва.

3. Перед плановим хірургічним втручанням у хворого виявлено гіперпротромбінемію на фоні призначення йому вікасолу. Який із перерахованих ліків є доцільним у цьому випадку?

*** А) Фенілін**

В) Тромбін

С) Кислота амінокапронова

Д) Контрикал

Е) Гепарин

4. На прийомі стоматолог у хворого з великою формою епілепсії виявив гіпертрофічний гінгівіт. Хворий скаржився на часту нудоту, блювоту. Ці симптоми виникли на фоні тривалого застосування одного з препаратів, похідної гіданотоїну. Вкажіть цей засіб:

*** А) Дифенін.**

- В) Гексамідин
- С) Карбамазепін
- Д) Триметин.
- Е) Фенобарбітал

5. На прийомі у лікаря-стоматолога у хворого стався напад стенокардії. Який засіб, представник групи нітратів, доцільно використати?

*** А) Нітрогліцерин.**

- В) Ментол
- С) Талінолол
- Д) Ериніт
- Е) Валідол

6. Хворому, який страждає на парадонтит, у комплексній терапії призначили седативний засіб рослинного походження. Вкажіть його.

*** А) Настоянка валеріани.**

- В) Настій трави термопсису.
- С) Вивар кори крушини.
- Д) Вивар кори дуба
- Е) Рідкий екстракт грициків.

7. Для лікування туберкульозу призначений антибіотик, який офарблює сечу в червоний колір. Вкажіть цей антибіотик.

- * А) Ріфампіцин**
- В) Еритроміцин
- С) Амоксицилін
- Д) Нітроксолін
- Е) Цефотаксим

8. Який анестетик придатний для всіх видів місцевої анестезії?

- * А) Лідокаїн**
- В) Новокаїн
- С) Трімекаїн
- Д) Дікаїн
- Е) Анестезин

9. У хворого, під час видалення зуба відбувся судорожний випадок. Який препарат доцільно йому призначити?

- * А) Діазепам**
- В) Димедрол
- С) Корвалол
- Д) Настоянка валеріани
- Е) Галоперідол

10. Для знеболення пологів лікар призначив анагезуючий засіб. Який з анагетиків найбільш доцільно використовувати в даній ситуації?

- * А) Промедол**
- В) Морфін
- С) Анальгін
- Д) Парацетамол
- Е) Фентаніл

11. У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають важкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс?

*** А) Абстинентний синдром**

- В) Терапевтичний ефект
- С) Сенсibiliзація
- Д) Кумуляція
- Е) Толерантність

12. . При очікуванні екстракції зуба у пацієнта виникло сильне відчуття страху. Який з препаратів йому слід призначити для усунення цих відчуттів?

*** А) Діазепам**

- В) Аміназін
- С) Анальгін
- Д) Етімізол
- Е) Карбамазепін

13. У хворого гостра серцево-легенева недостатність, яка супроводжується набряком легенів. Який препарат з групи діуретиків необхідно призначити?

*** А) Фуросемід**

- В) Тріамтерен
- С) Спіронолактон
- Д) Діхлотіазід
- Е) Діакарб

14. У хворого для обробки опікової поверхні шкіри був використаний препарат, антисептичні властивості якого забезпечуються вільним киснем, що виділяється в присутності органічних речовин. Оберіть правильну відповідь:

- * А) Калію перманганат**
- В) Фурацилін
- С) Хлоргексидин
- Д) Розчин йоду спиртовий
- Е) Натрію гідрокарбонат

15. Хворий тривалий час вживав антибіотики широкого спектру, що викликали зниження апетиту, нудоту, пронос з гнилісним запахом. Про яку побічну дію йде мова?

- * А) Дисбактеріоз**
- В) Алергічна реакція
- С) Пряма подразнююча дія
- Д) Гепатотоксична дія
- Е) Нефротоксична дія

16. При катаральній ангіні хворому призначили препарат з групи сульфаніламідів. Визначте механізм антибактеріальної дії сульфаніламідів.

- * А) Конкурентний антагонізм з ПАБК**
- В) Порушення синтезу білків клітинної стінки
- С) Зниження проникності мембран
- Д) Пригнічення сульфгідрильних груп тіолових ферментів
- Е) Коагуляція білка

17. Які з нижче перерахованих груп хіміотерапевтичних засобів при неправильному вживанні можуть викликати кристалурію?

*** А) Сульфаніаміди**

- В) Антибіотики-аміноглікозиди
- С) Похідні 8-оксихіноліну
- Д) Фторхінолони
- Е) Нітрофурани

18. У хворого діагностовано гострий виразково-некротичний гінгівіт. В комплексній терапії призначено метилурацил. До якої групи належить цей лікарський засіб?

*** А) стимулятори лейкопоезу**

- В) антисептичні засоби
- С) протівірусні засоби
- Д) ненаркотичні анальгетики
- Е) адсорбуючі засоби

19. Хворий В., 30 років, звернувся до лікаря зі скаргами на пронос і болі в животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,5оС. Напередодні хворий був у лісі, де пив воду з відкритого водоймища. Встановлений бактеріологічно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання.

*** А) Метронідазол**

- В) Хінгамін
- С) Інтраконазол
- Д) Фурацилін
- Е) Ацикловір

20. У хворого після операції резекції шлунка на 2-3 день не відновилась перистальтика кишок. Що потрібно призначити хворому для стимуляції функції шлунково-кишкового тракту?

*** А) Прозерин**

В) Празозин

С) Циклодол

Д) Атропіну сульфат

Е) Ацетилхолін

21. Хворому перед операцією був уведений дитилін (лістенон) і проведена інтубація. Після закінчення операції і припинення наркозу самостійне дихання не відновилось. Нестача якого ферменту в організмі хворого продовжує дію м'язового релаксанту?

*** А) Псевдохолінестерази**

В) Сукцинатдегідрогенази

С) Карбонгідрази

Д) N-ацетилтрансферази

Е) K⁺-Na⁺-АТФ-ази

22. Після закапування в око крапель у хворого розвинувся мідріаз і параліч акомодатії. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект?

*** А) М-холінолітики**

В) М-холіноміметики

С) Антихолінестеразні

Д) Бета-адреноміметики

Е) Альфа-адреноміметики

23. У приймальне відділення лікарні доставлений хворий з важким отруєнням невідомою речовиною в стані гострої судинної недостатності. Що з зазначених препаратів необхідно використовувати для невідкладної допомоги?

*** А) Мезатон**

- В) Нафтизин
- С) Ізадрин
- Д) Сальбутамол
- Е) Анаприлін

24. Який антибіотик, що може спричинити гіоплазію емалі зубів, протипоказаний дітям до 12 років?

*** А) Доксциліну гідрохлорид**

- В) Бензилпеніциліну калієва сіль
- С) Амоксицилін
- Д) Цефтріаксон
- Е) Бензилпеніциліну натрієва сіль

25. Який препарат найбільш доцільно призначати стоматологічному хворому для пролонгування дії місцевого анестетика при інфільтраційній анестезії?

*** А) Адреналін**

- В) Ізадрин
- С) Атропін
- Д) Галантамін
- Е) Прозерін

26. На прийомі у стоматолога хворому 28 років призначено препарат для зменшення салівації при пломбуванні зуба. Визначте даний препарат.

*** А) Атропін**

В) Адреналін

С) Прозерін

Д) Пілокарпін

Е) Мезатон

27. Бригада швидкої допомоги була викликана до хворого 48 років із приводу інфаркта міокарда. У комплексну терапію було включено анальгетик. Вкажіть найбільш доцільний препарат?

*** А) Фентаніл.**

В) Аспірин.

С) Індометацин.

Д) Промедол.

Е) Морфін.

28. Чоловікові 48 років з хронічним холицистопанкреатитом для покращення травлення призначено панкреатин. До якого виду лікування належить ця форма фармакотерапії?

*** А) .Замісна**

В) .Симптоматична

С) .Патогенетична

Д) .Етіотропна

Е) .Профілактична

29. Стабільні органічні кислоти та луги, а також органічні неелектроліти, транспортуються за участю:

*** А) .Пасивної дифузії**

- В) .Полегшеної дифузії
- С) .Активного транспорту
- Д) .Піноцитозу
- Е) .Фільтрації

30. Хвора В., з хронічною серцевою недостатністю тривалий час лікується препаратами наперстянки. В результаті порушення ритму прийому у жінки виникли симптоми інтоксикації, які є наслідком:

*** А) Матеріальної кумуляції**

- В) Функціональної кумуляції
- С) Синергізму
- Д) Антагонізму
- Е) Сенсибілізації

31. Хлопчику 5 років з початковим множинним карієсом була призначена ремінералізуюча терапія. Після застосування розчину у вигляді аплікації з'явилося почорніння зубів. Який лікарський засіб було застосовано?

*** А) срібла нітрат**

- В) кальцію хлорид
- С) кальцію глюконат
- Д) кальцію лактат
- Е) натрію фторид

32. Після операції видалення зуба у хворого розвинувся гіпертонічний криз. Який з препаратів допоможе хворому в даному випадку?

*** А) бензогексоній**

- В) мезатон
- С) нітрогліцерин
- Д) целанід
- Е) норадреналін

33. Під час операції видалення зуба для провідникової анестезії обрали тримекаїн. Який засіб потрібно застосувати в комбінації з тримекаїном для пролонгування дії та зменшення резорбтивного ефекту останнього?

*** А) адреналіну гідрохлорид**

- В) галантаміну гідробромід
- С) платифіліну гідротартрат
- Д) піромекаїн
- Е) атропіну сульфат

34. Хворій для лікування алергічного хейліту призначили лоратадин. Який механізм дії даного лікарського засобу

*** А) пригнічує H1-гістамінорецептори**

- В) блокує вихід медіаторів алергії з тканинних базофілів
- С) підвищує активність гістамінази
- Д) пригнічує проліферацію лімфоцитів і утворення антитіл
- Е) гальмує утворення комплексу антиген-антитіло

35. При операції на щелепно-лицьовій ділянці для зниження секреції слинних залоз хворому ввели атропіну сульфат. Виникла тахікардія, сухість та гіперемія шкіри, гіпертермія, параліч акомодациї та підвищення внутрішньоочного тиску. Який з лікарських засобів доцільно використати в даному випадку?

*** А) прозерин**

В) скополамін

С) адреналін

Д) атенолол

Е) діпірідамол

36. Під час лікування пульпіту на порожнину зуба наклали девіталізуючу миш'яковисту пасту строком на 24 години. Хворий порушив названий термін і з'явився на повторне відвідування через 72 години. Виникнули симптоми інтоксикації миш'якистою кислотою і продуктами розпаду пульпи. Яким лікарським засобом необхідно обробити канал?

*** А) унітіолом**

В) калію перманганатом

С) натрію гідроксидом

Д) перекису воднем

Е) калію хлоридом

37. Хворий з хронічним гастритом, що знаходився на тривалій дієті, скаржиться на загальну втому, сухість шкіри, геморагічні висипи на шкірі, кровоточивість ясен, розхитування та випадання зубів. Який з лікарських засобів доцільно використати в даному випадку?

*** А) кислота аскорбінова**

В) карбамазепін

С) фенобарбітал

Д) сульфоксамфокаїн

Е) дихлотиазід

38. Хворому зі злоякісним новоутворенням верхньої щелепи для знеболювання призначили морфін гідрохлорид. Після введення препарату виникло пригнічення дихання, різке звуження зіниць, ціаноз, гіпотермія, втрата свідомості. Який лікарський засіб потрібно ввести хворому в першу чергу?

*** А) налоксон**

В) атропіну сульфат

С) дроперидол

Д) промедол

Е) адреналіну гідрохлорид

39. Хворому з артритом скронево-щелепового суглобу був призначений диклофенак-натрій. Необхідно пам'ятати, що побічною дією тривалого застосування цього засобу є:

*** А) ульцерогенність**

В) тератогенність

С) ототоксичність

Д) канцерогенність

Е) лікарська залежність

40. Хворому під час ускладненої екстракції зуба був призначений засіб для неінгаляційного наркозу ультракороткої дії. Який це засіб?

*** А) пропанідид**

В) закис азоту

С) феназепам

Д) аміназин

Е) фенотерол

41. У хворого з епілепсією було встановлено гіпертрофічний гінгівіт. Який лікарський засіб міг спричинити такий побічний ефект?

*** А) дифенін**

- В) омнопон
- С) бісептол
- Д) кавінтон
- Е) левамізол

42. У дитини п'яти років спостерігається покреслені жовтувато-коричневими смугами емаль і дентин, оголення дентину, множинний карієс. Відомо, що під час вагітності мати дитини перехворіла дизентерією і приймала антибіотики. Який препарат міг спричинити таку побічну дію?

*** А) тетрациклін**

- В) лінкоміцин
- С) стрептоцид
- Д) ністатин
- Е) ампіцилін

43. Хворому хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом призначили полоскання рота розчином калію перманганату. Яка повинна бути концентрація розчину в даному випадку?

*** А) 0,1\%**

- В) 25\%
- С) 10\%
- Д) 5\%
- Е) 50\%

44. При лечении эпилепсии фенobarбиталом сонливость, наблюдающаяся в начале лечения, постепенно ослабевает и исчезает. Какое явление имеет место в данном случае?

*** А) Привыкание**

- В) Кумуляция
- С) Сенсибилизация
- Д) Идиосинкразия
- Е) Тахифилаксия

45. При повторном применении новокаина в терапевтической дозе у больного, который хорошо переносил это вещество раньше, возник сильный токсический эффект. Какое явление имеет место в данном случае?

*** А) Сенсибилизация**

- В) Кумуляция
- С) Идиосинкразия
- Д) Тахифилаксия
- Е) Абстиненция

46. При длительном применении дигитоксина у больного постепенно возникли и стали нарастать нежелательные нарушения ритма сердечной деятельности. Какое явление имеет место в данном случае?

*** А) Кумуляция**

- В) Сенсибилизация
- С) Идиосинкразия
- Д) Тахифилаксия
- Е) Абстиненция

47. Человек, долго принимавший лекарство, не может прекратить его использование, так как при этом возникают нарушения психических, соматических и вегетативных функций. Как называется синдром различных нарушений при отказе от приема вещества?

*** А) Абстиненция**

В) Сенсибилизация

С) Идиосинкразия

Д) Тахифилаксия

Е) Кумуляция

48. Больной обратился к стоматологу с жалобами на гнойное воспаление десен. Какой препарат будет наиболее эффективен, если предполагается анаэробная природа возбудителя?

*** А) Метронидазол**

В) Гентамицин

С) Оксациллин-натрий

Д) Ко-тримоксазол

Е) Нитроксолин

49. У больной 45 лет невроз, проявляющийся раздражительностью, бессонницей, немотивированной тревогой. Какое вещество устранил все симптомы болезни?

*** А) Диазепам**

В) Экстракт валерианы

С) Пирацетам

Д) Кофеин –бензоат натрия

Е) Леводопа

50. У больного после инъекции новокаина развился коллапс, бронхоспазм. Какое вещество является средством выбора в этой ситуации?

*** А) Адреналина гидрохлорид**

- В) Мезатон
- С) Фенотерол
- Д) Ангиотензинамид
- Е) Изадрин

51. Больному после аппендектомии с целью профилактики инфекции назначен цефтриаксон. Нарушение какого процесса лежит в основе противомикробной активности этого антибиотика?

*** А) Образования микробной стенки**

- В) Синтеза нуклеиновых кислот
- С) Рибосомального синтеза белка
- Д) Энергетического обмена
- Е) Проницаемости цитоплазматической мембраны

52. Больной эпилепсией доставлен в бессознательном состоянии с повторяющимися судорожными приступами. Состояние купировано введением диазепама. С действием на какие медиаторные системы связан его эффект?

*** А) ГАМКергические**

- В) Дофаминергические
- С) Норадренергические
- Д) Серотонинергические
- Е) Холинергические

53. Человек, длительно находившийся в душном помещении, потерял сознание. Сознание восстановилось после вдыхания нашатырного спирта. С прямым влиянием на какие структуры связано действие вещества?

*** А) Рецепторы верхних дыхательных путей**

- В) Сосудодвигательный центр
- С) Дыхательный центр
- Д) Резистивные сосуды
- Е) Емкостные сосуды

54. Під час прийому у стоматолога у хворого виник напад стенокардії. Який препарат слід застосувати?

*** А) Нітрогліцерин**

- В) Адреналіну гідрохлорид
- С) Діазепам
- Д) Атропін
- Е) Клофелін

55. Під час проведення місцевого знеболення у хворого виник анафілактичний шок. Який із перерахованих препаратів необхідно перш за все ввести хворому?

*** А) Адреналін**

- В) Діазепам
- С) Атропін
- Д) Анаприлін
- Е) Нітрогліцерин

56. При огляді ротової порожнини пацієнта лікар-стоматолог відмітив ознаки кандидозного урадження, а саме точковий наліт білого кольору на слизовій оболонці щік, піднебіння, язика. Який з перелічених препаратів використовується для лікування даного захворювання?

*** А) Ітраконазол**

- В) Доксидикліну гідрохлорид
- С) Азитроміцин
- Д) Цефтріаксон
- Е) Амоксицилін

57. При підготовці до видалення зуба стоматолог порекомендував пацієнтові з метою профілактики кровотечі приймати препарат. Який засіб рекомендував лікар?

*** А) Вікасол**

- В) Гепарин
- С) Аспаркам
- Д) Магнію сульфат
- Е) Димедрол

58. Який з перерахованих препаратів застосовують у стоматології для збільшення тривалості дії місцевого анестетика?

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Промедол
- С) Атропіну сульфат
- Д) Лідокаїн
- Е) Азитроміцин

59. До стоматолога звернувся пацієнт з артритом щелепно-лицевого суглоба. Лікар-стоматолог призначив диклофенак-натрій. Який механізм дії цього препарату?

*** А) Пригнічення циклооксигенази**

- В) Пригнічення каталази
- С) Активація опіатних рецепторів
- Д) Блокада опіатних рецепторів
- Е) Активація фосфодіестерази

60. Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено бета-лактамний антибіотик. Який препарат належить до цієї групи?

*** А) Амоксицилін**

- В) Ципрофлоксацин
- С) Доксидиклін
- Д) Азитроміцин
- Е) Ітраконазол

61. Під час видалення зуба у хворого виникла кровотеча. Лікар-стоматолог наклав тампон із перекисом водню. При цьому не спостерігалось піноутворення. Відсутність якого ферменту обумовила порушення дії препарату?

*** А) Каталази**

- В) Глюкозо-6-фосфатази
- С) Бутирилхолінестерази
- Д) Гідроксилази
- Е) Піруватоксидази

62. У хворого 64 років після екстракції зуба виникла гостра серцева недостатність. Який препарат з кардіотонічною дією необхідно призначити хворому?

*** А) Корглікон**

- В) Дібазол
- С) Анаприлін
- Д) Нітрогліцерин
- Е) Верапаміл

63. До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на запалення і кровоточивість ясен. Який препарат рослинного походження доцільно застосувати?

*** А) Кору дуба**

- В) Лист красавки
- С) Лист наперстянки
- Д) Траву горицвіту весняного
- Е) Квітки липи

64. Дитині 6 років з метою девіталізації пульпи в канал зуба була закладена пара-формальдегідна паста. Який механізм її девіталізуючої дії:

*** А) коагуляція білків та муміфікація тканин**

- В) порушення тканевого дихання та окисного фосфорилування
- С) пряма літична дія на пульпу
- Д) склерозування пульпи
- Е) Гіперплазія пульпи

65. Чоловік 40 років звернувся до стоматолога зі скаргою на підвищену чутливість зубів при гігієнічній чистці вранці і при вживанні холодних напоїв. Препарат з вмістом якого хімічного елементу може застосувати лікар для зникнення гіперестезії емалі?

*** А) Препарати фтору**

- В) Препарати хлору
- С) Препарати натрію
- Д) Препарати магнію
- Е) Препарати йоду

66. Для усунення наслідків травми хворому заплановане хірургічне втручання. Виберіть з вказаних препаратів детергент для хірургічної антисептики рук хірурга

*** А) Хлоргексидин**

- В) Хлорамін
- С) Розчин йоду
- Д) Пероксид водню
- Е) Розчин фурациліну

67. В стоматологічному кабінеті необхідно терміново провести дезинфекцію обладнання. Виберіть з наявних засобів препарат з відсутністю неприємного запаху і фарбувальних властивостей

*** А) Хлоргексидин**

- В) Розчин карболової кислоти
- С) Хлорне вапно
- Д) Етакридину лактат
- Е) Формалін

68. Збудник туберкульозу може існувати як внутрішньоклітинно, так і позаклітинно, а також у казеозному некрозі. Виберіть препарат, який здатний згубно діяти на мікобактерії туберкульозу будь-якої локалізації

*** А) Ріфампіцин**

- В) Стрепатомицин
- С) Ізоніазид
- Д) Етамбутол
- Е) ПАСК

69. На прийом до лікаря звернувся хворий, у якого супутнім захворюванням є бронхіальна астма. Який препарат не буде протипоказаний цьому хворому?

*** А) Платифіліну гідротартрат**

- В) Анаприлін
- С) Ацеклідін
- Д) Прозерін
- Е) Піридостигміну бромід

70. В лікуванні рецидивуючого афтозного стоматиту місцево застосували антисептичний засіб, який має анестезуючу дію і є антидотом стафілококового токсину. Який це засіб?

*** А) Етоній**

- В) Димексид
- С) Хлоргексидину біглюконат
- Д) Метиленовий синій
- Е) Етакридину лактат

71. Який з пропонованих антибіотиків групи цефалоспоринів можна застосувати ентерально при генералізованому пародонтиті?

*** А) Цефалексин**

- В) Цефалоридин
- С) Цефотаксим
- Д) Цефазолін
- Е) Цефпіром

72. Для знеболення слизової оболонки порожнини рота аплікаційно застосували засіб з групи нестероїдних протизапальних з розрахунку епітелізації виразкових утворень. Визначити препарат.

*** А) Кислота мефенамова**

- В) Кислота ацетилсаліцилова
- С) Натрієва сіль фенілоцтової кислоти
- Д) Похідне пропіонової кислоти
- Е) Похідне індолоцтової кислоти

73. Через пригнічення гідроксилювання непрямих антикоагулянтів значно зростає їх вплив на зсідання крові, спостерігаються крововиливи. До якого типу відноситься ця дія.

*** А) Ідіосинкразія**

- В) Наслідки кумуляції
- С) Тахіфілаксія
- Д) Тератогенність
- Е) Спадкова толерантність

74. Високий окисно-відновлюючий потенціал дозволяє антисептику діяти бактерицидно, фунгіцидно, дубляче і антидотно. Який це засіб, вигідний в лікуванні афтозного стоматиту?

*** А) Метиленовий синій**

- В) Етакридину лактат
- С) Брильянтовий зелений
- Д) Гексаметилентетрамін
- Е) Хлоргексидину біглюканат

75. У дитини 2-х років спостерігається порушення енхондрального окостеніння, збільшення остеοїдної тканини, розм.'ячення перетвореної кістки. Який препарат вирішить ці проблеми?

*** А) Ергокальциферол**

- В) Ретаболіл
- С) Рибофлавін
- Д) Ціанокобаламін
- Е) Паратіреοїдин

76. Який засіб у складі твердіючих пов'язок може бути застосований в лікуванні генералізованого пародонтиту з метою видалення нежиттєздатних тканин з раньової поверхні?

*** А) Трипсин**

- В) Альтеплаза
- С) Трентал
- Д) Аєвіт
- Е) Аскорутин

77. При огляді у дитини визначається явища кон'юнктивіту, порушення зору в сутінках, паління шкіри та слизових оболонок, хейліт, ангулярний стоматит [тріщини в куточках рота]. Яким засобом можна лікувати цей стан?

*** А) Рибофлавін**

В) Аскорутин

С) Ретинолу ацетат

Д) Токоферолу ацетат

Е) Рибоксин

78. Під час судомного нападу лікар скористався препаратом з групи неорганічних солей. Амплітуда судом зменшилась, але виникло пригнічення дихання. Яким засобом допомоги і стимуляції дихання необхідно скористатись?

*** А) Кальцію хлорид**

В) Лобеліну гідрохлорид

С) Натрію хлорид

Д) Калію хлорид

Е) Кальцію гліцерофосфат

79. Для протезування пацієнта з епілепсією в анамнезі, необхідно підготувати його засобом:

*** А) Хлозепід**

В) Хлорпротіксен

С) Хлоралгідрат

Д) Фенобарбітал

Е) Фентаніл

80. Яким наркозним засобом краще скористатись для операції у пацієнта з травмою нижньої щелепи, якщо спостерігається виражена гіпоксія головного мозку?

*** А) Натрію оксибутират**

В) Діазоту оксид

С) Тіопентал-натрій

Д) Кета міну гідрохлорид

Е) Ефір для наркозу