

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нормальна анатомія - база тестів 2005 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2005 року**

Кількість запитань: **176**

1. Після обстеження у хворого виявлені симптоми акромегалії. Яка ендокринна залоза втягнута в патологічний процес?

*** A) Аденогіпофіз.**

B) Нейрогіпофіз.

C) Епіфіз.

D) Наднирники.

E) Щитоподібна залоза.

2. У потерпілого при травмі потиличної кістки ушкоджено сигмоподібний синус. Яка частина кістки ушкоджена?

*** A) Pars lateralis**

B) Clivus

C) Pars basilaris

D) Squama

E) –

3. У пацієнта виявлено болючість при пальпації у точках Вале. При запаленні гілок якого нерва спостерігаються такі симптоми?

*** A) Трійчастого**

B) Лицевого

C) Блукаючого

D) Окорухового

E) Відвідного

4. У пацієнта виявлено порушення голосоутворення, ковтання, поперхування їжею (їжа при ковтанні потрапляє у носову порожнину). При ураженні якого ядра найімовірніше зустрічаються такі симптоми?

*** А) Двоякого ядра**

- В) Нижнього слиновидільного ядра
- С) Ядра одинокого шляху
- Д) Заднього ядра блукаючого нерва
- Е) Верхнього слиновидільного ядра

5. Лікар-стоматолог, знечуючи нижньощелепний нерв в ділянці овального отвору, випадково ушкодив артерію, яка проходить через остистий отвір. Яку артерію було ушкоджено?

*** А) A.meningea media**

- В) A.sphenopalatina
- С) A.alveolaris inferior
- Д) A.maxillaris
- Е) A.temporalis profunda

6. До стоматолога звернувся хворий з запаленням комірки другого верхнього кутнього зуба. Яка частина зуба буде уражена в першу чергу?

*** А) Корінь**

- В) Шийка
- С) Коронка
- Д) Порожнина зуба
- Е) Канал кореня зуба

7. У стоматологічну поклініку звернувся хворий з запаленням коміркового відростка верхньої щелепи (остеомієліт). Яка тканина зуба може постраждати при цьому захворюванні в першу чергу?

*** А) Періодонт**

- В) Пульпа
- С) Дентин
- Д) Емаль
- Е) Цемент

8. У хворого після екстракції 7 верхнього зуба у лунці з'явилися бульбашки повітря. Стінка якої приносової пазухи пошкоджена?

*** А) Гайморової**

- В) Клиноподібної
- С) Лобової
- Д) Середні комірки решітчастої пазухи
- Е) Задні комірки решітчастої пазухи

9. Під час операції резекції язика при макроглосії хірург-стоматолог з гемостатичною метою накладає хажими на основу язика. Яка артерія при цьому перетискається?

*** А) Глибока артерія язика**

- В) Язикова артерія
- С) Під(язикова артерія
- Д) Висхідна піднебінна артерія
- Е) Низхідна піднебінна артерія

10. Під час операції видалення гемангіоми верхньої губи, або в ділянці кута рота, яку артерію потрібно перетискати помічнику хірургі?

*** А) Губну**

- В) Лицеву
- С) Висхідну піднебінну
- Д) Низхідну піднебінну
- Е) Щічну

11. Внаслідок травми у хворого пошкоджено окоруховий нерв. Які з перелічених симптомів не будуть спостерігатись у цьому випадку?

*** А) Випадіння правої половини зору**

- В) Розширення зіниці
- С) Птоз (опущення повіки)
- Д) Відсутність рухів пошкодженого очного яблука ввверх і досередини
- Е) Порушення акомодції

12. При огляді 6-місячної дитини лікар виявив не закриті задні тім'ячка. В якому віці задні тім'ячка закриваються при нормальному розвитку дитини?

*** А) До 2-місячного віку**

- В) До народження
- С) До 6-місячного віку
- Д) До кінця першого року життя
- Е) До кінця другого року життя

13. Після операції на щитоподібній залозі у хворого спостерігається порушення голосоутворення (голос тихий, осиплий). Який нерв ушкоджено?

*** А) Поворотний гортанний нерв**

- В) Верхній гортанний нерв
- С) Бронхіальні гілки
- Д) Трахеальні гілки
- Е) Горлові гілки

14. У хворого відсутня чутливість передніх 2/3 язика. Який нерв уражено?

*** А) Язиковий нерв**

- В) Барабанна струна
- С) Верхній гортанний нерв
- Д) Піднебінні нерви
- Е) Язико-горловий нерв

15. Неефективність ортодонтичного лікування дитини зумовлена стійким ротовим диханням. Носове дихання утруднене за рахунок гіпертрофії мигдаликів:

*** А) Трубних**

- В) Глоткового
- С) Язикового
- Д) Піднебінних
- Е) Піднебінних і трубних

16. Пацієнту, що звернувся до стоматолога, необхідно видалити нижнє праве ікло. Який нерв забезпечує іннервацію цього зуба?

*** А) Нижній комірковий нерв**

- В) Підборідний нерв
- С) Язиковий нерв
- Д) Піднебінні нерви
- Е) Щічний нерв

17. У хворого діагностовано звих акроміального кінця ключиці. При цьому виявлено розрив зв'язок акроміально-ключичного суглобу. Які зв'язки пошкоджені?

*** А) Ligg.coracoclaviculare et acromioclaviculare**

- В) Ligg.collaterale ulnare et radiale
- С) Ligg.sacrotuberale et sacrospinale
- Д) Ligg.cruciatum anterius et posterius
- Е) Ligg.collaterale tibiale et ibulare

18. У пацієнта обмеження рухів, що виникли при падінні на рівні ноги. У пацієнта відчуття нестабільності в суглобі, невпевненість при ході та защемлення. Які структури колінного суглоба уражені?

*** А) Присередній меніск**

- В) Латеральний меніск
- С) Передня схрещена зв'язка
- Д) Задня схрещена зв'язка
- Е) Зв'язка головки стегна

19. У пацієнта виявлено компресійний перелом на рівні четвертого грудного хребця. На рівні якого сегмента спинного мозку буде ураження?

*** A) ThV**

B) ThII

C) ThVII

D) LI

E) CVIII

20. Жінка похилого віку, госпіталізована з скаргами на різкий біль, набряк в ділянці правого кульшового суглобу, що з'явилася після падіння. При огляді: стегно приведенне всередину, рухи в кульшовому суглобі порушені. Перелом, якої кістки або її частини визначив лікар?

*** A) шийка стегнової кістки**

B) тіло стегнової кістки

C) виростки стегнової кістки

D) лобкова кістка

E) сіднича кістка

21. Хворому, з діагностичною метою, призначена задня риноскопія (задній огляд порожнини носа), на якій виявлено викривлення задньої частини носової перегородки. Яка кістка викривлена?

*** A) леміш**

B) медіальна пластинка крилоподібного відростка

C) латеральна пластинка крилоподібного відростка

D) перпендикулярна пластинка решітчастої кістки

E) вертикальна пластинка піднебінної кістки

22. Під час операції на кульшовому суглобі дитини 5 років, була пошкоджена зв'язка, внаслідок чого почалося кровотеча. Яка зв'язка була пошкоджена?

*** А) головки стегна**

- В) поперечна вертлужной западини
- С) Повздошньостегнова
- Д) Лобково стегнова
- Е) Сідничо стегнова

23. Хворий 50 років, госпіталізований з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м'яз травмовано?

*** А) щелепно-під'язикова**

- В) щито-під'язикова
- С) шило-под'язиковий
- Д) лопатково-під'язикова
- Е) грудинно-під'язикова

24. Хвора 40 років, звернулася зі скаргами на неможливість зводити і розводити пальці кисті. В анамнезі: травма м'яких тканин і м'язів медіальної частини передпліччя з пошкодження ліктьового нерва в нижній третині. Які м'язи втратили свою функцію?

*** А) міжкісткові**

- В) червоподібні
- С) поверхневий згинач пальців
- Д) глибокий згинач пальців
- Е) розгинач пальців

25. Мати немовляти скаржиться на постійну зригування неперетравленого молока її дитиною. Про який дефект розвитку свідчить цей факт?

*** А) атрезія стравоходу**

- В) заяча губа
- С) вовча паща
- Д) атрезія анального отвору
- Е) нориця стравоходу

26. Хворому 18 років, звернувся в поліклініку з травмою, у ділянці присінку носа. При огляді: механічне пошкодження слизової оболонки присінку, яке не переходить на власне порожнину носа. Що є межею між присінком та власне порожниною носа?

*** А) поріг носа**

- В) валик носа
- С) перегородка носа
- Д) хоани
- Е) ніздрі

27. Хворій 32 років, виставлено діагноз бартолініт (запалення великих залоз присінку). В якому органі сечостатевої системи розташовані ці залози?

*** А) великі статеві губи**

- В) малі статеві губи
- С) клітор
- Д) піхва
- Е) матка

28. Хворий 65 років, госпіталізований з приводу крововиливу в головний мозок. Після огляду виявлено, що місце крововиливу локалізоване на латеральній поверхні півкуль. Яка судина, що живить цю ділянку мозку, пошкоджена?

*** А) середня мозкова артерія**

- В) передня мозкова артерія
- С) задня мозкова артерія
- Д) передня сполучна гілка
- Е) задня сполучна гілка

29. У дитини 2 років, після перенесеного захворювання, спостерігається постійна сльозотеча. При огляді: закупорка протоки, що виводить сльозу з очної ямки. Яка це протока?

*** А) носослізна протока**

- В) верхній сльозовий канадець
- С) нижній сльозовий канадець
- Д) сльозовий струмок
- Е) сльозове озеро

30. Хворий 30 років, звернувся в поліклініку зі скаргами на гіперсекрецію сірчистих залоз і велике виділення сірки з вух. В якій частині органу слуху розташовані дані залози?

*** А) зовнішній слуховий прохід**

- В) внутрішній слуховий прохід
- С) вушна раковина
- Д) слухова труба
- Е) барабанна порожнина

31. Хворому проведена анестезія у ділянці горба верхньої щелепи. При цьому в нього почало спостерігатися зменшення виділення слюзи і сухість кон'юнктиви. В який вегетативний вузол голови, також потрапив анестетик?

*** А) крило-піднебінний**

- В) вушний
- С) війчастий
- Д) під нижньощелепний
- Е) під'язиковий

32. Після проведеної операції на шиї, хворій втратив чутливість на її передній поверхні. Яка гілка шийного сплетіння була пошкоджена під час операції?

*** А) поперечний шийний нерв**

- В) великий вушний нерв
- С) малий потиличний нерв
- Д) надключичний нерв
- Е) шийна петля

33. Хвора 45 років, звернулася з скаргами на збільшення підшкірних вен, розташованих на передній поверхні гомілки. Після огляду, знайдено варикозне розширення вен і порушення відтоку крові з даної ділянки. Яка вена збирає кров з цієї ділянки?

*** А) велика підшкірна**

- В) мала підшкірна
- С) латеральна підшкірна
- Д) медіальна підшкірна
- Е) серединна

34. Під час ультразвукового дослідження дитини 1,5 років, знайдено незарощення овального вікна, що підтверджено клінічно. У якому відділі серця розташований даний дефект?

- * А) міжпередсердна перегородка**
- В) міжшлуночкова перегородка
- С) права передсердно-шлуночкова перегородка
- Д) ліва передсердно-шлуночкова перегородка
- Е) верхівка серця

35. У хворого з травмою верхньої кінцівки в ділянці ліктьового суглобу виявлено перелом медіального над виростка плечової кістки. Порушення інервації якого з м'язів передпліччя може викликати ця травма?

- * А) m. flexor carpi ulnaris**
- В) m. flexor carpi radialis
- С) m. extensor carpi ulnaris
- Д) m. extensor carpi radialis longus
- Е) m. palmaris longus

36. У потерпілого, з травмою голови у скроневій ділянці справа, діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій ймовірноше всього пошкоджена?

- * А) Середня оболонна артерія**
- В) Середня мозкова артерія
- С) Поверхнева скронева артерія
- Д) Передня оболонна артерія
- Е) Задня вушна артерія

37. До лікаря звернувся потерпілий із скаргами на значне обмеження рухів при розгинанні кисті та пальців првої руки після травми середньої третини плеча.

Який нерв ймовірноше всього пошкоджено?

*** A) n. Radialis**

B) n. Ulnari

C) n. Medianus

D) n. Muscuocutaneus

E) n. Axillaris

38. Яка з артерій плеча, має основне значення при забезпеченні коллатерального кровообігу верхньої кінцівки після перевязки плечової артерії?

*** A) Глибока артерія плеча.**

B) Променева побічна артерія.

C) Середня побічна артерія.

D) Дельтоподібні гілки.

E) Живильні ртерії плеча.

39. У хворого підчас аускультатії вислуховується шум в ділянці проекції верхівки серця. Ваду якого з клапанів серця можна запідозрити?

*** A) Мітрального.**

B) Тристулкового.

C) Клапана легеневого стовбура.

D) Клапана аорти.

E) Клапана нижньої порожнистої вени.

40. У приймальне відділення лікарні доставлений хворий з кровотечею внаслідок різаної рани в ділянці медіальної кісточки. Яка з артерій наймовірніше ушкоджена?

*** А) Задня великогомілкова.**

В) Передня великогомілкова.

С) Малогомілкова.

Д) Передня поворотна великогомілкова.

Е) Задня поворотна великогомілкова

41. Під час обстеження, ендокринологом виявлено у хворого симптоми базедової хвороби (екзофтальм, зоб, тахікардія). Яка залоза уражена патологічним процесом?

*** А) Щитоподібна.**

В) Аденогіпофіз.

С) Нейрогіпофіз.

Д) Наднирники.

Е) Епіфіз.

42. У хворого знайдені симптоми порушення росту (гігантизм). Патологічний процес якої залози внутрішньої секреції може привести до даної патології?

*** А) Аденогіпофіз.**

В) Нейрогіпофіз.

С) Епіфіз.

Д) Наднирники.

Е) Щитоподібна залоза.

43. При виконанні оперативного втручання на діафрагмі ротової порожнини, хірургу необхідно виділити ділянку, що має назву трикутника Пірогова. Яка структура утворює його верхню межу?

*** A) N. hypoglossus**

B) M. stylohyoideus

C) M. geniohyoideus

D) M. digastricus

E) M. mylohyoideus

44. При втручанні з метою лікування вивіху нижньої щелепи, лікар повинен пам'ятати про м'яз, який відтягує при скороченні капсулу і суглобовий диск скронево-нижнещелепного суглобу. Який це м'яз?

*** A) M. pterygoideus lateralis**

B) M. masseter

C) M. pterygoideus medialis

D) M. temporalis

E) M. mylohyoideus

45. У хворого з клінікою порушення функції спинного мозку на рівні поперекових сегментів необхідне оперативне втручання. Де згідно правила "скелетотопії сегментів" розташовані вони?

*** A) На рівні X-XI грудних хребців**

B) На рівні VII-X грудних хребців

C) На рівні XI-XII грудних хребців

D) На рівні XII грудного - I поперекового хребця

E) На рівні I-II поперекових хребців

46. У хворого 49 років спостерігається ушкодження білої речовини спинного мозку в межах заднього канатику, а також клініку порушення одного з провідних шляхів спинного мозку. З яких частин складається задній канатик спинного мозку?

*** A) asc. gracilis et asc. cuneatus**

- B) asc. gracilis
- C) asc. cuneatus
- D) asc. Говерса
- E) asc. Флексига

47. У хворого на інсульт спостерігається порушення структури та функції заднього відділу задньої ніжки внутрішньої капсули. Які з провідних шляхів у нормі там проходять?

*** A) Radiatio acustica et radiatio optica**

- B) ibrae corticonuclearis
- C) ibrae corticospinalis
- D) ibrae parietopontinae
- E) ibrae occipitopontinae

48. При проведенні томографії у пацієнта 48 років було виявлено пухлину, що локалізується в медіальному відділі основи ніжки мозку. Волокна якого провідного шляху в нормі локалізовані в цієї ділянці?

*** A) Tr. rontopontinus**

- B) Tr. pyramidalis
- C) Tr. occipitotemporoparietopontinus
- D) Tr. rubrospinalis
- E) Tr. tectospinalis

49. При обстеженні хворого 54 років було встановлено пухлину внутрішньої будови мосту на рівні формування corpus trapezoideum. Якому з провідних шляхів мозку вони належать?

*** A) Tr. acusticus**

- B) Tr. spinothalamicus lateralis
- C) Tr. spinocerebellaris anterior
- D) Tr. spinocerebellaris posterior
- E) Tr. spinothalamicus anterior

50. У хворой жінки 60 років було встановлено наявність пухлини покриву середнього мозку в межі розташування lemniscus medialis. Якому з провідних шляхів належить ця структура?

*** A) Tr. bulbothalamicus**

- B) Tr. pyramidalis
- C) Tr. rontopontinus
- D) Tr. rubrospinalis
- E) Tr. reticulospinalis

51. До лікарні поступив хворий з підозрою на крововилив у ділянку мозку. При томографічному обстеженні було встановлено ушкодження lemniscus lateralis мозкового стовбура. Якому з провідних шляхів належить ця структура?

*** A) Tr. acusticus**

- B) Tr. pyramidalis
- C) Tr. rontopontinus
- D) Tr. tectospinalis
- E) Tr. reticulospinalis

52. У хворого 49 років при томографічному обстеженні було виявлено пухлину в покришкової частині мосту з ушкодженням *ibrae pontis transversae*. Якому з провідних шляхів мозку вони належать?

*** A) Tr. corticopontocerebellaris**

- B) Tr. rubrospinalis
- C) Tr. pyramidalis
- D) Tr. tectospinalis
- E) Tr. reticulospinalis

53. У хворого 27 років при обстеженні було виявлено зміну секреторної функції привушної слинної залози, що пов'язане з порушеннями її вегетативної симпатичної іннервації. За допомогою якої судини симпатичні нервові волокна потрапляють до залози?

*** A) temporalis superficialis**

- B) buccalis
- C) lingualis
- D) acialis
- E) zygomaticotemporalis

54. У хворого 35 років при обстеженні слюзового апарату було встановлено зміни секреторної функції слюзової залози, що пов'язане з порушенням її вегетативної іннервації. З яких вегетативних гангліїв здійснюється її симпатична та парасимпатична іннервація?

*** A) G. cervicale superius et g. pterygopalatinum**

- B) G. cervicale superius et g. oticum
- C) G. cervicale superius et g. submandibulare
- D) G. cervicale superius et g. ciliare
- E) G. cervicale medius et g. pterygopalatinum

55. У хворого виявлене стоматологічне ускладнення - зміна секреторної функції піднижньощелепної та під'язичної слинних залоз, що пов'язане з порушенням їх вегетативної симпатичної іннервації. За допомогою якої судини вони отримують симпатичні постгангліонарні волокна (plexus periarterialis)?

*** A) lingualis**

B) temporalis

C) alveolaris in erior

D) acialis

E) In raorbitalis

56. У хворого з остеомієлітом нижньої щелепи виявлено ознаки пошкодження plexus dentalis in erior та порушення іннервації зубів та ясен нижньої щелепини. Гілками якого нерва воно утворюється в нормі?

*** A) N. alveolaris in erior**

B) N. maxillaris

C) N. lingualis

D) N. buccalis

E) N. acialis

57. У хворого 25 років при обстеженні виявлено зміну секреторної функції залоз носової порожнини, що пов'язано з патологією крило-піднебінного вузла. Який нерв несе до нього вегетативні симпатичні волокна?

*** A) N. petrosus pro dus**

B) N. petrosus major

C) N. petrosus minor

D) N. maxillaris

E) Chorda tympani

58. У хворого 65 років при обстеженні виявлено зміну секреторної функції привушної залози, що пов'язано з патологією нерва, що несе від вушного вузла до залози післявузлові парасимпатичні волокна. Який це нерв ?

*** A) N. Auriculotemporalis**

- B) N. petrosus major
- C) N. mandibularis
- D) N. parotideus major
- E) N. lingualis

59. До лікаря звернувся чоловік 65 років зі скаргами на зміну голосу. При обстеженні було виявлено порушення іннервації м'язів, що впливають на поширення та звуження голосової щілини. Яким нервом вони іннервуються?

*** A) N. laryngeus inferior**

- B) N. laryngeus superior
- C) N. laryngeus internus
- D) N. accessorius
- E) N. glossopharyngeus

60. Після ДТП травмований не може кивати головою (згинання та розгинання голови вперед та назад). Функція якого суглоба порушена?

*** A) Атлanto-потиличного**

- B) Атлanto-аксиального бічного
- C) Атлanto-аксиального середнього
- D) Дуговідросткових
- E) -

61. На прийом до лікаря звернувся музичний працівник зі скаргами на погіршення вокальних можливостей. При обстеженні виявлено патологію іннервації m. Cricothyroideus, що напружує голосові зв'язки. Який з нервів здійснює її іннервацію?

*** A) N. Laryngeus superior**

B) N. laryngeus inferior

C) N. laryngeus internus

D) N. accessorius

E) N. glossopharyngeus

62. В онкологічне відділення поступив хворий з підозрою на пухлину легень. При обстеженні виявили локалізацію патології в нижньої частці правої легені. Лікар повинен знати, яку кількість бронхолегеневих сегментів має ця частка?

*** A) 5**

B) 6

C) 4

D) 3

E) 2

63. При виконанні артеріографії нирки, контрастна речовина потрапляє до передньої та задньої гілок ниркової артерії, а потім до сегментарних артерій. Яка кількість сегментів нирки кровопостачається за допомогою задньої гілки ниркової артерії?

*** A) 1 сегмент**

B) 3 сегмента

C) 2 сегмента

D) 4 сегмента

E) 5 сегментів

64. Чоловіка 35 років доставлено в лікарню з травмою черепа в ділянці черепного склепіння зліва і пошкодженням головного мозку. При обстеженні хворого констатовано відсутність у нього вольових рухів м'язів голови і шиї справа. Пошкодження якої ділянки головного мозку могло бути причиною цього?

*** А) Нижнього відділу передцентральної звивини зліва.**

- В) Нижнього відділу постцентральної звивини зліва.
- С) Верхнього відділу передцентральної звивини зліва.
- Д) Верхнього відділу постцентральної звивини зліва.
- Е) Нижнього відділу передцентральної звивини справа.

65. До неврологічного відділення доставлено чоловіка 65 років з діагнозом “інсульт” (крововплив в ділянку головного мозку). При огляді хворого встановлено параліч мимічних та жувальних м'язів зліва. Обстеження за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули справа. Який провідний шлях ушкоджено у хворого?

*** А) Tr. cortico-nuclearis.**

- В) Tr. cortico-spinalis.
- С) Tr. cortico-thalamicus.
- Д) Tr. cortico- ronto-pontinus.
- Е) Tr. cortico-temporo-parieto-occipito-pontinus.

66. У хворого чоловіка 60 років виявлено пухлину головного мозку в ділянці задньої ніжки внутрішньої капсули (в самому задньому відділі). Які функціональні порушення повинні бути у такого хворого?

*** А) Порушення зору та слуху.**

- В) Порушення вольових рухів м'язів голови та шиї.
- С) Порушення вольових рухів м'язів тулуба і кінцівок.
- Д) Порушення пропріоцептивної та екстероцептивної чутливості з протилежного боку.
- Е) Порушення нюху.

67. Жінка 58 років звернулася до лікаря зі скаргами на порушення смакової чутливості язика. При обстеженні за допомогою ЯМР у неї виявлено невеликий крововплив в ділянці довгастого мозку. Пошкодження якого ядра довгастого мозку могло спричинити порушення смаку у хворой?

*** А) Ядра одинокого шляху.**

- В) Подвійного ядра.
- С) Ядра під'язикового нерва.
- Д) Нижнього слиновидільного ядра.
- Е) Дорсального ядра блукаючого нерва.

68. Жінка 60 років звернулася до лікаря зі скаргами на затруднення рухів язика, що заважає їй нормально розмовляти та їсти. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що у хворой є невеликий крововплив в нижньому відділі довгастого мозку. Про пошкодження якого ядра довгастого мозку у хворой можна думати?

*** А) Ядра під'язикового нерва.**

- В) Нижнього слиновидільного ядра.
- С) Ядра додаткового нерва.
- Д) Подвійного ядра.
- Е) Ядра одинокого шляху.

69. Високий зріст юнака може бути зумовлений збільшенням продукції:

*** А) Соматотропного гормону гіпофіза**

- В) Тестостерону кори наднирників
- С) Тестостерону паренхіми яєчок
- Д) Паратгормону
- Е) Дезоксикортикостерону ацетату

70. Чоловік звернувся до стоматолога зі скаргами на болі при жуванні і відведенні щелепи вперед. Які жувальні м'язи піддалися запаленню?

*** А) M.m. pterigoidei laterales**

В) M.m. pterigoidei mediales

С) M.m. temporales

Д) M.m. masseteres

Е) –

71. Гіперфункція якої ендокринної залози клінічно проявляється зменшенням маси тіла, збільшенням частоти серцевих скорочень, збільшенням теплопродукції та тепловіддачі, психоемоційним збудженням та безсонням.

*** А) Щитоподібної залози**

В) Наднирникових залоз

С) Яєчників

Д) Гіпофізу

Е) Пара гангліїв

72. Оперативне втручання з приводу видалення щитоподібної залози у відновний період може ускладнитися зменшення частоти серцевих скорочень, порушенням потовідділення, ламкістю волосся та сухістю шкіри, сонливістю, депресією. Чим це може бути обумовлене?

*** А) Тиреоїдною недостатністю**

В) Паратиреоїдною недостатністю

С) Гіпофізарною недостатністю

Д) Глюкагонової недостатністю

Е) Розладами імунітету

73. При огляді у пацієнта виявлено розташування верхніх різців у два ряди. Яка природжена аномалія має місце?

*** А) Краудинг**

- В) Діастема
- С) Оклюзія
- Д) Адентія
- Е) Роумінг

74. У пацієнта при ковтанні часточки їжі потрапляють у носову порожнину. Ураження якого м'яза м'якого піднебіння можна припустити?

*** А) М'яз -підіймач піднебінної завіски**

- В) М'яз-натягач піднебінної завіски
- С) М'яз-язичка
- Д) Піднебінно-язиковий м'яз
- Е) Піднебінно-глотковий м'яз

75. Пацієнт 46 років скаржиться на біль у правій підребровій ділянці. При обстеженні виявлено, що верхня межа печінки розташована на рівні 4 ребра по правій середньоключичній лінії. Де в корні розташована найвища точка верхньої межі печінки?

*** А) V ребро**

- В) IV ребро
- С) V міжребір'я
- Д) VI ребро
- Е) VI міжребір'я

76. Хвора 43 років скаржиться на біль у правій підребровій ділянці, пов'язаний з прийманням їжі. При пальпації виявлена локальна зона гіперстезії біля перетину зовнішнього краю правого прямого м'яза живота з ребровою дугою. Захворювання якого органу можна припустити?

*** А) Жовчний міхур**

- В) Підшлункова залоза
- С) Шлунок
- Д) Права нирка
- Е) Селезінка

77. В пологовому будинку неонатолог на протязі першої доби життя немовля не спостерігає відходження меконію. Наявність якої вади розвитку можна припустити?

*** А) Атрезія ануса**

- В) Атрезія стравоходу
- С) Меккелев дивертикул
- Д) Макростома
- Е) Мікростома

78. У дитини 7 років відсутнє носове дихання. При обстеженні виявлено “готичне” піднебіння, синці під очима. Дитина дихає лише через рот. Збільшення якого мигдалику приводить до такого стану?

*** А) Глотковий мигдалик**

- В) Піднебінний мигдалик
- С) Язиковий мигдалик
- Д) Трубний мигдалик
- Е) Peyєрові бляшки

79. Під час операції при ревізії органів черевної порожнини лікар оглядає кишку, що має м'язові стрічки, випини, чепцеві відростки. Який з перерахованих відділів кишечника оглядає лікар?

*** A) Colon transversum**

B) Duodenum

C) Jejunum

D) Ileum

E) Appendix vermi ormis

80. Невропатолог при огляді хворої встановив відсутність шкіряної чутливості на передній і бічній поверхні шиї. Функція якого нерва порушена?

*** A) N. transversus colli**

B) N. occipitalis minor

C) N. auricularis magnus

D) Nn. supraclaviculares

E) N. occipitalis major

81. Стоматолог при огляді порожнина рота хворого виявив запалення тканини, які оточують зуб. Які тканини запалено.

*** A) Paradont**

B) Gingiva

C) Pulpa dentis

D) Dentinum

E) Cementum

82. Стоматолог при видаленні зуба руйнує зв'язки між цементом кореня та зубною альвеолою. Назвіть цю структуру.

*** A) Periodontium**

B) Gingiva

C) Pulpa dentis

D) Dentinum

E) Cementum

83. Стоматолог при огляді видаленого зуба, який має масивну коронку в формі ромба, чотири горбика та три кореня (2 щічних та 1 язиковий). Визначте, який цей зуб.

*** A) Верхній 1-й великий кутній зуб**

B) Нижній 1-й великий кутній зуб

C) Верхній 2-й великий кутній зуб

D) Нижній 2-й великий кутній зуб

E) Верхній 3-й великий кутній зуб

84. Коронка видаленого зуба має овальну форму, 2 горбика на жувальній поверхні, верхівка кореня подвоєна. Визначте який зуб видалено.

*** A) Верхній 1-й малий кутній зуб**

B) Верхній 2-й малий кутній зуб

C) Нижній 1-й малий кутній зуб

D) Нижній 2-й малий кутній зуб

E) Верхнє ікло

85. У ЛОР- відділення потрапив хворий з запаленням слизової оболонки порожнини носа і порушенням нюху. Яка зона слизової оболонки вражена?

A) Загальний носовий хід

*** B) Верхній носовий хід**

C) Середній носовий хід

D) Нижній носовий хід

E) Перегородка носа

86. У постраждалого травма черепа з порушенням дірчастої пластинки решітчастої кістки. Який нерв може бути ушкоджений?

*** A) N. OI actorius**

B) N. opticus

C) N. ophthalmicus

D) N. trochliaris

E) N. abducens

87. У хворого 12-річного хлопчика виникають тетанічні судороги. Функція яких залоз може бути порушена в цьому випадку?

*** A) Glandulae parathyroidae**

B) Hypophysis

C) Glandula thyroidea

D) Thymus

E) Glandula pinealis

88. У хворої встановлено порушення відділення тіреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої долі гіпофіза лікар має діло?

*** A) Globus anterior**

- B) In undibulum
- C) Lobus posterior
- D) Pars intermedia
- E) -

89. При огляді порожнини рота дитини 7 років стоматолог знайшов, що за другим молочним великим кутнім зубом виріс зуб. Визначите цей зуб?

*** A) Перший постійний великий кутній зуб**

- B) Другий постійний великий кутній зуб
- C) Третій постійний великий кутній зуб
- D) Перший постійний малий кутній зуб
- E) Другий постійний малий кутній зуб

90. Дитині 10 років видалили перший молочний великий кутній зуб. Який постійний зуб виросте на його місці?

*** A) Перший малий кутній зуб**

- B) Другий малий кутній зуб
- C) Перший великий кутній зуб
- D) Другий великий кутній зуб
- E) Третій великий кутній зуб

91. Дитині 13 років видалили другий молочний великий кутній зуб. Який постійний зуб виросте на його місці?

*** А) Другий малий кутній зуб**

- В) Перший малий кутній зуб
- С) Перший великий кутній зуб
- Д) Другий великий кутній зуб
- Е) Третій великий кутній зуб

92. При огляді порожнини рота дитини педіатр знайшла 8 різців. Розвиток дитини відповідає віковій нормі. Визначте вік дитини.

*** А) 10-12 місяців**

- В) 6-7 місяців
- С) 7-8 місяців
- Д) 12-15 місяців
- Е) 16-20 місяців

93. При ФГДС лікар, оглядаючи слизову оболонку шлунка, знайшов поздовжні складки (“шлункову доріжку”). Яку ділянку шлунка оглядав лікар?

*** А) Curvatura ventriculi minor**

- В) Pars cardiaca
- С) Pars pylorica
- Д) Curvatura ventriculi major
- Е) ornix

94. Лікар стоматолог знайшов неглибоку порожнину з ураженням емалі між двома верхніми центральними різцями. Діагноз: карієс. На який поверхні коронки лікар пломбує зуб?

*** A) acies contactus mesialis**

B) acies lingualis

C) acies occlusialis

D) ies labialis

E) acies contactus distalis

95. У потерпілого артеріальна кровотеча з різаної рани в ділянці переднього краю жувального м'яза. Яку судину потрібно перев'язати?

*** A) acialis**

B) maxillaris

C) labiales in eriores

D) mentalis

E) lingualis

96. Мімічні м'язи сприяють зміні виразу обличчя. Ушкодження якого нерва може створити явище відсутності міміки?

*** A) Лицевого нерва**

B) Трійчастого нерва

C) Щічного нерва

D) Верхньощелепного нерва

E) Сконево-вушного нерва

97. Для знечулення різців верхньої щелепи анестетик вводять в ділянку різцевого отвору. Який нерв залягає в цьому місці?

*** A) n. nasopalatinus**

B) n. pharyngeus

C) n. palatinus major

D) rr. nasales posteriores inferiores

E) nn. palatini minores

98. При туберальній анестезії голку просують до задньозовнішньої поверхні горбика верхньої щелепи і вводять анестетик. Які нерви при цьому знечуюються?

*** A) r.r. alveolaris superiores posteriores**

B) r.r. alveolaris superiores anteriores

C) r. alveolaris superior medius

D) n. maxillaris

E) n. in raorbitalis

99. При туберальній анестезії з відсутністю великих корінних зубів орієнтуються по виличнокомірковому гребеню. Якому зубу відповідає цей гребінь?

*** A) Першому моляру**

B) Другому моляру

C) Третьому моляру

D) Першому премоляру

E) Другому премоляру

100. Внаслідок щелепно-лицевої травми в ділянці підскроневої поверхні великого крила клиновидної кістки були травмовані нерви, що проходять в надкриловидному просторі. Функція яких нервів буде порушена?

*** А) Глибокі скроневі нерви**

- В) Задні носові нерви
- С) Піднебінний нисхідний нерв
- Д) Підочноямковий нерв
- Е) Щічний нерв

101. Внаслідок травми виник запальний процес м'яких тканин між медіальним і латеральним криловидними м'язами. В який простір переміститься гній флегмони міжкриловидного простору при ускладненні?

*** А) В криловидно-щелепний простір**

- В) В скронево-криловидний простір
- С) В жувально-нижньощелепний простір
- Д) В навколоушний простір
- Е) В підапоневротичний простір

102. При внутрішньоротовому оперативному доступі до ураженого крилоподібно-щелепного простору роблять розріз слизової оболонки вздовж крилощелепної складки з наступним розшаруванням м'яких тканин. Яка артерія може бути пошкоджена і викликати кровотечу при цій маніпуляції?

*** А) Нижня альвеолярна артерія**

- В) Жувальна артерія
- С) Верхня задня альвеолярна артерія
- Д) Скронева глибока артерія
- Е) Криловидна артерія

103. Одним із методів зняття гострого болю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в кінці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулення першої гілки трійчастого нерва?

*** А) Внутрішній край надбрівної дуги**

- В) Зовнішній край надбрівної дуги
- С) Орбітальний край виличної кістки
- Д) Ділянка лобного відростка верхньої щелепи
- Е) Ділянка перенісся

104. Запальний процес шкіри голови викликав занесення збудників інфекції в кавернозний синус оболонки мозку. Які вени сприяли цьому ускладненню?

*** А) Лицеві вени**

- В) Задні вушні вени
- С) Потиличні вени
- Д) Глотково-гортанні вени
- Е) Верхньощелепні вени

105. Хвора скаржиться на біль у лівій половині нижньої щелепи та нижніх зубів, які ірадіюють у ліво-скронеvu ділянку та зовнішній слуховий прохід. Крім того у неї болісне натискування у точці проекції лівого підборідного отвору. Ураження яких нервів є причиною цих симптомів?

А) Лицевого нерва

*** В) Чутливих волокон третьої гілки V пари черепних нервів**

- С) Рухових волокон 3-ої гілки V пари черепних нервів
- Д) Першої гілки V пари черепних нервів
- Е) Другої гілки V пари черепних нервів

106. Пацієнт скаржиться на напади короткочасного болю ліворуч у верхній щелепі та зубах, які віддають у підочномкову ділянку. Об'єктивно: відмічається біль при натискуванні в області лівого підочномкового отвору. Який нерв уражено?

*** А) Друга гілка трійчастого нерва**

- В) Перша гілка трійчастого нерва
- С) Третя гілка трійчастого нерва
- Д) Блоковий нерв
- Е) Лицевий нерв

107. Пацієнту потрібно виконати операцію видалення верхнього третього великого кутнього зуба. Який нерв потрібно знеболити для виконання операції?

*** А) Коміркові верхні задні нерви**

- В) Коміркові верхні передні нерви
- С) Коміркові верхні середні нерви
- Д) Великий піднебінний нерв
- Е) Задні верхні носові нерви

108. Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта порушена смакова чутливість передніх 2/3 язика та слиновиділення. Травмою якого нерва це викликано?

*** А) Барабанної струни**

- В) Великого кам'янистого нерва
- С) Малого кам'янистого нерва
- Д) Глибокого кам'янистого нерва
- Е) Під'язикового нерва

109. Лікарю-стоматологу для знеболення необхідно ввести анестетик у крилопіднебінну ямку і з ротової порожнини. В ділянці якого анатомічного утвору потрібно робити ін'єкцію?

*** А) Великого піднебінного отвору**

- В) Піднижньоочноямоккового отвору
- С) Різцевого каналу
- Д) Нижньощелепного отвору
- Е) Підборідного отвору

110. У хворого діагностовано кореневу кісту, яка проросла у носову порожнину. Який зуб імовірно уражений?

*** А) Верхній центральний різець**

- В) Верхнє ікло
- С) Верхній латеральний різець
- Д) Верхній перший премоляр
- Е) Верхній перший моляр

111. Хворий скаржиться на біль в ділянці щоки під оком, верхніх молярів при надкушуванні твердої їжі, підвищену до 38-40⁰С температуру тіла, односторонню нежить з гнійними виділеннями. Під час огляду діагностовано гострий одонтогенний гайморит, спричинений поширенням інфекції при періодонтиті (запалення періодонта). Ураження яких зубів могло спричинити таке ускладнення?

*** А) Других верхніх молярів**

- В) Верхнього ікла
- С) Першого верхнього премоляра
- Д) Верхнього латерального різця
- Е) Верхнього 8-го зуба

112. При огляді у пацієнта виявлено рухливість зубів, гіперемію ясенного краю, ціаноз і набряк міжзубних сосочків. Лікар діагностував пародонтит (запалення пародонту). В яких тканинах розвинувся патологічний процес?

*** А) Кореневий цемент, періодонт, альвеолярний відросток, ясна**

В) Корінь зуба, кореневий цемент, періодонт

С) Періодонт, ясна, корінь зуба

Д) Альвеолярний відросток, корінь зуба, ясна

Е) Корінь зуба, періодонт, зубна комірка

113. Хворий звернувся із скаргами на біль за кутом нижньої щелепи. Було діагностовано абсцес крило-щелепного простору. Між якими анатомічними утворами виник гнійний процес?

*** А) Між медіальним крилоподібним м'язом та внутрішньою поверхнею нижньої щелепи**

В) Між латеральним та медіальним крилоподібними м'язами

С) Між латеральним крилоподібним та скронеvim м'язом

Д) Між латеральним крилоподібним м'язом і під скроневою поверхнею великого крила клиноподібної кістки

Е) Між латеральним крилоподібним м'язом та гілкою нижньої щелепи

114. При проведенні анестезії в отвір нижньої щелепи у пацієнта виникла контрактура (обмежене відкривання рота). Який м'яз було пошкоджено при маніпуляції?

*** А) Латеральний крилоподібний**

В) Жувальний

С) Скроневий

Д) Шило-язиковий

Е) Під'язиково-язиковий

115. У пацієнта 27 років після травми челюсних кісток в області забою з'явився набряк тканини, крововолови в надкісницю. При гістологічному дослідженні ураженої тканини виявлено дрібноклітинні інфільтрати з поодинокими нейтрофілами. Який патологічний процес найбільш ймовірно розвинувся?

*** А) Простий периостит**

- В) Гнійний периостит
- С) Фіброзний периостит
- Д) Остеомієліт
- Е) Секвестральне гнійне запалення

116. Під час огляду рентгенограми було виявлено ознаки запалення гаверсових та фолькмановських каналів челюсних кісток, поширення запального процесу в надкісницю та накопичення там ексудату. Який найбільш ймовірний процес розвивається?

*** А) Гнійний периостит**

- В) Секвестральне гнійне запалення
- С) Фібринозний периостит
- Д) Остеомієліт
- Е) Специфічний периостит

117. Пацієнта С. госпіталізовано з приводу запалення кішкового мозку челюсних кісток нижньої щелепи. Під час операції виявлено гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка. Такі прояви найбільш характерні для:

*** А) Остеомієліт**

- В) Секвестрит
- С) Одонтогенна інфекція
- Д) Гнійний периостит
- Е) Простий періостит

118. При огляді ротової порожнини пацієнта А. 30 р., виявлена запальна гіперемія тканини в області верхівки моляра, набряк. Місцями виявляються дрібні абсцеси. Для якого процесу характерні такі зміни?

*** А) Гострий періодонтит**

- В) Хронічний періодонтит
- С) Гранулематозний періодонтит
- Д) Гнійний періодонтит
- Е) Секвестр

119. Під час операції виявлено вогнище гнійного запалення зі строни альвеолярного відростка щелепи із утворенням піднадкістничного абсцесу з відшаруванням підкістниці і накопиченням гною. При цьому візуально виявлено перифокальний набряк оточуючих м'яких тканин. Для якого процесу характерні такі зміни?

*** А) Гнійний периостит**

- В) Простий периостит
- С) Фіброзний периостит
- Д) Остеомієліт
- Е) Секвестр

120. У чоловіка 50 років видалена пухлина в ділянці нижньої щелепи. Макроскопічно вона мала вигляд щільного вузла, зв'язаного з кісткою. Макроскопічно складалася з кісткової маси пластинчастої будови з дуже вузькими судинними каналами. Вкажіть вид пухлини.

*** А) Компактна остеома**

- В) Губчаста остеома
- С) Фіброма
- Д) Хондрома
- Е) Остеосаркома

121. У жінки 27 років видалено пухлину щелепи. При гістологічному дослідженні паренхіма пухлини складається із великої кількості однотипних дрібних одноядерних клітин овальної форми. Серед них розташовані багатоядерні клітини, іноді дуже численні. Зустрічаються дрібні крововиливи і зерна гемосидерину, що надає пухлині бурого кольору. Іноді зустрічаються новоутворені кісткові балочки.

*** А) Гігантоклітинна пухлина**

- В) Амелобластома.
- С) Аденоматоїдна пухлина
- Д) Дентинома
- Е) Цементобластома.

122. При огляді зубів у дитини стоматолог виявив, що перший великий корінний зуб руйнується карієсом. Поверхневий шар дентину уражений, дентинові каналці розширені, а відростки одонтобластів зруйновані. Сформована каріозна порожнина. Назвіть стадію карієсу.

*** А) Середній карієс**

- В) Стадія плями
- С) Глибокий карієс
- Д) Стаціонарний карієс
- Е) Поверхневий карієс

123. Мужчина 30 років, який самостійно лікував зуб, закладаючи анальгін у дефект зуба, звернувся до стоматолога, бо зубний біль став нестерпним. При огляді пошкодженого зуба виявлено тяжкі розлади кровоплину в пульпі та обмежене оболонкою гнійне її розплавлення. Назвіть процес.

*** А) Абсцес пульпи**

- В) Глибокий карієс
- С) Дифузний гнійний пульпіт
- Д) Гангрена пульпи
- Е) Хронічний гангренозний пульпіт

124. При огляді зуба стоматолог виявив фіброзну капсулу , яка щільно спаяна із навколишніми тканинами. За гістологічного дослідження вмісту капсули виявлено фібробласти , макрофаги, лімфоцити, , плазматичні та жирові клітини, а також клітини інородних тіл. Назвіть вид періодонтиту.

*** А) Проста гранулема**

- В) Хронічний гранулюючий періодонтит
- С) Складна гранулема
- Д) Кистогранулема
- Е) Гострий гнійний періодонтит

125. При розтині тіла людини 32 років виявлений гнійний пульпіт, який ускладнився гнійним тромбофлебітом, геморагії в слизових оболонках і внутрішніх органах, дистрофічні зміни в печінці, міокарді, гострий некротичний нефроз, селезінка збільшена, дає багатий зішкрібок. Для якого захворювання найбільш характерні виявлені зміни?

*** А) Септицемія**

- В) Септикопемія
- С) Хірургічний сепсис
- Д) Гострий гнійний пульпіт
- Е) Одонтогенний сепсис

126. Хворий 17 років, звернувся до стоматолога зі скаргами на болі десен і наявності виразок на них. При огляді виявлено, що слизова десен повнокрівна, на окремих ділянках локалізуються темно-червоні та сірувато-жовті ділянки змертвілого епітелію. Коли забрати епітелій вздовж облямівки десни, то видно виразки, які вповнені грануляційною тканиною. Виставте діагноз.

*** А) Виразковий стоматит**

- В) Афтозний стоматит
- С) Виразково-некротичний стоматит
- Д) Ртутний стоматит
- Е) Променевий стоматит

127. При гістологічному дослідженні біоптату привушної слинної залози виявлено її запалення лімфо-макрофагально і плазмоклітинна інфільтрація стромы з проникненням інфільтрату в залозу з руйнуванням її епітеліальних клітин, що завершується склерозом стромы і атрофією залоз. Ідентичні зміни виявлені в інших великих і малих слинних залозах, у залозах бронхів, шлунка і кишечника. Поставте діагноз.

*** А) Сіалоаденіт при синдромі Шегрена.**

- В) Вірусний епідемічний паротит
- С) Поліморфна аденома
- Д) Мукоепідермальна пухлина
- Е) Гнійний паротит

128. При розтині трупа жінки 50 років виявлено пухлину правої привушної залози. Пухлина має вигляд вузла еластичної консистенції, на розрізі білувата.. Гістологічно виявлено поліморфні зміни: епітеліальні утвори формують поля , окремі гнізда, тяжі, які анастомозують між собою. Виявляються крім епітеліальних полів солідної будови вогнища мукоїдного, міксоїдного і хондроїдного характеру. Клітини округлої, полігональної, кубічної, циліндричної форми та веретеноподібні із світлою цитоплазмою. Назвіть пухлину.

*** А) Поліморфна аденома**

- В) Мономорфна аденома.
- С) Аденолімфома
- Д) Мукоепідермоїдна пухлина
- Е) Ацинозно-клітинна пухлина.

129. При обстеженні біоптату кістки верхньої щелепи жінки 17 років виявлено вогнище ураження , яке побудоване із однорідних великих клітин , що нагадують гістіоцити та чисельні еозинофіли. Назвіть хворобу.

*** А) Еозинофільна гранулема**

- В) Ангіоматозний епуліс
- С) Херувизм
- Д) Фіброзна дисплазія щелепи
- Е) Аденоматоїдна пухлина

130. У дитини після перенесеного кору, при огляді лікар виявив у м'яких тканинах щоки нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, які ледь флюктують. Він зрозумів, що у дитини розвинулося важке ускладнення., а саме:

*** А) Волога гангрена (нома)**

- В) Суха гангрена
- С) Газова гангрена
- Д) Пролежень
- Е) Трофічна виразка

131. При огляді новонародженої дитини акушер-гінеколог звернув увагу на те, що в області твердого піднебіння є дефект у вигляді щілини. Цей дефект є результатом:

*** А) Морфогенетичного апоптозу**

- В) Філогенетичного апоптозу
- С) Гістогенетичного апоптозу
- Д) Некрозу
- Е) Атрофії

132. У пацієнта 37 років , лікар виявив в шкірі щоки в проекції нижньощелепного суглоба зліва пухлину. Пухлина щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин. Мікроскопічно: хаотично переплетені колагенові волокна , клітин, мало. Назвіть пухлину:

*** А) Тверда фіброма**

- В) М'яка фіброма
- С) Гістіоцитома
- Д) Дерматофіброма
- Е) Десмоїд

133. У пацієнтки 40 років в альвеолярному відростку щалапи виявлено пухлину з чіткими межами , щільної консистенції. Мікроскопічно: тканина подібна на дентин, з домішками зубного цементу. Назвіть пухлину:

*** А) Одонтома**

- В) Остеома
- С) Цементома
- Д) Адамонтимома
- Е) Остеосаркома

134. Лікар-стоматолог виявив у пацієнта запалення ясен та навколозубної тканини. Спостерігається набряк, місцями присутні виразкові ділянки . Зуби хитаються, деякі випали. Некротичні процеси та деякі виразки мають місце на язика та мигдаликах. Яка хвороба спричинила такі ускладнення.

*** А) Скорбут**

- В) Гангренозна ангіна
- С) Флегмонозна ангіна
- Д) Виразково-некротична ангіна.
- Е) Д-авітаміноз

135. У пацієнта виявлені дрібні точкові крововиливи в шкірі., набрякання ясен та незначні розхитування зубів. В становлено діагноз - цинга. Недостатністю якого вітаміну зумовлене дане захворювання?

*** А) Комплексна недостатність С та Р**

- В) Вітаміну Д
- С) Вітаміну С
- Д) Вітаміну А
- Е) Вітаміну В

136. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на локальний біль в області підборіддя, підвищення температури тіла у цій ділянці. Візуально визначається інфільтрат конусоподібної форми багряно-синюшого кольору, який піднімається над поверхнею шкіри. Лікар діагностував:

*** А) Фурункул**

- В) Карбункул
- С) Емпієму
- Д) Абсцес
- Е) Флегмону

137. У хворої через 3 дні після видалення двох каріозних зубів піднялась температура до 40С свідомість потьмарилась, на шкірі з'явилися петехіальні крововиливи. Через 2 доби наступила смерть. Гістологічно виявлено: септичну селезінку, дистрофічні зміни та інтерстиційне запалення в міокарді, печінці, нирках. Яка форма сепсису є найбільш вірогідною?

*** А) Септицемія**

- В) Септикопіємія
- С) Затяжний септичний ендокардит
- Д) Хроніосепсис
- Е) Хвороба Чорногубова

138. Больной 62 лет был доставлен в клинику с глубокими ожогами мягких тканей ягодичной области. Из опроса выяснилось, что больной прикасался к раскаленной печки и при этом не чувствовал сильной боли и температуры. При обследовании было установлено, что больной страдает хроническим сифилисом, который поразил в спинном мозге проводящие пути. Назовите эти пути.

*** А) Боковые спинно-таламические пути**

В) Передние спинно-таламические пути

С) Тонкий и клиновидный пучки

Д) Передние спинно-мозжечковые пути

Е) Задние спинно-мозжечковые пути

139. В результате гнойного воспаления дистальной фаланги большого пальца правой руки, больному необходимо было удалить ногтевую пластинку. Какие факторы анатомического строения ногтя должен учитывать хирург во время операции?

*** А) Ноготь является производным эпидермиса**

В) Ноготь является выростом костной ткани

С) Ноготь является хрящевой пластинкой

Д) Ноготь является выростом сухожилия

Е) Ноготь является производным дермы

140. Во время медицинского осмотра в военкомате молодому человеку был поставлен диагноз гинекомастия. О каком виде аномалии развития производных кожи идет речь?

*** А) Развитие молочной железы по женскому типу**

В) Развитие добавочных молочных желез

С) Уменьшение количества потовывх желез

Д) Отсутствие волосяного покрова

Е) Формирование ложных половых губ

141. Больной 44 лет страдающей хроническим синуситом обратился к врачу с жалобами на ухудшение зрения и ограничение подвижности правого глаза. При рентгеновском исследовании была выявлена деформация нижней стенки правой глазницы. Какой параназальный синус вероятнее всего поражен?

*** А) Правая верхнечелюстная пазуха**

- В) Клиновидная пазуха
- С) Лобная пазуха
- Д) Правый решетчатый синус
- Е) Левый решетчатый синус

142. Пациент обратился к врачу-терапевту с жалобами на повышение температуры, недомогание, боль в горле при глотании. Осмотрев зев больного врач поставил диагноз: тонзиллит (воспаление небных миндалин) При этом было отмечено увеличение размеров лимфатических узлов. Какие это узлы?

*** А) Латеральные глубокие шейные.**

- В) Подподбородочные.
- С) Поднижнечелюстные.
- Д) Затылочные.
- Е) Поверхностные шейные.

143. Пациент обратился к стоматологу с жалобами на продолжительные боли в области передних зубов нижней челюсти. При осмотре врач обнаружил пришеечный кариес нижних правых резцов. При этом было отмечено увеличение в размерах группы лимфатических узлов. В какие лимфоузлы происходит отток лимфы от нижних резцов и клыков?

*** А) Подподбородочные**

- В) Поднижнечелюстные
- С) Поверхностные шейные
- Д) Глубокие шейные
- Е) Лицевые

144. На прием к стоматологу пришел пациент длительное время страдающий болями зубов нижней челюсти. При осмотре врач обнаружил кариозные полости на контактных поверхностях первого и второго нижнего моляра слева. Кроме того было отмечено увеличение размеров и болезненность группы лимфатических узлов. В какие лимфатические узлы следуют отводящие лимфатические сосуды от малых и больших нижних коренных зубов?

*** А) Поднижнечелюстные**

В) Подподбородочные

С) Надключичные

Д) Лицевые

Е) Заглоточные

145. Во время операции на позвоночном столбе больному К. удалили дуги позвонков и соединяющие их связки. Назовите эти связки.

*** А) Желтые связки**

В) Межостистые связки

С) Передняя продольная связка

Д) Задняя продольная связка

Е) Межпозвоночные связки

146. Хирургу необходимо произвести удаление части травмированной стопы по линии Лисфранкова сустава. Какую связку необходимо пересечь?

*** А) Медиальную межкостную предплюстно-плюстневую связку.**

В) Пяточно-ладьевидную

С) Раздвоенную

Д) Таранно-ладьевидную

Е) Таранно-пяточную

147. При проведении операции аппендектомии анестезиолог констатировал у больного отсутствие зрачкового рефлекса в результате передозировки наркоза. Какая структура ствола мозга вовлечена в процесс?

*** А) Средний мозг**

- В) Промежуточный мозг
- С) Мозжечок
- Д) Продолговатый мозг
- Е) Задний мозг

148. При проведении компьютерной томографии мозга у больной паркинсонизмом нарушений в стволе мозга не выявлено. При исследовании конечного мозга обнаружена патология:

*** А) Чечевицеобразного ядра**

- В) Угловой извилины
- С) Краевой извилины
- Д) Крючка извилины морского коня.
- Е) Миндалевидного ядра.

149. У больной 49 лет обнаружена раковая опухоль шейки матки. В какие регионарные лимфатические узлы возможно распространение метастазов?

*** А) Паховые и подвздошные**

- В) Поясничные
- С) Верхние и нижние брыжеечные
- Д) Околопузырные и поясничные
- Е) Грудной лимфатический проток

150. В клинику поступил пострадавший с глубокой колотой раной наружной поверхности правой голени. При обследовании выявлена невозможность активного разгибания стопы. Сухожилия и волокна мышц-разгибателей целы. Какой нерв поврежден у данного пострадавшего?

*** A) N.peroneus pro undus.**

B) N.peroneus super icialis.

C) N.peroneus communis.

D) N.peroneus longus.

E) N.peroneus brevis.

151. У женщины с резаной раной левой подмышечной области при обследовании выявлена невозможность пронировать кисть. Сухожилия и волокна мышц предплечья целы. Какой нерв поврежден у данной пострадавшей?

*** A) N.medianus.**

B) N. ulnaris.

C) N.radialis.

D) N. cutaneus brachii medialis.

E) N. cutaneus antebrachii medialis.

152. На рентгенограмме органов грудной клетки в передней прямой проекции имеет место расширение левого контура срединной тени в нижнем его отделе. Какой отдел сердца увеличен?

*** A) Левый желудочек.**

B) Правый желудочек

C) Левое предсердие

D) Правое предсердие

E) Ушко левого предсердия

153. При гипертрофии правого желудочка увеличивается (расширяется) преимущественно правый контур срединной тени на рентгенограмме органов грудной клетки в передней прямой проекции. Чем образован правый контур?

*** А) .Правым предсердием**

- В) Правым желудочком
- С) Ушком правого предсердия
- Д) Восходящим отделом аорты
- Е) Легочным стволом

154. Мужчина 45 лет обратился к хирургу с жалобами на боль внизу живота справа. При глубокой пальпации врач обнаружил болезненность в правой паховой области. В каком отделе кишечника возможен патологический процесс?

*** А) Слепая кишка**

- В) Поперечная ободочная
- С) Нисходящая ободочная
- Д) Сигмовидная ободочная
- Е) Прямая.

155. В приемное отделение поступил юноша с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Во время оперативного вмешательства обнаружено раневое отверстие передней стенки поперечной ободочной кишки. Сколько листков висцеральной брюшины было нарушено?

*** А) 5**

- В) 6
- С) 7
- Д) 4
- Е) 3

156. Чоловік скаржиться на порушення чутливості шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового ходу. Пошкодження якого нерва викликало такий стан у хворого?

*** A) (n. auricularis magnus plexus cervicalis**

B) n. ariculotemporalis n.trigeminus

C) n. auricularis anteriores n.trigeminus

D) r. auricularis n. vagus

E) n. auricularis posterior n. acialis

157. У хворого після інсульту втрачена здатність впізнавати знайомі обличчя, букви, слова (алексія), спостерігається дезорієнтація в оточенні - не може уявити планування палати- місцезнаходження ліжка, стола (просторово- зорова агнозія), всі предмети здаються маленькими (мікропсія) при збереженні зору. В якій ділянці кори великого мозку у хворого локалізован патологічний процес?

*** A) Gyrus angularis**

B) Gyrus rontalis medius

C) Gyrus rontalis superior

D) Gyrus supramarginalis

E) Gyrus precentralis

158. Хворий 49 років, звернувся до лікаря зі скаргами на появу темної плями перед очима. При офтальмоскопії виявлений набряк в ділянці найбільш чутливого до світла місця сітківки. Яка ділянка сітківки уражена?

*** A) Macula lutea**

B) Discus nervi optici.

C) Ora serata

D) ovea centralis

E) Pars caeca retinae

159. У дитини 7 років травма очного яблука з ураженням компонентів внутрішнього ядра ока. Які структури входять до складу внутрішнього ядра ока?

*** A) Camerae bulbi, lens, corpus vitreum.**

B) Lens, corpus vitreum, corpus ciliare

C) Lens, corpus vitreum, iris.

D) Camerae bulbi, lens, sclera

E) Camerae bulbi, corpus vitreum, cornea

160. При хворобі Рейтера спостерігається одночасне ураження очних яблук, сечовивідних шляхів і суглобів. Найбільш часто визначається ураження судинної оболонки очного яблука. Які частини має судинна оболонка очного яблука?

*** A) Iris, corpus ciliare, choroidea**

B) Cornea, iris, corpus ciliare

C) Iris, corpus ciliare, sclera

D) Corpus vitreum, iris, corpus ciliare

E) Iris, lens, corpus ciliare

161. У новонародженого хлопчика лікар-неонатолог констатує повну відсутність пігментного епітелію райдужки. У дитини-альбіноса райдужка має червоний колір, тому що просвічуються кровоносні судини оболонок очного яблука. До якої оболонки очного яблука відноситься райдужка?

*** A) Судинної**

B) Фіброзної

C) Чутливої

D) Слизової

E) М'язової

162. У чоловіка, 50 років, діагностовано вікова далекозорість в зв'язку з послабленням акомодацийних властивостей кришталика та гладеньких м'язів судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м'яза з віком послаблено?

*** A) M. ciliaris**

- B) M. sphincter pupillae
- C) M. dilatator pupillae
- D) M. obliquus superior
- E) M. obliquus inferior

163. Хворий обстежується в очному відділенні. Лікар виявив при обстеженні підвищення внутрішньоочного тиску - глаукому. Обстеження підтвердило, що у хворого звужені шляхи циркуляції водянистої вологи з камер очного яблука. Через які отвори відтікає humor aqueus з камер очного яблука?

*** A) Spatia anguli iridocornealis**

- B) Canalis opticus
- C) Lamina cribrosa
- D) Canaliculus lacrimalis
- E) Spatium episclerale

164. У чоловіка з цукровим діабетом періодично виникають запалення залоз повік, вивідні проточки яких відкриваються вздовж переднього краю повік та розташовуються поряд з кореннями вій. Які залози у хворого уражені?

*** A) Glandulae sebaceae (Zeis)**

- B) Glandulae sudoriparae ciliares (Moll)
- C) Glandulae lacrimalis conjunctivae (Krause)
- D) Glandulae tarsales (Meibom)
- E) Glandulae lacrimalis

165. У хворого 50 років діагностовано дегенерація рогівки Теріенса. Клінічні прояви хвороби визначаються в ділянці переходу рогівки у білкову оболонку ока. Яка структура є анатомічною межею між рогівкою і білковою оболонкою ока?

*** A) Sulcus sclerae.**

- B) Limbus cornea
- C) Lamina cribrosae sclerae
- D) Sinus venosus sclerae
- E) Lamina episcleralis

166. Хворий 50 років після інсульту (крововиливу в стовбурову частину мозку) не реагує на несподівані чи надмірні звукові подразнення. Лікар запідозрив у хворого пошкодження підкіркових центрів слуху, від яких починається захисний шлях, при участі якого відбувається відхиляючі рухи тіла у разі надходження сигналу небезпеки. В яких структурах знаходяться підкіркові центри слуху?

*** A) Colliculus superior**

- B) Corpus geniculatum mediale
- C) Brachium colliculi superioris
- D) Brachium colliculi inferioris
- E) Brachium colliculi inferioris

167. У хворого запалення внутрішнього вуха. Після обстеження лікар констатує ураження VIII пари черепних нервів. У якому вузлі знаходяться тіла перших нейронів слухового аналізатора?

*** A) G. spirale cochleae**

- B) G. vestibulare
- C) G. geniculi
- D) G. trigeminale
- E) G. ciliare

168. У хворого 40 років лікар констатує неврит VIII пари черепних нервів. У якому вузлі знаходяться тіла перших нейронів статокінетичного аналізатора?

*** A) G. vestibulare**

B) G. geniculi

C) G. trigeminale

D) G. spirale cochleae

E) G. ciliare

169. Об'єктивним симптомом сальпінгоотита є втягнення барабанної перетинки. Рукоятка слухової кісточки, яка пов'язана з membrana tympani, приймає більш горизонтальне положення. Положення якої кісточки визначає при обстеженні лікар?

*** A) Malleus**

B) Incus

C) Stapes

D) Squama os temporale

E) Processus mastoideus

170. У хворого пошкоджена барабанна перетинка, яка в нормі сприймає звукові коливання і передає їх перилімфі присінка внутрішнього вуха через систему слухових кісточок. Які м'язи забезпечують ступінь натягнення барабанної перетинки і обсяг зміщення стремінця?

*** A) M. tensor tympani, m. stapedius**

B) M. tensor tympani

C) M. stapedius

D) M. tensor veli palatini

E) M. uvulae

171. У хворого запалення надхрящниці зовнішнього вуха після механічної травми. Відмічається набряк і гіперемія, які поширюється на всю вушну раковину крім тої частини, яка не містить хряща. Яка частина вушної раковини не залучена до патологічного процесу?

*** A) Lobulus auriculae**

- B) Helix
- C) Anthelix
- D) Tragus
- E) Antitragus

172. У дитини втрачений слух внаслідок дегенеративних змін клітин g.spirale cochleae. Де розташований g.spirale cochleae?

*** A) Canalis spiralis modioli**

- B) Basas modioli
- C) Scala vestibuli
- D) Scala tympani
- E) Apertura interna canalaculi cochlea

173. Під час профогляду лікар виявив у школяра сірчасту пробку в зовнішньому слуховому проході, яка розташована в самій вузькій його частині. Де розташована сірчаста пробка?

*** A) В місці з'єднання хрящової і кісткової частин**

- B) В ділянці вушної часточки
- C) Біля барабанної перетинки
- D) Біля козелка
- E) Біля барабанної вирізки

174. У хворого з гнійним ураженням зовнішнього слухового проходу запалення розповсюджується на привушну залозу. Яким шляхом розповсюджується інфекція?

*** A) Через incisurae cartilaginis (Santorini)**

- B) В місці з'єднання хрящової і кісткової частин
- C) Paries anterior meatus acusticus externus
- D) Paries posterior meatus acusticus externus
- E) Біля барабанної вирізки

175. У хворого з епідемічним паротитом (свинка) раптово виникла одностороння повна глухота, яка пов'язана з гострим гнійним лабіринтитом. Де розташовані рецептори pars cochlearis n. vestibulocochlearis?

*** A) Organum spirale**

- B) Ganglion spirale cochleae
- C) Macula utriculi
- D) Macula sacculi
- E) Cristae ampullaris ductus semicircularis

176. Спазм судин внутрішнього вуха призводить до подразнень закінчень вестибулярної частини VIII пари черепних нервів, проявами яких є запаморочення, нудота, порушення рівноваги, поява ністагму. Де розташовані рецептори pars vestibularis n. vestibulocochlearis?

*** A) Cristae ampullaris ductus semicircularis, macula sacculi, macula utriculi**

- B) Organum spirale
- C) Ganglion spirale cochleae
- D) Ganglion oticum
- E) Ganglion vestibulare