

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Фармакологія - база тестів 2006 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2006 року**

Кількість запитань: **80**

1. Що необхідно призначити хворому неврозом, який страждає фобіями?

*** А) Діазепам.**

В) Аміназин.

С) Резерпін.

Д) Галоперидол.

Е) Зопіклон.

2. Який лікарський засіб ви призначете хворому для лікування гіперліпідемії?

*** А) Фенофібрат**

В) Пірацетам

С) Адреналін

Д) Мезатон

Е) Кордіамін

3. Під час слабкості пологової діяльності призначають:

*** А) Окситоцин**

В) Но-шпу

С) Прогестерон

Д) Вікасол

Е) Фенотерол

4. Хворому на цукровий діабет було призначено інсулін. Який режим введення цього препарату?

*** А) За 20 хвилин до їжі**

В) Перед сном

С) 40 хвилин після їжі

Д) Під час їжі

Е) За 1,5 години до їжі

5. У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Що потрібно йому призначити для швидкої допомоги?

*** А) Аміназин.**

- В) Діазепам.
- С) Натрія бромід.
- Д) Резерпін.
- Е) Фторотан.

6. Хворий поступив на приймальне відділення лікарні з отруєнням інсектицидом антихолінестеразної дії. Який препарат, що блокує М-холінорецептори, потрібно призначити в даному випадку?

*** А) Атропін.**

- В) Скополамін.
- С) Платифілін.
- Д) Бензогексоній.
- Е) Амізил.

7. У 12-летнего ребенка непереносимость ряда пищевых продуктов. Их употребление вызывает аллергическую реакцию в виде зудящих высыпаний на коже. Какое противогистаминное средство следует назначить, чтобы не мешать школьным занятиям ребенка?

*** А) Лоратадин**

- В) Димедрол
- С) Диклофенак
- Д) Эуфиллин
- Е) Эфедрин

8. У дитини спостерігались підшкірні крововиливи. Призначення синтетичного аналогу вітаміну К- вікасолу дало позитивний ефект. В синтезі якого білка системи згортання крові бере участь цей препарат?

*** А) Протромбіну**

- В) Антигемофільного глобуліну
- С) Фактора Хагемана
- Д) Фібриногену
- Е) Колагену

9. У больной немотивированной чувство тревоги, беспокойства, бессонница. Какая группа фармакологических средств показана в этом случае?

*** А) Транквилизаторы**

- В) Ноотропы
- С) Антидепрессанты
- Д) Нейролептики
- Е) Соли лития

10. Больная 65 лет страдает хроническим запором вследствие гипотонии толстого кишечника. Какое средство лечения следует избрать при этих обстоятельствах?

*** А) Бисакодил**

- В) Касторовое масло
- С) Магния сульфат
- Д) Прозерин
- Е) Метоклопрамид

11. У больного аллергический насморк с обильным выделением слизи, зудом, частым чиханием. Какое из перечисленных средств следует выбрать в этом случае, если известно, что оно избирательно блокирует гистаминовые рецепторы?

*** А) Лоратадин**

В) Эфедрин

С) Адреналин

Д) Нафтизин

Е) Преднизолон

12. Большая доза симпатолитика вызвала у больного падение артериального давления. Какую группу антигипотензивных средств наиболее целесообразно использовать для его повышения в этом случае?

*** А) Адреномиметики**

В) Сердечные гликозиды

С) Аналептики

Д) Плазмозаменители

Е) Н-холиномиметики

13. В приемное отделение поступил больной с признаками острой сердечной недостаточности: бледностью, акроцианозом, частым, поверхностным дыханием. Какое из перечисленных средств показано в этом случае?

*** А) Коргликон**

В) Дигитоксин

С) Кордиамин

Д) Нитроглицерин

Е) Адреналина гидрохлорид

14. У больного на фоне инфаркта миокарда возникла пароксизмальная желудочковая тахикардия. Какое из перечисленных противоаритмических средств следует избрать, чтобы не уменьшить сердечный выброс?

*** А) Лидокаина гидрохлорид**

- В) Новокаиномид
- С) Верапамил
- Д) Анаприлин
- Е) Калия хлорид

15. Женщина 45 лет обратилась к врачу с жалобами на головную боль, головокружение, сердцебиение. Обследование установило повышение АД и наличие высокой концентрации ангиотензина 2 в крови больной. Какое из перечисленных антигипертензивных средств наиболее показано в этом случае?

*** А) Лизиноприл**

- В) Празозин
- С) Метопролол
- Д) Резерпин
- Е) Верапамил

16. К стоматологу обратился больной с жалобами на зуд и жжение в полости рта, повышенную температуру. Был поставлен диагноз гингивостоматит. Какое из перечисленных средств следует избрать, если известно, что причиной болезни является анаэробная микрофлора?

*** А) Метронидазол**

- В) Ампициллин
- С) Доксициклина гидрохлорид
- Д) Гентамицина сульфат
- Е) Нистатин

17. В кардиологическое отделение поступил больной с интенсивной болью, обусловленной инфарктом миокарда. Для купирования боли было решено потенцировать действие анальгетика нейролептиком. Какой из перечисленных нейролептиков наиболее пригоден в данном случае?

*** А) Дроперидол**

- В) Аминазин
- С) Трифтазин
- Д) Галоперидол
- Е) Сульпирид

18. К стоматологу обратился больной с поражением слизистой ротовой полости. Был поставлен диагноз герпетический стоматит. Какое из перечисленных средств обеспечит действие на этиотропный фактор?

*** А) Ацикловир**

- В) Димедрол
- С) Парацетамол
- Д) Левамизол
- Е) Фурацилин

19. Після довготривалого прийому ізосорбіду для профілактики приступів стенокардії хворий відмітив значне зниження ефекту останнього. Яке явище мало місце?

*** А) Толерантність**

- В) Кумуляція
- С) Фізична залежність
- Д) Алергія
- Е) Потенціювання

20. У хворого, який довготривало приймав преднізолон, в результаті відміни препарату виникло загострення захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна зв'язати ці прояви?

*** А) Виникнення недостатності наднирників**

- В) Сенсibiliзацією до препарату
- С) Звиканням до препарату
- Д) Гіперпродукцією АКТГ
- Е) Кумуляцією препарату

21. Для лікування бактеріальної пневмонії було призначено бензилпеніцилін. Який механізм антимікробної дії препарату?

*** А) Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів**

- В) Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
- С) Порушення проникності цитоплазматичної мембрани
- Д) Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
- Е) Антагонізм з параамінобензойною кислотою

22. Вкажіть антибіотик для лікування сифілісу.

*** А) Бензилпеніцилін**

- В) Стрептоміцин
- С) Канаміцин
- Д) Амфотерицин
- Е) Ністатин

23. Діагностовано трихомоніаз. Який антимікробний препарат необхідно призначити?

*** А) Метронідазол**

- В) Ампіцилін
- С) Хлорохін
- Д) Ністатин
- Е) Гентаміцин

24. У пацієнта з'явились герпетичні висипання. Який засіб необхідно призначити?

*** А) Ацикловір**

- В) Гентаміцин
- С) Клотримазол
- Д) Бензилпеніцилін
- Е) Бісептол

25. Для індивідуальної профілактики малярії було призначено препарат.

*** А) Хінгамін**

- В) Рифампіцин
- С) Ампіцилін
- Д) Гентаміцин
- Е) Бісептол (Ко-тримаксазол)

26. В місті Н. під час дослідження питної води виявлено холерний вібріон. Який препарат необхідно призначити у випадку виникнення симптомів холери?

*** А) Доксидиклін**

- В) Еритроміцин
- С) Біцилін-5
- Д) Бензилпеніциліну натрієва сіль
- Е) Бензилпеніциліну калієва сіль

27. У хворого на пародонтит у пародонтальних кишнях виявлена анаеробна мікрофлора. Лікар-стоматолог призначив хіміотерапевтичний засіб - похідне імідазолу. Який це препарат?

*** А) Метронідазол**

- В) Фуразолідон
- С) Метил урацил
- Д) Флюконазол
- Е) Мебендазол

28. У пацієнта герпетичний стоматит на фоні імунодепресії. Який препарат, що застосовують внутрішньовенно, всередину і місцево, забезпечить протівірусну та імуностимулюючу дії?

*** А) Ацикловір**

- В) Ремантадин
- С) Левамизол
- Д) Метисазон
- Е) Амоксицилін

29. Перед проведенням тривалих ендодонтичних маніпуляцій при пломбуванні зубів нижньої щелепи, лікар-стоматолог застосував аміназин. Для отримання якої дії це було зроблено?

*** А) Протиблювотної**

- В) Гіпотермічної
- С) Гіпотензивної
- Д) Антипсихотичної
- Е) Анальгезуючої

30. Для зниження температури тіла при лихоманці і зменшення зубного болю хворому призначили парацетамол. Який механізм розвитку цих ефектів?

*** А) Блокування циклооксигенази-2**

- В) Блокування моноамінооксидази
- С) Блокування ліпоксигенази
- Д) Блокування холінестерази
- Е) Блокування фосфодіестерази

31. З метою прискорення загоєння променевої виразки був призначений вітамінний препарат. Вказати цей препарат.

*** А) Ретинолу ацетат**

- В) Ретаболіл
- С) Преднізолон
- Д) Левамизол
- Е) Метилурацил

32. З метою діагностики гінгівіту стоматолог застосував місцево 5\% розчин йоду спиртового. Це викликало сильну печію, кашель, ядуху. Який препарат необхідно застосувати місцево для інактивації йоду?

*** А) Унітіол [тіосульфат натрію]**

- В) Кальцію хлорид
- С) Натрію хлорид
- Д) Метиленовий синій
- Е) Трилон Б

33. Прийом пацієнта в стоматолога ускладнився тим, що в нього виникла надмірна слинотеча і бронхоспазм. Який препарат викликав ці ускладнення, якщо хворий застосовує його в очних краплях?

*** А) Пілокарпіну гідрохлорид**

- В) Атропіну сульфат
- С) Галантаміну гідробромід
- Д) Платифіліну гідротартрат
- Е) Ефедрину гідрохлорид

34. При хронічному афтозному стоматиті стоматолог призначив вітамінний препарат, який сприяє епітелізації виразок і має імуностимулюючу дію. Який це препарат?

*** А) Ретинолу ацетат**

- В) Ергокальциферол
- С) Кислота нікотинова
- Д) Піридоксину гідрохлорид
- Е) Токоферолу ацетат

35. З метою купірування гіпертонічного кризу лікар-стоматолог внутрішньовенно ввів хворому лікарський засіб міотропної дії, який швидко знизив артеріальний тиск. Який препарат був застосований?

*** А) Магнію сульфат**

- В) Натрію хлорид
- С) Кальцію хлорид
- Д) Анаприлін
- Е) Корглікон

36. Внаслідок пломбування кореневого каналу зубу у хворого виник зубний біль. Який препарат необхідно призначити для купірування болю, враховуючи наявність у хворого гастриту?

*** А) Парацетамол**

- В) Анальгін
- С) Кислоту ацетилсаліцилову
- Д) Диклофенак – натрій
- Е) Індометацин

37. У хворого на туберкульоз застосовували рифампіцин, що призвело до розвитку стійкості мікобактерій туберкульозу. З яким препаратом необхідно поєднувати рифампіцин для попередження цього ускладнення?

*** А) Ізоніазид**

- В) Ацикловір
- С) Інтраконазол
- Д) Метронідазол
- Е) Амоксицилін

38. Хворому на активну форму туберкульозу призначили ізоніазид. Який вітамінний препарат необхідно застосовувати для профілактики побічної дії ізоніазиду?

*** А) Піридоксину гідрохлорид**

- В) Ретинолу ацетат
- С) Токоферолу ацетат
- Д) Рутин
- Е) Ціанокобаламін

39. Хворому на алергічний риніт призначено препарат тривалої антигістамінової дії [до 24 год.] з незначним седативним ефектом. Визначити цей препарат.

*** А) Лоратидин**

В) Димедрол

С) Супрастин

Д) Кальцію хлорид

Е) Тавегіл

40. У хворого, який застосовував для лікування артриту нижньощелепного суглобу диклофенак-натрій, виникло загострення виразкової хвороби шлунка. Який механізм побічної дії цього препарату?

*** А) Інгібування циклооксигенази-1 [ЦОГ-1]**

В) Інгібування циклооксигенази-2 [ЦОГ-2]

С) Інгібування ліпоксигенази

Д) Інгібування фосфодіестерази

Е) Інгібування моноамінооксидази

41. У хворого алергічна реакція на новокаїн. Виберіть засіб для проведення місцевої анестезії в даному випадку.

*** А) Лідокаїн.**

В) Анестезин.

С) Новокаїнамід.

Д) Тримекаїн.

Е) Дикаїн.

42. Виберіть міорелаксант для потенціювання наркозу.

*** А) Дитилин.**

В) Диплацин.

С) Тубокурарин.

Д) Бензогексоній.

Е) Гігроній.

43. У хворого міастенія. Який засіб із групи антихолінестеразних засобів показано у даному випадку?

*** А) Прозерин.**

В) Ацетилхолін.

С) Пілокарпін.

Д) Карбахолін.

Е) Ацеклідін.

44. У пацієнтки 36 років діагностована виразкова хвороба. Лікар порекомендував їй М-холіноблокатор периферичної дії. Який препарат був назначений?

*** А) Гастроцепін.**

В) Атропін.

С) Платифілін.

Д) Скополамін.

Е) Амізіл.

45. Хворий В. 40 років знаходиться на лікуванні в офтальмологічному відділенні з вираженим підвищенням внутрішньоочного тиску. Який препарат потрібно призначити?

*** А) Пілокарпін.**

В) Атропін.

С) Анаприлін.

Д) Сальбутамол.

Е) Прозерин.

46. Який із механізмів дії аміназина обумовлює його антипсихотичний ефект?

*** А) Блокада дофамінових рецепторів.**

В) Блокада α -адренорецепторів.

С) Блокада М-холінорецепторів.

Д) Блокада серотонінових рецепторів.

Е) Стимуляція ГАМК-рецепторів.

47. У хворого, що лікувався у клініці нервових хвороб, виникло ускладнення: кашель, нежить, сльозоточивість. Який препарат призвів до таких порушень?

*** А) Натрія бромід.**

В) Діазепам.

С) Валеріана.

Д) Феназепам.

Е) Резерпін.

48. Який з вказаних препаратів не Відноситься до групи алкалоїдів опію?

*** А) Трамадол.**

В) Морфін.

С) Кодеїн.

Д) Омнопон.

Е) Папаверин.

49. Серед фармакологічних середників, які застосовують для премедитації під час дооперативної підготовки хворого, є міорелаксанти. Який механізм впливу вказаних препаратів на функції синапсів?

*** А) Порушення взаємодії нейромедіатора з рецептором**

- В) Порушення секреції нейромедіатора в синаптичну щілину
- С) Порушення депонування нейромедіатора в нервових закінченнях
- Д) Порушення транспорту нейромедіатора
- Е) Порушення синтезу нейромедіатора

50. Хворому з хронічною серцевою недостатністю і азотемією призначили серцевий глікозид з найбільш пролонгованою дією. Визначте препарат

*** А) Дигітоксин**

- В) Дигоксин
- С) Целанід
- Д) Настій трави горицвіту
- Е) Строфантин

51. Хворому з переломом стегна призначили наркотичний аналгетичний засіб. Взаємодією з якими рецепторами обумовлена його знеболююча дія?

*** А) Опіатними рецепторами**

- В) Адренорецепторами
- С) Холіорецепторами
- Д) Бензодіазепіновими рецепторами
- Е) ГАМК-ергічними рецепторам

52. Хворий звернувся до стоматолога зі скаргами на те, що після лікування препаратом вісмуту (біохінол), у нього з'явилися сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини. Який засіб слід застосувати для усунення побічних ефектів?

*** А) Унітіол**

- В) Налоксон
- С) Калію перманганат
- Д) Метиленовий синій
- Е) Діамантовий зелений

53. У кардіологічне відділення поступив хворий з гіпертонічним кризом, хворому внутрішньовенно ввели антигіпертензивний засіб – сіль лужноземельного металу. Який препарат ввели хворому?

*** А) Магнію сульфат**

- В) Калію хлорид
- С) Натрію гідрокарбонат
- Д) Кальцію лактат
- Е) Бензогексоній

54. В кардіологічному відділенні у хворого виникла аритмія. Хворому лікар призначив аміодарон, Який основний механізм проти аритмічної дії аміодарону?

*** А) Переважно блокує калієві канали**

- В) Пригнічує холінорецептори
- С) Стимулює гістамінові рецептори
- Д) Активує серотонінові рецептори
- Е) Змінює чутливість міокарду до ацетилхоліну

55. Хворому після екстракції зуба з приводу пульпіту призначено доксицикліну гідрохлорид. Яку рекомендацію повинен дати лікар-стоматолог хворому, виписуючи рецепт на цей препарат?

*** А) Уникати перебування на сонці**

- В) Запивати великою кількістю рідини
- С) Приймати перед їжею
- Д) Курс лікування не повинен перевищувати 5 днів
- Е) Не приймати разом з протизапальними препаратами

56. Хворому на пневмонію, у якого в анамнезі відмічались алергічні реакції на певні харчові продукти, призначено бензилпеніциліну натрієву сіль в дозі 500 000 ОД 6 разів на день. Після чергового введення лікарського засобу виникла пропасниця, втрата свідомості, судоми. Що розвинулось у хворого?

*** А) Анафілактичний шок**

- В) Ідіосинкразія
- С) Тахіфілаксія
- Д) Кумуляція
- Е) Толерантність

57. Хворому з неоперабельним раком шлунка призначили морфін для зняття вираженого больового синдрому. З часом хворий відмітив зменшення знеболюючого ефекту та тривалості дії препарату, різке посилення больових відчуттів. Лікар пояснив це тим, що:

*** А) Розвинулась толерантність до препарату**

- В) Виникла тахіфілаксія
- С) Розвинулась психічна залежність
- Д) Морфін здатний до кумуляції
- Е) Зменшилась реабсорбція морфіну в канальцях нирок

58. Що вивчає такий розділ фармакології, як фармакокінетика ?

*** А) . "Рух" ліків в організмі**

- В) Дію ліків на організм
- С) Токсичну дію ліків
- Д) Побічні ефекти ліків
- Е) Взаємодію ліків

59. Який з перелічених шляхів введення лікарських засобів в організм не належить до групи ін'єкційних?

*** А) Ректальний**

- В) Під мозкові оболонки
- С) Внутрішньом'язовий
- Д) Внутрішньовенний
- Е) Підшкірний

60. Під час стоматологічних маніпуляцій у хворого виник гіпертонічний криз. Який з перелічених засобів сприятиме нормалізації артеріального тиску?

*** А) Магнію сульфат**

- В) Прозерин
- С) Парацетамол
- Д) Морфін
- Е) Кофеїн-бензоат натрію

61. Після 10-денного лікування антибіотиком у пацієнта виникли дисбактеріоз, жовтяниця, фотосенсибілізація. Препарат якої групи приймав хворий?

*** А) Тетрацикліни**

- В) Пеніциліни
- С) Цефалоспорини
- Д) Макроліти
- Е) Аміноглікозиди

62. Що таке агоніст рецептора?

*** А) Речовина, яка зв'язується з рецептором і стимулює його**

В) Речовина, яка взаємодіє з природним лігандом рецептора

С) Речовина, яка блокує рецептор

Д) Речовина, яка викликає руйнування рецептора

Е) Речовина, яка не впливає на рецептор

63. Перед проведенням інфільтраційної анестезії хворому зробили пробу на чутливість до новокаїну, яка виявилась позитивною. Який з перерахованих препаратів можна використати для місцевої анестезії в даному випадку?

*** А) Лідокаїн**

В) Новокаїнамід

С) Морфін

Д) Анальгін

Е) Димедрол

64. До лікаря звернувся юнак із скаргами на біль в серці. Виявилося, що він полюбляє каву і вживає в день до 8 склянок цього міцного напою. Чому кофеїн, який міститься у каві, може погіршувати серцеву діяльність?

*** А) Викликає тахікардію, збільшує потребу міокарда в кисні**

В) Послаблює силу серцевих скорочень

С) Уповільнює провідність в серці

Д) Викликає звуження коронарних судин

Е) Порушує ритм серцевих скорочень

65. До приймального відділення лікарні доставлено людину з гострим отруєнням морфіном. Який специфічний антагоніст наркотичних анальгетиків необхідно застосувати в цьому випадку?

*** А) Налоксон**

В) Парацетамол

С) Мета цин

Д) Дигоксин

Е) Унітіол

66. Сердечные гликозиды уменьшают активность калий-натриевого насоса. Как при этом изменяется возбудимость сердечной мышцы ?

*** А) Уменьшается**

В) Увеличивается

С) Не изменяется

Д) Значительно увеличивается

Е) Исчезает

67. При использовании местных анестетиков в ротовой полости наблюдается сохранение тактильной чувствительности и исчезновение болевой. Какой из нижеперечисленных механизмов объясняет это явление ?

*** А) Повышение болевого порога, снижение порога к механическим стимулам**

В) Повышение болевого порога и порога механического раздражения

С) Снижение болевого порога, повышение порога механического раздражения

Д) Повышение болевого порога, неизменность порога механического раздражения

Е) Снижение болевого порога и порога механического раздражения

68. До пологового будинку поступила вагітна жінка зі слабкими пологовими потугами. Який препарат гормональної дії треба призначити для підсилення пологової діяльності?

*** А) Окситоцин**

- В) Ергометрин
- С) Прозерин
- Д) Хінін
- Е) Кальцію хлорид

69. У дитини спостерігається ксерофтальмія, сухість шкіри, лущення. Який вітамінний засіб треба призначити?

*** А) Ретінолу ацетат**

- В) Ергокальциферол
- С) Токоферолу ацетат
- Д) Вікасол
- Е) Ціанокоболамін

70. У хворого на стенокардію з'явилася біль у серці. Який засіб треба призначити для швидкої допомоги?

*** А) Нітрогліцерин**

- В) Панангін
- С) Дипіридамоп
- Д) Калію хлорид
- Е) Рибоксин

71. У хворого схильність до кровотечі, лікар за тиждень перед видаленням зуба призначив засіб, щоб уникнути кровотечі. Який це засіб?

*** А) Вікасол**

- В) Гепарин
- С) Ціанокоболамін
- Д) Неодикумарин
- Е) Синкумар

72. У хворого на хронічну серцеву недостатність після тривалого лікування виникли ознаки токсичної дії серцевих глікозидів. Яке явище викликає це ускладнення?

*** А) Кумуляція**

- В) Лікарська залежність
- С) Сумація
- Д) Антагонізм
- Е) Синергізм

73. Хворому з набряками призначено K^+ -зберігаючий діуретик - антагоніст альдостерону. Визначте цей препарат.

*** А) Спіронолактон**

- В) Дигоксин
- С) Новокаїнамід
- Д) Клофелін
- Е) Алопуринол

74. В реанімаційне відділення надійшов хворий з отруєнням важким металом. Який антидот буде найбільш ефективним в даному випадку?

*** А) Унітіол**

В) Налоксон

С) Атропін

Д) Прозерин

Е) Алоксим

75. Хворому на остеомієліт нижньої щелепи був призначений антибіотик терациклінової групи. Вкажіть цей препарат.

*** А) Доксидикліну гідрохлорид**

В) Рифампіцин

С) Стрептоміцин

Д) Оксацилін

Е) Амікацин

76. Стоматолог, оглядаючи хворого, звернув увагу на надмірне слюновиділення. Лікар застосував препарат, що спричиняє сухість в ротовій порожнині. Вкажіть цей препарат

*** А) Атропін**

В) Фентоламін

С) Пілокарпін

Д) Прозерин

Е) Галантамін

77. Хворому на паркінсонізм необхідно призначити препарат, який є попередником допамина. Це має бути:

*** А) Ліводопа**

В) Циклодол

С) Аміназин

Д) Фенобарбітал

Е) Нітразепам

78. Хворому на стоматит лікар призначив полоскання ротової порожнини. Який антисептик з групи окислювачів найбільш придатний для цього?

*** А) Калію перманганат**

В) Борна кислота

С) Розчин йоду спиртовий

Д) Сипрт етиловий

Е) Хлорамін

79. Вкажіть вітамін, який призначають для профілактики і лікування карієсу, стимуляції процесів загоювання кісток щелепи при їх переломі.

*** А) Кальциферол**

В) Токоферол

С) Рутин

Д) Рибофлавін

Е) Ретинол

80. Хвора М., 40 р., звернулась на прийом до стоматолога. Перед цим пацієнтка тривалий час вживала антибіотики широкого спектру дії. Після проведеного обстеження лікар виставив діагноз: кандидомікоз слизової оболонки рота. Який засіб показаний у даному випадку?

*** А) Ітраконазол**

В) Грізеофульвін

С) Амоксицилін

Д) Сульфален

Е) Гентаміцин