

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нормальна анатомія - база тестів 2006 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2006 року**

Кількість запитань: **195**

1. У хворого виявлено ваду тристулкового клапана. Визначте місце його розташування.

*** А) Між правим передсердям і правим шлуночком**

В) Між лівим передсердям і шлуночком

С) Устя аорти

Д) Устя легеневого стовбура

Е) Устя вінцевого синуса

2. Під час операції грижосічення в чоловіка хірург пошкодив вміст пахвинного каналу. Визначте його вміст.

*** А) unculus spermaticus**

В) Urachus

С) Lig. teres uteri

Д) Lig. inguinalis

Е) -

3. При УЗД у хворого виявлена аневризма в ділянці дуги аорти, яка привела до зміни голосової функції гортані. Який нерв при цьому передавлено?

*** А) Поворотний гортанний**

В) Діафрагмальний

С) Верхній гортанний

Д) Нижньощелепний

Е) Під'язиковий

4. В лікарню поступив хворий з ножовим пораненням в ділянці сонного трикутника з рясною кровотечею, темного кольору. Яка судина пошкоджена?

*** А) Внутрішня яремна вена**

- В) Зовнішня яремна вена
- С) Внутрішня сонна артерія
- Д) Лицева артерія
- Е) Лицева вена

5. У хворого верхня брова не підіймається вгору, не приймає дугоподібну форму, не утворюються поперечні складки на лобі. Пошкодженням іннервації якого м'яза можна це пояснити?

*** А) Лобне черевце надчереального м'яза**

- В) Потиличне черевце надчереального м'яза
- С) Круговий м'яз ока
- Д) М'яза-зморщувача брови
- Е) М'яз гордіїв

6. Дитина помилково випила розчин оцтової кислоти. Яка з оболонок стравоходу постраждала?

*** А) Слизова**

- В) М'язова
- С) Серозна
- Д) Адвентиціальна
- Е) -

7. В ведділення черепно-мозкової травми потрапив хворий з пошкодженням великого крила клиноподібної кістки. Лінія перелому пройшла через остистий отвір. Яка судина постраждала?

*** A) Середня оболонна артерія**

- B) Поверхнева скронева артерія
- C) Латеральна крилоподібна артерія
- D) Передня глибока скронева артерія
- E) Задня глибока скронева артерія

8. Хворий скаржиться на біль та набряк в ділянці дна порожнини рота. Після огляду діагностовано запальний процес в місці виходу вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Яке анатомічне утворення підлягло запаленню?

*** A) Caruncula sublingualis**

- B) renulum labii superioris
- C) renulum labii inferioris
- D) renulum linguae
- E) -

9. При огляді ротової порожнини дитини стоматолог визначив появу перших постійних нижніх кутніх зубів. Скільки років дитині?

*** A) 6-7**

- B) 4-5
- C) 8-9
- D) 10-11
- E) 12-13

10. Під час рентгенологічного дослідження шлунка в вертикальному положенні лікар описує присутність повітря. В якій частині шлунка він знаходиться?

*** А) Склепінні**

В) Воротарній

С) Тілі

Д) Кардіальній

Е) Ділянці малої кривизни

11. При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність нижніх медіальних різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік.

*** А) 6-7 міс.**

В) 8-9 міс.

С) 10-12 міс.

Д) 13-14 міс

Е) -

12. При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила що прорізалися ікла. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік.

*** А) 14-20 міс.**

В) 8-10 міс.

С) 10-12 міс.

Д) 6-8 міс.

Е) -

13. При огляді порожнини рота пацієнта стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні першого верхнього моляра, яка звернена до другого моляра. Яка поверхня зуба уражена?

- * А) Дистальна**
- В) Мезіальна
- С) Язична
- Д) Жувальна
- Е) Вестибулярна

14. Хворий скаржиться на біль та оніміння у слизовій ясен верхньої щелепи. Які нерви вражені?

- * А) Верхні коміркові нерви**
- В) Нижні коміркові нерви
- С) Величні нерви
- Д) Вузлові нерви
- Е) Підчонамкові нерви

15. При огляді порожнини рота пацієнта стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні другого моляра, яка звернена до першого моляра. Визначте уражену поверхню коронки.

- * А) acies mesialis**
- В) acies distalis
- С) acies lingualis
- Д) acies vestibularis
- Е) acies occusialis

16. У хворого вилучений зуб, у якого коронка овальної форми, на жувальній поверхні два горбки. Корінь сильно здавлений у мезіо-дистальному напрямку, його верхівка роздвоєна. Визначите який зуб вилучений.

*** А) Перший верхній премоляр**

- В) Перший нижній премоляр
- С) Ікло
- Д) Другий верхній премоляр
- Е) Другий нижній премоляр

17. Хворий вилучений зуб. Коронка зуба має ромбоподібну форму, на жувальній поверхні чотири горбки, він має три корені. Визначите який зуб вилучений.

*** А) Перший верхній моляр**

- В) Перший нижній моляр
- С) Другий верхній моляр
- Д) Третій верхній моляр
- Е) Другий нижній моляр

18. При видаленні зуба руйнують зв'язки між цементом та зубною альвеолою. Визначте цю структуру

*** А) Периодонт**

- В) Емаль
- С) Дентин
- Д) Цемент
- Е) Десна

19. При огляді порожнини рота стоматологом виявлене запалення тканин, які оточують зуб. Яке анатомічне утворення запалилося?

*** A) Paradontium**

- B) Cementum
- C) Gingiva
- D) Alveola dentalis
- E) Periodontum

20. При Ro-дослідженні гайморових пазух установлене проростання кореня зуба в їхню порожнину. Визначте який зуб міг прорости?

*** A) Верхнє ікло**

- B) Перший верхній премоляр
- C) Другий верхній премоляр
- D) Перший верхній моляр
- E) Другий верхній моляр

21. У хворого порушена больова та температурна чутливість язика. Які сосочки мови уражені?

*** A) Ниткоподібні, конічні**

- B) Листоподібні, грибоподібні
- C) Жолобуваті, ниткоподібні
- D) Конічні, жолобуваті
- E) Грибоподібні, ниткоподібні

22. У хворому 30 років, для підтвердження діагнозу менінгіт потрібно провести спинно-мозкову пункцію. Які оболонки спинного мозку повинні бути пропунктовані для успішного отримання спинно-мозкової рідини?

*** А) Тверда і павутина**

В) Тверда і м'яка

С) Тверда

Д) Павутина

Е) М'яка

23. Хворого госпіталізовано до лікарні з пошкодження шийних сегментів спинного мозку. Скільки сегментів має цей відділ спинного мозку?

*** А) 8**

В) 7

С) 5

Д) 12

Е) 2

24. У хворої 60 років діагностовано крововилив в задні роги спинного мозку. Якими, по функції, є задні роги?

*** А) Чутливими**

В) Руховими

С) Симпатичними

Д) Парасимпатичними

Е) Змішаними

25. Хворого звернувся до поліклініки зі скаргами на порушення адаптація зору. Що відповідає за адаптацію?

*** А) Райдужка**

- В) Кришталик
- С) Склоподібне тіло
- Д) Передні камера ока
- Е) Задня камера ока

26. Хворого, звернувся до лікаря зі скаргами на порушено відчуття рівноваги, що з'явилося після травми. Який нерв пошкоджено?

*** А) Присінково-завитковий**

- В) Трійчастий
- С) Лицевий
- Д) Проміжний
- Е) Блукаючий

27. У хворого пухлина кореня язика з враженням жолобуватих сосочків. Відчуття якого смаку буде відсутнє у хворого?

*** А) Гірке**

- В) Солоне
- С) Солодке
- Д) Кисле
- Е) Температурне

28. Хворий 45 років госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з тім'яної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?

*** А) Тім'яний отвір**

- В) Мищелковий канал
- С) Соскоподібний отвір
- Д) Остистий отвір
- Е) Овальний отвір

29. Хворий 45 років госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з ділянки позаду вушної раковини в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?

*** А) Соскоподібний отвір**

- В) Тім'яний отвір
- С) Мищелковий канал
- Д) Остистий отвір
- Е) Овальний отвір

30. Хвору прооперовано з приводу стегнової кили. Де проежуються вихідні ворота для цієї кили?

*** А) Стегновий трикутник**

- В) Стегновий канал
- С) Пахвинна ділянка
- Д) Лобкова ділянка
- Е) Сіднична ділянка

31. Внаслідок травми у хворого спостерігається порушення функції слізної залози. Який нерв забезпечує її секрецію?

- * A) N. petrosus major**
- B) N. petrosus minor
- C) N. petrosus profundus
- D) N. auricularis minor
- E) N. auricularis major

32. Хворого оперують з приводу травми печінки та крововиливом в передшлункову сумку. Що є границею, та попереджує проникнення крові до печінкової сумки?

- * A) Серпоподібна зв'язка**
- B) Кругла зв'язка
- C) Вінцева зв'язка
- D) Права трикутна зв'язка
- E) Ліва трикутна зв'язка

33. Хворого госпіталізовано з приводу внутрішньої кровотечі в наслідок падіння та надриву зв'язки, що фіксує печінку до діафрагми. Що це за зв'язка?

- * A) Вінцева зв'язка**
- B) Кругла зв'язка
- C) Серпоподібна зв'язка
- D) Трикутна зв'язка
- E) Печінково-шлункова зв'язка

34. Хлопчика 3 років госпіталізовано с запаленням середнього вуха, що почалося після перенесеного назо-фаренгиту. Крізь яке утворення інфекція могла потрапити з глотки до барабанної порожнини?

*** А) Слухову трубу**

- В) Зовнішній слуховий прохід
- С) Внутрішній слуховий прохід
- Д) Соскоподібну печеру
- Е) Внутрішнє вухо

35. При обстеженні хворого 65 років виявлено погіршення кровопостачання переднього відділу міжшлуночкової перегородки серця. Яка артерія погано функціонує?

*** А) Передня міжшлуночкова**

- В) Задня міжшлуночкова
- С) Права вінцева
- Д) Ліва вінцева
- Е) Огинаюча

36. Внаслідок травми у хворого спостерігається порушення функції привушної слинної залози. Який нерв забезпечує її секрецію?

*** А) N. petrosus minor**

- В) N. petrosus major
- С) N. petrosus profundus
- Д) N. auricularis minor
- Е) N. auricularis major

37. У хворого з абсцесом правого крилоподібного - щелепного простору з'явилися набряк, покрасіння та болі в ділянці правої щоки. Куди розповсюдився гнійний процес?

*** А) Жирове тіло щоки.**

- В) Міжапоневротичний простір.
- С) Жувально-нижньощелепний простір.
- Д) Крилоподібно-піднебінна ямка.
- Е) Простір привушної залози.

38. В щелепно-лицьове відділення потрапив хворий зі скаргами на тризм, глибоку припухлість в висковій ділянці. Де вірогідніше всього сформується абсцес?

*** А) Між скроневим м'язом та окістям скроневої кістки.**

- В) Між поверхневим та глибоким листками скроневої фасції.
- С) Між поверхневим листком фасції та скроневим м'язом.
- Д) Між скроневим м'язом та шкірою.
- Е) В міжапоневротичному просторі.

39. Хворий потрапив до щелепно-лицьового відділення з переломом виличної дуги. При цьому спостерігається затруднене закривання рота. Порушення функції якого м'язу привело до цього?

*** А) Жувального м'язу.**

- В) При середнього крилоподібного.
- С) Бічного крилоподібного.
- Д) Двочеревцевого.
- Е) Виличного.

40. Для оперативного доступу до нижнє щелепної залози лікар виконав розріз біля краю нижньої щелепи, відступив від нього на 1 см. Для попередження пошкодження якої судини це зроблено?

*** A) Submentalіs.**

- B) mentalis.
- C) lingualis.
- D) acialis.
- E) labialis inferior.

41. Для видалення 27 зуба лікар стоматолог виконав туберальну анестезію. Через день у хворого виникла гематома м'яких тканин в привушно-жувальній ділянці. Які судини було ушкоджено?

*** A) Plexus pterygoideus sinister.**

- B) Vena acialis sinistra.
- C) Vena retromandibularis dextra.
- D) Plexus pterygoideus dexter.
- E) Vena acialis dextra.

42. Хворого 17 років, після автомобільної аварії госпіталізовано з масивною кровотечею з м'яких тканин обличчя. Яку артерію треба притиснути щоб зупинити кровотечу?

*** A) Лицеву артерію.**

- B) Язикову артерію.
- C) Зовнішню сонну артерію.
- D) Загальну сонну артерію.
- E) Внутрішню сонну артерію.

43. Хворому М. 48 років з діагнозом: Змішана пухлина привушної залози, для визначення ступеню враження була проведена контрастна рентгенографія. Як називається такий метод дослідження слинних залоз?

*** А) Сіалографія.**

В) Спірографія.

С) Сальпінгографія.

Д) Сканування.

Е) Сфігмографія.

44. Нейрохірург при плануванні оперативного втручання визначив індекс мозкового черепу. Який тип черепу визначається при показнику 85.0?

*** А) Брахікранія.**

В) Доліхокранія.

С) Лізокранія.

Д) Клиноподібний череп.

Е) Човникподібний череп.

45. До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на різку біль та припухлість в ділянці щоки тільки під час прийому їжі. Яке захворювання є причиною цього?

*** А) Конкремент в загальній протоці привушної залози.**

В) Глибокий карієс другого верхнього моляру.

С) Периодонтит другого нижнього моляру.

Д) Невралгія третьої гілки трійчастого нерву.

Е) Перикоронарит третього нижнього моляру.

46. До лікаря звернувся хворий у якого один бік обличчя нерухомий, око не заплющується, кут рота опущений, витікає слина. Який нерв уражений?

*** А) Лицевий нерв.**

В) Проміжний нерв.

С) Під'язиковий нерв.

Д) Друга гілка трійчастого нерва.

Е) Перша гілка трійчастого нерва.

47. До лікаря звернувся хворий у якого один бік обличчя нерухомий, око не заплющується, кут рота опущений, витікає слина. Який нерв уражений?

*** А) Лицевий нерв.**

В) Проміжний нерв.

С) Під'язиковий нерв.

Д) Друга гілка трійчастого нерва.

Е) Перша гілка трійчастого нерва.

48. Хворий скаржиться на порушення сприймання смаку на корінь язика, розладнання акту ковтання і зниження секреції привушної залози. Який нерв вірогідніше всього вражений?

*** А) Язикоглотковий нерв.**

В) Проміжний нерв.

С) Язиковий нерв.

Д) Під'язиковий нерв.

Е) Блукаючий нерв.

49. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на сухість ока, порожнини носа і рота. Пошкодження яких анатомічних утворів може привести до цього?

*** А) Крило піднебінний та вушний вузли.**

- В) Верхній шийний симпатичний вузол.
- С) Трійчастий нерв.
- Д) Лицьовий нерв.
- Е) Блукаючий нерв.

50. В стоматологічне відділення швидка допомога доставила хворого з переломом нижньої щелепи, що привело до западіння кореня язика та розвитку асфіксії. Дія якого м'язу може привести до цього?

*** А) Під'язиково-язикового м'язу.**

- В) Підборідно-язикового м'язу.
- С) Двочеревцевого м'язу.
- Д) Щелепно-під'язикового м'язу.
- Е) Власних м'язів язика.

51. У хворого після проведення мандибулярної анестезії спостерігається Звисання і неможливість підняття нижньої щелепи. Що стало причиною цього?

*** А) Блокада рухових гілок нижньощелепного нерву.**

- В) Пошкодження нижнього альвеолярного нерву.
- С) Гематома.
- Д) Травма окістя нижньої щелепи.
- Е) Відломок ін'єкційної голки.

52. Хворому Р. 57 років при видаленні нижнього моляру була проведена мандібулярна анестезія. Зникнення чутливості нижньої щелепи не відбулося. Яке анатомічне утворення нижньої щелепи стало на заваді проникнення анестетика в нерв?

*** А) Язичок нижньої щелепи.**

В) Коса лінія нижньої щелепи.

С) Нижньощелепний валок.

Д) Гілка нижньої щелепи.

Е) Гребінець щічного м'язу.

53. У хворого Н. 30 років після видалення нижнього першого премоляру виникла кровотеча у комірки. Яка артерія зумовила кровотечу?

*** А) Нижня коміркова артерія.**

В) Підборідна артерія.

С) Поперечна артерія обличчя.

Д) Язикова артерія.

Е) Щічна артерія.

54. Хворого К. 27 років доставлено в лікарню з рваною раною язика. Яку артерію і в якому топографічному утворенні треба перев'язати щоб зупинити кровотечу?

*** А) Язикову артерію в трикутнику Пирогова.**

В) Загальну сонну в сонному трикутнику.

С) Підборідну артерію в місці виходу.

Д) Внутрішню сонну в сонному трикутнику.

Е) Зовнішню сонну в сонному трикутнику.

55. У хворого П. 40 років, після видалення верхнього лівого присереднього різця виникла кровотеча з комірки. Яка артерія зумовила кровотечу?

*** А) Передня верхня коміркова артерія.**

- В) Задня верхня коміркова артерія.
- С) Висхідна піднебінна артерія.
- Д) Низхідна піднебінна артерія.
- Е) Нижня коміркова артерія.

56. Лікар діагностував гнійно запальний процес в крило-піднебінній ямці. В яку анатомічну ділянку розповсюдження гнійної інфекції найменш вірогідне?

*** А) Порожнину середнього вуха.**

- В) Орбіту.
- С) Порожнину носа.
- Д) Ротову порожнину.
- Е) Середню черепну ямку.

57. На прийом до лікаря прийшов хворий високого росту, з відвислою нижньою губою і великим носом, та з великими кінцівками. Підвищення секреції якої залози можна запідозрити у цього хворого?

*** А) Передньої долі гіпофіза**

- В) Прищитоподібної залози
- С) Епіфіза
- Д) Щитоподібної залози
- Е) Задньої долі гіпофіза

58. При обстеженні хворого з черепно-мозковою травмою виявилося порушення здатності писати слова. Які кіркові ядра пошкоджені?

*** А) Ядро рухового аналізатора письмової мови**

- В) Ядро зорового аналізатора письмової мови
- С) Ядро рухового аналізатора артикуляції мови
- Д) Ядро слухового аналізатора усної мови
- Е) Ядро рухового аналізатора

59. Хворому чоловіку під час операції хірург випадково перерізав частковий бронх, який проводить повітря у верхню частку правої легені. У які сегменти не поступає повітря?

*** А) Верхівковий, задній, передній**

- В) При середній основний та передній основний
- С) Бічний та присередній
- Д) Задній основний та бічний основний
- Е) Верхівковий та нижній язичкові

60. У жінки запалення плеври. В плевральних пазухах накопичилась патологічна рідина. Хірург для покращення стану хворої вирішив виконати плевральну пункцію. Виберіть ділянку пункції.

*** А) Між 8-9 ребром по лопатковій лінії**

- В) Між 7-8 ребром по середньо ключичній лінії
- С) Між 6-7 ребром по передній серединній лінії
- Д) Між 5-6 ребром по при хребтовій лінії
- Е) Між 9-10 ребром по передній пахвовій лінії

61. У жінки пухлина гортані. При огляді лікар помітив, що вона випинає в порожнину гортані під складками присінка. Назвіть в якій частині порожнини гортані виявили пухлину?

*** А) Присінку**

- В) Входу до гортані
- С) Голосниковій
- Д) Підголосниковій
- Е) Шлуночка

62. Під час обстеження чоловіка 40 років лікар помітив пухлину на голосовій складці. В яку частину голосової щілини вона буде випинати?

*** А) Міжперетинкову**

- В) Міжм'язову
- С) Між хрящову
- Д) Між фіброзну
- Е) Середню

63. У жінки 52 років під впливом хіміотерапії, в загальному аналізі крові виявлено зменшення всіх формених елементів крові (панцитопенія). Який орган переважно постраждав від хіміотерапевтичних препаратів?

*** А) Червоний кістковий мозок**

- В) Селезінка
- С) Печінка
- Д) Жовтий кістковий мозок
- Е) Вилочкова залоза

64. Перед оперативним втручанням лікар замислився. Які нерви можна пошкодити при операції на пазусі верхньої щелепи ?

*** А) Верхні коміркові нерви**

- В) Нижні коміркові нерви
- С) Величні нерви
- Д) Вузлові нерви
- Е) Підочноямкові нерви

65. У хворого 42 років має місце гнійний запальний процес в ділянці стегна (післяін'єкційний абсцес). Які лімфатичні вузли будуть збільшені внаслідок цього процесу?

*** А) Поверхневі та глибові пахові**

- В) Підколінні
- С) Задні шийні
- Д) Паратрахеальні
- Е) Під нижньощелепні

66. При оперативному втручанні внаслідок злоякісного пухлинного процесу II стадії молочної залози видаляють не тільки залозу, а й регіонарні лімфатичні вузли. Яку мету переслідують хірурги роблячи операцію в такому обсязі?

*** А) Зменшити ризик розповсюдження злоякісної пухлини**

- В) Покращити загальний стан хворої
- С) Ніякої мети немає
- Д) Зменшити об'єм пухлини
- Е) Зменшити кількість лімфовузлів

67. До лікарні надійшла дитина 4 років зі стороннім тілом у дихальних шляхах. У який бронх найбільш імовірно потрапляння стороннього тіла, якщо його діаметр приблизно 1,5 см?

*** А) У правий головний бронх**

В) У частковий бронх

С) У лівий головний бронх

Д) У лівий сегментарний бронх

Е) У правий сегментарний бронх

68. Під час обстеження хворого похилого віку було встановлено діагноз—блукаюча нирка. Зміни якої структури нирки найімовірніше призводять до цього стану?

*** А) ascia renalis**

В) Corpus adiposum pararenale

С) Sinus renalis

Д) Hilus renalis

Е) Ureter

69. Після оперативного втручання на органах малого тазу жінки з приводу кровотечі виникла олігурія та біль у поперековій ділянці справа. Що з матковою артерією хірург перев'язав випадково?

*** А) Правий сечовід**

В) Праву маткову трубу

С) Круглу зв'язку матки

Д) Лівий сечовід

Е) Внутрішню клубову вену

70. У жінки діагностоване запалення жирової клітковини між листками широкої зв'язки матки. Дайте визначення цього утворення.

*** А) Параметрій**

В) Периметрій

С) Міометрій

Д) Ендометрій

Е) Передміхуровий простір

71. Лікар аналізує рентгенограму серця. Патологія знайдена по правому контуру серцево-судинної тіні. Які відділи серця її утворюють

*** А) Праве передсердя та правий шлуночок**

В) Легенева артерія та праве передсердя

С) Легенева артерія та правий шлуночок

Д) Висхідна аорта та праве передсердя

Е) Висхідна аорта та правий шлуночок

72. У хворого інфаркт міокарда задньої стінки правого шлуночка, гілки якої артерії тромбовані?

*** А) Правої коронарної артерії**

В) Лівої коронарної артерії

С) Лівої та правої коронарної артерії

Д) Правої підключичної артерії

Е) Лівої підключичної артерії

73. При виконанні оперативного втручання на діафрагмі ротової порожнини, хірургу необхідно виділити ділянку, що має назву трикутника Пірогова. Яка структура займає його площу?

*** A) M. hyoglossus**

B) M. stylohyoideus

C) M. geniohyoideus

D) M. digastricus

E) M. hypoglossus

74. При втручанні з метою лікування вивіху нижньої щелепи, лікар повинен пам'ятати про дію м'язу, задні пучки якого тягнуть назад висунуту нижню щелепу. Про який з м'язів йде мова?

*** A) M. temporalis**

B) M. masseter

C) M. pterygoideus medialis

D) M. pterygoideus lateralis

E) M. mylohyoideus

75. У хворого з клінікою порушення функції спинного мозку на рівні VI-VII грудних сегментів необхідне оперативне втручання. Де згідно правила "скелетотопії сегментів" розташовані вони?

*** A) На рівні IV-V грудних хребців**

B) На рівні VII-X грудних хребців

C) На рівні XI-XII грудних хребців

D) На рівні XII грудного - I поперекового хребця

E) На рівні I-II поперекових хребців

76. У хворого 49 років спостерігається ушкодження білої речовини спинного мозку в межах латеральної частини заднього канатику, а також клініку порушення пропріоцептивної чутливості від суглобів та м'язі верхньої кінцівки. Волокна якого з провідних шляхів утворюють латеральний відділ заднього канатику?

*** A) asciculus cuneatus tr.bulbothamici**

- B) Tr. spinothalamicus lateralis
- C) Tr. spinocerebellaris anterior
- D) Tr. spinocerebellaris posterior
- E) asciculus gracilis tr.bulbothamici

77. У хворого на інсульт спостерігається гематома та порушення структури кінцевої частини задньої ніжки внутрішньої капсули. Які з провідних шляхів у нормі там проходять?

*** A) Radiatio acustica et optica**

- B) ibrae corticonuclearis
- C) ibrae corticospinalis
- D) ibrae parietopontinae
- E) ibrae occipitopontinae

78. При проведенні томографії у пацієнта 48 років було виявлено пухлину, що локалізується в присередньому відділі основи ніжки мозку. Волокна якого провідного шляху в нормі локалізовані в цієї ділянці?

*** A) Tr. rontopontinus**

- B) Tr. pyramidalis
- C) Tr. occipitotemporoparietopontinus
- D) Tr. rubrospinalis
- E) Tr. tectospinalis

79. При обстеженні хворого 54 років було встановлено пухлину внутрішньої будови мосту мозку на рівні формування *trabeculae pontis transversae*. Якому з провідних шляхів мозку вони належать?

*** A) Tr. corticopontocerebellaris**

B) Tr. Pyramidalis

C) Tr. spinocerebellaris anterior

D) Tr. rubrospinalis

E) Tr. Tectospinalis

80. У хворой жінки 70 років було встановлено наявність пухлини на межі покриву середнього мозку та основи ніжок. Яка з внутрішніх структур середнього мозку розташована в цій ділянці?

*** A) Substantia nigra**

B) Nucleus ruber

C) Tr. rontopontinus

D) Lemniscus medialis

E) Tr. reticulospinalis

81. До лікарні поступив хворий з підозрою на крововилив у ділянку мозку. При томографічному обстеженні було встановлено ушкодження ділянки, що має назву (*trigonum lemnisci*). Якому з провідних шляхів належить ця ділянка?

*** A) Слуховому шляху**

B) Зоровому шляху

C) Tr. rontopontinus

D) Tr. Tectospinalis

E) Tr. Reticulospinalis

82. У хворого 52 років при томографічному обстеженні було виявлено пухлину в покривній частині мосту з ушкодженням волокон медіальної петлі. Якому з провідних шляхів мозку вони належать?

*** A) Tr. bulbothamicus**

- B) Tr. rubrospinalis
- C) Tr. rontopontinus
- D) Tr. tectospinalis
- E) Tr. reticulospinalis

83. У хворого 27 років при обстеженні було виявлено зміну секреторної функції привушної слинної залози, що пов'язане з порушеннями її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає після- вузлові парасимпатичні волокна для неї?

*** A) Ganglion oticum**

- B) Ganglion ciliare
- C) Ganglion pterygopalatinum
- D) Ganglion submandibulare
- E) Ganglion parotideum

84. У хворого 32 років при обстеженні слюзового апарату було встановлено зміни секреторної функції слюзової залози, що пов'язано з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?

*** A) Ganglion pterygopalatinum**

- B) Ganglion ciliare
- C) Ganglion oticum
- D) Ganglion submandibulare
- E) Ganglion parotideum

85. Лікарю необхідно знеболити передній відділ слизової оболонки твердого піднебіння. Блокаду яких нервів йому потрібно зробити?

*** A) Носо-піднебінних нервів**

- B) Верхніх коміркових нервів
- C) Величних нервів
- D) Глоткових нервів
- E) Підчонамкових нервів

86. У хворого 33 років виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який з нервів несе волокна вегетативної іннервації до неї і в складі якого з більш крупних?

*** A) Chorda tympani у складі n. lingualis**

- B) N. auriculotemporalis у складі n. mandibularis
- C) N. mandibularis у складі n. lingualis
- D) N. petrosus major у складі n. acialis
- E) N. petrosus minor у складі n. tympanicus

87. У хворого з остеомієлітом верхньої щелепи виявлено ознаки пошкодження plexus dentalis superior та порушення іннервації зубів верхньої щелепи. Гілками якого з нервів утворено це сплетіння?

*** A) N. in raorbitalis**

- B) N. dentalis superior
- C) N. mandibularis
- D) N. buccalis
- E) N. acialis

88. Во время прохождения медкомиссии у пациента 25 лет был выявлен патологически тип грудной клетки. При этом поперечные размеры были уменьшены, а грудина сильно выступала вперед. Определите тип грудной клетки.

*** А) Килевидная грудная клетка**

В) Воронкообразная грудная клетка

С) Плоская грудная клетка

Д) Цилиндрическая грудная клетка

Е) Бочкообразная грудная клетка

89. У хворого 32 років при обстеженні було встановлено зміни секреторної функції залоз носової порожнини, що пов'язано з порушенням функції її вегетативного вузла. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна до них?

*** А) Ganglion pterygopalatinum**

В) Ganglion ciliare

С) Ganglion oticum

Д) Ganglion submandibulare

Е) Ganglion nasale

90. Во время рентгенографического исследования верхних больших коренных зубов, особенно третьих, у пациентов часто возникает рвотный рефлекс. Какие анатомические структуры раздражает рентгеновская пленка, вызывая рвотный рефлекс?

*** А) Небную зановеску**

В) Десны

С) Язык

Д) Небные миндалины

Е) Заднюю стенку глотки

91. У пациента 64 лет во время рентгенографии 17-го зуба возник рвотный рефлекс и снимок получился нечетким. Рефлекс возник в результате раздражения рентгеновской пленкой мягкого неба. Какие черепные нервы были вовлечены в этот процесс?

*** A) 9 и 10**

B) 8 и 9

C) 7 и 9

D) 5 и 7

E) 6 и 10

92. Пациенту 27 лет хирург-стоматолог удалил нижний левый второй моляр. Укажите номер зуба по классификации ВОЗ.

*** A) 36**

B) 26

C) 15

D) 72

E) 63

93. Пациенту 5 лет, хирург-стоматолог удалил правый нижний боковой резец. Укажите номер зуба по классификации ВОЗ.

*** A) 82**

B) 42

C) 52

D) 24

E) 22

94. Мать 6-ти месячного ребенка обратилась к педиатру с жалобой на беспокойное поведение и плач. Врач, осмотрев ребенка, объяснил, что у него началось прорезывание зубов. Укажите, какие молочные зубы, по классификации ВОЗ, обычно прорезываются первыми?

*** А) 71 и 81**

В) 31 и 41

С) 72 и 82

Д) 71 и 72

Е) 12 и 13

95. У ребенка 6 лет началась смена молочных зубов на постоянные. Укажите, какие постоянные зубы обычно прорезываются первыми?

*** А) Нижние первые моляры**

В) Нижние первые премоляры

С) Верхние первые премоляры

Д) Верхние медиальные резцы

Е) Нижние клыки

96. Пациент 20 лет обратился к стоматологу с жалобами на боли в области задних зубов верхней челюсти. После осмотра врач объяснил пациенту, что у него прорезываются зубы “мудрости”. Укажите эти зубы по классификации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

*** А) 18 и 28**

В) 38 и 48

С) 28 и 38

Д) 18 и 48

Е) 81 и 82

97. Во время профилактического осмотра стоматолог обнаружил, что у пациента 28 лет удален верхний правый латеральный резец, а в антимере этого зуба имеется кариозная полость. Назовите, какой зуб нуждается в лечении?

*** А) Верхний левый латеральный резец**

- В) Нижний левый латеральный резец
- С) Нижний правый латеральный резец
- Д) Верхний правый латеральный резец
- Е) Верхний правый медиальный резец

98. На приеме стоматолог обнаружил у пациента 36 лет кариозные полости на передних зубах, которые не имеют добавочных антогонистов. Назовите, какие это зубы.

*** А) Нижние медиальные резцы**

- В) Нижние медиальные резцы
- С) Верхние латеральные резцы
- Д) Верхние медиальные резцы
- Е) Верхние клыки

99. Пациент 54 лет обратился к ортопеду-стоматологу по поводу протезирования задних зубов. Врач определил, что в протезировании нуждаются зубы не имеющие добавочных антогонистов. Определите какие это зубы.

*** А) Верхние третьи моляры**

- В) Нижние третьи моляры
- С) Нижние вторые моляры
- Д) Верхние вторые моляры
- Е) Нижние первые моляры

100. Через несколько лет после удаления нескольких больных зубов пациент 49 лет обратился к стоматологу по поводу протезирования. При осмотре врач не отметил стоматологической патологии со стороны санированной ротовой полости. Однако он обратил внимание, что некоторые зубы выступают из зубного ряда и у них увеличена высота клинической коронки. Назовите причину.

*** А) Отсутствие контакта с зубами-антагонистами**

- В) Уменьшение промежутков между зубами
- С) Увеличение промежутков между зубами
- Д) Ретенция зубов
- Е) Пульпит

101. В нефрологическое отделение обратился больной 53 лет с жалобами на боли в области левой почки. Проведя клинические и лабораторные исследования врач определил воспаление внутрипочечных мочевыводящих путей.

*** А) Почечная лоханка**

- В) Почечное тельце
- С) Прямые мочевые канальцы
- Д) Извитые мочевые канальцы
- Е) Извитые мочевые канальцы

102. В нефрологическое отделение обратился пациент 48 лет с жалобами на боли и тяжесть в области правой почки. В результате обследования врач предположил, что в патологический процесс вовлечены структуры нефронов. Определите эти структуры.

*** А) Прямые мочевые канальцы**

- В) Собирательные трубочки
- С) Междольковые артерии и вены.
- Д) Сосочковые протоки
- Е) Форникальный аппарат

103. В клинику скорой помощи поступил больной с ножевым ранением левой поясничной области. В ходе операции хирург установил, что внутренние органы не повреждены, но лезвие ножа повредило одну из мышц почечного ложа. Назовите эту мышцу.

*** А) Большая поясничная мышца**

- В) Малая поясничная мышца
- С) Выпрямитель позвоночника
- Д) Внутренняя косая мышца живота.
- Е) Наружная косая мышца живота

104. У женщины 53 лет острый панкреатит. Врач обнаружил, что заболевание вызвало нарушение кровоснабжения отделов тонкой кишки и большей части толстой кишки. Сдавление каких сосудов могло вызвать такие нарушения ?

*** А) Верхних брыжеечных**

- В) Нижних брыжеечных
- С) Позвоночных
- Д) Поджелудочных
- Е) Селезеночных

105. Ребенок 5 лет во время игры получил удар в область рукоятки грудины. В результате травмы пострадал орган, находящийся за рукояткой грудины. Назовите этот орган.

*** А) Вилочковая железа**

- В) Щитовидная железа
- С) Сердце
- Д) Перикард
- Е) Гортань

106. У больного с хроническим заболеванием почек была диагностирована киста почки. Компьютерная томография выявила, что патологический процесс порастил почечную пирамиду и прилежащий участок коркового вещества почки. Какая структура почки поражена?

- * А) Почечная доля**
- В) Почечный сегмент
- С) Корковая доля
- Д) Почечная ножка
- Е) Почечный синус

107. У пацієнта віком 56 р. діагностовано у задній стінці глотки краніофарингеому. Ця пухлина утворилась залишковими клітинами, що беруть участь в утворенні гіпофіза і виникають з:

- * А) Ектодермального виступа стомодерма**
- В) Виступа проміжного мозку
- С) Залишок ротоглоткової перетинки
- Д) Ентодерми першої глоткової кишені
- Е) Мезодерми головної кишки

108. У пациента при осмотре в клинике был выявлен патологический тип грудной клетки. При этой аномалии мечевидный отросток был сильно смещен кзади, образуя углубление в нижней части передней грудной стенки. Определите тип аномалии.

- * А) Воронкообразная грудная клетка**
- В) Бочкообразная грудная клетка
- С) Килевидная грудная клетка
- Д) Коническая грудная клетка
- Е) Цилиндрическая грудная клетка

109. У пациента при осмотре в клинике был выявлен патологический тип грудной клетки. При этом ребра занимали более горизонтальное положение (в норме около 45 градусов) Передне-задние размеры грудной клетки примерно равны ее поперечному размеру. Определите тип грудной клетки.

*** А) Бочкообразная грудная клетка**

- В) Плоская грудная клетка
- С) Воронкообразная грудная клетка
- Д) Килевидная грудная клетка
- Е) Коническая грудная клетка

110. При травмі голови у постраждалого порушена піраміда скроневої кістки. Лінія перелому пройшла перпендикулярно вісі піраміди, латерально внутрішнього слухового отвору. Який канал скроневої кістки вірогідніше всього порушений?

*** А) Канал лицевого нерва**

- В) М(язово-трубний канал
- С) Барабанний канадець
- Д) Сонний канал
- Е) Каналець барабанної струни

111. При травмі голови у ділянці скроневої кістки виник відрив її луски. Який канал скроневої кістки вірогідніше всього порушений?

*** А) М(язово-трубний канал**

- В) Лицевий канал
- С) Барабанний каналець
- Д) Сонний канал
- Е) Каналець барабанної струни

112. Під час операції на нижній поверхні скроневої кістки хірург може порушити утворення, яке розташоване попереду від яремної ямки. Порушення якого каналу можливе при невдалих рухах хірурга?

*** А) Сонний канал**

- В) Лицевий канал
- С) Барабанний канадець
- Д) М(язово-трубний канал
- Е) Каналець барабанної струни

113. Під час травми голови виникло пошкодження заднього гострого кута великих крил клиноподібної кістки, виникла значна кровотеча. Пошкодження якого отвору клиноподібної кістки призвело до кровотечі?

*** А) Остьового отвору**

- В) Колового отвору
- С) Верхньої очноямкової щілини
- Д) Нижньої очноямкової щілини
- Е) Зоровий канал

114. Яремний отвір розташований на нижній поверхні черепа. Через нього проходять нерви та велика венозна судина. У яку порожнину черепа буде розповсюджена кровотеча, якщо судина буде пошкоджена у ділянці отвору?

*** А) Задня черепна ямка**

- В) Передня черепна ямка
- С) Середня черепна ямка
- Д) Верхня черепна ямка
- Е) Нижня черепна ямка

115. Після тривалих концертів у нетренованого сурмача виникла біль у обох щоках. Напруження якого м(яза призвело до болю?

- * А) Щічного м(яза**
- В) Жувального м(яза
- С) Величного м(яза
- Д) Сконевого м(яза
- Е) Крилоподібного м(яза

116. У хворого після крововилива у мозок порушена рухова іннервація деяких жувальних м(язів , а також постраждало виразне мовлення. Функція якого м(яза постраждала?

- * А) Сконевого м(яза**
- В) Жувального м(яза
- С) Величного м(яза
- Д) Щічного м(яза
- Е) Крилоподібного м(яза

117. При забитті бічної поверхні голови виник перелом величної дуги з частковим порушенням жувального м(яза. Як зміниться акт жування при таких умовах?

- * А) Зменшиться ступінь стискання**
- В) Збільшиться ступінь стискання
- С) Зменшаться бічні рухи нижньої щелепи
- Д) Посиляться бічні рухи нижньої щелепи
- Е) Бічні рухи будуть відсутні

118. При запаленні лицевого нерва виникло стискання поверхневих вен шиї з частковим порушенням мимічних рухів. Який м'яз постраждав?

*** А) Груднино-ключично-соскоподібний м'яз**

- В) Двочерепцевий м'яз
- С) Лопатково-під'язиковий м'яз
- Д) Трапецієподібний м'яз
- Е) Щелепно-під'язиковий

119. При операції на м'яких тканинах шиї з правого боку порушилась регулярна рухова екскурсія правого склепіння діафрагми. Це сталося в результаті пошкодження нерва. Якого?

*** А) Правого діафрагмального**

- В) Лівого діафрагмального
- С) Правого поперечного нерва шиї
- Д) Лівого поперечного нерва шиї
- Е) Надключичного нерва

120. При об'єктивному обстеженні на рентгенограмі чоловіка 45 років виявлені “парадоксальні” рухи діафрагми. Такі порушення пов'язані з відсутністю досконалої іннервації. Порушення якого нерва вірогідніше всього в цьому випадку?

*** А) Діафрагмального нерва**

- В) Великого вушного нерва
- С) Малого вушного нерва
- Д) Поперечного нерва шиї
- Е) Надключичного нерва

121. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини і зовнішнього слухового проходу. Подразнення якого нерва є в даному випадку?

*** А) Великого вушного нерва**

- В) Правого малого потиличного нерва
- С) Великого потиличного нерва
- Д) Лівого малого потиличного нерва
- Е) Надключичного нерва

122. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на підвищену больову чутливість заднього великого та малого прямих м(язів голови (підпотиличних м(язів). Подразнення якого нерва є в даному випадку?

*** А) Підпотиличного нерва**

- В) Правого малого потиличного нерва
- С) Великого потиличного нерва
- Д) Лівого малого потиличного нерва
- Е) Надключичного нерва

123. Після деяких медичних маніпуляцій у хворого знижена чутливість шкіри передньої та бічної ділянки шиї з правого боку. Вкажіть, який нерв постраждав в цьому випадку?

*** А) Правий поперечний нерв шиї**

- В) Лівий поперечний нерв шиї
- С) Надключичний нерв
- Д) Малий потиличний нерв
- Е) Діафрагмальний нерв

124. У хворого пухлина у ділянці верхнього носового ходу. Рецептори якого черепного нерва можуть бути вражені?

*** А) Нюховий нерв**

- В) Зоровий нерв
- С) Відвідний нерв
- Д) Блоковий нерв
- Е) Лицевий нерв

125. Уразі пухлини в ділянці верхніх горбків чотиригорбкової пластинки сталося випадіння реакції зіниці на світло (зіничний рефлекс). Функція якого ядра черепних нервів вірогідніше всього порушена?

*** А) Додаткового ядра окорухового нерва**

- В) Рухового ядра окорухового нерва
- С) Рухового ядра відвідного нерва
- Д) Рухового ядра блокового нерва
- Е) Рухового ядра додаткового нерва

126. Після травми очної ямки у хворого виявлена збіжна косоокість на травмованій стороні. Який черепний нерв пошкоджений?

*** А) Блоковий нерв**

- В) Окоруховий нерв
- С) Відвідний нерв
- Д) Додатковий нерв
- Е) Зоровий нерв

127. При екстирпації бічних часток щитоподібної залози хірург особливу увагу повинен звертати на те, щоб уникнути видалення прищитоподібних залоз. Ці залози розміщені:

*** А) Позаду бічних часток**

- В) Спереду бічних часток
- С) Збоку від бічних часток
- Д) Медіальніше від бічних часток
- Е) позаду перешийка залози

128. Хірург, перетинаючи шлях больової чутливості спинного мозку (хордотомія), використовує зубчасту зв'язку як орієнтир для розтину. Усі твердження, що стосуються цієї зв'язки вірні, крім:

*** А) Вона розмежовує правий та лівий відділи підпавутинного простору**

- В) Вона простягається від м'якої оболонки
- С) Вона утворює 19-23 зубці
- Д) Вона прикріплюється до павутинної та твердої оболонки
- Е) Вона фіксує спинний мозок, запобігаючи його розтягуванню в довжину

129. Після перенесення менінгоенцефаліту у хворої виявлені залишкові явища у вигляді ураження лицевого нерва правого боку.Порушення якої групи м'язів буде при цій патології:

*** А) Мімічних м'язів**

- В) Жувальних м'язів
- С) Підпід'язикових м'язів
- Д) Надпід'язикових м'язів
- Е) Глибких м'язів шиї

130. У хворого після травми голови виникло подразнення певної зони кори головного мозку, що викликало втрату тактильного і температурного відчуття. На яку закрутку подіяло це подразнення?

*** А) Зацентрально**

- В) Кутову
- С) Надкрайову
- Д) Передцентральну
- Е) Поясну

131. У хворого при рентгенологічному - дослідженні з приводу гаймориту виявлено наявність гною у лівій верхньощелепній пазусі. Які шляхи виділення гною з цієї пазухи?

*** А) У лівій середній носовий хід**

- В) У лівий загальний носовий хід
- С) У лівий нижній носовий хід
- Д) У лівий носоглотковий хід
- Е) У лівий верхній носовий хід

132. При оперативному підході до щитоподібної залози з поперечного (комірцевого) доступу відкривається міжапоневротичний надгрудний простір. Ушкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в цьому просторі, є небезпечним?

*** А) Яремної венозної дуги**

- В) Зовнішньої яремної вени
- С) Підключичної вени
- Д) Нижньої щитоподібної артерії
- Е) Верхньої щитоподібної артерії

133. У дитини 8 років госпіталізованої з приводу травми нижньої щелепи у відділення щелепно-лицевої хірургії при рентгенологічному обстеженні виявлено в ділянці підборіддя хрящову перемичку, що сполучає дві симетричні половини нижньої щелепи. У якому віці в нормі зростаються дві половини нижньої щелепи?

*** А) До 1-2 років**

- В) До народження
- С) Протягом перших 3 місяців життя
- Д) До 5 років
- Е) До 18 років

134. При огляді новонародженої дитини педіатр виявив наявність в ротовій порожнині нижніх центральних різців. В якому віці вони прорізаються в нормі?

*** А) В 6 -8 місяців**

- В) До народження
- С) Протягом першого місяця життя
- Д) В 10 - 12 місяців
- Е) До 2 -х років

135. Батьки звернулися до стоматолога з приводу затримки зміни зубів у дитини 9 років, в якій в ротовій порожнині наявні лише молочні зуби. З якого віку починається прорізування постійних зубів(період змінного)?

*** А) 3 5 - 6 років**

- В) 3 2-х років
- С) 3 8 років
- Д) 3 10 - 12 років
- Е) 3 16 років

136. 40 - річна жінка скаржиться на відсутність чутливості підборідної ділянки, нижньої губи, болючість зубів нижньої щелепи, жувальних м'язів. Встановлено діагноз: запалення третьої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?

*** А) Овальний отвір**

- В) Круглий отвір
- С) Остистий отвір
- Д) Яремний отвір
- Е) Рваний отвір

137. У відділення щелепно-лицевої хірургії потрапила жінка з травмою в ділянці гілки нижньої щелепи. Встановлено ушкодження середньої оболонної артерії, з порушенням кровопостачання оболонки головного мозку. Через який отвір вона входить у порожнину черепа?

*** А) Остистий отвір**

- В) Верхня очноямкова щілина
- С) Сонний канал
- Д) Рваний отвір
- Е) Яремний отвір

138. В результаті травми хворий отримав різану рану щоки у вертикальному напрямку в ділянці жувального м'яза, в результаті цієї травми спостерігається порушення функції м'язів. Гілки якого нерва були пошкоджені.?

*** А) Лицевий**

- В) Нижньощелепний
- С) Блукаючий
- Д) Верхньощелепний
- Е) Підязиковий

139. В результаті екстракції другого верхнього великого кутнього зуба зліва у жінки 62 років виник відрив горба верхньої щелепи. що спричинило значну кровотечу. Гілки якої артерії пошкоджені?

*** А) Верхні задні коміркові**

- В) Верхні передні коміркові
- С) Велика піднебінна артерія
- Д) Верхні середні коміркові
- Е) Мала піднебінна артерія

140. При переломі нижньої щелепи в ділянці її кута, спостерігається напружена гематома. В результаті травми якої судини це сталося?

*** А) Нижньої щелепної**

- В) Нижньої коміркової
- С) Язикова артерія
- Д) Лицева артерія
- Е) Внутрішня сонна артерія

141. У хворої 70 р. потрібно провести ампутацію стопи на рівні поперечного суглоба стопи (суглоб Шопара) Яку зв'язку треба пересікти щоб провести дану операцію?

*** А) Роздвоєна зв'язка**

- В) Надп'яtkово- п'яtkова міжкісткова зв'язка
- С) П'яtkова човноподібна підошовна зв'язка
- Д) Надп'яtkово- малогомілкова зв'язка
- Е) П'яtkово -малогомілкова зв'язка

142. У хворого пухлина стовбура головного мозку. У пацієнта спостерігається косоокість, парез м'язів, нижня щелепа опущена донизу, знижена гострота слуха. В якій частині стовбура мозку розташований процес?

*** А) Міст.**

- В) Довгастий мозок.
- С) Середній мозок.
- Д) Мозочок.
- Е) Спинний мозок

143. У хворого порушено виділення секрету слъозовою залозою, що призвело до висихання волокнистої оболонки очного яблука, лікарем встановлено порушення іннервації слъозової залози з боку g. pterigopalatinum. У складі яких нервів секреторні постгангліонарні волокна досягають слъозової залози?

*** А) N.zygomaticus et n. lacrimalis.**

- В) N. zygomaticus et n. supraorbitalis.
- С) Nn. nasales posteriores et n. lacrimalis.
- Д) N. In raorbitalis et n. lacrimalis.
- Е) N. zygomaticus et n. rontalis.

144. Хворому з гайморитом (запалення слизової оболонки верхньощелепної пазухи) проведена пункція цієї пазухи з метою евакуації гною. При цьому виникає біль унаслідок подразнення нерва, що іннервує латеральну стінку носової порожнини. Гілки якого нерва при операції подразнюються?

*** А) N. ethmoidalis anteriores, nn. nasalis posteriores superiores**

- В) N. ethmoidalis posteriores
- С) N. lacrimalis.
- Д) N. mandibularis.
- Е) N. acialis.

145. У хворого на ботулізм порушена секреція слини, сліз, слизу, що призводить до різкої сухості слизових оболонок, чим пояснюються кератити, фарингіти, глосити. Волокна якого парасимпатичного вегетативного вузла іннервують залози носової порожнини, піднебіння, слюзової залози?

*** A) G. pterygopalatinum.**

- B) G. ciliare.
- C) G. sympathicus
- D) G. oticum.
- E) G. trigeminale.

146. У хворого під час інсульту стався розрив а. basilaris, гілки якої кровопостачають міст. Унаслідок цього порушено функцію ядер черепних нервів, що лежать в pars dorsalis pontis. У хворого відсутня чутливість шкіри обличчя, склери, температурна чутливість язика, обличчя амімічне, знижено слух, косоокість. Ядра яких черепних нервів пошкоджені?

*** A) V, VI, VII, VIII**

- B) III, IV, VI, 2 гілка V пари.
- C) III, IV, VI, 3 гілка V пари.
- D) III, IV, VI, VII.
- E) III, IV, VI.

147. У хворого порушено виділення рідини слюзовою залозою в кон'юнктивний мішок, що призвело до висихання волокнистої оболонки очного яблука. Лікарем встановлено порушення іннервації слюзової залози з боку вегетативного вузла, який знаходиться в ossa pterygopalatina. Через який анатомічний утвір гілки цього вузла потрапляють в очну ямку до слюзової залози?

*** A) issura orbitalis in erior**

- B) issura orbitalis superior.
- C) Canalis opticus.
- D) oramen rotundum.
- E) oramen zygomaticoorbitale.

148. У хворого з аневризмою правої підключичної артерії – сиплість голосу. Встановлено, що це обумовлено порушенням функції нерва, який стискується аневризмою. Який нерв стискується аневризмою?

*** A) N. laryngeus recurrens dexter.**

B) N. laryngeus superior dexter.

C) N. laryngeus recurrens sinister.

D) N. laryngeus superior sinister.

E) N. laryngeus inferior sinister.

149. У хворого закупорка вивідних проток слъозової залози, що перешкоджає слъозовій рідині омивати передню поверхню очного яблука, що призводить до запалення склери та болю очного яблука. Який нерв забезпечує іннервацію зовнішньої оболонки очного яблука?

*** A) N. trigeminus.**

B) N. oculomotorius.

C) N. abducens.

D) N. trochlearis.

E) N. opticus.

150. У хворого однобічне слъозовиділення під час їжі (синдром “крокодилових сліз”), пов’язаний з парезом лицевого нерва в барабанній порожнині ішемічного генеза. Подразнення якої гілки VII пари черепних нервів є першоосновою даного синдрому?

*** A) N. petrosus major.**

B) Chorda tympani.

C) N. stapedius.

D) N. petrosus minor.

E) R. buccalis.

151. У хворого встановлено синдром Сладера - невралгія крило-піднебінного вузла: напад болю в ділянці ока, зубів, яка розповсюджується на язик, м'яке піднебіння, ритмічне скорочення м'якого піднебіння (цокаючий звук), парестезії обличчя, шум в усі. Чим утворений radix parasymphathicus g. pterygopalatinum?

*** A) N. petrosus major.**

B) Chorda tympani.

C) N. stapedius.

D) N. petrosus minor.

E) R. buccalis.

152. У хворого встановлено синдром Сладера - невралгія крило-піднебінного вузла: напад болю в ділянці ока, зубів, яка розповсюджується на язик, м'яке піднебіння, ритмічне скорочення м'якого піднебіння (цокаючий звук), парестезії обличчя, шум в усі. Чим утворений radix symphathicus g. pterygopalatinum?

*** A) N. petrosus profundus.**

B) N. petrosus major.

C) Chorda tympani.

D) N. petrosus minor.

E) R. buccalis.

153. У чоловіка, 45 років, з пухлиною щитоподібної залози хірург видалив більшу частину цієї залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається сиплість голосу внаслідок порушення функції м'язів гортані. Встановлено, що під час операції пошкоджено гілку черепного нерва в місці її розташування поблизу задньої поверхні щитоподібної залози. Який нерв пошкоджений?

*** А) Верхній гортанний.**

В) Зворотній гортанний.

С) Підборідний.

Д) Язиковий.

Е) Під'язиковий.

154. У хворого на фоні гнійного гаймориту з'явився тупий біль верхніх малих кутніх зубів. Які нерви подразнюються процесом в sinus maxillae?

*** А) N. alveolaris superiores media.**

В) N. alveolaris superiores posteriores.

С) N. alveolares inferiores.

Д) N. zygomaticus.

Е) N. alveolaris superiores anteriores.

155. У чоловіка, 64 років, після операції на привушній залозі виникли вегетативно-судинні розлади в привушній області (потепління, почервоніння), які посилюються під час їди. Лікар встановив, що післяопераційним рубцем здавленні вегетативні волокна в складі n. auriculotemporalis. Гілки якого парасимпатичного вузла голови здавлені рубцем в привушній залозі?

*** А) Ganglion oticum.**

В) Ganglion ciliare.

С) Ganglion pterygopalatinum.

Д) Ganglion superiores n. vagi.

Е) Ganglion inferiores n. vagi.

156. У лікарню прийнято чоловіка, 57 років, з гнійним запаленням глибоких лімфатичних вузлів шиї. Запалення поширилось на кам'янисту ямочку (ossula petrosa) скроневої кістки і на нерв, який потрапляє в барабанну порожнину через отвір цієї ямочки. Який нерв уражений?

*** A) N. tympanicus.**

B) R. sinus carotici.

C) N. petrosus profundus.

D) Chorda tympani.

E) R. auricularis nervi vagi.

157. У хворого на фоні розриву а. carotis interna в печеристій пазусі спостерігається пульсуючий екзофтальм (синхронно пульсу), вислуховується дуючий й шум (через очне яблуко), розширення очної щілини і зіниці. Які пари черепних нервів, що проходять в sinus cavernosus разом з пошкодженою судиною, стиснені гематомою?

*** A) III, IV, VI, 1 гілка V.**

B) III, IV, 1 гілка V.

C) IV, VI, 1 гілка V.

D) VI.

E) VII.

158. У хворого спостерігається обмеження рухів очного яблука вниз і латерально. Самий перший симптом при цій патології - двоїння при погляді вниз. Який черепний нерв пошкоджений?

*** A) N. trochlearis.**

B) N. abducens.

C) N. oculomotorius.

D) N. ophthalmicus.

E) N. In raorbitalis.

159. У хворого з ботулізмом порушена секреція слини, сліз, слизу, що призводить до різкої сухості слизових оболонок, чим пояснюються кератити, фарингіти, глосити. В якому вузлі лежать тіла постгангліонарних симпатичних волокон, які іннервують залози носової порожнини, піднебіння, слъзової залози?

*** A) G. sympaticus.**

B) G. ciliare.

C) G. pterygopalatinum.

D) G. oticum.

E) G. trigeminale.

160. У чоловіка з цукровим діабетом періодично виникають запалення сальних залоз верхньої повіки (Glandulae sebaceae (Zeis)) з пошкодженням коренів вій, що викликає у хворого біль, свербіння. Який нерв іннервує шкіру верхньої повіки?

*** A) N. ophtalmicus.**

B) N. oculomotorius.

C) N. abducens.

D) N. trochlearis.

E) N. In raorbitalis.

161. У хворого короточасні приступи болю в ділянці лоба, скроні, щоки, верхньої губи, які посилюються під час їди, розмови, доторкання до високочутливої скроневої зони ("куркової зони"). Відмічається болючість точок: супра-, інфраорбітальної, ментальної. Неврит якого нерва у хворого?

*** A) N. trigeminus.**

B) N. acialis.

C) N. vagus.

D) N. glossopharyngeus.

E) N. hypoglossus.

162. Сечо-кам'яна хвороба ускладнилася виходом камінця з нирки. На якому рівні сечовода, вірогідніше всього, він може зупинитися?

*** А) На межі черевної та тазової частин**

- В) У нирковій мисці
- С) В середній черевній частині
- Д) На 2 см вище впадіння в сечовий міхур
- Е) На 5 см вище тазової частини

163. Під час оперативного втручання на малому тазі жінки виникла необхідність перев'язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев'язаним разом з нею?

*** А) Сечовід**

- В) Маткова труба
- С) Кругла зв'язка матки
- Д) Внутрішня клубова вена
- Е) Сечівник

164. У хворого чоловіка пухлина задньої стінки сечового міхура. Який комплект органів, вірогідніше всього, може бути залучений в процес?

*** А) Пряма кишка, сім'яні міхурці, ампула сім'явиносної протоки**

- В) Передміхурова залоза
- С) Пряма кишка, передміхурова залоза
- Д) Чоловічий сечівник
- Е) Куперові залози

165. При аускультації серця було встановлено роздвоєння I тону в V міжреберному просторі по середньоключичній лінії у верхівковій точці. Патологію якого клапана вислухав лікар?

*** А) Двостулкового**

- В) Тристулкового
- С) Клапана аорти
- Д) Клапана легеневого стовбура
- Е) Клапана верхньої порожнистої вени

166. При аускультації серця було встановлено роздвоєння I тону на рівні хряща п'ятого правого ребра. Патологія якого клапана вислухав лікар?

*** А) Тристулкового**

- В) Двостулкового
- С) Клапана аорти
- Д) Клапана легеневого стовбура
- Е) Клапана верхньої порожнистої вени

167. При аускультації серця був визначений діастолічний шум в II міжреберному проміжку по правій пригруднинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

*** А) Клапана аорти**

- В) Двостулкового
- С) Тристулкового
- Д) Клапана легеневого стовбура
- Е) Клапана верхньої порожнистої вени

168. При аускультції серця був визначений систолічний шум в II міжреберному проміжку по лівій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

*** А) Клапана легеневого стовбура**

- В) Двостулкового
- С) Тристулкового
- Д) Клапана аорти
- Е) Клапана верхньої порожнистої вени

169. У дітей роблять тільки верхню трахеотомію внаслідок низького розташування:

*** А) Перешийка щитоподібної залози**

- В) Часток щитоподібної залози
- С) Гортані
- Д) Трахеї
- Е) Язика

170. Молода мати звернулась до лікаря з занепокоєнням щодо відсутності сльозовиділення у дитини 2-х тижнів під час плачу. Коли починає працювати слізна залоза у дітей?

*** А) 3 3 тижня життя**

- В) 3 2 місяця життя
- С) 3 6 місяця життя
- Д) 3 8 тижня життя
- Е) Одразу після народження

171. Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?

*** А) Велика підшкірна вена**

- В) Мала підшкірна вена
- С) Стегнова вена
- Д) Підколінна вена
- Е) Великогомілкова вена

172. У чоловіка 40 років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?

*** А) Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка**

- В) М'ясисту оболонку
- С) Внутрішню сім'яну фасцію
- Д) М'яз підіймач яєчка
- Е) Зовнішню сім'яну фасцію

173. Під час операції видалення матки лікар перев'язує маткову артерію, яка проходить у товщі широкої зв'язки матки. При цьому треба пам'ятати, що біля маткової артерії проходить сечовід, де саме?

*** А) Зверху**

- В) Спереду
- С) Ззаду
- Д) Знизу
- Е) Латеральніше

174. При виконанні операції з приводу пухлини черевної частини сечоводу у хворого 38 років, лікар повинен пам'ятати, яка судина найближче його розташована біля сечоводу?

*** A) testicularis**

B) renalis

C) ileocolica

D) iliaca interna

E) iliaca communis

175. У хворой жінки 52-років після травми при огляді лікар констатував зниження пульсації, блідність шкіри і зниження температури в ділянці великого пальця правої руки. Ушкодження якої з артерій верхньої кінцівки найімовірніше приводить до таких наслідків?

*** A) a. princeps pollicis**

B) a. ulnaris

C) a. radialis

D) a. digitalis communis

E) a. digitalis propria

176. Хворому чоловіку, 55 років, після операції потрібно вивести з сечового міхура сечу катетером. Лікар повинен пам'ятати, яка частина сечівника найбільш звужена:

*** A) pars membranacea**

B) ostium uretrae externum

C) ossa navicularis

D) pars spongiosa

E) pars prostatica

177. При оперативному втручанні на черевній порожнині хірургу необхідно виділити початок кореня брижі тонкої кишки. Де у нормі розташоване це місце?

*** А) Зліва в ділянці дванадцятипало-порожньокишкового згину.**

В) В ділянці правого згину ободової кишки.

С) В ділянці лівого згину ободової кишки.

Д) В ділянці сигмоподібної ободової кишки.

Е) В правому брижовому синусі.

178. Хворому 35 років призначено проведення цистоскопії, лікар повинен пам'ятати, що межею між фіксованою та рухомою частинами чоловічого сечівника є:

*** А) lig. Undi orme**

В) lig. Suspensorium penis

С) Pars. prostatica urethrae

Д) Radix penis

Е) ascia penis pro unda

179. При обстеженні хворої виявлено різке зниження гемоглобіну та колірного показника при зменшеному вмісті еритроцитів. Для якої анемії це характерно?

*** А) Гіпохромної**

В) Гіперхромної

С) Гіпопластичної

Д) Нормохромної

Е) Гемолітичної

180. В крові хворої виявлено зниження кількості гемоглобіну, тромбоцитів, появу мієлобластів та інших недозрілих клітин - ця картина крові типова для

*** A) Гострого лейкозу**

- B) Хвороби Вакеза
- C) Анемії Аддісона-Бірмера
- D) Стоматиті Венсана
- E) Герпетичного стоматита

181. До лікаря звернулась хвора із скаргами на болі в горлі при ковтанні. При об'єктивному обстеженні у неї виявлено припухлість та почервоніння лімфоїдної тканини зліва від кореня язика. Патологію якого лімфоїдного утворення вивив лікар?

*** A) Tonsilla palatina**

- B) Tonsilla lingualis
- C) Tonsilla pharyngea
- D) Tonsilla tubaria
- E) Nodus lymphaticus

182. У лікарню поступив хворий з травмою ліктя. Під час обстеження було виявлено пошкодження медіального надвиростка плечової кістки та артеріальної судини, що огинає його із заду. Яка судина пошкоджена?

*** A) collateralis ulnaris sup.**

- B) collateralis ulnaris in .
- C) recurrens radialis.
- D) interossea recurrens.
- E) collateralis radialis.

183. У клініку госпіталізовано водія з травмою стопи. В результаті обстеження виявлено відрив медіальної кісточки великогомілкової кістки, та пошкодження артерії, що огинає його ззаду. Яка з перерахованих артерій скоріше за все може бути ушкодженою?

*** A) tibialis post.**

B) tibialis ant.

C) peronea.

D) plantaris med.

E) recurrens tibialis post.

184. Ухворого відмічається випадіння смакової чутливості передніх двох третин язика, ураження якого нерва ймовірно?

*** A) Барабанної струни**

B) Блукаючого

C) Язикоглоткового

D) Нюхового

E) Додаткового

185. Ухворого відмічається випадіння функції сприйняття світлових подразників медіальної половини сітківки. Який відділ провідного шляху зорового аналізатора уражений?

*** A) Зорове перехрестя**

B) Лівий зоровий тракт

C) Правий зоровий тракт

D) Лівий зоровий нерв

E) Лівий зоровий нерв

186. При розвитку гнійного запального процесу внутрішнього вуха існує ймовірність втягнення в процес твердої мозкової оболонки. Через які структури?

*** А) Водопровід присінка**

- В) Вікно присінка
- С) Вікно завитки
- Д) Каналець заитки
- Е) Барабанний каналець

187. При ендоскопічному обстеженні шлунка діагностовано виразку в ділянці шлункової доріжки. Де локалізоване вказане патологічне утворення?

*** А) На малій кривині**

- В) На великій кривині
- С) У дні шлунка
- Д) У воротарній частині
- Е) У кардіальній частині

188. У хворого виразкова хвороба шлунка ускладнилась перфорацією, в результаті чого шлунковий вміст потрапив у чепцеву сумку. Яку із її стінок формує задня стінка шлунка?

*** А) Передню**

- В) Задню
- С) Верхню
- Д) Нижню
- Е) Ліву

189. При ендоскопічному обстеженні дванадцятипалої кишки діагностовано пухлину великого сосочка. Вкажіть локалізацію цього патологічного утворення.

*** А) У її низхідній частині**

- В) У її верхній частині
- С) У її горизонтальній частині
- Д) У її висхідній частині
- Е) У її верхньому згині

190. Ухворого на рентгенограмі черепа виявлено стоншення та звуження тіні спинки турецького сідла. Розростання якої частини головного мозку могло спричинити таке явище?

*** А) Гіпофізу**

- В) Епіфізу
- С) Гіпоталамусу
- Д) Зорового перехрестя
- Е) Таламусу

191. Ухворої виставлено діагноз “нецукровий діабет”, характерними ознаками якого є полідіпсія та поліурія. Ураження якої частини головного мозку могло спричинити таке явище?

*** А) Нейрогіпофізу**

- В) Епіфізу
- С) Аденогіпофізу
- Д) Гіпофізу
- Е) Таламусу

192. Ухворого акромегалія, при цьому у крові відмічається високий вміст гормону соматотропіну. Яка анатомічна структура відповідає за його вироблення?

*** А) Аденогіпофізу**

- В) Епіфізу
- С) Нейрогіпофізу
- Д) Гіпоталамусу
- Е) Таламусу

193. Які артерії мають основне значення у розвитку обхідного кровообігу верхньої кінцівки після перев'язки плечової артерії в нижній третині плеча

*** А) Глибока артерія плеча, ліктьові колатеральні артерії**

- В) Латеральна грудна артерія
- С) Зворотна променева артерія
- Д) Ліктьова артерія
- Е) Зворотна ліктьова артерія

194. При остеохондрозі шийного відділу хребетного стовбура перетискається судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це судина?

*** А) Хребетна артерія**

- В) Внутрішня сонна артерія
- С) Зовнішня сонна артерія
- Д) Основна артерія
- Е) Задня мозкова артерія

195. У хворого виявлено порушення кровотоку у басейні лівої задньої мозкової артерії. Які ділянки кори кінцевого мозку можуть постраждати за цих умов?

*** А) Нижня поверхня лівих скроневої та потиличної часток**

В) Зовнішня поверхня потиличних часток

С) Скроневі частки

Д) Зовнішня поверхня лобної, вискової та тім'яної часток

Е) Нижня поверхня обох потиличних часток