

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нормальна анатомія - база тестів 2008 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2008 року**

Кількість запитань: **300**

1. У ребенка повреждена нижняя губа в области правого угла рта. Из раны тонкой струйкой изливается алая кровь. Ветви какой артерии повреждены при травме?

*** А) Лицевой артерии**

В) Язычной артерии

С) Позвоночной артерии

Д) Восходящей глоточной артерии

Е) Верхнечелюстной артерии

2. В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два кифоза. Это объясняется развитием способности к:

*** А) Прямохождению**

В) Плаванию

С) Ползанию

Д) Сидению

Е) Лежанию

3. После правостороннего перелома в области передней трети нижней челюсти определяется кровоизлияние (гематома) в области подбородка. Повреждением какой артерии оно вызвано?

*** А) Подбородочной**

В) Нижней губной

С) Язычной

Д) Лицевой

Е) Нёбной

4. Больной поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с вывихом височно-нижнечелюстного сустава с повреждением основной его связки. Назовите эту связку?

*** А) Латеральная**

В) Нижнечелюстная

С) Шило-нижнечелюстная

Д) Крыло-нижнечелюстная

Е) Медиальная

5. У больного травма свода черепа. Какие синусы могут быть повреждены?

*** А) Верхний сагиттальный**

В) Верхний каменистый

С) Нижний каменистый

Д) Нижний сагиттальный

Е) Сигмовидный

6. Поранений робітник поступив у лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з артеріальною кровотечею. Яка артерія імовірно пошкоджена?

*** А) a. brachialis**

В) a. radialis

С) a. axillaris

Д) a. subscapularis

Е) a. profunda brachii

7. У хворої , 34 років, виразка шлунка. Для того, щоб більш точно описати розташування виразки, лікар повинен знати з яких частин складається шлунок?

*** А) тіло, дно шлунку, пілорична та кардіальна частини**

В) дно шлунка, велика та мала кривизна, кардіальна частина

С) передня та задня стінки, пілорична частина, кардіальна частина

Д) дно, склепіння шлунку, пілорична частина, привратникова частина, кардіальна частина

Е) тіло, дно, велика та мала кривизна шлунку

8. Чоловік звернувся до хірурга з варікозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен розташовані на задній поверхні кожи гомілки, на задній та передній поверхні кожи стегна. Які поверхневі вени здійснюють відток від нижньої кінцівки?

*** А) велика та мала підшкіряні вени**

В) мала підшкіряна вена, глибока вена стегна

С) підколінна, поверхнева підшкіряна вена

Д) стегова вена, велика та мала підшкіряні вени

Е) задня великогомілкова вена, велика підшкіряна вена

9. Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?

*** А) uncus**

В) operculum frontale

С) gyrus temporalis superior

Д) gyrus postcentralis

Е) sul. calcarinus

10. Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні шиї. Який нерв забезпечує чутливість цієї області шиї?

*** A) n. transversus colli**

B) n. auricularis magnus

C) nn. supraclaviculares

D) n. occipitalis minor

E) n. phrenicus

11. 57-річна хвора на гіпертонію звернулась до лікаря з скаргою на біль великого пальця руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідність шкіри і зниження температури в цій області. Яка з артерій верхньої кінцівки найімовірніше ушкоджена?

*** A) a. princeps pollicis**

B) a. ulnaris

C) a. perforans

D) a. digitalis communis

E) a. digitalis propria

12. До уролога звернувся чоловік віком 58 років зі скаргами на різкі болі при сечівиділенні та зменшенні кількості сечі. Лікар припустив наявність сечокам'яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірно затримання каміння?

*** A) pars membranacea**

B) Pars prostatica

C) Pars spongiosa

D) Pars pelvina

E) Pars intramuralis

13. В ендокрінологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька разів були переломи кінцівок пов'язані з крихкістю кісток. Функція яких ендокринних залоз (ендокринної залози) порушена?

*** А) прищитоподібні**

- В) щитоподібна
- С) вилочкова
- Д) надниркові
- Е) епіфіз

14. У больного кариесом нижнего левого премоляра появилась припухлость шеи выше подъязычной кости. Повысилась температура, появилось слюнотечение, сокращение жевательных мышц, больной с трудом открывает рот. Поставлен диагноз - флегмона дна ротовой полости. Какие мышцы будут вовлечены в процесс?

*** А) Челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная**

- В) Двубрюшная и подъязычно-шиловидная
- С) Подъязычно-язычная и шило-язычная
- Д) Подкожная и шило-подъязычная
- Е) Щитоподъязычная и грудино-подъязычная

15. У больного вследствие неадекватного лечения воспаления среднего уха [мезотимпанита] возникло гнойное воспаление ячеек сосцевидного отростка височной кости [мастоидит]. Гнойник прорвался в ложе грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В пределах какой фасции шеи локализуется патологический процесс?

*** А) Поверхностного листка собственной фасции шеи**

- В) Поверхностной
- С) Глубокого листка собственной фасции шеи
- Д) Внутренней фасции шеи
- Е) Предпозвоночной

16. После перенесенного энцефалита у больного имеются остаточные явления в виде поражения лицевого нерва слева. Нарушение иннервации каких мышц при этом будет выражено

*** А) Мимических мышц**

- В) Жевательных мышц
- С) Подкожной мышцы шеи
- Д) Средних мышц шеи
- Е) Глубоких мышц шеи

17. При выполнении ваго-симпатической блокады по-Вишневскому вводят раствор новокаина по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы шеи выше места пересечения ее с наружной яремной веной. В пределах какого треугольника шеи выполняют блокаду?

*** А) Лопаточно-трапециевидного**

- В) Ключично-лопаточного
- С) Сонного
- Д) Треугольника Пирогова
- Е) Поднижнечелюстного

18. Для временной остановки кровотечения эффективным методом является пальцевое прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку 6 шейного позвонка. В каком треугольнике шеи нужно осуществить пальцевое прижатие сонной артерии для остановки кровотечения?

*** А) Сонном**

- В) Поднижнечелюстном
- С) Пирогова
- Д) Лопаточно-трахеальном
- Е) Лопаточно-ключичном

19. При осмотре полости рта справа от уздечки языка увеличен подъязычный сосочек. Определите выделительная функция каких желез будет нарушена?

*** А) Поднижнечелюстной и подъязычной**

- В) Околоушной и щитовидной
- С) Щитовидной и околощитовидной
- Д) Подъязычной и околоушной
- Е) Околоушной и поднижнечелюстной

20. При подходе к щитовидной железе из поперечного (воротникообразного) доступа вскрывается клетчаточное надгрудинное пространство. Повреждение какого анатомического образования, находящегося в данном пространстве, является опасным?

*** А) Венозной яремной дуги**

- В) Лимфатических узлов
- С) Сонной артерии
- Д) Подключичной артерии
- Е) Внутренней яремной вены

21. У больного резаная рана лица в области жевательной мышцы. Проток какой железы может быть поврежден?

*** А) Околоушной**

- В) Большой подъязычной
- С) Поднижнечелюстной
- Д) Малых подъязычных
- Е) --

22. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття різцями верхньої щелепи зубів нижньої. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Ортогнатія**

- В) Прогенія
- С) Біпрогнатія
- Д) Прямий прикус
- Е) Закритий прикус

23. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття різцями нижньої щелепи зубів верхньої. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Прогенія**

- В) Ортогнатія
- С) Біпрогнатія
- Д) Закритий прикус
- Е) Прямий прикус

24. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається дотикання ріжучих країв верхніх та нижніх різців . Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Прямий прикус**

- В) Ортогнатія
- С) Біпрогнатія
- Д) Закритий прикус
- Е) Прогенія

25. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Біпрогнатія**

В) Ортогнатія

С) Прямий прикус

Д) Закритий прикус

Е) Прогенія

26. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями. Контакт між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Відкритий прикус**

В) Ортогнатія

С) Прямий прикус

Д) Закритий прикус

Е) Прогенія

27. Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований медіальний горбик на ріжучому краї правого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:

*** А) Параконус.**

В) Метакоус

С) Мезоконус

Д) Гіпоконус

Е) Протоконус

28. Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого верхнього моляра. Цей горик називається:

*** А) Гіпоконус.**

В) Метаконус.

С) Параконус.

Д) Мезоконус.

Е) Протоконус.

29. Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність тригону на жувальній поверхні першого верхнього лівого моляра. Тригон це є злиття:

*** А) Пара-,мета- і протоконуса.**

В) Гіпо-, пара- і метаконуса.

С) Прото-, пара- і гіпоконуса.

Д) Мета-, пара- і гіпоконуса

Е) Пара-, мета- і гіпоконуса.

30. З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

*** А) L III -L IV**

В) L II -L III

С) L I -L II

Д) Th XII - L I

Е) L V - S I

31. Під час рентгеноскопичного дослідження органів грудної клітки у хворого відзначена нерухомість діафрагми з правого боку. Який нерв пошкоджено з правого боку?

*** А) Діафрагмальний нерв**

В) Блукаючий нерв

С) Симпатичний стовбур

Д) Шийна петля

Е) Додатковий нерв

32. У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?

*** А) Передміхурова залоза.**

В) Сімянний міхурець.

С) Придаток яєчка.

Д) Яєчко.

Е) Цибулино-сечівникова залоза.

33. Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган хворий?

*** А) Передміхурова залоза.**

В) Яєчко.

С) Сім'яні міхурці.

Д) Придаток яєчка.

Е) Сечовий міхур.

34. У пацієнта аспермія. Який орган не працює?

*** А) Яєчко.**

В) Сімянні міхурці.

С) Придаток яєчка..

Д) Простата.

Е) Передміхурова залоза.

35. У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу?

*** А) Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.**

В) Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії.

С) Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії.

Д) Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії.

Е) Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої артерії.

36. Яку артерію можна пошкодити при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?

*** А) Нижня альвеолярна артерія.**

В) Щічна артерія.

С) Язикова артерія.

Д) Криловидні гілки.

Е) Середня оболонна артерія.

37. Гнійні вогнища на обличчі вище ротової порожнини небезпечні можливістю поширення інфекції у порожнину черепа. Наявністю яких анастомозів вен обличчя це зумовлено?

*** А) З очними венами**

В) З крилоподібним сплетенням

С) З передніми вушними венами

Д) З потиличною веною

Е) З середньою і глибокими скроневими венами

38. Є потреба катетеризації сечового міхура. В якій частині уретри або структурі може виникати опір катетеру?

*** А) Перетинчастій.**

В) Простатичній.

С) Губчастій.

Д) Зовнішньому отворі сечівника.

Е) Внутрішньому отворі сечівника.

39. Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?

*** А) Задня**

В) Передня

С) Бічну права

Д) Бічну ліва

Е) Будь-яка

40. В результаті травми у хворого пошкодився відвідний нерв. Який з перелічених симптомів спостерігається?

*** А) Параліч латерального прямого м'яза очного яблука.**

В) Параліч медіального прямого м'яза очного яблука.

С) Стійке розширення зіниці.

Д) Розлад акомодції.

Е) Порушення слъзовиділення.

41. У травмпункт поступив хворий, який не може розігнути передпліччя в ліктьовому суглобі. Який м'яз пошкоджений?

*** А) Триголовий м'яз плеча.**

- В) Двоголовий м'яз плеча.
- С) Плечо-променевий м'яз.
- Д) Дзьобо-плечовий м'яз.
- Е) Плечовий м'яз.

42. Хвора з діагнозом пієлонефрит поступила в клініку урології. Після проведення обстеження відмічено приєднання інфекції, що супроводжувалося пієловенозним рефлюксом. Ураження якої структури призвело до виникнення ускладнення?

*** А) Форнікальний апарат нирки**

- В) Екскреторні шляхи нирки
- С) Прямі трубочки
- Д) Ниркові канальці
- Е) Ниркове тільце

43. У хворого скарги на порушення сечовипускання. Діагностовано гіпертрофію передміхурової залози. Пошкодження якої частини органа призводить до виникнення даної патології?

*** А) Середньої частки.**

- В) Лівої частки.
- С) Правої частки.
- Д) Основи.
- Е) Верхівки.

44. Хворий, 43 років, звернувся зі скаргою на пухлину на корені язика. Хірург стоматолог виявив, що це зло'якісна пухлина. Плануючи операцію, він вирішив перев'язати артерію, що проходить в трикутнику Пирогова. Це:

*** A) a. lingualis**

B) a. sublingualis

C) a. profunda linguae

D) a. suprahyoideum

E) a. palatina ascendens

45. Хворий 27-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на наявність твердої пухлини спереду від козелка вушної раковини. Хірург стоматолог, видаляючи пухлину, зустрів вену. Це була :

*** A) v. retromandibularis**

B) v. facialis

C) v. jugularis interna

D) v. jugularis externa

E) v. auricularis posterior

46. Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку, хірург стоматолог виявив камінь в піднижньощелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

*** A) a. facialis**

B) a. submental

C) a. alveolaris inferior

D) a. labialis inferior

E) a. lingualis

47. Хворому для виготовлення функціонально повноцінного протеза необхідно видалити ліве верхнє ікло. Після інфраорбітальної анестезії у хворого з'явилась гематома в передній ділянці обличчя, яка швидко збільшувалась. Було встановлено, що травмовано артерію, яка є гілкою:

*** A) a. maxillaris**

B) a. alveolaris inferior

C) a. temporalis superficialis

D) a. ophthalmica

E) a. labialis superior

48. Хірург стоматолог зашивав чоловіку 26 років різану рану в ділянці шиї над грудниною і запобігав кровотечі з судини, що лежить між поверхневим і глибоким листком власної фасції шиї. Це:

*** A) arcus venosus juguli**

B) v. thyroidea inferior

C) v. thyroidea superior

D) v. jugularis interna

E) v. jugularis externa

49. До хірурга стоматолога привели хворого з вуличною травмою в ділянці піднижньощелепного трикутника. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована артерія, яка іде до м'якого піднебіння. Яку артерію пошкоджено?

*** A) palatina ascendens**

B) palatina descendens

C) sphenopalatina

D) pharyngea ascendens

E) facialis

50. Чоловік 28-ми років з різаною раною шкіри лобової ділянки, був доставлений до лікарні. Для зупинки кровотечі перев'язана судина, яка кровопостачає цю ділянку. Яка судина була перев'язана?

*** A) a. supraorbitalis**

B) a. infraorbitalis

C) a. angularis

D) a. dorsalis nasi

E) a. temporalis superficialis

51. Хворий 60-ти років при падінні отримав травму голови та був доставлений до лікарні. При обстеженні виявлена підшкірна гематома скроневої ділянки. Пошкодження якої судини призвело до появи гематоми?

*** A) a.temporalis superficialis**

B) a.maxillaris

C) a.auricularis posterior

D) a.buccalis

E) a occipitalis

52. У хворого з травмою голови хірург стоматолог виявив, що тромб, який утворився в сигмоподібній пазусі, досягнув яремного отвору та перейшов на цибулину внутрішньої яремної вени. У хворого спостерігається порушення ковтання, зниження частоти серцевих скорочень,судоми m.sternocleidomastoideus та m. trapezius, важке дихання. Хірург встановив, що викликано подразнення черепних нервів, які лежать поряд з цибулиною внутрішньої яремної вени? Які це пари черепних нервів?

*** A) IX, X, XI**

B) VII

C) XII

D) III, IV, VI

E) V

53. У хворого 60-и років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?

*** A) Ворітної.**

- B) Нижньої порожнистої вени.
- C) Непарної вени.
- D) Верхньої порожнистої вени.
- E) Верхньої брижової.

54. При трепанації соскоподібного відростка скроневої кістки з приводу гнійного отиту для хірурга стоматолога існує можливість пошкодження каналу лицевого нерва та кровотечі. Яка артерія проходить разом з лицевим нервом в каналі?

*** A) a. stylomastoidea**

- B) a. facialis
- C) a. auricularis posterior
- D) a. meningea media
- E) a. occipitalis

55. Стоматолог встановив, що хворий 23-х років скаржиться на велику кількість слини. Стимуляція якого вегетативного вузла викликає утворення великої кількості слини серозного характеру?

*** A) ganglion oticum**

- B) Ganglion pterygopalatinum
- C) Ganglion ciliare
- D) Ganglion submandibulare
- E) Ganglion sublinguale

56. Хірург-стоматолог у жінки 24 років діагностував гнійне запалення клиноподібної пазухи. Зроблено все можливе, щоб запобігти втягненню в процес стінки артерії, яка лежить в печеристій пазусі та тим самим уникнути смертельної кровотечі. Яка це артерія?

*** A) a. carotis interna**

B) a. carotis externa

C) a. ophthalmica

D) a. supraorbitalis

E) a. infraraorbitalis

57. При видаленні липоми у хворого біля крила носу хірург-стоматолог пошкодив судину, що привело до утворення підшкірної гематоми. Яка судина пошкоджена?

*** A) a. facialis**

B) a. maxillaris

C) a. supraorbitalis

D) a. infraraorbitalis

E) a. angularis

58. До хірурга-стоматолога привезли чоловіка 28 років з вуличною травмою. Лікар виявив, що при пошкодженні луски скроневої кістки у хворого виникла субдуральна гематома. Пошкодження якої артерії призвело до утворення гематоми?

*** A) a. meningea media**

B) a. maxillaris

C) a. carotis interna

D) a. ophthalmica

E) a. sphenopalatina

59. небезпечно витискувати гноячки на лиці, особливо вище ротової щілини.

Анастомозами яких вен може поширитися інфекція у порожнину черепа?

*** А) Анастомози вен лица з очними венами**

В) Анастомози вен лица з криловидним сплетенням

С) Анастомози вен лица з передніми вушними венами

Д) Анастомози з потиличною веною

Е) Анастомози вен лица з середньою і глибокими висковими венами

60. Вивчаючи жувальні м'язи, студент зрозумів, що не піднімає нижню щелепу тільки:

*** А) Зовнішній крилоподібний м'яз**

В) Внутрішній крилоподібний м'яз

С) Жувальний м'яз

Д) Передні пучки скроневого м'яза

Е) Середні пучки скроневого м'яза

61. У хворої дитини 10 днів від народження провели операцію з приводу розщеплення верхньої губи ("заяча губа"). Розщеплення верхньої губи є наслідком:

*** А) Незрощення лобового і верхньощелепних відростків I-ої зябрової дуги**

В) Незрощення піднебінних валиків верхньощелепних відростків I-ої зябрової дуги

С) Незрощення другої зябрової дуги

Д) Незрощення третьої зябрової дуги

Е) Незрощення верхньо- і нижньощелепних відростків I-ої зябрової дуги

62. После удаления II малого коренного зуба верхней челюсти у больного отмечается луночное кровотечение. Укажите повреждением какой артерии оно вызвано?

*** А) Средней верхней альвеолярной**

В) Задней верхней альвеолярной

С) Нижней альвеолярной

Д) Небной

Е) Передней верхней альвеолярной

63. У пострадавшего в ДТП левосторонний перелом средней трети нижней челюсти. Какие сосуды могут быть травмированы?

*** А) Нижние альвеолярные артерия и вена**

В) Верхние альвеолярные артерия и вена

С) Верхнечелюстная артерия и крыловидное сплетение

Д) Язычные артерия и вена

Е) Челюстно-подъязычные артерия и вена

64. Больной с воспалением слизистой языка (глосситом) жалуется на расстройство вкусовой чувствительности передних двух третей языка. Поражением какого нерва оно вызвано?

*** А) Барабанной струны**

В) Барабанного

С) Малого каменистого

Д) Язычного

Е) Языкоглоточного

65. При осмотре больного А. невропатолог отмечает асимметрию лица: сглаженность складок кожи лба, глаз полностью не закрывается, на одной стороне глазная щель шире, рот перекошен. Какой нерв поражен?

*** А) Лицевой**

В) Глазной

С) Верхнечелюстной

Д) Нижнечелюстной

Е) Добавочный

66. В результате травмы языка возникло укротимое кровотечение. В каком топографо-анатомическом образовании можно перевязать артерию для остановки кровотечения?

*** А) Треугольнике Пирогова**

В) Лопаточно-ключичном треугольнике

С) Сонном треугольнике

Д) Лопаточно-трапецевидном треугольнике

Е) Лопаточно-трахеальном треугольнике

67. У хворого відкритий рот, він не може закрити рота і членороздільно говорити. Яке ураження у хворого?

*** А) Вивих нижньої щелепи.**

В) Параліч жувальних м'язів.

С) Ураження рухового центру мови.

Д) Перелом нижньої щелепи.

Е) Стрес.

68. Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобові.

Порушення функції якого основного м'язів може це визвати?

*** A) Musculus triceps brachii**

B) Musculus infraspinatus

C) Musculus levator scapule

D) Musculus teres major

E) Musculus subscapularis

69. Яка артерія може бути пошкоджена при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?

*** A) Нижня альвеолярна артерія**

B) Щічна артерія

C) Язикова артерія

D) Крилоподібні гілки

E) Середня оболонна артерія

70. У травмованого субдуральна гематома у висковій ділянці. Яка артерія пошкоджена?

*** A) Середня оболонна артерія.**

B) Середня мозкова артерія.

C) Задня сполучна артерія.

D) Передня оболонна артерія.

E) Передня мозкова артерія.

71. Хворому на злоякісну пухлину язика хірург перев'язує а. Lingualis в ділянці трикутника Пірогова, він особливу увагу звертає на:

*** A) n. hypoglossus**

B) n. lingualis

C) n. sublingualis

D) n. glossopharyngeus

E) Ansa cervicalis

72. У відділення хірургічної стоматології поступила новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхатись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. В якій ділянці піднебіння знаходилась розщілена? Між:

*** A) Os incisivum et processus palatinus maxillae**

B) Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae

C) Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum

D) Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum

E) В ділянці canalis incisivus

73. До стоматолога звернулася жінка зі скаргою на синець і припухлість під оком. При обстеженні виявлено, що у хворої під підоочноямковою анестезією кілька днів тому вирвали перший малий кутній зуб, а через кілька днів з'явилась гематома в ділянці foramen intraorbitale. Гілка якої артерії була травмована?

*** A) Верхньощелепної**

B) Лицевої

C) Поверхневої скроневої

D) Верхньої губної

E) Жувальної

74. Чоловік 65 років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений м'яз:

*** А) Скроневий**

- В) Жувальний
- С) Бічний крилоподібний
- Д) Присередній крилоподібний
- Е) Двочеревцевий

75. Хворий звернувся до стоматолога зі скаргою на сухість ділянки під язиком справа. Лікар встановив, що ущільнена chorda tympani при її виході в праву підскроневу ямку через fissura:

*** А) Petrotympanica**

- В) Tympanomastoidea
- С) Petrosquamosa
- Д) Sphenopetrosa
- Е) Petrooccipitalis

76. З травмою в ділянці шиї до відділення хірургічної стоматології потрапив хворий чоловік з розривом arcus venosus juguli, яка знаходиться в spatium:

*** А) Interaponeuroticum suprasternale**

- В) Interscalenum
- С) Antescalenum
- Д) Retropharyngeale
- Е) Previscerale

77. Для уточнення діагнозу у хворого 15 років потрібно зробити сіалографію привушної залози. Де знаходиться отвір, через який буде введена рентген контрастна маса:

*** А) На щоці в ділянці напроти II-го верхнього великого кутнього зуба**

В) На щоці в ділянці напроти II-го нижнього великого кутнього зуба

С) На щоці в ділянці напроти верхнього II-го малого кутнього зуба

Д) На caruncula sublingualis

Е) На plica sublingualis

78. Вирвавши зуб у пацієнта, стоматолог побачив, що він має два корені. Що то за зуб?

*** А) Нижній великий кутній**

В) Верхній великий кутній

С) Ікло

Д) Нижній малий кутній

Е) Верхній різець

79. Хворий втратив здатність впізнавати предмети за характерними для них звуками (годинник, колокол, музика). Яка частка мозку ушкоджена?

*** А) lobus temporalis**

В) lobus occipitalis

С) lobus frontalis

Д) lobus parietalis

Е) insula

80. У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоїдітом. Надалі виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

A) Прямої

*** B) Сигмоподібної**

C) Поперечної

D) Верхньої сагітальної

E) Нижньої кам'янистої

81. У новонародженної дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

*** A) Атрезія заднього проходу**

B) Атрезія стравоходу

C) Заяча губа

D) Дивертікул стравоходу

E) Дивертікул порожньої кишки

82. У новонародженої дитини під час смоктання молоко потрапляє до носової порожнини. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

*** A) Незарощення піднебіння**

B) Дивертікул стравоходу

C) Атрезія стравоходу

D) Заяча губа

E) Звуження стравоходу

83. Хворий не може на одній половині обличчя підняти брову, закрити повністю око, оголити зуби. Який нерв уражений?

*** А) Лицевий нерв**

- В) Очний
- С) Верхньощелепний
- Д) Нижньощелепний
- Е) Окоруховий

84. У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої артерії виникло порушення кровообігу?

*** А) Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії**

- В) Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії
- С) Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії
- Д) Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії
- Е) Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої арте_рії

85. У травмованого епідуральна гематома у скроневій ділянці. Яка артерія пошкоджена?

*** А) Середня оболонна артерія**

- В) Середня мозкова артерія
- С) Задня сполучна артерія
- Д) Передня оболонна артерія
- Е) Передня мозкова артерія

86. У хворого знижений слух. При огляді виявлено сірчані корки. В якій частині органа слуху зміни?

- * А) У зовнішньому вусі**
- В) У середньому вусі
- С) У внутрішньому вусі
- Д) У барабанній перетинці
- Е) У слуховій трубі

87. У хворого поранення у праву бічну ділянку живота. Яка частина товстої кишки найімовірніше може бути пошкоджена?

- * А) Висхідна ободова кишка**
- В) Поперечна ободова кишка
- С) Низхідна ободова кишка
- Д) Сигмовидна ободова кишка
- Е) Пряма кишка

88. У хворого судоми. Про гіпофункцію якої ендокринної залози можна думати?

- * А) Прищитоподібної залози**
- В) Шишкоподібного тіла
- С) Гіпофіза
- Д) Статевих залоз
- Е) Наднирникових залоз

89. 30 річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого?

*** А) Сконевого (задні волокна)**

В) Сконевого (передні волокна)

С) Крилоподібного медіального

Д) Крилоподібного латерального

Е) Жувального

90. Під час рентгенологічного дослідження у хворого у вертикальному положенні лікар констатує наявність повітря у шлунці. В якій частині воно знаходиться?

*** А) В дні**

В) В тілі

С) В кардіальній

Д) В пілоричній

Е) В ділянці малої кривини

91. У хворого після застудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?

*** А) Трійчастий**

В) Під'язиковий

С) Додатковий

Д) Блукаючий

Е) Язикоглоткового

92. Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. У якому носовому ході під час риноскопії було виявлено гній?

*** А) Середній**

- В) Верхній
- С) Нижній
- Д) Загальний
- Е) Найвищий

93. Потерпілий доставлений у клініку з відкритим переломом гілки нижньої щелепи з великою кровотечею в ділянці перелому. Пошкодження якої артерії, вірогідніше за все, мало місце?

*** А) Коміркової нижньої**

- В) Середньої вискової
- С) Лицевої
- Д) Язикової
- Е) Висхідної піднебінної

94. Хворому проведена субтотальна субфасціальна резекція щитовидної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?

*** А) Зворотній гортанний нерв**

- В) Верхній гортанний нерв
- С) Під'язиковий нерв
- Д) Язиковий нерв
- Е) Нижньощелепний нерв

95. До лікаря педіатра звернулася мати с приводу того, що у її дитини віком 1 рік голова повернена в лівий бік. Який із м'язів шиї недорозвинений?

*** А) Грудинно-ключично-соскоподібний м'яз**

- В) Підшкірний м'яз
- С) Двочеревцевий м'яз
- Д) Довгий м'яз шиї
- Е) Шило-під'язиковий м'яз

96. При обстеженні миміки хворого виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може свистіти, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

*** А) Колового м'яза рота**

- В) Великого виличного м'язу
- С) Шийного м'язу
- Д) М'язу сміху
- Е) Жувального м'язу

97. У хворого на тимому (пухлину вилочкової залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?

*** А) Верхню порожнисту вену**

- В) Зовнішню яремну вену
- С) Підключичну вену
- Д) Внутрішню яремну вену
- Е) Передню яремну вену

98. Дитина віком 10 років скаржиться на затруднення носового дихання. При обстеженні встановлено, що причиною є стійка гіпертрофія лімфоїдної тканини. Збільшення якого мигдалика має місце ?

*** А) Глоткового**

- В) Піднебінного
- С) Трубного лівого
- Д) Язикового
- Е) Трубного правого

99. У хворого 28 років, діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки носо-сльозової протоки. З анамнезу стало відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла проникнути у носо-сльозову протоку ?

*** А) Із нижнього носового ходу**

- В) Із середнього носового ходу
- С) Із верхнього носового ходу
- Д) Із присінку носа
- Е) Із лобової пазухи

100. Больной с гнойным правосторонним воспалением среднего уха доставлен в ЛОР-отделение. При осмотре обнаружена подкожная флегмона в области сосцевидного отростка. Через какую стенку барабанной полости проник гной?

*** А) Заднюю**

- В) Переднюю
- С) Нижнюю
- Д) Медиальную
- Е) Верхнюю

101. Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепній пазусі . У який носовий хід виділяється гній?

*** А) У середній носовий хід**

- В) У носоглотковий хід
- С) У нижній носовий хід
- Д) У верхній носовий хід
- Е) У загальний носовий хід

102. Больной обратился к врачу с жалобой на затруднение при жевании. При обследовании обнаружена атрофия правых височной и жевательной мышц. При открывании рта челюсть отклоняется влево. Какой нерв поражен?

*** А) Двигательная часть нижнечелюстного**

- В) Лицевой
- С) Нижний альвеолярный
- Д) Верхнечелюстной
- Е) Челюстно-подъязычный

103. У пострадавшего скальпированная рана височной области головы справа с повреждением ветвей поверхностной височной артерии. В каком месте удобно осуществить пальцевое прижатие артериального сосуда для остановки кровотечения?

*** А) Впереди слухового прохода выше скуловой дуги.**

- В) В области сосцевидного отростка
- С) В области скуловой кости
- Д) В области надглазничного края
- Е) Позади ушной раковины

104. Больной с гнойным воспалением среднего уха жалуется на расстройства вкуса на передней 2/3 языка, и нарушение слюноотделения. Какой нерв поражен?

*** А) Барабанной струны**

- В) Барабанный
- С) Большой каменистый
- Д) Малый каменистый
- Е) Язычный

105. Больной поступил в неврологическое отделение с жалобами на боли в правой половине лица. При обследовании обнаружено снижение чувствительности кожи в этой области, болезненность при надавливании в над- и подглазничных точках, подбородке. Какой нерв поражен?

*** А) Тройничный**

- В) Лицевой
- С) Подъязычный
- Д) Добавочный
- Е) Кожные ветви плечевого сплетения

106. У пострадавшего определяется перелом в области внутренней поверхности левого голеностопного сустава. Где вероятнее всего произошел перелом?

*** А) Медиальная лодыжка**

- В) Нижняя треть малоберцовой кости
- С) Таранная кость
- Д) Латеральная лодыжка
- Е) Пяточная кость

107. В результате травмы головы у пострадавшего обнаружено повреждение правого мыщелка затылочной кости. Какая часть затылочной кости повреждена?

*** А) Латеральная**

В) Чешуя

С) Основная

Д) Яремный отросток

Е) Затылочное отверстие

108. Больной обратился к терапевту с жалобами на боли в грудной клетке при дыхании, одышку, затруднении кашлевых движений, икоту. Какие дыхательные мышцы поражены?

*** А) Диафрагма**

В) Наружная межреберная

С) Наружная зубчатая

Д) Внутренние межреберные

Е) Мышцы живота

109. При дослідженні хворого лікар визначив, що його язик не рухається вперед (не висувається з рота). Який м'яз пошкоджений?

*** А) Підборідно-язиковий.**

В) Підязиково-язиковий.

С) Поздовжний м'яз язика.

Д) Шило-під'язиковий.

Е) Поперечний м'яз язика.

110. Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи м'язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?

*** A) Tr.cortico-nuclearis**

B) Tr.cortico-spinalis

C) Tr.cortico-thalamicus

D) Tr.cortico-fronto-pontinus

E) Tr.thalamo-corticalis

111. Після звільнення з під завалу в постраждалого відзначається затемнення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?

*** A) Тім'яна та потилична кістка**

B) Клиновидна кістка та нижня щелепа

C) Лобна та носові кістки

D) Сконева кістка та верхня щелепа

E) Вилична кістка та слізна кістка

112. Під час ультразвукового обстеження серця лікар спостерігає за стулками мітрального клапана. Що відбувається з ними при систолі передсердь?

*** A) Вивертаються в порожнину шлуночка**

B) Притискаються до стінок передсердя

C) Вивертаються в порожнину передсердя

D) Стуляються, закриваючи просвіт отвору

E) Притискаються до стінки судин

113. Підвищення кров'яного тиску в аорті, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

*** А) Лівий шлуночок**

- В) Ліве передсердя
- С) Правий шлуночок
- Д) Праве передсердя
- Е) Венозний синус

114. Підвищення кров'яного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

*** А) Правого шлуночка**

- В) Лівого шлуночка
- С) Правого передсердя
- Д) Лівого передсердя
- Е) Венозного синуса

115. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у середню черепну ямку?

*** А) Через верхню очноямкову щілину**

- В) Через передній решітчастий отвір
- С) Через задній решітчастий отвір
- Д) Через нижню очноямкову щілину
- Е) Через вилично-очноямковий отвір

116. Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта спостерігається відсутність відчуття смаку передньою частиною язика, слиновиділення та слюзовиділення. Подразненням якого нерва це викликано?

*** А) Лицевого**

В) Під'язикового.

С) Нижньощелепного.

Д) Блукаючого.

Е) Барабанного.

117. Потерпілого доставлено у лікарню з переломом нижньої щелепи та значною кровотечею у ділянці перелому. Пошкодження якої артерії вірогідніше всього мало місце?

*** А) Нижньої коміркової артерії**

В) Висхідної глоткової артерії

С) Язикової артерії

Д) Висхідної піднебінної артерії

Е) Верхньої коміркової артерії

118. В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

*** А) IX**

В) X

С) VIII

Д) V

Е) XII

119. У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобову пазуху?

*** А) із середнього носового ходу**

В) із верхнього носового ходу

С) із нижнього носового ходу

Д) із присінка носової порожнини

Е) із решітчасто-клиноподібної кишені

120. Дитина 3-х років поступила у лікарню з чужорідним тілом у бронхах. В який бронх вірогідніше всього потрапило інорідне тіло?

*** А) в правий головний бронх**

В) в лівий головний бронх

С) в правий сегментарний бронх

Д) в лівий сегментарний бронх

Е) в дольковий бронх

121. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено?

*** А) d.Ureter**

В) Pelvis renalis

С) Uretra

Д) Vesica urinaria

Е) Ren

122. Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер'я. Ушкодження якого з органів, що проєктуються в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу.

*** A) Lien**

- B) Cauda pancreatis
- C) Fundus ventriculi
- D) Flexura coli sinistra
- E) Ren sinistra

123. У дітей часто можна спостерігати затруднене носове дихання, яке пов'язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

*** A) Tonsilla pharyngea**

- B) Tonsilla lingualis
- C) Tonsilla palatina
- D) Tonsilla tubaria
- E) Усіх названих мигдаликів

124. До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу болюча. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?

*** A) N. auricularis magnus**

- B) N. occipitalis minor
- C) N. supraclaviculares
- D) N. vagus
- E) N. transversus colli

125. Чоловік 42-х років звернувся до медпункта з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно: затруднене згинання передпліччя. Які з названих м'язів ймовірно ушкоджені у хворого?

*** A) M.brachialis, m.biceps brachii**

B) M.biceps brachii, m.anconeus

C) M.coracobrachialis, m.supraspinatus

D) M.deltoideus, m.infraspinatus.

E) M.deltoideus, m.biceps brachii.

126. Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

*** A) Пазуха клиновидної кістки.**

B) Сонний канал.

C) Зоровий канал.

D) Барабанна порожнина.

E) Лицевий канал.

127. У потерпілого є травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кровотечею? Яке з утворень вірогідно ушкоджено?

*** A) Sinus sagittalis superior.**

B) Sinus petrosus superior.

C) Sinus rectus.

D) Sinus sagittalis inferior.

E) Sinus transversus.

128. Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці підочноямкового отвору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?

*** A) Canalis infraorbitalis.**

B) Canalis pterigoideus.

C) Canalis nasolacrimalis.

D) Canalis incisivus.

E) Fissura orbitalis inferior.

129. При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованій стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

*** A) N.abducens**

B) N.trochlearis

C) N.oculomotorius

D) N.ophtalmicus

E) N. infraorbitalis

130. У хворого під час висування язика спостерігається відхилення його верхівки вліво. Рухова інервація якого черепного нерву порушена в цьому випадку?

*** A) N.hypoglossus dexter**

B) N.glossopharyngeus dexter

C) N. vagus dexter

D) N. trigeminus sinister

E) N.facialis sinister

131. Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики), при збиванні долотом крилоподібного гачка, ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча. Яку артерію ушкоджено?

- * А) Низхідну піднебінну артерію.**
- В) Висхідну піднебінну артерію.
- С) Висхідну глоткову артерію.
- Д) Клиноподібну артерію.
- Е) Задню верхню альвеолярну артерію.

132. У хворого, 26 років, виявлений великий фурункул м'яких тканин обличчя біля кореню носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути уражена?

- * А) Печеріста пазуха**
- В) Верхня сагітальна пазуха
- С) Потилична пазуха
- Д) Сигмовидна пазуха
- Е) Верхня кам'яниста пазуха

133. У хворого виявлене руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до задньої черепної ямки. Яка з стінок зруйнована?

- * А) Paries mastoideus**
- В) Paries membranaceus
- С) Paries labyrinthicus
- Д) Paries tegmentalis
- Е) Paries jugularis

134. При обстеженні підлітка, лікарем виявлена вроджена вада серця - функціонування боталової протоки. Що з'єднує ця протока у внутрішньоутробному періоді розвитку?

*** А) Легеневий стовбур та аорту**

- В) Правий та лівий шлуночок
- С) Аорту та нижню порожисту вену
- Д) Праве та ліве передсердя
- Е) Легеневий стовбур та верхню порожисту вену

135. При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Яка судина втягнена в патологічний процес?

*** А) a. carotis interna**

- В) a. carotis externa
- С) a. meningea media
- Д) a. auricularis posterior
- Е) a. temporalis superficialis

136. При обстеженні хворого, який звернувся у неврологічне відділення, виявлено зглаженість лобних складок, неможливість примружити очі, кут рота опущений, "парусить" щоки. Який нерв пошкоджений?

*** А) Лицевий**

- В) Окоруховий
- С) Трійчастий
- Д) Блукаючий
- Е) Додатковий

137. При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість, розширена зіниця, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений?

*** А) Окоруховий**

В) Очний

С) Блоковий

Д) Відвідний

Е) Зоровий

138. В лікарню звернулася хвора К. 38 років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть яка з гілок якого нерва при цьому була уражена?

*** А) Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва**

В) Язикові гілки язикогорлового нерва

С) Язикові гілки під'язикового нерва

Д) Барабанна струна лицевого нерва

Е) Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

139. До лікаря-невропатолога звернулася хвора Л. 52 років із скаргами на втрату чутливості шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи. Вкажіть яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена:

*** А) Верхньощелепний нерв трійчастого нерва**

В) Великий кам'янистий нерв лицевого нерва

С) Очний нерв трійчастого нерва

Д) Нижньощелепний нерв трійчастого нерва

Е) Барабанна струна лицевого нерва

140. Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?

*** А) Лицевого.**

- В) М'язово-трубного.
- С) Барабанного.
- Д) Канальця барабанної струни.
- Е) Сонного.

141. Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?

*** А) Лицевого.**

- В) Сонного.
- С) М'язово-трубного.
- Д) Барабанного.
- Е) Канальця барабанної струни.

142. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

*** А) Вовча паща.**

- В) Викривлення носової перегородки вправо.
- С) Перелом основи черепа.
- Д) Заяча губа
- Е) Викривлення носової перегородки вліво.

143. У поступившего в клинику больного отмечаются: сильная головная боль, ригидность мышц затылка, повторная рвота, болезненность при перкуссии черепа, повышена чувствительность к световым раздражителям Установлен диагноз — менингит. Показана спинномозговая пункция. Укажите анатомическое место проведения спинномозговой пункции.

*** А) Между 3 и 4 поясничными позвонками**

В) Между 1 и 2 поясничными позвонками

С) Между 12 грудным и 1 поясничным позвонками

Д) Между 5 поясничным и основанием крестца

Е) Между 11 и 12 грудными позвонками

144. У хворого кривошия. Який м'яз шиї уражений?

*** А) m. Sternocleidomastoideus**

В) m. Omohyoideus

С) m. Platysma

Д) m. Sternohyoideus

Е) m. Mylohyoideus

145. У человека развился гигантизм. Функция какой железы внутренней секреции нарушена?

*** А) Гипофиза.**

В) Эпифиза.

С) Щитовидной.

Д) Вилочковой.

Е) Надпочечников.

146. У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути сонну артерію для тимчасової зупинки кровотечі?

*** А) До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.**

В) До хребта у верхній частині шиї.

С) До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.

Д) До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.

Е) До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.

147. Дитина поступила в лор-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання почалось з запалення носоглотки. Встановлено, що інфекція потрапила в барабанну порожнину через слухову трубу, яка лежить в:

*** А) canalis musculotubarius.**

В) canaliculus tympanicus.

С) canalis caroticus.

Д) canaliculus chordae tympani.

Е) canaliculi carotici tympanici.

148. При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив в реанімаційне відділення лікарні з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна дуга, яка лежить у:

*** А) spatium interaponeuroticum suprasternal-E.**

В) spatium pretracheal-E.

С) spatium retropharyngeal-E.

Д) spatium interscalenum.

Е) spatium antescalenum.

149. Трикутник шиї обмежений ззаду грудинноключичнососковидним м'язом, зверху-заднім черевцем двочеревцевого м'яза, зпереду - верхнім черевцем лопатковопід'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.

*** А) Сонний.**

- В) Лопатковотрахейний.
- С) Підщелепний.
- Д) Лопатковоключичний.
- Е) Лопатковотрапецієвидний.

150. Після травми обличчя у хворого гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози блоковано гематомою?

*** А) привушна**

- В) під'язикова
- С) піднижньоще
- Д) губна
- Е) щічна

151. Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень?

*** А) слизова**

- В) м'язова
- С) серозна
- Д) еластична мембрана
- Е) м'язова і серозна

152. Який нерв вражено, якщо у хворого права носогубна складка розглажена, розширена права очноямкова щілина (її не вдається закрити під час примружування, тому що повіки не змикаються), виникають затруднення під час розмови і приймання їжі (їжа застряє між щокою і зубами)?

*** A) N. facialis dexter.**

B) N. abduceus dexter.

C) N. glossopharyngeus sinister.

D) N. vagus dexter.

E) N. trigeminus dexter.

153. До лікаря звернувся хворий з периодонтом нижнього кутного зуба. Встановлено, що запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими втягнуті в запальний процес?

*** A) Піднижньощелепні**

B) Бічні шийні

C) Передні шийні

D) Підборідні

E) Лицеві

154. Хворий 45 р. випадково випив оцтову кислоту. Опік яких відділів травної системи перш за все буде відбуватися?

*** A) Порожнина рота, ротоглотки .**

B) Порожнина рота та гортаноглотки.

C) Глотки, шлунку

D) Глотки та стравоходу.

E) Стравоходу та шлунку.

155. Больной не может поднять опущенную вниз нижнюю челюсть. Какие мышцы не могут выполнить свои функции?

*** А) Жевательные мышцы.**

- В) Мимические мышцы.
- С) Круговая мышца рта.
- Д) Надчерепная мышца.
- Е) Мышца поднимающая угол рта.

156. В зв'язку з наявністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід його видалити. В якому місці легко знайти язичкову артерію і перев'язати її?

*** А) Трикутнику Пирогова.**

- В) В сонному трикутнику.
- С) Влопаточно-підключичному трикутнику.
- Д) В лопаточно-трапецієвидному трикутнику.
- Е) В лопаточно-трахейному трикутнику.

157. У ребенка рваная рана левой щеки. Из раны струйкой изливается алая кровь. В каком месте и какую артерию следует прижать для остановки кровотечения?

*** А) Лицевую артерию в области края нижней челюсти впереди жевательной мышцы.**

- В) Язычную артерию в области угла нижней челюсти
- С) Верхнечелюстную артерию в области шейки нижней челюсти
- Д) Нижнечелюстную артерию в области подбородка
- Е) Подглазничную артерию в области скуловой дуги.

158. У больного с флегмоной щеки (гнойным воспалением) развился менингит. Какой сосудистый анастомоз вероятнее всего послужил причиной осложнения?

*** А) Между лицевой веной и венами глазницы**

В) Между лицевой и глазной артериями

С) Между лицевой и позадичелюстной венами

Д) Между височной и надглазничной артериями

Е) Между лицевой веной и крыловидным сплетением.

159. У пострадавшего отмечается правосторонний перелом и кровоизлияние (гематома) в области передней трети нижней челюсти, потеря кожной чувствительности в области подбородка. Какой нерв травмирован?

*** А) Подбородочный нерв**

В) Челюстно-подъязычные нервы

С) Нижний альвеолярный нерв

Д) Щечный нерв

Е) Верхние альвеолярные нервы

160. У пострадавшего левосторонний оскольчатый перелом скуловой кости с потерей кожной чувствительности над ней. Какой нерв поврежден?

*** А) Скуло-лицевой нерв**

В) Нижнеглазничный нерв.

С) Малая гусиная лапка

Д) Лицевой нерв

Е) Щечный нерв

161. У пострадавшего правосторонний перелом средней трети нижней челюсти. Какой канал может быть поврежден?

*** А) Нижнечелюстной**

- В) Нижний глазничный
- С) Малый небный
- Д) Большой небный
- Е) Крыловидный

162. У травмированного правосторонний перелом венечного отростка нижней челюсти со смещением. Какая мышца сместит отросток?

*** А) Височная**

- В) Медиальная крыловидная
- С) Латеральная крыловидная
- Д) Жевательная
- Е) Напрягающая мягкое небо.

163. У больной 47-ми лет диагностирована опухоль вершины языка. В какие регионарные лимфатические узлы возможно метастазирование?

*** А) Поднижнечелюстные**

- В) Околоушные
- С) Сосцевидные
- Д) Затылочные
- Е) Заглоточные

164. К врачу обратилась мать годовалого ребенка, у которого прорезались шесть зубов. Укажите, какое количество зубов должен иметь ребенок данного возраста?

*** А) 8**

В) 10

С) 7

Д) 12

Е) 6

165. После удаления II большого коренного зуба верхней челюсти у больного отмечается кровотечение из альвеолярной лунки. Укажите из системы какого артериального сосуда наблюдается кровотечение?

*** А) Верхнечелюстной артерии**

В) Нижней альвеолярной артерии

С) Лицевой артерии

Д) Восходящей глоточной артерии

Е) Челюстно-подъязычной артерии

166. При вскрытии глубокого абсцесса щеки был произведен вертикальный разрез, после чего наблюдается парез (нарушение функции) мышц на стороне операции. Ветви какого нерва были перерезаны?

*** А) Лицевого**

В) Верхнечелюстного

С) Нижнечелюстного

Д) Блуждающего

Е) Подъязычного тройничного

167. Больной жалуется на сухость во рту, уменьшение выделения слюны. Какие нервы поражены?

- * А) Парасимпатические барабанной струны.**
- В) Чувствительные язычного нерва
- С) Двигательные волокна подъязычного нерва
- Д) Симпатические волокна симпатического ствола
- Е) Парасимпатические волокна блуждающего нерва

168. Больной с воспалением слизистой языка (глосситом) жалуется на расстройство общей чувствительности передних двух третей языка. Поражением какого нерва оно вызвано?

- * А) Язычного**
- В) Барабанной струны
- С) Языкоглоточного
- Д) Блуждающего
- Е) Барабанного

169. У травмированного двухсторонний вывих височно-нижнечелюстного сустава. Какие основные связки сустава будут повреждены?

- * А) Латеральные**
- В) Шило-челюстные
- С) Крыловидно-челюстные
- Д) Клиновидно-челюстные
- Е) Внутрисуставные

170. При осмотре больного обнаружено, что при высовывании языка, его верхушка отклоняется в сторону. Функция какой мышцы языка при этом нарушена?

*** А) Подбородочно-язычной**

В) Подъязычной

С) Верхней продольной

Д) Нижней продольной

Е) Шилоязычной

171. Внаслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність якого м_яза блоковано?

*** А) Musculus sphincter pupillae**

В) Musculus ciliaris

С) Musculus rectus lateralis

Д) Musculus rectus superior

Е) Musculus rectus inferior

172. У хворого запалення легенів ускладнилось ексудативним плевритом. В якому з перелічених анатомічних утворень переважним чином може накопичуватися рідина?

*** А) sinus costodiaphragmaticus pleurae**

В) sinus costomediastinalis pleurae

С) sinus phrenicomediastinalis pleurae

Д) sinus transversus pericardii

Е) sinus obliquus pericardii

173. У постраждалого черепно-мозкова травма. Рентгенологічно: перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий та круглий отвори. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

*** А) Клиноподібна**

- В) Вискова
- С) Решітчаста
- Д) Лобова
- Е) Потилична

174. Лікар-стоматолог при лікуванні зубів вводить в просвіт між щокою і альвеолярним відростком верхньої щелепи ватний тампон. Вивідний отвір протока якої залози він закриває?

*** А) Привушної**

- В) Піднижньощелепної
- С) Під'язикового
- Д) Щитоподібної
- Е) Прищитоподібної

175. Во время операции хирург производит срединный разрез поверхностных слоев шеи над рукояткой грудины. Верви какого венозного анастомоза должен перевязать хирург для остановки кровотечения?

*** А) Яремной дуги**

- В) Нижних щитовидных вен
- С) Вен вилочковой железы
- Д) Внутренних яремных вен
- Е) Плечеголовые вены

176. Хронічна нежить ускладнилася запаленням лобової пазухи. Через який носовий хід потрапила інфекція до цього синусу?

*** А) Середній**

- В) Нижній
- С) Загальний
- Д) Верхній
- Е) Носоглотковий

177. У больного воспалительный процесс в области околоушной слюнной железы. Каким образом воспалительный процесс может проникнуть в крыловидно-нёбную ямку?

*** А) Через крыло-верхнечелюстную щель**

- В) Через верхнюю глазничную щель
- С) Через нижнюю глазничную щель
- Д) Через круглое отверстие
- Е) Через крыловидный канал

178. У пострадавшего травма верхней челюсти с повреждением подглазничного отверстия. Какая поверхность челюсти повреждена?

*** А) Передняя**

- В) Носовая
- С) Глазничная
- Д) Подвисочная
- Е) -

179. У пострадавшего травма верхней челюсти, выбит первый малый коренной зуб. Какой отросток верхней челюсти поврежден?

*** А) Альвеолярный**

В) Скуловой

С) Небный.

Д) Лобный

Е) -

180. При травме затылочной области определяется трещина в области поперечного синуса. Какая часть затылочной кости повреждена?

*** А) Чешуя**

В) Левая боковая

С) Правая боковая

Д) Основная

Е) Мыщелок

181. При обследовании лица больного отмечается, что правый угол рта смещен в левую сторону, правая щека и губы прижаты к зубам и деснам челюстей. Нарушением функции какой мышцы это вызвано?

*** А) Щечной мышцы**

В) Мышцы смеха

С) Круговой мышцы рта

Д) Мышцы, опускающей угол рта

Е) Скуловых мышц

182. У пострадавшего справа определяется отрыв участка угла нижней челюсти, смещение отломка назад и вверх. Какая связка способствует этому смещению?

- * A) Шило-нижнечелюстная**
- B) Внутрисуставные
- C) Латеральная
- D) Клиновидно-нижнечелюстная
- E) Крыловидно-нижнечелюстная

183. При виконанні операції з приводу пухлини черевної частини сечоводу у хворого , лікар повинен пам'ятати, що попереду його розташована важлива артеріальна судина. Яка саме?

- * A) testicularis**
- B) renalis
- C) ileocolica
- D) iliaca interna
- E) iliaca communis

184. На прийом до лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кістки (етмоїдіт). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання. Гілками якої артерії кровопостачаються решітчасті комірки в нормі?

- * A) ophtalmica**
- B) infraorbitalis
- C) facialis
- D) cerebri anterior
- E) transversa faciei

185. Хворому чоловіку 60-ти років після операції потрібно вивести сечу катетером. В якому місці сечівника можливо зробити прорив при недостатньо вмілій маніпуляції (найбільш звужена у нормі частина)?

*** A) pars membranacea**

B) ostium uretrae externum

C) fossa navicularis

D) pars spongiosa

E) pars prostatica

186. Аналізуючи діагностичні тести хворої жінки, хірург планує взяти лімфу з грудної протоки при її впадінні в венозне русло. Де це відбувається?:

*** A) Лівому венозному куті.**

B) Правому венозному куті.

C) Місці утворення нижньої порожнистої вени.

D) Місці утворення верхньої порожнистої вени.

E) Місці утворення ворітної вени.

187. Хворий 15 років скаржиться на сильний біль в очах, голові, розпливчастість літер при читанні після довгої роботи на близькій відстані. Ураження якого м'яза ока має місце в даному випадку?

*** A) Війковий м'яз**

B) М'яза – розширювача зіниці

C) Верхнього косого м'яза

D) Нижнього косого м'яза

E) -

188. У хворого 69-ти років при гнійній інфекції носової порожнини виник абсцес лобової частки мозку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилася інфекція?

*** A) Foraminae cribrosae**

- B) Foramen ovale
- C) Foramen ethmoidalae posterior
- D) Foramen sphenopalatinum
- E) Foramen rotundum

189. Унаслідок травми в ділянці вінцевого відростка нижньої щелепи у хворого спостерігається порушення зміщення нижньої щелепи назад. Вірогідність пошкодження якого м'яза існує?

*** A) m. temporalis**

- B) m. masseter
- C) m. pterygoideus lateralis
- D) m. pterygoideus medialis
- E) m. levator anguli oris

190. При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої травми він не може опустити нижню щелепу. Пошкодження якого м'язу може бути причиною вказаного порушення?

*** A) Підборідно-під'язиковий**

- B) Жувальний
- C) Скроневий
- D) Медіальний крилоподібний
- E) Латеральний крилоподібний

191. 30-ти річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого?

*** А) Сконевого (задні волокна)**

В) Крилоподібного латерального

С) Сконевого (передні волокна)

Д) Крилоподібного медіального

Е) Жувального

192. При гнійному отиті гній розповсюдився у комірки соскоподібного відростка і далі ускладнився менінгітом. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?

*** А) В задню черепну ямку**

В) В крило-піднебінну ямку

С) В середню черепну ямку

Д) В передню черепну ямку

Е) В очну ямку

193. У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення слюзи. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?

*** А) Крилопіднебінний**

В) Вушний

С) Війковий

Д) Піднижньощепепний

Е) Під'язиковий

194. Хворий не може на одній половині лица підняти брову, закрити повністю око, оголити зуби. Який нерв уражений?

*** А) Лицевий нерв**

- В) Верхньощелепний
- С) Очний
- Д) Нижньощелепний
- Е) Окоруховий

195. У хворого спостерігається асиметрія лица, особливо при спробах виконати активне скорочення м'язів лица. Про пошкодження якого нерва повинен думати лікар?

*** А) Лицевого (його рухової частини)**

- В) Трійчастого I - гілки
- С) Трійчастого II - гілки
- Д) Трійчастого III - гілки
- Е) Під'язикового

196. Дитина 5 років поступила в лор-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт). Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину ?

*** А) М'язовотрубний канал.**

- В) Каналець барабанної струни.
- С) Сонно-барабанні каналці.
- Д) Барабанний каналець.
- Е) Сонний канал.

197. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено при операції?

*** A) Ureter**

- B) Uretra
- C) Vesica urinaria
- D) Pelvis renalis
- E) Ren

198. У чоловіка 52-х років при піднятті надмірної ваги виникло грижове вип'ячування в здухвинній ділянці. Через яке анатомічне утворення ймовірніше всього виникло грижове вип'ячування?

*** A) Canalis inguinalis**

- B) Anulus femoralis
- C) Anulus umbilicalis
- D) Linea alba
- E) Lig. Inguinalis

199. При огляді хворого, 32 років, відмічається диспропорційний рост скелету, збільшення понадбровних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток, стоп. Функція якої залози порушена?

*** A) Гіпофіз**

- B) Епіфіз
- C) Підшлункова
- D) Щитоподібна
- E) Надниркова

200. У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?

*** A) N. facialis**

B) N. trigeminus

C) N. vestibulo-cochlearis

D) N. vagus

E) N. glossopharyngeus

201. Після травми м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з названих нервів знаходиться в зоні ушкодження?

*** A) N. ulnaris**

B) N. musculocutaneu

C) N. dorsalis scapularis

D) N. subscapularis

E) N. radialis

202. Випадково ударившись ліктем об край стола, студент відчув пекучість і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

*** A) N. ulnaris.**

B) N. radialis.

C) N. medianus.

D) N. axillaris.

E) N. musculocutaneus.

203. При оперативному втручанні в черевній порожнині хірургу необхідно проникнути в чепцеву (сальникову) сумку. Як може проникнути хірург в цю частину порожнини очеревини, не порушуючи цілісність малого чепця (сальника)?

*** А) Через чепцевий (сальниковий) отвір**

- В) Через праву біляободову борозну
- С) Через ліву біляободову борозну
- Д) Через правий брижовий синус
- Е) Через лівий брижовий синус

204. Після падіння хворий став скаржитись на неспроможність розігнути ногу у колінному суглобі. Які м'язи пошкоджено?

*** А) Чотирьохголовий**

- В) Напівсухожилковий
- С) Напівперетинчастий
- Д) Двоголовий стегна
- Е) Триголовий гомілки

205. Хворий скаржиться, на біль в яснах зубах верхньої щелепи. Про запалення якого нерва йде мова?

*** А) II гілка V пари**

- В) III гілка V пари
- С) I гілка V пари
- Д) Під'язикового
- Е) Додаткового

206. Запалення барабанної порожнини (гнойний отіт) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній до комірок?

*** А) Задню**

В) Передню

С) Медіальну

Д) Латеральну

Е) Верхню

207. Дитина 5-ти років страждає на деформацію шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, обличчя повернене вправо, пасивні рухи голови вправо обмежені. Порушення розвитку якого м'язу мало місце у цій патології?

*** А) Грудинно-ключично-соскоподібного**

В) Трапецієподібного

С) Ремінного м'язу голови

Д) Грудинно-під'язикового

Е) Довгого м'язу голови

208. У пострадавшего травма в результате прямого удара по внутренней поверхности средней трети голени. Перелом какого анатомического образования наиболее вероятен?

*** А) Диафиз большеберцовой кости**

В) Дистальный эпифиз малоберцовой кости

С) Дистальный эпифиз большеберцовой кости

Д) Проксимальный эпифиз большеберцовой кости

Е) Проксимальный эпифиз малоберцовой кости

209. У хворого порушилася робота жувальних м'язів. Який нерв пошкоджен ?

*** A) Нижньощелепний нерв**

- B) Язиковий нерв
- C) Вушно-скроневий нерв
- D) Щічний нерв
- E) Верхньощелепний нерв

210. Спортсмен-баскетболіст скаржиться на біль вище п'яти, що підсилюється під час ходіння. Сухожилок якого з м'язів вірогідно ушкоджено?

*** A) m.triceps surae**

- B) m.tibialis posterior
- C) m.flexor digitorum longus
- D) m.fibularis longus
- E) m.fibularis brevis

211. Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого з м'язів вірогідно буде страждати?

*** A) m.masseter**

- B) m.orbicularis oris
- C) m.buccinator
- D) m.procerus
- E) m.isorius

212. Хворий скаржиться на неможливість бічних рухів нижньої щелепи. Який з м'язів найвірогідніше ушкоджено?

*** A) m.pterygoideus lateralis**

B) m.pterygoideus medialis

C) m.buccinator

D) m.masseter

E) m.risorius

213. У хворого утруднене щільне змикання щелеп при жуванні. Відзначається часткова атрофія жувальних м'язів, що розташовані нижче скулової дуги. Гілки якого нерва іннервують вказані м'язи?

*** A) N. mandibularis**

B) N. maxillaris

C) N. alveolaris inferior

D) Nn. alveolares superiores

E) N. infraorbitalis

214. В результате травмы у пострадавшего произошел перелом в наружной нижней трети правой голени. В какой кости произошел перелом?

*** A) Малоберцовой**

B) Большеберцовой

C) Бедренной

D) Таранной

E) Пяточной

215. У боксёра, получившего удар в область височно-нижнечелюстного сустава, произошёл травматический вывих. Смещение каких суставных поверхностей выйдет за пределы физиологической нормы?

*** А) Головки нижней челюсти и нижнечелюстной ямки**

- В) Венечного отростка и крыловидной ямки
- С) Венечного отростка и поднижнечелюстной ямки
- Д) Головки нижней челюсти и поднижнечелюстной ямки
- Е) Шейки нижней челюсти и поднижнечелюстной ямки

216. При обстеженні хворого похилого віку, був встановлений супутній діагноз “Блукаюча нирка”. Зміни в яких структурах нирки, найбільш вірогідно, призводять до цього стану?

*** А) Corpus adiposum pararenale**

- В) Sinus renalis
- С) Hilus renalis
- Д) Fascia renalis
- Е) Ureter

217. У хворого 16 років фурункул у ділянці крила носа праворуч. Процес ускладнився збільшенням лімфоїдних вузлів. В які лімфоїдні вузли відбувся відтік з цієї ділянки носа?

*** А) nodi lymphoidei submandibulares**

- В) nodi lymphoidei occipitales
- С) nodi lymphoidei mastoidei
- Д) nodi lymphoidei parotidei
- Е) nodi lymphoidei cervicalis superficialis

218. Хірург визначив, що найбільший простір для обстеження і виконання оперативних втручань на підшлунковій залозі хворого дає розтин lig. gastrocolicum. В який простір черевної порожнини при цьому потрапляє хірург?

*** А) Чепцеву сумку**

- В) Правий бічний канал
- С) Лівий бічний канал
- Д) Передшлункову сумку
- Е) Печінкову сумку

219. У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоїдітом. Надалі виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

*** А) Сигмоподібної**

- В) Нижньої кам'янистої
- С) Верхньої сагітальної
- Д) Поперечної
- Е) Прямої

220. У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення слюзи. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?

*** А) Крилопіднебінний**

- В) Вушний
- С) Війковий
- Д) Піднижньощепепний
- Е) Під'язиковий

221. Дитина 5-ти років поступила в лор-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт). Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?

*** А) М'язовотрубний канал**

В) Каналець барабанної струни

С) Сонно-барабанні канальці

Д) Барабанний каналець

Е) Сонний канал

222. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено при операції?

*** А) Ureter**

В) Uretra

С) Vesica urinaria

Д) Pelvis renalis

Е) Ren

223. При огляді хворого відмічається диспропорційний рост скелету, збільшення понадбровних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток, стоп. Функція якої залози порушена?

*** А) Гіпофіз**

В) Епіфіз

С) Підшлункова

Д) Щитоподібна

Е) Надниркова

224. При запаленні глибоких лімфатичних вузлів пахвової області хірург повинен був розкрити глибоко розміщений гнійник. Після операції хворий втратив здатність згинати передпліччя в ліктьовому суглобі та порушилася шкірна чутливість передньо-бічної поверхні передпліччя. Якого нерва було ушкоджено при оперативному втручанні?

*** A) N.musculocutaneus**

- B) N.radialis
- C) N.ulnaris
- D) N.medianus
- E) N.axillaris

225. Випадково ударившись ліктем об край стола, студент відчув пекучість і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

*** A) N. ulnaris**

- B) N. radialis
- C) N. medianus
- D) N. axillaris
- E) N. musculocutaneus

226. У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці таї порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації в променевій артерії). Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш ймовірна?

*** A) Здавлення підключичної артерії**

- B) Здавлення пахвової артерії
- C) Здавлення підключичної вени
- D) Здавлення хребтової артерії
- E) Здавлення пахвової вени

227. Хронічна нежить ускладнилася запаленням лобової пазухи. Через який носовий хід потрапила інфекція до цього синусу?

*** А) Середній**

- В) Нижній
- С) Загальний
- Д) Верхній
- Е) Носоглотковий

228. Хворому важко формувати та рухати харчову грудку, це порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стала неможливою. Яка пара черепних нервів при цьому пошкоджена?

*** А) XII**

- В) V
- С) IX
- Д) XI
- Е) VII

229. У хворого сечо-кам'яна хвороба ускладнилася виходом камінця з нирки. На якому рівні сечовода, вірогідніше всього, він може зупинитися?

*** А) На межі черевної та тазової частин**

- В) В лоханці
- С) В середній черевній частині
- Д) На 2 см вище впадіння в сечовий міхур
- Е) На 5 см вище тазової частини

230. Під час оперативного втручання у жінки виникла необхідність перев'язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев'язаним разом з нею?

*** А) Сечовід**

- В) Маткова труба
- С) Кругла зв'язка матки
- Д) Внутрішня клубова вена
- Е) Сечівник

231. Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?

*** А) Велика підшкірна вена**

- В) Мала підшкірна вена
- С) Стегнова вена
- Д) Підколінна вена
- Е) Великогомілкова вена

232. При онкологічному захворюванні одного з органів грудної порожнини, пухлина метастазує дуже швидко, оскільки лімфа від цього органу частіше за все відтікає одразу до грудної лімфатичної протоки. Який це орган?

*** А) Стравохід**

- В) Легені
- С) Трахея
- Д) Серце
- Е) Виличкова залоза

233. У хворой жінці 47 років при обстеженні виявлено рефлюкс (зворотній закид сечі) . У якій частині нирки розташовані гладенькі м'язи, порушення функції яких може бути причиною рефлюкса?

*** A) Calyx renalis minor**

B) Calyx renalis major

C) Pelvis renalis

D) Ductuli papillares

E) Capsula glomeruli

234. При огляді порожнини рота стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні коронки другого малого корінного зуба, зверненого к першому моляру. Назовіть уражену поверхню коронки.

*** A) Facies mesialis**

B) Facies vestibularis

C) Facies lingualis

D) Facies distalis

E) Facies occlusalis

235. У лікарню госпіталізована хвора у важкому стані з діагнозом - геморагічний інсульт в ділянці лобної долі правої півкулі головного мозку. Ушкодження якої артерії найбільш ймовірно призвело до цього стану?

*** A) Cerebri anterior.**

B) cerebri posterior.

C) communicans anterior.

D) cerebri media.

E) communicans posterior.

236. У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину перев'язує лікар для зупинки кровотечі?

*** А) Язикову артерію**

- В) Дорзальну артерію язика
- С) Глибокої артерії язика
- Д) Лицевої артерії
- Е) Висхідної артерії глотки

237. У лівих вентральних аферентних спиноталамічних шляхах бракує інформації від протилежної частини тіла певного сегмента. Нейрони якого ядра заднього рогу спинного мозку пошкоджені?

*** А) Власного ядра**

- В) Губчастого шару
- С) Желатинозної субстанції
- Д) Грудного ядра Кларка
- Е) Вентрального ядра

238. У хворого при неврологічному обстеженні виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?

*** А) Середня мозкова артерія**

- В) Передня мозкова артерія
- С) Задня мозкова артерія
- Д) Передня сполучна артерія
- Е) Основна артерія

239. В наслідок перенесеної хвороби у чоловіка порушено розширення голосової щілини. Який м'яз пошкоджено?

*** А) Задній персне-черпакуватий**

- В) Бічний персне-черпакуватий
- С) Персне-щитоподібний
- Д) Щито-черпакуватий
- Е) Голосовий

240. У хворої виявлено ексудативний плеврит. На якому рівні необхідно провести плевральну пункцію по задній пахвовій лінії?

*** А) IX міжреберний простір**

- В) VIII міжреберний простір
- С) VII міжреберний простір
- Д) X I міжреберний простір
- Е) VI міжреберний простір

241. Студентка 17 років видавила гнійничок у медіальному куті ока. Через 2 дні вона поступила в інститут нейрохірургії з діагнозом тромбоз печеристої пазухи. Яким шляхом інфекція попала в цю пазуху?

*** А) Через v.angularis**

- В) Через v. maxillaris
- С) Через v. profunda faciei
- Д) Через v. transversa faciei
- Е) Через v. diploicae frontalis

242. Чоловік 70 років під час бриття зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 дні він був доставлений в лікарню з діагнозом запалення оболон головного мозку. Яким шляхом інфекція проникла в порожнину черепа? Через:

*** A) V. emissariae mastoideae**

- B) V.v. labyrinthi
- C) V.v. tympanicae
- D) V. facialis
- E) V.v. auriculares

243. После тяжёлой травмы лицевого черепа у больного при акте глотания пища попадает в носовую часть глотки. Определите, функция какой мышцы была нарушена?

*** A) m.levator veli palatini**

- B) m.palatopharyngeus
- C) m.stylopharyngeus
- D) m.genioglossus
- E) m.palatoglossus

244. У хворої М., 37р. в результаті попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи виник кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена трахеотомія в ділянці шиї, яка обмежена верхнім черевцем m. omohyoideus, m.sternocleidomastoideus та серединною лінією шиї. В якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

*** A) omotracheale**

- B) caroticum
- C) submandibulare
- D) omotraperoideum
- E) omoclaviculare

245. Хворий 25 років, звернувся до прийомного покою із скаргами на нежить та головний біль на протязі 4 днів. Після обстеження йому встановили діагноз фронтит. Крізь який носовий хід інфекція потрапила до лобної пазухи?

*** А) Середній**

- В) Верхній
- С) Нижній
- Д) Загальний
- Е) Носоглотковий

246. Хворий 35-ти років, звернувся до прийомного покою зі скаргами на біль та набряк в ділянці дна ротової порожнини. Після огляду, діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?

*** А) Caruncula sublingualis**

- В) Vestibulum oris
- С) Foramen caecum linguae
- Д) Plica fimbriata
- Е) Recessus gingivalis

247. До лікарні надійшов хворий з пошкодженням щоки. Протока якої слинної залози може бути ушкоджена?

*** А) Привушна**

- В) Щічна
- С) Піднижньощелепна
- Д) Під'язикова
- Е) Кутня

248. В урологічному відділенні при проведенні катетеризації уретри у чоловіка 30 років, виникло утруднення при введенні катетера [катетер вводиться наполовину]. Який відділ сечівника звужений?

*** А) Перетинчастий**

- В) Передміхуровий
- С) Губчастий
- Д) Зовнішнє вічко
- Е) Внутрішнє вічко

249. Во время операции на лёгких хирург удалил сгусток крови из горизонтальной щели . Какие доли лёгкого отделяет эта щель?

*** А) Верхнюю и среднюю доли правого лёгкого**

- В) Нижнюю и среднюю доли правого лёгкого
- С) Верхнюю и нижнюю доли правого лёгкого
- Д) Верхнюю и нижнюю доли левого лёгкого
- Е) Нижние доли правого и левого лёгкого

250. Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри та м'язів. Які шляхи уражені?

*** А) Спіноталамічні**

- В) Латеральні спінокортикальні
- С) Медіальні спінокортикальні
- Д) Передні спіномозочкові
- Е) Задні спіномозочкові

251. У хворого відзначається різка болючість шкіри в ділянці обличчя. Який нерв уражено?

*** А) Трійчастий**

- В) Лицевий
- С) Окоруховий
- Д) Блукаючий
- Е) Язикоглотковий

252. Дитина 3-х років госпіталізована до клініки з діагнозом: отіт. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвірогідніше може потрапити гній?

*** А) В соскоподібну печеру**

- В) У внутрішнє вухо
- С) В слухову трубу
- Д) В зовнішній слуховий прохід
- Е) В задню черепну ямку

253. У больного удалён зуб, у которого язычная поверхность меньше щёчной. Жевательная поверхность в форме овала. Глубокая поперечная борозда разделяет щечный и язычный бугорки. Корень сильно сдавлен в мезио-дистальном направлении с продольными бороздами на аппроксимальных поверхностях и раздвоен. Определите какой зуб удалён:

*** А) Первый верхний премоляр**

- В) Верхний клык
- С) Нижний клык
- Д) Первый нижний премоляр
- Е) Второй верхний премоляр

254. Під час рентгеноскопичного дослідження органів грудної порожнини, у хворого справа спостерігалась нерухомість грудочеревної перепони. Який нерв пошкоджений?

*** А) Правий діафрагмальний нерв.**

В) Правий блукаючий нерв.

С) Правий відділ симпатичного стовбура.

Д) Шийна петля.

Е) Додатковий нерв.

255. Хворий 60 років при падінні отримав травму голови і був доставлений до лікарні. При обстеженні виявлена підшкірна гематома скроневої ділянки. Пошкодження якої судини призвело до появи гематоми?

*** А) a. temporalis superficialis**

В) a. maxillaris

С) a. auricularis posterior

Д) a. buccalis

Е) a. occipitalis

256. Стоматолог встановив, що хворий 23 років скаржиться на велику кількість слини. Стимуляція якого вегетативного вузла викликає утворення великої кількості слини серозного характеру?

*** А) ganglion oticum**

В) Ganglion pterygopalatinum

С) Ganglion ciliare

Д) Ganglion submandibulare

Е) Ganglion sublinguale

257. Хворий потрапив у клініку з пораненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м'яза. Який нерв ушкоджено?

*** А) Діафрагмальний**

- В) Блукаючий
- С) Язикоглотковий
- Д) Під'язиковий
- Е) Шийний відділ симпатичного стовбуру

258. Після зіштовхнення двох автомобілів у одного з водіїв відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, посилюється крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена?

*** А) Великогомілкова кістка**

- В) Малогомілкова кістка
- С) Стегнова кістка
- Д) Наколінок
- Е) Надп'яtkова кістка

259. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено при операції?

*** А) Ureter**

- В) Pelvis renalis
- С) Uretra
- Д) Vesica urinaria
- Е) Ren

260. До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу боляча. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?

*** A) N. auricularis magnus.**

B) N. transversus colli.

C) N. occipitalis minor.

D) Nn. supraclaviculares.

E) N. vagus.

261. Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

*** A) Пазуха клиновидної кістки**

B) Сонний канал.

C) Зоровий канал.

D) Барабанна порожнина.

E) . Лицевий канал.

262. У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м'яких тканин обличчя біля кореню носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути уражена?

*** A) Печеріста пазуха**

B) Верхня сагітальна пазуха

C) Потилична пазуха

D) Сигмовидна пазуха

E) Верхня кам'яниста пазуха

263. Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок щитоподібної залози?

*** A) II- IV**

B) III-IV

C) I-II

D) IV-V

E) V-VI

264. При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Яка судина втягнена в патологічний процес?

*** A) a. carotis interna**

B) a. carotis externa

C) a. meningea media

D) a. auricularis posterior

E) a. temporalis superficialis

265. В лікарню звернулася хвора 38 років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть яка з гілок якого нерва при цьому була ушкоджена?

*** A) Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва**

B) Язикові гілки язикогорлового нерва

C) Язикові гілки під'язикового нерва

D) Барабанна струна лицевого нерва

E) Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

266. Хворому 60 років важко формувати і рухати харчову грудку, це порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стала неможливою. Причиною цього могло стати порушення:

*** А) Під'язикового нерва**

- В) Додаткового нерва
- С) Язикоглоткового нерва.
- Д) Трійчастого нерва.
- Е) Лицевого нерва

267. У травмпункт доставлено пацієнта із кровотечею із рваної рани в ділянці кута рота. Цілісність якої артерії порушена?

*** А) лицевої.**

- В) верхньощелепної.
- С) язикової.
- Д) передньої верхньої коміркової.
- Е) підчонамкової.

268. Хворий звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об'єктивно – у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

*** А) Глотковий отвір слухової труби**

- В) Барабанний отвір слухової труби
- С) Хоани
- Д) Зів
- Е) Вхід до гортані

269. В травмотологічне відділення поступив постраждалий з відкритим переломом плечової кістки, сильною кровотечею та клінікою пошкодження нерва, що проходить разом з глибокою артерією плеча в одному з каналів верхньої кінцівки. Який це нерв?

*** A) N. radialis**

B) N. ulnaris

C) N. medianus

D) N. axillaris

E) N. musculocutaneus

270. У хворого з порушенням згортання крові виявлений тромбоз однієї з гілок нижньої брижової артерії. Який відділ кишечника вражений?

*** A) Colon sigmoideum**

B) Ileum

C) Caecum

D) Colon transversum

E) Colon ascendens

271. Хворий госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?

*** A) Виростковий канал**

B) Тім'яний отвір

C) Круглий отвір

D) Остистий отвір

E) Овальний отвір

272. У хворого встановлено параліч мимічних та жувальних м'язів. Гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях ушкоджено?

*** A) Tr. cortico-nuclearis.**

B) Tr. cortico-spinalis.

C) Tr. cortico-thalamicus.

D) Tr. cortico-fronto-pontinus.

E) Tr. cortico-temporo-parieto-occipito-pontinus.

273. При огляді порожнини рота дитини педіатр знайшла 8 різців. Розвиток дитини відповідає віковій нормі. Визначте вік дитини.

*** A) 10-12 місяців**

B) 6-7 місяців

C) 7-8 місяців

D) 12-15 місяців

E) 16-20 місяців

274. При фіброгастродуоденоскопії лікар, оглядаючи слизову оболонку шлунка, знайшов поздовжні складки ("шлункову доріжку"). Яку ділянку шлунка оглядав лікар?

*** A) Curvatura ventriculi minor**

B) Pars cardiaca

C) Pars pylorica

D) Curvatura ventriculi major

E) Fornix

275. У потерпілого артеріальна кровотеча з різаної рани в ділянці переднього краю жувального м'яза. Яку судину потрібно перев'язати?

*** A) facialis**

B) maxillaris

C) labiales inferiores

D) mentalis

E) lingualis

276. Хворий звернувся до поліклініки зі скаргами на утруднення при сечовиділенні. Після огляду встановлено, що гіпертрофовано орган, який охоплює проксимальний відділ уретри. Що це за орган?

*** A) Передміхурова залоза**

B) Бульбо-уретральна залоза

C) Цибулина статевого члену

D) Придаток яєчка

E) Сім'яні пухирці.

277. При обстеженні дитини виявлено- розростання глоточного мигдалика, щоутруднює вихід повітря із носової порожнини. Які отвори носової порожнини перекриваються при цьому захворюванні?

*** A) Хоани**

B) Ніздрі

C) Грушоподібний

D) Крило-піднебінний

E) Гайморова щілина

278. Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта порушена смакова чутливість передніх 2/3 язика та слиновиділення. Травмою якого нерва це викликано?

*** А) Барабанної струни**

- В) Великого кам'янистого нерва
- С) Малого кам'янистого нерва
- Д) Глибокого кам'янистого нерва
- Е) Під'язикового нерва

279. У хворого діагностовано кореневу кісту, яка проросла у носову порожнину. Який зуб імовірно уражений?

*** А) Верхній медіальний різець**

- В) Верхнє ікло
- С) Верхній латеральний різець
- Д) Верхній перший премолар
- Е) Верхній перший моляр

280. При втручанні з метою лікування вивіху нижньої щелепи, лікар повинен пам'ятати про м'яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижнещелепного суглобу. Який це м'яз?

*** А) M. pterygoideus lateralis**

- В) M. masseter
- С) M. pterygoideus medialis
- Д) M. temporalis
- Е) M. mylohyoideus

281. При туберальній анестезії голку просувають до задньо-зовнішньої поверхні горбика верхньої щелепи і вводять анестетик. Які нерви при цьому знечуються?

*** А) r.r. alveolaris superiores posteriores**

В) r.r. alveolaris superiores anteriores

С) r. alveolaris superior medius

Д) n. maxillaris

Е) n. infraorbitalis

282. При рентгеновском исследовании была выявлена деформация нижней стенки правой глазницы. Какой параназальный синус вероятнее всего поражен?

*** А) Правая верхнечелюстная пазуха**

В) Клиновидная пазуха

С) Лобная пазуха

Д) Правый решетчатый лабиринт

Е) Левый решетчатый лабиринт

283. При осмотре врач обнаружил пришеечный кариес нижних правых резцов. При этом было отмечено увеличение в размерах группы лимфатических узлов. Какие лимфоузлы увеличены?

*** А) Подподбородочные**

В) Затылочные

С) Поверхностные шейные

Д) Глубокие шейные

Е) Лицевые

284. Хвора госпіталізована до лікарні з діагнозом плеврит. В якому місці плевральної порожнини міститься найбільша кількість ексудату?

*** А) Реберно-діафрагмальний синус**

- В) Діафрагмально-медіастинальний синус
- С) Реберно-медіастинальний синус
- Д) Під куполом плеври
- Е) Під коренем легенів

285. Хворому призначена задня риноскопія (огляд порожнини носа), на якій виявлено викривлення задньої частини носової перегородки. Яка кістка викривлена?

*** А) леміш**

- В) медіальна пластинка крилоподібного відростка
- С) латеральна пластинка крилоподібного відростка
- Д) перпендикулярна пластинка решітчастої кістки
- Е) вертикальна пластинка піднебінної кістки

286. Лікарю-стоматологу для знеболення необхідно ввести анестетик у крилопіднебінну ямку і з ротової порожнини. В ділянці якого анатомічного утвору потрібно робити ін'єкцію?

*** А) Великого піднебінного отвору**

- В) Піднижньоочноямкового отвору
- С) Різцевого каналу
- Д) Нижньощелепного отвору
- Е) Підборідного отвору

287. Осмотрев зев больного, врач поставил диагноз: тонзиллит (воспаление небных миндалин) При этом было отмечено увеличение размеров лимфатических узлов. Какие это узлы?

*** A) Поднижнечелюстные.**

B) Подподбородочные.

C) Сосцевидные

D) Затылочные.

E) Поверхностные шейные.

288. Лікар стоматолог знайшов неглибоку порожнину з ураженням емалі між двома верхніми центральними різцями. Діагноз: карієс. На який поверхні коронки лікар пломбує зуб?

*** A) Facies contactus mesialis**

B) Facies lingualis

C) Facies occlusialis

D) Facies labialis

E) Facies contactus distalis

289. Під час операції у чоловіка на пахвинному каналі, з приводу грижі, хірург пошкодив його вміст. Визначте, що пошкодив хірург.

*** A) Funiculus spermaticus**

B) Urachus

C) Lig. teres uteri

D) Lig. inguinale

E) -

290. В ведділення черепно-мозкової травми потрапив хворий з пошкодженням великого крила клиноподібної кістки. Лінія перелому пройшла через остистий отвір. Яка судина постраждала?

*** А) Середня оболонна артерія**

- В) Поверхнева скронева артерія
- С) Латеральна крилоподібна артерія
- Д) Передня глибока скронева артерія
- Е) Задня глибока скронева артерія

291. При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність нижніх медіальних різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік.

*** А) 6-7 міс.**

- В) 8-9 міс.
- С) 10-12 міс.
- Д) 13-14 міс
- Е) -

292. У хворого інфаркт міокарда задньої стінки правого шлуночка. Гілки якої артерії тромбовані?

*** А) Правої коронарної артерії**

- В) Лівої коронарної артерії
- С) Лівої та правої коронарної артерії
- Д) Правої підключичної артерії
- Е) Лівої підключичної артерії

293. При ендоскопічному обстеженні дванадцятипалої кишки діагностовано пухлину великого сосочка. Вкажіть локалізацію цього патологічного утворення.

*** А) У низхідній частині**

В) У верхній частині

С) У горизонтальній частині

Д) У висхідній частині

Е) У верхньому згині

294. При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи, лікар повинен пам'ятати про дію м'язу, задні пучки якого тягнуть назад висунуту нижню щелепу. Про який з м'язів йде мова?

*** А) M. temporalis**

В) M. masseter

С) M. pterygoideus medialis

Д) M. pterygoideus lateralis

Е) M. mylohyoideus

295. У хворого при обстеженні було виявлено зміну секреторної функції привушної слинної залози, що пов'язане з порушеннями її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?

*** А) Ganglion oticum**

В) Ganglion ciliare

С) Ganglion pterygopalatinum

Д) Ganglion submandibulare

Е) Ganglion sublinguale

296. У хворого вилучений зуб, у якого коронка овальної форми, на жувальній поверхні два горбки. Корінь сильно здавлений у мезіо-дистальному напрямку, його верхівка роздвоєна. Визначите який зуб вилучений.

*** А) Перший верхній премоляр**

- В) Перший нижній премоляр
- С) Ікло
- Д) Другий верхній премоляр
- Е) Другий нижній премоляр

297. Внаслідок травми у хворого спостерігається порушення функції слізної залози. Який нерв забезпечує її секрецію?

*** А) N. petrosus major**

- В) N. petrosus minor
- С) Chorda tympany
- Д) N. auricularis magnus
- Е) N. occipitalis minor

298. Лікарю необхідно знеболити передній відділ слизової оболонки твердого піднебіння. Блокаду яких нервів йому потрібно зробити?

*** А) Носо-піднебінних нервів**

- В) Нижніх коміркових нервів
- С) Величних нервів
- Д) Глоткових нервів
- Е) Підчонаюмкових нервів

299. Уразі пухлини в ділянці верхніх горбків чотиригорбкової пластинки сталося випадіння зіничного рефлексу. Функція якого ядра черепних нервів вірогідніше всього порушена?

*** А) Додаткового ядра окорухового нерва**

В) Рухового ядра окорухового нерва

С) Рухового ядра відвідного нерва

Д) Рухового ядра блокового нерва

Е) Рухового ядра додаткового нерва

300. На приеме стоматолог обнаружил у пациента кариозные полости на передних зубах, которые не имеют добавочных антагонистов. Назовите эти зубы.

*** А) Нижние медиальные резцы**

В) Нижние латеральные резцы

С) Верхние латеральные резцы

Д) Верхние медиальные резцы

Е) Верхние клыки