

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нормальна анатомія - база тестів 2012 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2012 року**

Кількість запитань: **148**

1. После повреждения мозга у человека нарушено восприятие звука. В каком отделе коры произошло повреждение?

*** А) Височная область коры**

- В) Теменная область коры
- С) Затылочная область коры
- Д) Передняя центральная извилина
- Е) Задняя центральная извилина

2. Повреждение мозга привело к нарушению моторной функции речи. В каком отделе коры произошло повреждение?

*** А) Нижняя лобная извилина**

- В) Височная область коры
- С) Теменная область коры
- Д) Затылочная область коры
- Е) Передняя центральная извилина

3. У хворого порушено кровопостачання медіальної поверхні правої півкулі головного мозку. Яка артерія пошкоджена?

*** А) cerebri anterior**

- В) communicans posterior
- С) cerebri posterior
- Д) cerebri media
- Е) chorioidea

4. У хворого при фіброгастродуоденоскопії виявлене запалення цибулини 12-палої кишки. У якому відділі кишки локалізується запалення?

*** A) Pars superior**

B) Pars descendens

C) Pars horizontalis

D) Pars ascendens

E) -

5. Больная жалуется на боли при жевании, особенно при движении нижней челюсти назад. Какие мышцы поражены?

*** A) Задние пучки височных**

B) Передние пучки височных

C) Медиальные крыловидные

D) Латеральные крыловидные

E) Жевательные

6. Необхідно знечулити праві нижні великі кутні зуби. Куди ввести голку для провідникової анестезії?

*** A) В ділянку правого отвору нижньої щелепи**

B) В ясна нижньої щелепи справа

C) В ділянку правого підборідного отвору

D) В ділянку підчонямокового отвору

E) В ділянку овального отвору

7. Для вправлення вивиху нижньої щелепи необхідно звести її донизу. Яка анатомічна структура обумовлює таку дію?

*** А) Суглобовий горбок вискової кістки**

- В) Нижньощелепна ямка вискової кістки
- С) Виростковий відросток нижньої щелепи
- Д) Вінцевий відросток нижньої щелепи
- Е) Вирізка нижньої щелепи

8. До стоматолога звернулась жінка зі скаргою на втрату смаку на верхівці язика. Лікар виявив, що внаслідок безперервного паління сигарет загинули смакові рецептори, які лежать в papillae:

*** А) Fungiformes**

- В) Lenticiformes
- С) Foliate
- Д) Filiformes
- Е) Vallatae

9. У хворого 25 років, який скаржився на утруднене ковтання, виявлене пухлиноподібне підвищення на корені язика; 1-2 см в діаметрі, в ділянці сліпого отвору. Лікар встановив розростання залишків залози:

*** А) Щитоподібної**

- В) Прищитоподібної
- С) Аденогіпофіза
- Д) Загруднинної
- Е) Під'язикової

10. До стоматолога звернувся хворий зі скаргою на спотворене обличчя, на асиметрію лиця. Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок, віко вужче, очне яблуко виступає вперед. Який нерв уражений?

*** A) VII пари**

B) I пари

C) V пари

D) VI пари

E) IV пари

11. Хворий після порушення кровопостачання головного мозку втратив здатність до написання букв і цифр. В якій частці мозку виникла патологія?

*** A) lobus frontalis**

B) lobus occipitalis

C) lobus temporalis

D) lobus parietalis

E) insula

12. У хворого виявлений фурункул у зовнішньому слуховому проході. Які з перелічених лімфатичних вузлів у першу чергу можуть відреагувати на запальний процес?

*** A) nodi lymphatici parotidei**

B) nodi lymphatici retropharyngeales

C) nodi lymphatici mandibulares

D) nodi lymphatici cervicales superficiales

E) nodi lymphatici cervicales profundi

13. Заболевание печени и желчного пузыря может симулировать аппендицит при следующем положении червеобразного отростка:

*** А) Восходящее**

В) Нисходящее

С) Медиальное

Д) Латеральное

Е) Ретроцекальное

14. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у крилопіднебінну ямку?

*** А) Через нижню очноямкову щілину**

В) Через круглий отвір

С) Через клинопіднебінний отвір

Д) Через верхню очноямкову щілину

Е) Через вилично-очноямковий отвір

15. Під час гінекологічного обстеження пацієнтці був виставлений діагноз ендометриту (запалення ендометрію). Яка частина маткової стінки уражена запальним процесом?

*** А) Слизова оболонка**

В) Серозна оболонка

С) М'язова оболонка

Д) Адвентиційна оболонка

Е) Навколоматкова клітковина

16. У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично-соскоподібного м'яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?

*** А) Зовнішня яремна вена**

В) Передня яремна вена

С) Внутрішня яремна вена

Д) Задня вушна вена

Е) Поперечна вена шиї.

17. При гнійному отиті гноем розрушено верхню стінку барабанної порожнини. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?

*** А) В середню черепну ямку**

В) В задню черепну ямку

С) В передню черепну ямку

Д) В очну ямку

Е) В крило-піднебінну ямку

18. При лабораторному дослідженні в крові хворого відмічено підвищення рівня сахару. Яка з ендокринних залоз уражена?

*** А) Insulae pancreaticae**

В) Glandula suprarenalis

С) Glandula thyroidea

Д) Glandula parathyroidea

Е) Glandula pineale

19. Після травми хворий не може відвести плече. Порушення функції яких м'язів може це визвати?

- * A) Musculus deltoideus**
- B) Musculus infraspinatus
- C) Musculus levator scapule
- D) Musculus teres major
- E) Musculus subscapularis

20. Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепній пазусі справа. У який носовий хід виділяється гній?

- * A) У правий середній носовий хід**
- B) У правий нижній носовий хід
- C) У правий верхній носовий хід
- D) У правий загальний носовий хід
- E) У правий носоглотковий хід

21. Пострадавший получил травму наружной поверхности лица и височной области. Установлен перелом скуловой дуги. Отростки каких костей черепа повреждены?

- * A) Височный отросток скуловой и скуловой отросток височной**
- B) Скуловой отросток лобной и скуловой отросток височной
- C) Височный отросток скуловой и скуловой отросток лобной
- D) Скуловой отросток верхней челюсти и скуловой отросток височной
- E) Скуловой отросток верхней челюсти и скуловой отросток лобной

22. После автомобильной катастрофы травмированный не может производить наклоны головы вперед и назад. Определите в каком суставе произошли повреждения?

*** А) Атланто-затылочном**

В) Атланто-аксиальном латеральном

С) Дугоотростчатых суставах

Д) Атланто-аксиальном срединном

Е) - 19 Больной жалуется на боли при жевании, особенно при выдвижении нижней челюсти вперёд и смещении её в сторону. Функция каких мышц нарушена?

*** F) Латеральные крыловидные**

Г) Медиальные крыловидные

Н) Жевательные

-) Челюстно-подъязычные

-) Височные

23. У обследуемого отмечается резкое опущение угла рта слева. Нарушением функции каких мышц это вызвано?

*** А) Скуловых мышц**

В) Мышцы, опускающей угол рта

С) Мышцы, поднимающей верхнюю губу и крыло носа

Д) Мышцы смеха

Е) Круговой мышцы рта

24. У больного возникают боли при жевании, затруднения при поднятии вверх нижней челюсти (при закрытии рта). Функция каких мышц нарушена?

*** А) Височная, жевательная, медиальная крыловидная**

В) Височная, жевательная, латеральная крыловидная

С) Височная, латеральная и медиальная крыловидные

Д) Латеральная и медиальная крыловидные, жевательная

Е) Височная, жевательная, челюстно-подъязычная

25. Больной поступил в ЛОР-отделение с диагнозом гайморит (воспаление верхнечелюстной пазухи). Каким образом инфекция могла проникнуть в гайморову пазуху?

- * А) Через средний носовой ход**
- В) Через переднюю черепную ямку
- С) Через верхний носовой ход
- Д) Через среднюю черепную ямку
- Е) Через нижний носовой ход

26. При обстеженні хворого з порушенням іннервації шкіри та слизових оболонок обличчя, було виявлено запалення трійчастого вузла та порушення його кровопостачання. Гілкою якої артерії він кровопостачається в нормі?

- * А) meningea media**
- В) carotis interna
- С) A. infraorbitalis
- Д) sphenopalatina
- Е) ophtalmica

27. У жінки розвився неврит лицевого нерва, який призвів до параліча м'язів та погіршення слуху. Погіршення слуху було наслідком параліча:

- * А) Стремінцевого м'яза**
- В) Переднього вушного м'яза
- С) Верхнього вушного м'яза
- Д) Заднього вушного м'яза
- Е) Носового м'яза

28. У хворого на заглотковий абсцес внаслідок розповсюдження гною по міжфасціальному простору шиї виникло запалення органів заднього середостіння. Цим міжфасціальним простором є :

*** А) Позадувісцеральний простір**

- В) Надгруднинний міжапоневротичний простір
- С) Препревісцеральний простір
- Д) Претрахеальний простір
- Е) Піхва сонної артерії

29. Хворий скаржиться на втрату смакової чутливості. Яка ділянка кори ушкоджена?

*** А) Гачку**

- В) Гіпокампі (морському конику)
- С) Підмозолистому полі
- Д) Кутовій звивині
- Е) Прецентральної звивині

30. Потерпілого доставлено у травмпункт. Необхідно здійснити катетеризацію підключичної вени. У якій топографо-анатомічній ділянці будемо проводити пункцію?

*** А) Переддрабинчастому проміжку**

- В) Міждрабинчастому проміжку
- С) Сонному трикутнику
- Д) Мала надключична ямка
- Е) Лопатково-трахеальному трикутнику

31. При обстеженні у хворого виявлено порушення функції змикання очної щілини. Пошкодження якого м'яза можна запідозрити?

- * A) m. orbicularis oculi**
- B) m. procerus
- C) m. orbikularis oris
- D) m. corrugater supercilii
- E) m. depressor supercilii

32. У чоловіка 40 років внаслідок удару по голові з'явилися порушення слуху і парез мимічних м'язів. Лікар поставив йому діагноз - гематома мосто-мозочкового кута. Які нерви при цьому пошкоджені?

- * A) VII, VIII пари черепних нервів**
- B) V, VI, пари черепних нервів
- C) VIII, IX пари черепних нервів
- D) IX, X, пари черепних нервів
- E) XI, XII пара черепних нервів

33. У хворого встановлене зниження гостроти зору, пов'язане з патологією артеріальних судин очного яблука. Яка з перелічених артерій є головним джерелом кровопостачання сітківки?

- * A) a. centralis retinae**
- B) aa. ciliares i
- C) aa. conjunctivales
- D) a, lacrimalis
- E) aa. episclerales

34. Хворий не може підняти опущену нижню щелепу. Які м'язи не виконують своїх функцій?

*** A) Жувальні м'язи**

- B) М'яз-підіймач кута рота
- C) Коловий м'яз рота
- D) Мімічні м'язи
- E) Надчерепний м'яз

35. Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

*** A) N. ulnaris**

- B) N. radialis
- C) N. medianus
- D) N. musculocutaneus
- E) N. cutaneus antebrachii medialis

36. Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер'я. Ушкодження якого з органів, що проектується в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу.

*** A) Lien**

- B) Fundus ventriculi
- C) Flexura coli sinistra
- D) Cauda pancreatis
- E) Ren sinistra

37. Внаслідок операційної травми м'яких тканин шиї справа, порушилися регулярні рухові екскурсії правого куполу діафрагми. Який з нервів нервів вірогідно постраждав?

*** A) N. phrenicus dexter.**

B) N. intercostales.

C) N. vagus

D) N. accessorius

E) Rr. dorsales nervi spinalis

38. До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу боляча. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?

*** A) N. auricularis magnus.**

B) n.occipitalis minor.

C) Nn.supraclaviculares.

D) n.vagus.

E) n.transversus colli.

39. У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці і порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації в променевій артерії). Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш ймовірна?

*** A) Здавлення підключичної артерії.**

B) Здавлення пахової артерії.

C) Здавлення підключичної вени.

D) Здавлення хребтової артерії.

E) Здавлення пахової вени.

40. У хворого запалення верхньощелепного нерва. В якому отворі черепа проходить цей нерв?

*** А) Круглий**

В) Овальний

С) Яремний

Д) Остистий

Е) -

41. У хворого стеноз легеневого стовбура. З якої камери серця починається цей суд?

*** А) Правий шлуночок**

В) Лівий шлуночок

С) Праве передсердя

Д) Ліве передсердя

Е) -

42. У хворого порушений процес акомодатії ока. Який м'яз пошкоджений?

*** А) Musculus ciliaris**

В) Musculus sphincter pupillae

С) Musculus dilatator pupillae

Д) Musculus rectus superior

Е) Musculus rectus inferior

43. Внаслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність якого м'яза блоковано?

*** А) Musculus sphincter pupillae**

В) Musculus ciliaris

С) Musculus dilatator pupillae

Д) Musculus rectus superior

Е) Musculus rectus inferior

44. У хворого спостерігаються погіршення відчуття смаку з передніх 2/3 частин язика. Функція якого нерва порушена?

*** А) Барабанна струна**

- В) Язиковий нерв
- С) Нижній луночковий нерв
- Д) Великий кам'янистий нерв
- Е) Малий кам'янистий нерв

45. У чоловіка внаслідок поранення ділянки передньої поверхні плеча рука не згинається у ліктьовому суглобі. Який з названих м'язів вірогідно постраждав?

*** А) m.biceps brachii**

- В) m.deltoideus
- С) m.pectoralis major
- Д) m.triceps brachii

Е) m.anconeus 43 У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі, сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. Якого саме?

*** F) VI**

- Г) V
- Н) IV
-) III
-) II

46. У дитини природжене спастичне скорочення м'язів на одній стороні шиї, або "кривошия". Який м'яз при цьому страждає?

*** А) Грудинноключичнососцеподібний**

- В) Підшкірний
- С) Грудиннопід'язичний
- Д) Грудиннощитоподібний
- Е) Лопаточнопід'язичний

47. У хворого відсутня чутливість в передній ділянці шиї. Який нерв із шийного сплетіння пошкоджено?

*** A) Поперечний шийний**

- B) Великий вушний
- C) Малий потиличний
- D) Надключичний
- E) Шийна петля

48. Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального положення. Який із м'язів ймовірно пошкоджений?

*** A) m.deltoideus**

- B) m.triceps brachii
- C) m.anconeus
- D) m.coracobrachialis
- E) m.supinator

49. У хворого очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого з мімічних м'язів порушена?

*** A) m.orbicularis oculi**

- B) m.procerus
- C) m.corrugator supercilli
- D) m.occipitofrontalis [venter frontalis]
- E) m.zygomaticus major

50. У хворого спостерігається порушення функції білявушної слинної залози. Який нерв посилює її секрецію?

- * А) n.petrosus minor**
- В) n.petrosus major
- С) n.petrosus profundus
- Д) n.auricularis minor
- Е) n.auricularis major

51. У хворого стався тромбоз нижньої брижової артерії. Які відділи кишківника можуть бути враженими?

- * А) Сигмовидна кишка**
- В) Дванадцятипала кишка
- С) Клубова кишка
- Д) Червоподібний відросток
- Е) Шлунок

52. У 60 річного хворого на заглотковий абсцес внаслідок розповсюдження гною по міжфасціальному простору шиї виникло запалення органів заднього середостіння. Цим міжфасціальним простором є :

- * А) Занутряний простір**
- В) Надгруднинний міжапоневротичний простір
- С) Переднутряний простір
- Д) Передтрахейний простір
- Е) Піхва сонної артерії

53. У хворого 12 років запальний процес у внутрішньому вусі викликав розлите ураження оболон мозку. Лікар припустив, що процес розповсюдився через сполучення між субарахноїдальним простором головного мозку та перилімфатичним простором внутрішнього вуха. Через яке анатомічне утворення розповсюдилось запалення?

*** А) Aqueductus vestibuli**

- В) Fossa subarcuata
- С) Hiatus canalis n. petrosi majoris
- Д) Hiatus canalis n. petrosi minoris
- Е) Fissura petrosquamosa

54. При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої травми, він не може опустити донизу нижню щелепу. Пошкодження якого м'язу може бути причиною вказаної патології?

*** А) підборідно-під'язикового**

- В) жувального
- С) скроневого
- Д) медіального криловидного
- Е) латерального криловидного

55. У хворого 52 років раптово з'явилась асиметрія лиця. Вся уражена половина лиця непорушна, носогубна складка згладжена, очна щілина розширена; око не закривається, кут рота опущений. Вказаний синдром викликаний ураженням якого нерва?

*** А) Лицевого.**

- В) Трійчастого.
- С) Язикоглоткового.
- Д) Додаткового.
- Е) Під'язикового.

56. У хворого спостерігається біль та відчуття оніміння в слизовій ясен верхньої щелепи. Які з нервів можуть бути ушкоджені?

*** A) Nn. alveolaris superiores (n.maxillaris).**

B) N.alveolaris inferior

C) N. buccalis

D) N. lingualis

E) N.facialis

57. В результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки ві очної ямки потерпілий втратив можливість піднімати верхню повіку і дивитися угору. Який нерв вірогідно пошкоджений?

*** A) R. superior n.oculomotorius.**

B) R. inferior n.oculomotorius.

C) N. trochlearis

D) N. abducens.

E) N. ophthalmicus.

58. У хворого при висуванні язика спостерігається відхилення його верхівки вліво. Рухова інервація якого черепного нерву порушена у цьому випадку?

*** A) N.hypoglossus dexter.**

B) N.glossopharyngeus dexter.

C) N. vagus dexter.

D) N. trigeminus sinister.

E) N.facialis sinister

59. У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад сприймання смаку в передній частині язика. Який з нервів постраждав?

*** A) n.facialis.**

B) n.trigeminus.

C) n.vestibulo-cochlearis.

D) n.vagus.

E) n.glossopharyngeus.

60. До травматологічного відділення доставлено чоловіка з закритою травмою живота праворуч та підозрою на розрив печінки. В якому з приведених утворень очеревини слід чекати скопичення крові?

*** A) В прямокишково-міхуровій заглибині**

B) В верхньому клубово-сліпокишковому заутку.

C) В міжсигмовидному заутку.

D) В сальниковій сумці.

E) В лівій приободовій борозні.

61. Після травми м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з названих нервів знаходиться в зоні ушкодження?

*** A) N.ulnaris.**

B) N. musculocutaneus.

C) N. dorsalis scapularis.

D) N. subscapularis.

E) N.radialis.

62. До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу боляча. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?

*** A) N. auricularis magnus.**

B) n. transversus colli.

C) n. occipitalis minor.

D) n. supraclaviculares.

E) n. vagus.

63. При аускультатії серця було встановлено роздвоєння I тону в V міжреберному просторі по середньоключичній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

*** A) Двостулкового**

B) Тристулкового

C) Клапана аорти

D) Клапана легеневого стовбура

E) Клапана верхньої порожнистої вени

64. При аускультатії серця було встановлено роздвоєння I тону на основі мечоподібного відростка грудини. Патологія якого клапана вислухав лікар?

*** A) Тристулкового**

B) Двостулкового

C) Клапана аорти

D) Клапана легеневого стовбура

E) Клапана верхньої порожнистої вени

65. При аускультатії серця був визначений діастолічний шум в II міжреберному проміжку по правій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

*** А) Клапана аорти**

- В) Двостулкового
- С) Тристулкового
- Д) Клапана легеневого стовбура
- Е) Клапана верхньої порожнистої вени

66. При аускультатії серця був визначений систолічний шум в II міжреберному проміжку по лівій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

*** А) Клапана легеневого стовбура**

- В) Двостулкового
- С) Тристулкового
- Д) Клапана аорти
- Е) Клапана верхньої порожнистої вени

67. У чоловіка 40 років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперив не втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?

*** А) Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка**

- В) М'ясисту оболонку
- С) Внутрішню сім'яну фасцію
- Д) М'яз підіймач яєчка
- Е) Зовнішню сі'яну фасцію

68. У хворої жінки 52-років після травми при огляді лікар констатував зниження пульсації, блідність шкіри і зниження температури в області великого пальця правої руки. Ушкодження якої з артерій верхньої кінцівки найімовірніше приводить до таких наслідків?

*** A) a. princeps pollicis**

B) a. ulnaris

C) a. radialis

D) a. digitalis communis

E) a. digitalis propria

69. У лікарню поступила хвора на гіпертонічну хворобу 61 року, у якої виявлено аневризму a. communicans posterior артеріального кола великого мозку. Які судини цього кола вона з'єднує в нормі?

*** A) carotis interna et a. cerebri posterior**

B) carotis interna et a. cerebri media

C) carotis externa et a. cerebri anterior

D) cerebri anterior et a. cerebri media

E) cerebri media et a. cerebri posterior

70. У больного с желчекаменной болезнью развилась механическая желтуха. При обследовании установлено, что камень находится в общем желчном протоке. Какие желчевыводящие протоки образуют обтурированный проток?

*** A) Ductus hepaticus communis et ductus cysticus**

B) Ductus hepaticus dexter et sinister

C) Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus

D) Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus

E) Ductus hepaticus communis et ductus choledochus

71. У больной с опухолью поджелудочной железы развилась механическая желтуха вследствие сдавления желчевыводящего протока. Какой проток подвергся сдавлению?

*** A) Ductus choledochus**

B) Ductus cysticus

C) Ductus hepaticus communis

D) Ductus hepaticus dexter

E) Ductus hepaticus sinister

72. В кардиологическое отделение поступила больная с нарушением кровоснабжения левого предсердия. Изменение кровотока какой артерии привело к данному состоянию

*** A) R. Circumflexus**

B) R. interventricularis anterior

C) coronaria dextra

D) R. interventricularis posterior

E) R. r. ventriculares

73. У больного при обследовании в кардиологическом отделении установлено нарушение венозного оттока от задних стенок обоих желудочков. Нарушение кровотока в какой вене оно вызвано?

*** A) V. cordis media**

B) V. cordis magna

C) V. v. cordis minimae

D) V. cordis parva

E) V. obliqua atrii sinistri

74. У хворого наявна гіперестезія шкіри присередньої поверхні плеча. З паталогією якого нерва це пов'язано?

*** А) Присереднього шкірного нерва плеча.**

- В) Серединного.
- С) Ліктьового.
- Д) Променевого.
- Е) Пахвового.

75. У медико-генетичній консультації було проведено обстеження вагітної жінки (20-тижнева вагітність). На УЗО плід розвинутий нормально, у серцево-судинній системі відхилень від норми немає, артеріальна протока функціонує. Які судини плода вона з'єднує?

*** А) Легеневий стовбур з аортою**

- В) Легеневий стовбур з легеневими венами
- С) Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною
- Д) Аорту з нижньою порожнистою веною
- Е) Аорту з верхньою порожнистою веною

76. У жінки 28 років виявлена позаматкова вагітність, яка ускладнилася розривом маткової труби. У який простір очеревини можливе попадання крові?

*** А) Прямокишково - матковий**

- В) Міхурово - матковий
- С) Правий брижовий синус
- Д) Лівий брижовий синус
- Е) Міжсигмовидний синус

77. У військкоматі , на УЗО-діагностиці у хлопчика 19 років було виявлено опущення нирки. На рівні яких хребців розташовані нирки в нормі?

*** А) 11 грудного та 3 поперекового**

В) 9-10 грудних

С) 4-5 поперекових

Д) 12 грудного та 1 поперекового

Е) 9-12 грудних

78. У дитини 2 років після перенесеного грипу з'явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?

*** А) через слухову трубу**

В) через foramen jugularis

С) через canalis caroticus

Д) через atrium mastoideum

Е) через canalis nasolacrimalis

79. У дитини 1-го року життя виявлена одна з вад розвитку серцево-судинної системи - незарощення боталової протоки. Вкажіть місце її локалізації.

*** А) Судина, що з'єднує легеневу артерію і аорту**

В) Міжпредсердна перегородка

С) Міжшлуночкова перегородка

Д) Судина, що з'єднує пупочну і ніжню порожнисту вену

Е) Судина, що з'єднує воротну і ніжню порожнисту вену

80. У ребенка 1-го года жизни выявлен один из недостатков развития сердечно-сосудистой системы - незаращение боталового протока. Укажите место его локализации.

- * А) Сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту**
- В) Межпредсердная перегородка
- С) Межжелудочковая перегородка
- Д) Сосуд, соединяющий пупочную и нижнюю полую вену
- Е) Сосуд, соединяющий воротную и нижнюю полую вену

81. У хворого запалення під'язикового сосочка. Із яких слинних залоз буде затруднено виділення слини?

- * А) Під'язикова і піднижньощелепна**
- В) Під'язикова і привушна
- С) Привушна і піднижньощелепна
- Д) Привушна і піднебінна
- Е) Під'язикова і щічна

82. При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини?

- * А) 6-7 років**
- В) 4-5 років
- С) 8-9 років
- Д) 10-11 років
- Е) 12-13 років

83. В микропрепарате спинного мозга необходимо проанализировать состояние ядра, нейроны которого образуют моторные окончания в скелетной мускулатуре. Укажите данное ядро.

*** А) Собственное ядро переднего рога.**

- В) Грудное ядра.
- С) Промежуточное латеральное ядро.
- Д) Собственное ядро заднего рога.
- Е) Собственное ядро серого вещества

84. До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш відповідні?

*** А) Щитовидної залози**

- В) Прищитовидної залози
- С) Підшлункової залози
- Д) Яєчників
- Е) Наднирків

85. До лікаря звернувся чоловік 27 років. При огляді було виявлено збільшення кистей, стоп та нижньої щелепи. Крім того спостерігалась деформація суглобів (kiphosis), гормональні порушення (імпотенція, атрофія яєчок). Функції якої залози порушені?

*** А) Передньої частини гіпофізу**

- В) Надниркових залоз
- С) Шишкоподібного тіла
- Д) Щитовидної залози
- Е) Прищитовидних залоз

86. На розтині померлого після абдомінальної операції в венах малого тазу були знайдені численні тромби. Клінічно був зафіксований тромбоемболічний синдром. Де слід шукати ембол?

*** А) Легеневі артерії**

- В) Портальна вена
- С) Лівий шлуночок серця
- Д) Головний мозок
- Е) Вени нижніх кінцівок

87. У ребенка установлена врожденная расщелина верхней губы (“заячья губа”) и переднего отдела неба (“волчья пасть”). Несращением каких отростков вызван этот дефект?

*** А) Носового, небного**

- В) Верхнечелюстного, лобного
- С) Небного, нижнечелюстного
- Д) Нижнечелюстного, носового
- Е) Носового, лобного

88. В ендокрінологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька разів були переломи кінцівок пов'язані з крихкістю кісток. Функція якої ендокрінної залози порушена?

*** А) паращитовидна залоза**

- В) щитовидна залоза
- С) вилочкова залоза
- Д) надниркові залози
- Е) епіфіз

89. Во время драки 20-летний мужчина получил ножевое ранение шеи с повреждением наружной сонной артерии. Для временной остановки кровотечения эффективным методом является пальцевое прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку 6 шейного позвонка. В каком треугольнике шеи нужно осуществить пальцевое прижатие сонной артерии для остановки кровотечения?

*** А) Сонном**

- В) Поднижнечелюстном
- С) Пирогова
- Д) Лопаточно-трахеальном
- Е) Лопаточно-ключичном

90. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Біпрогнатія**

- В) Ортогнатія
- С) Прямий прикус
- Д) Закритий прикус
- Е) Прогенія

91. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями. Контакт між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Відкритий прикус**

- В) Ортогнатія
- С) Прямий прикус
- Д) Закритий прикус
- Е) Прогенія

92. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається повне перекриття нижніх різців верхніми (верхні різці закривають нижні). Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Закритий прикус**

- В) Прямий прикус
- С) Відкритий прикус
- Д) Прогенія
- Е) Ортогнатія

93. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається правильне змикання передніх зубів, а щічні жувальні горбики нижніх кутних зубів розміщені не досередини, а до зовні від верхніх. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Перехресний прикус**

- В) Прямий прикус
- С) Відкритий прикус
- Д) Прогенія
- Е) Закритий прикус

94. Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність каріозної плями в ділянці язиково-дистальної борозни на жувальній поверхні правого першого верхнього моляра. Ця борозна відмежовує:

*** А) Гіпоконус.**

- В) Параконус.
- С) Метаконус
- Д) Мезоконус.
- Е) Протоконус.

95. З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

*** A) LIII -LIV**

B) LII -LIII

C) LI -LII

D) TXII-LI

E) LV-SI

96. Небезпечно витискувати гноячки на лиці, особливо вище ротової щілини. Через які венозні анастомози може поширитися інфекція у порожнину черепа?

*** A) Анастомози вен лица з очними венами.**

B) Анастомози вен лица з криловидним сплетенням.

C) Анастомози вен лица з передніми вушними венами.

D) Анастомози з потиличною веною.

E) Анастомози вен лица з середньою і глибокими висковими венами.

97. Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (Дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?

*** A) Задню.**

B) Передню.

C) Бічну праву.

D) Бічну ліву.

E) Будь-яку.

98. Хворому 67 років для виготовлення функціонально повноцінного протеза необхідно видалити ліве верхнє ікло. Після інфраорбітальної анестезії у хворого з'явилась гематома в передній ділянці лица, яка швидко збільшувалась. Було встановлено, що травмовано артерію, яка є гілкою:

*** A) a. maxillaris**

B) a. facialis

C) a. temporalis superficialis

D) a. ophthalmica

E) a. labialis superior

99. Мати привела на консультацію до стоматолога дитину з недорозвинутим язиком. Лікар встановив аплазію м'язів язика, які є похідними:

*** A) Потиличних міотомів**

B) Мезодерми верхньощелепних відростків I-ої зябрової дуги

C) Мезодерми нижньощелепних відростків I-ої зябрової дуги

D) Мезодерми III, IV зябрових дуг

E) Мезодерми II-ої зябрової дуги

100. Стоматолог при обстеженні 23-річного хворого встановив, що хворий не може нижню губу висовувати вперед. Який нерв вражений?

*** A) R. Marginalis mandibulae**

B) N. mentalis

C) N. buccalis

D) N. infraorbitalis

E) N. sublingualis

101. Дитина 5 років поступила в лор- відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха . Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину ?

*** А) М'язовотрубний канал.**

- В) Барабанний каналець.
- С) Сонний канал.
- Д) Каналець барабанної струни.
- Е) Сонно-барабанні канальці.

102. У хворого після перенесеного простудного захворювання виникло порушення міміки. Він не може закривати очі, наморщувати брови, вискалювати зуби. Який нерв пошкоджено?

*** А) Лицевий**

- В) Блукаючий
- С) Трійчастий
- Д) Язикоглотковий
- Е) Інфраорбітальний

103. Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?

*** А) Середньому**

- В) Верхньому
- С) Нижньому
- Д) Загальному
- Е) Над верхньою носовою раковиною

104. Хворий втратив смак в передній частині двох-третіх язика. Порушення функції якого нерва можна припустити?

*** А) Барабанної струни**

- В) Язикоглоткового нерва
- С) Блукаючого нерва
- Д) Під'язикового нерва
- Е) Додаткового нерва

105. У хворого порушена моторна функція язика. З патологією якого нерва це пов'язано?

*** А) Під'язикового**

- В) Блукаючого
- С) Язикоглоткового
- Д) Лицевого
- Е) Додаткового

106. При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка з перешкода (пухлина)?

*** А) В воротарному**

- В) В кардіальному
- С) В ділянці дна
- Д) В ділянці тіла
- Е) У ділянці малої кривизни

107. У хворого після простудної захворювання виникло порушення виділення слюзи. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?

- * А) Крилопіднебінний**
- В) Війчастий
- С) Вушний
- Д) Піднижньощепепний
- Е) Під'язиковий

108. У хворого після простудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?

- * А) Трійчастий**
- В) Під'язиковий
- С) Діафрагмальний
- Д) Блукаючий
- Е) Барабанна струна

109. Після перенесеного простудного захворювання у хворого з'явилося оніміння в ділянці правої половини обличчя. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливості правої половини обличчя. Який нерв ушкоджено?

- * А) Трійчастий**
- В) Лицевий
- С) Язикоглотковий
- Д) Блукаючий
- Е) Під'язиковий

110. Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?

*** А) В середньому**

- В) В верхньому
- С) В нижньому
- Д) У загальному
- Е) В найвищому

111. В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може розповсюджуватись інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?

*** А) В грудну порожнину - переднє середостіння**

- В) В грудну порожнину - в середнє середостіння
- С) В грудну порожнину - в заднє середостіння
- Д) В ретровісцеральний простір
- Е) В надгрудинний міжапоневротичний простір

112. Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи м'язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?

*** А) Tr.cortico-nuclearis.**

- В) Tr.cortico-spinalis.
- С) Tr.cortico-thalamicus.
- Д) Tr.cortico-fronto-pontinus.
- Е) Tr.thalamo-corticalis.

113. Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з'явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

*** А) Підшлункової**

- В) Щитоподібної
- С) Статевих
- Д) Наднирникових
- Е) Епіфіза

114. Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

*** А) гіпофіза**

- В) щитоподібної
- С) статевих
- Д) наднирникових
- Е) епіфіза

115. При цистоскопії у нормі слизова оболонка сечового міхура утворює складки за винятком однієї ділянки трикутної форми, де слизова оболонка гладка. В якій частині сечового міхура знаходиться цей трикутник?

*** А) дно міхура**

- В) шийка міхура
- С) верхівка міхура
- Д) тіло міхура
- Е) перешийок міхура

116. В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

*** A) IX**

B) X

C) VIII

D) V

E) XII

117. У дітей часто можна спостерігати затруднене носове дихання, яке пов'язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

*** A) Tonsilla pharyngea**

B) Tonsilla palatina

C) Tonsilla lingualis

D) Tonsilla tubaria

E) Усіх названих мигдаликів

118. Чоловік 42 років звернувся до медпункта з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно: затруднене згинання передпліччя. Які з названих м'язів ймовірно ушкоджені у хворого?

*** A) M. brachialis, m. biceps brachii.**

B) M. biceps brachii, m. anconeus.

C) M. coracobrachialis, m. supraspinatus.

D) M. deltoideus, m. infraspinatus.

E) M. deltoideus, m. biceps brachii.

119. При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованій стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

*** A) N.abducens.**

B) N.trochlearis.

C) N.oculomotorius.

D) N.opthalmicus.

E) N. infraorbitalis..

120. При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість,розширений зрачок, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений?

*** A) Окоруховий**

B) Очний

C) Блоковий

D) Відвідний

E) Зоровий

121. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

*** A) Вовча паща.**

B) Викривлення носової перегородки вправо.

C) Перелом основи черепа.

D) Заяча губа.

E) Викривлення носової перегородки вліво.

122. У поступившего в клинику больного отмечают: сильная головная боль, ригидность мышц затылка, повторная рвота, болезненность при перкуссии черепа, повышена чувствительность к световым раздражителям. Установлен диагноз — менингит. Показана спинномозговая пункция. Укажите место ее проведения.

*** А) Между 3 и 4 поясничными позвонками**

В) Между 1 и 2 поясничными позвонками

С) Между 12 грудным и 1 поясничным позвонками

Д) Между 5 поясничным и основанием крестца

Е) Между 11 и 12 грудными позвонками

123. При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив в реанімаційне відділення лікарні з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна дуга, яка лежить у:

*** А) spatium interaponeuroticum suprasternale.**

В) spatium pretracheale.

С) spatium retropharyngeale.

Д) spatium interscalenum.

Е) spatium antescalenum.

124. При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринно залози може спричинити таке руйнування кістки?

*** А) Гіпофіз**

В) Вилочкова залоза

С) Епіфіз

Д) Щитовидна залоза

Е) Наднирник

125. У хворого діагностовано ураження лицевого нерва. На якому рівні пошкоджений нерв, якщо у хворого спостерігається таке сполучення клінічних симптомів: параліч мимічних м'язів, порушення смакової чутливості передньої частини язика, сухість в роті (зменшення слиновідділення). Зниження слюзовідділення немає.

*** А) В каналі лицевого нерву нижче коліна, після відходження великого кам'янистого нерва.**

В) На основі мозку.

С) В каналі лицевого нерву, до відходження великого кам'янистого нерва.

Д) Після виходу нерва з каналу.

Е) В білявушній залозі.

126. Заболевание печени и желчного пузыря может симулировать аппендицит при следующем положении червеобразного отростка:

*** А) Восходящее.**

В) Нисходящее.

С) Медиальное.

Д) Латеральное.

Е) Ретроцекальное.

127. У новонародженої дитини на протязі першої доби педіатр помітив, що при смоктанні молока воно потрапляє у носову порожнину. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

*** А) Незарощення піднебіння**

В) Дивертікул стравоходу

С) Атрезія стравоходу

Д) Заяча губа

Е) Звуження стравоходу

128. У хворого 52 років раптово з'явилась асиметрія лиця. Вся уражена половина лиця непорушна, носогубна складка згладжена, очна щілина розширена; око не закривається, кут рота опущений. Вказаний синдром викликаний ураженням якого нерва ?

*** А) Лицевого.**

В) Язикоглоткового.

С) Трійчастого.

Д) Додаткового.

Е) Під'язикового.

129. Дитина, 5 років, потрапила в тяжкому стані в інфекційний відділ клінічної лікарні з діагнозом дифтерії. Для запобігання ядухи дитині провели трахеостомію, В якому трикутнику шиї проведена дана операція ?

*** А) Omotracheale.**

В) Caroticum.

С) Omoclaviculare.

Д) Submandibulare.

Е) Omotrapezoideum.

130. Хворий 28 років на виробництві отримав хімічний опік обличчя і рідина потрапила в око. Хворий втратив зір. Яка структура очного яблука ушкоджена внаслідок хімічного опіку?

*** А) Рогівка**

В) Кришталик

С) Склисте тіло

Д) Сітківка

Е) Райдужка

131. Після травми обличчя у хворого гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози блоковано гематомою?

*** А) привушна**

- В) під'язикова
- С) піднижньощелепна
- Д) губна
- Е) щічна

132. В зв'язку з наявністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід його видалити. В якому місці легко знайти язичну артерію і перев'язати її?

*** А) Трикутнику Пирогова.**

- В) В сонному трикутнику.
- С) Влопаточно-підключичному трикутнику.
- Д) В лопаточно-трапецієвидному трикутнику.
- Е) В лопаточно-трахейному трикутнику.

133. У хворого з лікар діагностував тромбоз селезінкової артерії (інфаркт селезінки). Звідки відходить уражена артерія?

*** А) Черевний стовбур**

- В) Верхня брижова артерія
- С) Нижня брижова артерія
- Д) Загальна печінкова артерія
- Е) Ліва шлункова артерія

134. У боксера після удару в привушну ділянку зліва виник параліч м'язів на цій же стороні. Який нерв ушкоджено?

*** А) Лицевий**

В) Очний

С) Верхньощелепний

Д) Нижньощелепний

Е) Малий кам'янистий нерв

135. При обстеженні дитини лікар виявив набряк та гіперемію лімфоїдної тканини в ділянці мигдаликової ямки. Який з мигдаликів міститься в нормі в цьому місті?

*** А) Tonsilla palatina**

В) Tonsilla pharyngealis

С) Tonsilla tubaria

Д) Tonsilla lingualis

Е) -

136. У пациента с повреждением промежуточного мозга выявлено нарушение слуха. Какие структуры при этом повреждены?

*** А) Медиальные коленчатые тела**

В) Латеральные коленчатые тела

С) Красное ядро

Д) Передние ядра гипоталамуса

Е) Заднее вентральное ядро

137. После повреждения мозга у человека нарушено восприятие зрительной информации. В каком отделе коры произошло повреждение?

*** А) Затылочная область коры**

- В) Теменная область коры
- С) Височная область коры
- Д) Передняя центральная извилина
- Е) Задняя центральная извилина

138. В хірургічне відділення доставлено потерпілого з пораненням променевої поверхні передпліччя. З рани витікає венозна кров. Яка судина постраждала?

*** А) V. cephalica**

- В) V. basilica
- С) V. intermedia cubiti
- Д) Vv. ulnares
- Е) Vv. brachiales

139. При операції на шлунку хірург пересік ліву шлункову артерію, перев'язав її, але кров продовжувала витікати з протилежного кінця артерії. Яка артерія анастомозує з нею?

*** А) Права шлункова артерія**

- В) Селезінкова артерія
- С) Права шлунково-чепцева артерія
- Д) Ліва шлунково-чепцева артерія
- Е) Верхня підшлунково-дванадцятипала артерія

140. До ЛОР-лікаря звернулася жінка зі скаргами на порушення нюху. Під час огляду виявлено атрофічні зміни regio olfactoria слизової оболонки носової порожнини. Де вона знаходиться?

*** А) В ділянці верхнього носового ходу**

В) В ділянці середнього носового ходу

С) В ділянці нижнього носового ходу

Д) В ділянці загального носового ходу

Е) -

141. В приймальний покій лікарні доставлено хворого з гострою затримкою сечі. При огляді лікар встановив, що в хворого обтурація сечівника зв'язана з патологією органу, який його охоплює. Про який орган йде мова?

*** А) Передміхурова залоза**

В) Яєчко

С) Сім'яний пухирець

Д) Сім'яний канатик

Е) Надяєчко

142. Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функцій якого з основних м'язів може це спричинити?

*** А) m. triceps brachii**

В) m. subscapularis

С) m. teres major

Д) m. infraspinatus

Е) m. levator scapulae

143. Хворому проведено лобектомію правої середньої частки легені. Які сегменти були ураженні?

*** А) Бічний та присередній**

- В) Верхівковий, передній
- С) Присередній і передній основні
- Д) Задній і бічний основні
- Е) Верхівково-задній та передній

144. Щоб взяти спинномозкову рідину для дослідження лікар повинен зробити пункцію підпавутинного простору спинного мозку. Між якими хребцями треба ввести голку, щоб не пошкодити спинний мозок?

*** А) Між III і IV поперековими хребцями.**

- В) Між XI і XII грудними хребцями.
- С) Між XII грудним і I поперековими хребцями.
- Д) Між I і II поперековими хребцями.
- Е) Між IV і V грудними хребцями.

145. У приймальне відділення лікарні доставлений хлопчик з ознаками внутрішньої кровотечі після удару у ліву підреберну ділянку. Який орган найімовірніше пошкоджений?

*** А) Селезінка**

- В) Шлунок
- С) Підшлункова залоза
- Д) Ліва нирка
- Е) Поперечна ободова кишка

146. Пацієнт звернувся до окуліста зі скаргами на опущення верхньої повіки. При обстеженні була діагностована пухлина головного мозку. Ядро якої пари черепних нервів уражено патологічним процесом?

*** А) III**

В) II

С) IV

Д) VI

Е) VII

147. Хворого госпіталізовано з остеомієлітом верхньої щелепи, внаслідок чого відбулося розплавлення стінки орбіти. Яка стінка очної ямки пошкоджена?

*** А) нижня**

В) верхня

С) медіальна

Д) латеральна

Е) -

148. Хворий госпіталізований з травмою медіальної групи м'язів стегна. Які види рухів не зможе робити хворий?

*** А) приведення стегна**

В) відведення стегна

С) згинання стегна

Д) розгинання стегна

Е) супінацію стегна