

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Фармакологія - база тестів 2013 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2013 року**

Кількість запитань: **240**

1. У хворого після екстракції зуба розвинулася гостра серцева недостатність. Який препарат доцільно призначити?

*** А) Строфантин**

- В) Дигітоксин
- С) Кордігіт
- Д) Настойку конвалії
- Е) Адонізид

2. Хворому на бронхіальну астму призначено кетотифен. Який механізм антиалергічної дії цього препарату?

*** А) стабілізує мембрани тучних клітин**

- В) Блокує H2-рецептори.
- С) Блокує H1- та H2-рецептори.
- Д) Порушує синтез гістаміну.
- Е) Активує ферменти деградації гістаміну.

3. У больного стоматит, воспаление слизистой полости рта. Какое из перечисленных веществ с местным антиэкссудативным действием следует использовать в этом случае?

*** А) Квасцы**

- В) Висмута субнитрат
- С) Натрия гидрокарбонат
- Д) Дерматол
- Е) Ксероформ

4. У больного после введения новокаина для проведения проводниковой анестезии возник анафилактический шок. Какое из названных средств предпочтительно как первоочередной препарат выбора?

*** А) Адреналин**

- В) Мезатон
- С) Диазолин
- Д) Димедрол
- Е) Дипразин

5. У больного появилось чувство жжения в ротовой полости, белый пушистый налет на языке. Диагностирована молочница. Какое из предлагаемых средств следует использовать?

*** А) Нистатин**

- В) Амфотерицин
- С) Гризеофульвин
- Д) Тетрациклин
- Е) Гентамицин

6. Для лікування абсцедуючого парадонтозу був призначений ферментний препарат з групи протеолітичних ферментів. Визначте препарат.

*** А) Трипсин кристалічний**

- В) Лідаза
- С) Стрептоліаза
- Д) Актилізе
- Е) Контрикал

7. Хворий довгий час вживав антибіотики широкого спектру, що викликали зниження апетиту, нудоту, проносну дію, випорожнення з гнилосним запахом, похудіння. Про яку побічну дію йдеться мова?

*** А) Дисбактеріоз**

- В) Алергічна реакція
- С) Пряма подразнююча дія
- Д) Гепатотоксична дія
- Е) Нефротоксична дія

8. У реанімаційне відділення поступив хворий з ознаками гострого отруєння морфіном. Який засіб необхідно використати у даному випадку для промивання шлунка?

*** А) Калію перманганат**

- В) Натрію гідрокарбонат
- С) Фурацилін
- Д) Розчин натрія хлориду
- Е) Борну кислоту

9. Хворому в післяопераційному періоді тривалий час вводили промедол. Після відміни препарату у пацієнта виникли важкі психічні та соматичні порушення. Як називається це явище?

*** А) Абстинентний синдром**

- В) Ідіосинкразія
- С) Тахіфілаксія
- Д) Синдром обкрадання
- Е) Синдром віддачі

10. Для більш швидкого введення в наркоз хворому застосовано наступну комбінацію: ефір для наркозу + азоту закис + фторотан. Який це тип взаємодії лікарських засобів?

- * А) Сумований синергізм**
- В) Синергоантагонізм
- С) Потенційований синергізм
- Д) Фізичний антагонізм
- Е) Опосередкований синергізм

11. У хворого діагностовано гострий інфаркт міокарду, який супроводжується стійкими болями за грудиною. Неефективність попередньо введених препаратів дала підставу лікарю провести нейролептанальгезію. Який нейролептик використовується для цього виду знеболення?

- * А) Дроперидол**
- В) Метаперазин
- С) Галоперидол
- Д) Резерпин
- Е) Аміназин

12. В лікарню доставлено важко хворого, який по дорозі втратив свідомість. Щоб привести його до тями, лікар дав йому понюхати розчин аміку. Який вид дії лежить в основі фармакологічного ефекту препарату?

- * А) Рефлекторна дія**
- В) Резорбтивна дія
- С) Місцева дія
- Д) Вибіркова дія
- Е) Етіотропна дія

13. У хворого, що звернувся в лікарню із скаргами на пронос, діагностували амебну дизентерію. В комплексне лікування був включений тетрациклін. Який вид дії призначеного препарата?

*** А) Етіотропна дія**

- В) Пряма дія
- С) Рефлекторна дія
- Д) Основна дія
- Е) Незворотня дія

14. У хворого, який звернувся до лікаря, діагностували анацидний гастрит. Для покращення роботи шлунка хворому призначили таблетки ацедин-пепсину. Який вид лікування був призначений хворому?

*** А) Замісна терапія**

- В) Симптоматична терапія
- С) Профілактичне застосування
- Д) Етіотропна терапія
- Е) Каузальна терапія

15. Який із зазначених лікарських засобів слід додати до розчину лідокаїну для збільшення тривалості його дії.

*** А) Адреналін**

- В) Кофеїн
- С) Анальгін
- Д) Атропін
- Е) Анаприлін

16. Стоматологічному хворому для пригнічення страху перед болем призначили психоседативний засіб. Який препарат найбільш ефективний в цьому випадку?

*** А) Діазепам**

В) Аміназин.

С) Літію карбонат.

Д) Настоянка валеріани.

Е) Натрію бромід.

17. Хворому з діагнозом цукровий діабет II типу ендокринолог призначив глібенкламід. Вкажіть основний механізм дії цього засобу.

*** А) Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса**

В) Пригнічує глюконеогенез

С) Підсилює метаболізм глюкози

Д) Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами

Е) Активує транспорт глюкози в клітину

18. Хвора 50 років госпіталізована в клініку з нападом стенокардії у поєднанні з бронхіальною астмою. Після призначення анаприліну у хворого виник бронхоспазм. Який препарат слід було призначити в даному випадку?

*** А) Метопролол**

В) Еуфілін.

С) Карбокромен.

Д) Платифілін.

Е) Ізадрин.

19. Вагітна жінка страждає від печії. Який засіб є оптимальним в даному випадку?

*** А) Альмагель.**

В) Натрію гідрокарбонат.

С) Вісмуту субнітрат.

Д) Ранітидин.

Е) Омепразол.

20. Хворому 60 років було встановлено діагноз цироз печінки, причиною якого було токсичне ураження алкоголем. Який препарат краще за все призначити хворому?

*** А) Ессенціале**

В) Вітамін Е

С) Аскорбінову кислоту

Д) Рибоксін

Е) Кислота глютамінову

21. Для патогенетичного лікування невралгій, в т.ч. і альвеолярних нервів, використовують ненаркотичні анальгетики. Виберіть найбільш вірогідний механізм їх дії.

*** А) Інактивація циклооксигенази та пригнічення синтезу простагландинів**

В) Антибрадикінінова активність

С) Інактивація ліпоксигенази та пригнічення синтезу лейкотрієнів

Д) Взаємодія з енкефаліновими рецепторами

Е) Блокада проведення імпульсів на різних рівнях ноціцептивної системи

22. Після прийому нітрогліцерину під язик максимальна концентрація його в крові досягається через:

*** А) 4-5 хвилин**

В) 1 хвилину

С) 15 хвилин

Д) 30 хвилин

Е) 1 годину

23. У пацієнта під час проведення провідникової анестезії лідокаїном розвинувся анафілактичний шок. Який із перерахованих препаратів є препаратом вибору:

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

В) Норадреналіну гідротартрат

С) Кордіамін

Д) Дімедрол

Е) Атропіну сульфат

24. Для фармакодинаміки якого лікарського засобу характерно підвищення настрою та психомоторної активності, зменшення відчуття втоми, збільшення фізичної та розумової активності, тимчасове зниження потреби у сні ?

*** А) Кофеїн**

В) Дроперидол

С) Аміназин

Д) Барбітал

Е) Вольтарен

25. Хворому на тромбофлебіт було призначено антикоагулянт непрямої дії синкумар. Вкажіть, через який проміжок часу слід чекати розвитку максимального антикоагулянтного ефекту.

*** А) 48-72 години**

В) 12-24 години

С) 6-12 годин

Д) 3-6 годин

Е) 5-10 хвилин

26. Жінка 45 років страждає сезонним алергічним ринітом, пов'язаним з цвітінням амброзії. Який лікарський засіб з групи стабілізаторів тучних клітин, можна застосувати для профілактики даного захворювання?

*** А) Кетотифен**

В) Діазолін

С) Фенкарол

Д) Тавегіл

Е) Димедрол

27. Хворому 42 років для лікування бактеріальної пневмонії призначено ампіцилін. Вкажіть, який механізм бактерицидної дії препарату?

*** А) Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів**

В) Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка

С) Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани

Д) Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів

Е) Антагонізм із параамінобензойною кислотою

28. Хворій 38 років після стаціонарного лікування гострого ревматоїдного артриту для профілактики рецидивів захворювання призначено Біцилін-5. Яка тривалість дії цього препарату?

*** А) 30 діб**

В) 3 доби

С) 7 діб

Д) 14 діб

Е) 12 год

29. У хворого на туберкульоз, що знаходиться на лікуванні, погіршився слух. Який препарат викликав таке ускладнення?

*** А) Стрептоміцин**

В) Ізоніазид

С) Канаміцину сульфат

Д) Етіонамід

Е) Ріфампіцин

30. Для лечения крапивницы с целью устранения зудящей сыпи на коже больному назначен димедрол. Какой механизм обеспечивает его эффективность в этом случае?

*** А) Конкурентная блокада H1-рецепторов**

В) Ингибция синтеза гистамина

С) Угнетение высвобождения гистамина

Д) Ускорение разрушения гистамина

Е) Независимый антагонизм с гистамином

31. У вагітної жінки при аналізі крові виявлено мегалобласти і високий кольоровий показник. Встановлено діагноз: мегалобластична анемія. Який засіб необхідно призначити хворій?

*** А) Ціанокобаламін**

- В) Піридоксин
- С) Аскорбінову кислоту
- Д) Нікотинову кислоту
- Е) Коамід

32. Хворому встановлено діагноз - активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів найбільш доцільно призначити в першу чергу?

*** А) Ізоніазид**

- В) Сульфален
- С) Циклосерін
- Д) Етіонамід
- Е) Етоксид

33. У больного анафилактический шок. От какого из названных адреномиметиков можно ожидать наибольшего терапевтического эффекта в этом случае?

*** А) Адреналина**

- В) Мезатона
- С) Эфедрина
- Д) Фенотерола
- Е) Норадrenalина

34. Після закапування в око крапель у хворого на глаукому розвинувся міоз і короткозорість. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект.

*** А) М-Холіноміметичні засоби**

- В) М-Холіноблокуючі засоби
- С) Альфа-адреноміметичні засоби
- Д) Н-Холіноміметичні засоби
- Е) Гангліоблокатори

35. У хірургічне відділення лікарні поступила хвора з явищами гострого панкреатиту: блюванням, проносом, сильним оперізуючим болем у животі, слабкістю, гіпотензією, збезводненням організму. Який препарат з антиферментною дією слід застосувати?

*** А) Контрикал**

- В) Анальгін
- С) Адреналін
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Натрію гідрокарбонат

36. У жінки, яка тривалий час з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу приймає протитуберкульозні засоби, різко знизився слух. Який з препаратів міг викликати таке ускладнення?

*** А) Амікацин**

- В) Ізоніазид
- С) Етамбутол
- Д) Рифампіцин
- Е) Етіонамід

37. Хворій з приводу мегалобластичної анемії, яка виникла після гастректомії, отримав тривалий курс лікування вітаміном В12. Препарат вводили внутрішньом'язово. В чому перевага парентерального шляху введення вітаміну В12 від ентерального?

*** А) Ефективний при недостатності гастромукопротеїну**

- В) Швидко всмоктується препарат
- С) Тривалий час циркулює у крові
- Д) Не руйнується у печінці
- Е) Швидко виводиться

38. Після тривалої терапії препаратом з кори крушини, його проносний ефект зменшився. Яке явища обумовило цей процес?

*** А) звикання**

- В) тахіфілаксія
- С) лікарська залежність
- Д) алергія
- Е) синдром відміни

39. У хворого на цукровий діабет після чергової ін'єкції інсуліну стан погіршився: появився неспокій, холодний піт, тремор кінцівок, загальна слабкість, запаморочення. За допомогою якого препарату знімаються ці симптоми?

*** А) Адреналін**

- В) Бутамід
- С) Кофеїн
- Д) Норадреналін
- Е) Глібутид

40. Хворому на шизофренію було призначено аміназин. Який з перерахованих фармакодинамічних ефектів є підставою для його призначення даному хворому?

*** А) Антипсихотичний**

В) Протиблювотний

С) Гіпотермічний

Д) Міорелаксуючий

Е) Гіпотензивний

41. Який з перерахованих сечогінних засобів не буде проявляти діуретичного ефекту у пацієнта з хворобою Адісона?

*** А) Спіронолактон**

В) Фуросемід

С) Фуросемід

Д) Тріамтерен

Е) Етакринова кислота

42. Тривале вживання деяких лікарських засобів, що передують вагітності, збільшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Як називається ця дія?

*** А) Мутагенний ефект**

В) Ембріотоксичний ефект

С) Тератогенний ефект

Д) Фетотоксичний ефект

Е) Бластомогенний ефект

43. Лікар призначив пацієнту мазь “Ефкамон”, яка за механізмом дії належить до подразнюючих речовин відтяжної дії. Коли ця мазь є протипоказаною?

*** А) Ушкодження шкіри**

- В) Невралгія
- С) Біль у суглобах
- Д) Міалгія
- Е) Неврит

44. При алергичному дерматиті лікар призначив хворому у складі комплексної терапії H1-гістаміноблокатор. Визначте цей препарат.

*** А) Дипразин**

- В) Кромолін натрій
- С) Преднізолон
- Д) Адреналін
- Е) Гідрокортизон

45. Хворому на ревматоїдний артрит призначено преднізолон. Який механізм його протизапальної дії?

*** А) Зниження активності фосфоліпази A2 та синтезу арахідонової кислоти**

- В) Блокада фосфодіестерази й накопичення цАМФ
- С) Звуження судин у вогнищі запалення
- Д) Покращення нервової трофіки у вогнищі запалення
- Е) Пригнічення синтезу простагландинів за рахунок зниження активності ЦОГ

46. За даними бактеріоскопії мазку з уретри у хворого виявлено гонорею. Враховуючи, що препаратами вибору для лікування гонореї є фторхінолони, хворому необхідно призначити:

*** А) Ципрофлоксацин**

- В) Фуразолідон
- С) Фторурацил
- Д) Уросульфам
- Е) Цефазолін

47. Хвора скаржиться на біль у голені, яка підсилюється при ходьбі. Об'єктивно відмічається набряк та почервоніння по ходу вени, тому лікар призначив антикоагулянт прямої дії для місцевого вживання. Який препарат можна використати з цією метою?

*** А) Мазь гепаринова**

- В) Мазь саліцилова
- С) Мазь троксевазінова
- Д) Мазь бутадіонова
- Е) Тромбін

48. Юнак захворів на гостру диспепсію. Є потреба застосувати сульфаніламідний препарат, що не всмоктується у кишечнику. Який саме?

*** А) фталазол**

- В) норсульфазол
- С) етазол
- Д) сульфадіметоксін
- Е) сульфален

49. Хвора, 19 років, на первинний сифіліс отримує комплексну терапію, до складу якої входить натрієва сіль бензил-пеніциліну. Механізми дії цього препарату?

*** А) блокада синтезу петтидогліканів мікробної оболонки**

- В) Блокада синтезу білків цитоплазми
- С) Блокада тіолових груп ензимів
- Д) Блокада синтезу РНК
- Е) Блокада синтезу ДНК

50. Хворий з алергічним ринітом прийняв антигістамінний препарат у таблетках всередину. Через деякий час хворий відчув сухість у роті, загальмованість, у нього виник легкий сон. Який препарат прийняв хворий?

*** А) Димедрол**

- В) Фенобарбітал
- С) Діазолін
- Д) Діазепам
- Е) Парацетамол

51. Препарат має широкий спектр протимікробної дії. Є антибіотиком вибору для лікування черевного тифу, дизентерії та деяких сальмонельозів. Побічні ефекти: пригнічення кровотворення, диспепсичні розлади, дисбактеріоз. Назвати препарат.

*** А) Левоміцетин**

- В) Фталазол
- С) Бензилпеніциліну натрієва сіль
- Д) Неоміцину сульфат
- Е) Тетрациклін

52. Чоловік віком 50 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль за грудиною, яка виникає у нього на вулиці, по дорозі на роботу, при фізичному напруженні. Хворіє протягом року. Спочатку біль зникав після прийому валідолу, але в останні дні його прийом неефективний. Який препарат слід призначити

*** А) Нітрогліцерин**

В) Калію хлорид

С) Октадин

Д) Клофелін

Е) Салбутамола

53. Отметить концентрацию этилового спирта, обладающую наиболее активным противомикробным действием при наличии белка в среде:

*** А) 70%**

В) 15%

С) 40%

Д) 60%

Е) 96%

54. Указать комбинированный препарат из группы сульфаниламидов с высоким бактерицидным эффектом.

*** А) Бактрим**

В) Фталазол

С) Сульфадимезин

Д) Салазопиридазин

Е) Этambutol

55. Больному необходимо назначить химиотерапевтическое средство с широким спектром действия из группы фторхинолонов. Указать препарат.

*** А) Ципрофлоксацин**

- В) Амоксициллин
- С) Карбенициллин
- Д) Азлоциллин
- Е) Хиноксидин

56. Указать сердечный гликозид быстрого действия при острой сердечной недостаточности.

*** А) Строфантин**

- В) Настойка горичвета весеннего
- С) Дигитоксин
- Д) Лантозид
- Е) Адонизид

57. Отметить препарат миотропного типа действия при гипертоническом кризе:

*** А) Магния сульфат**

- В) Резерпин
- С) Октадин
- Д) Апрессин
- Е) Хлордiazепоксид

58. Указать препарат для приема внутрь при сахарном диабете у лиц с пониженной инсулинообразующей функцией поджелудочной железы:

*** А) Глибенкламин**

- В) Инсулин
- С) Суспензия инсулин-ультраленте
- Д) Глюкагон
- Е) Кальцитрин

59. Хворого на ішемічну хворобу серця спіткав гострий напад стенокардії. Який з препаратів йому слід призначити?

*** А) Нітрогліцерин.**

- В) Нітронг.
- С) Нітросорбіт
- Д) Тринітролонг.
- Е) Нітромак.

60. Чоловік 30 років прийняв високу дозу дигітоксину. В комплекс лікування отруєння входить підсилення виділення яду з ШКТ за допомогою послаблюючих засобів. Оберіть препарат для отримання сильного одноразового послаблюючого ефекту.

*** А) Магнію сульфат.**

- В) Фенолфталеїн.
- С) Касторове масло.
- Д) Кора крушини.
- Е) Листя Сени.

61. При проведенні планової операції в ділянці верхньої щелепи хірург вирішив використовувати атаралгізію. Які лікарські засоби застосовують для цієї маніпуляції?

*** А) Транквілізатори**

- В) Засоби для наркозу
- С) Наркотичні анальгетики
- Д) Ненаркотичні анальгетики
- Е) Седативні засоби

62. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на стоматит, який він лікував антисептичними засобами. Лікар прийшов до висновку, що ураження слизової оболонки мають герпетичну природу. Який препарат необхідно призначити хворому?

*** А) Ацикловір**

В) Ремантадин

С) Фуразолідон

Д) Бісептол

Е) Клотримазол

63. Для полоскання ротової порожнини хворому призначили лікарський засіб з групи нітрофуранів у таблетках для зовнішнього застосування. Який препарат призначений хворому?

*** А) Фурацилін**

В) Фурапласт

С) Фурадонін

Д) Фурагін

Е) Фуразолідон

64. Після екстракції зуба у хворого розвинулась гостра лівошлуночкова недостатність. Який з нищезазначених препаратів доцільно ввести внутрішньовенно хворому?

*** А) Корглікон**

В) Бемегрид

С) Етимізол

Д) Вінпоцетин

Е) Пірацетам

65. Хворому з невралгією трійчастого нерва був введений парантерально ненаркотичний анальгетик, який має швидку але короткочасну дію, випускається в таблетках і ампулах. Вкажіть який препарат був введений хворому

*** А) Анальгін**

- В) Ібупрофен
- С) Кислота мефенамова
- Д) Піроксикам
- Е) Індометацин

66. У хворого, під час видалення зубу стався напад судом. Який препарат доцільно йому призначити?

*** А) Сібазон**

- В) Дімедрол
- С) Корвалол
- Д) Настоянка валеріани
- Е) Фенобарбітал

67. До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість ротової порожнини. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: ксеростомія. Який з лікарських засобів доцільно застосовувати.

*** А) Пілокарпіну гідрохлорид**

- В) Атропіну сульфат
- С) Метацин
- Д) Іпратропію бромід
- Е) Галазолін

68. В комплексне лікування пародонтозу призначили вітамінний засіб з вираженою судиннорозширюючою дією. Визначити цей препарат?

*** А) Кислота нікотинова**

В) Кислота аскорбінова

С) Тіаміну хлорид

Д) Піридоксину гідрохлорид

Е) Ретинолу ацетат

69. Для подовження і підсилення місцевоанестезуючої активності новокаїну, а також для зменшення вірогідності кровотечі під час проведення видалення зуба, лікар-стоматолог застосував препарат з групи адреноміметиків. Назвіть препарат.

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

В) Беротек

С) Ізадрин

Д) Дофамін

Е) Сальбутамол

70. У хворого під час відвідування стоматолога трапився напад бронхіальної астми. Що необхідно призначити хворому для зняття бронхоспазму?

*** А) Сальбутамол**

В) Анаприлін

С) Метацин

Д) Дроперидол

Е) Бензогексоній

71. На прийомі у стоматолога хворий відчув біль за грудиною, для лікування якої прийняв таблетку нітрогліцерину під язик. Який механізм дії цього препарату?

- * А) Накопичує цГМФ**
- В) Блокує ЦОГ
- С) Блокує аденозіндезаміназу
- Д) Блокує АПФ
- Е) Блокує аденозинові рецептори

72. Хворий, який приймав засіб для зниження АТ, звернувся до стоматолога зі скаргою на підвищену сухість у роті, який з гіпотензивних засобів має таку побічну дію?

- * А) Клофелін**
- В) Дибазол
- С) Верапаміл
- Д) Анаприлін
- Е) Адельфан

73. Хворому під час пломбування зуба миш'яковиста паста випадково попала на слизову щоки. Який антидот слід ввести цьому хворому для попередження можливої загальнорезорбтивної токсичної дії миш'яку?

- * А) Унітіол**
- В) Активоване вугілля
- С) Натрію тіосульфат
- Д) Тетацин-кальцію
- Е) ЕДТА

74. У лікарню було привезено хворого з опіками шкіри. Для очищення ран від мертвих тканин та слизу для локального лікування лікар призначив ферментний препарат. Назвіть цей препарат.

*** А) Трипсин**

- В) Панзинорм
- С) Аспарагіназа
- Д) Пепсин
- Е) Стрептокіназа

75. К стоматологу обратилась больная с жалобами на боль, чувство жжения в десне от горячего, кислого, соленого, сладкого, кровоточивость десен во время приема пищи и чистки зубов. Д-з: острый катаральный гингивит. Выберите препарат с вяжущим механизмом действия.

*** А) Отвар коры дуба**

- В) Галаскорбин
- С) Хлоргексидин
- Д) Na гидрокарбонат
- Е) Цитраль

76. В стоматологическую поликлинику доставлен больной, который вместо р-ра хлогексидина прополоскал рот раствором уксусной эссенции. Жалуется на чувство жжения, боль при приеме пищи. При осмотре на слизистой рта обнаружена плотная пленка беловато-серого цвета. Выберите из назначенного стоматологом лечения кератопластический препарат.

*** А) Винилин**

- В) Магния окись
- С) Анестезин
- Д) Натрия гидрокарбонат
- Е) Диазолин

77. Больной обратился к стоматологу с жалобами на боль, жжение в слизистой десны, особенно во время приема пищи, повышение температуры тела до 37,5°C, головную боль, слабость. Диагноз: язвенно-некротический гингивит Венсана. Определите антисептик, назначенный врачом при проведении лечения.

*** А) Этакридин**

- В) Настой листьев ромашки
- С) Трипсин
- Д) Галаскорбин
- Е) Ампиокс

78. У пацієнта під час проведення провідникової анестезії лідокаїном розвинувся анафілактичний шок. Який із перерахованих препаратів є препаратом вибору:

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Норадреналіну гідротартрат
- С) Кордіамін
- Д) Дімедрол
- Е) Атропіну сульфат

79. До стоматолога звернувся хворий з артритом щелепно-лицевого суглоба. Лікар призначив мазь, що містила протизапальний засіб з групи похідних піразолону. Який засіб містився в мазі?

*** А) Бутадіон**

- В) Мефенамова кислота
- С) Ібупрофен
- Д) Індометацин
- Е) Диклофенак натрій

80. Для лікування парадонтозу хворому призначено комплексне лікування з використанням антибіотика лінкоміцина. Позитивного ефекту не наступило. Призначте інший антибіотик, здатний накопичуватись в кістках, зубах і сполучній тканині..

*** А) Тетрациклін**

- В) Ерітроміцин
- С) Ністатин
- Д) Левоміцетин
- Е) Оксацилін

81. Хворому на бактеріальну пневмонію призначили курс лікування еритроміцином. Відомо, що його антибактеріальні властивості зумовлені здатністю цього середника сполучатися з вільною 50S-субодиницею рибосоми. Який процес життєдіяльності бактерій блокує цей антибіотик.

*** А) Синтез білків**

- В) Синтез РНК
- С) Синтез ДНК
- Д) Синтез жирів
- Е) Синтез полісахаридів

82. Малотоксичный антибиотик, относительно редко вызывает побочные эффекты. Относится к антибиотикам резерва из группы макролидов. Его механизм действия заключается в угнетении синтеза белка рибосомами бактерии в результате угнетения фермента пептидтранслоказы. Определите препарат.

*** А) Азитромицин**

- В) Сизамицин
- С) Левоміцетин
- Д) Ампицилін
- Е) Тетрациклін

83. Сердечные гликозиды уменьшают активность калий-натриевой АТФ-азы. Как при этом изменяется возбудимость сердечной мышцы ?

*** А) Снижается**

В) Увеличивается

С) Не изменяется

Д) Значительно увеличивается

Е) Исчезает

84. Хворому для лікування ІХС був призначений бета-адреноблокатор, через деякий час у нього з'явився кашель, бронхоспазм. У якого з перелічених засобів є така побічна дія

*** А) Анаприлін**

В) Талінол

С) Атенолол

Д) Фенігидин

Е) Метопролол

85. Хворому з артритом тазостегневого суглоба лікар призначив протизапальний препарат - селективний інгібітор ферменту циклооксигенази-2 . Що це за препарат?

*** А) Мелоксікам**

В) Індометацин

С) Вольт арен

Д) Ібупрофен

Е) Кислота мефенамова

86. Хворому на гостру серцеву недостатність було введено серцевий глікозид швидкої дії. Який з перелічених засобів було введено?

*** А) Строфантин**

- В) Адонізид
- С) Дигітоксин
- Д) Целанід
- Е) Мілринон

87. Хворому для короточасного хірургічного втручання зробили нейролептанальгезію шляхом введення фентаніла і дроперидола. Що з перелічених явищ обґрунтовує досягнення знеболювання, достатнього для проведення операції?

*** А) Потенціювання**

- В) Кумуляція
- С) Сумація
- Д) Сенсibiliзація
- Е) Прямий синергізм

88. В умовах запалення знижується сила місцевоанестезуючої дії новокаїну. В умовах якого стану у вогнищі запалення виникає порушення гідролізу солі новокаїну і вивільнення активного анестетика-основи?

*** А) Локального тканинного ацидозу**

- В) Локального тканинного алкалозу
- С) Пригнічення карбангідрази
- Д) Активація сукцинатдегідрогенази
- Е) Пригнічення окислювального фосфорилування

89. Для купірування гіпертонічного кризу лікар призначив клофелін. До якої групи за механізмом дії відноситься зазначений лікарський засіб?

*** А) Центральних альфа 2-адреноміметиків**

- В) альфа-адреноблокаторів
- С) Неселективних альфа-адреномиметиків
- Д) Селективних альфа 1-адреномиметиків
- Е) Селективних бета1- адреноблокаторів

90. Хворому на бронхіальну астму призначено кетотифен. Який механізм антиалергічної дії цього препарату?

*** А) стабілізує мембрани тучних клітин**

- В) Блокує H2-рецептори.
- С) Блокує H1- та H2-рецептори.
- Д) Порушує синтез гістаміну.
- Е) Активує ферменти деградації гістаміну.

91. Хворому на мигливу аритмію, в анамнезі у котрого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи протипоказан хворому?

*** А) Анаприлін**

- В) Аймалін
- С) Верапаміл
- Д) Ніфедипін
- Е) Новокаїнамід

92. У хворого анафілактичний шок. Від якого з перерахованих адреноміметиків можна чекати найбільший терапевтичний ефект?

*** А) Адреналін**

- В) Мезатон
- С) Ефедрин
- Д) Норадреналін
- Е) Алупент

93. Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, відчув зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, меншій від середньої терапевтичної. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?

*** А) Потенціювання**

- В) Сумація
- С) Кумуляція
- Д) Лікарська залежність
- Е) Толерантність

94. Однією з вимог до протисклеротичних засобів, які застосовуються на протязі всього життя хворою, є низька токсичність та безпечність в процесі лікування. Яка з перелічених груп гіпохолестеричних засобів має найменшу кількість побічних ефектів?

*** А) Інгібітори всмоктування ХС в кишечнику**

- В) Інгібітори синтезу ХС
- С) Знижуючи рівень загальних ліпідів крові
- Д) Фібрати
- Е) Ангіопротектори прямої дії

95. Студент 3 курсу при проходженні медичної практики повинен був поставити гірчичники на спину хворого. Для цього він змочив гірчичники водою з температурою більше 60 С і поставив їх на спину хворому. Через півгодини студент виявив, що шкіра хворого на місці прикладення гірчичників не почервоніла. З чим пов'язана відсутність ефекту гірчичників?

*** А) З інактивацією мірозину**

- В) З інактивацією холінестерази
- С) З активацією мірозину
- Д) З інактивацією моноамінооксидази
- Е) З активацією метилтрансферази

96. Хворий, який страждає на гіпертонічну хворобу І стадії, приймав препарат у таблетках всередину. Через кілька тижнів він став помічати болі у шлунку, нудоту, апатію, сонливість, зниження інтересу до життя. Який препарат міг викликати такі ускладнення?

*** А) Резерпін**

- В) Дихлотіазид
- С) Октадин
- Д) Фенігідин
- Е) Каптоприл

97. Молода дівчина 17 років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?

*** А) Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу**

- В) Для стимуляції дихання
- С) Для нормалізації АТ
- Д) Для інактивації фенобарбіталу
- Е) Для пробуджуючого ефекту

98. Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено?

- * А) Лідокаїн**
- В) Анестезин
- С) Верапаміл
- Д) Панангін
- Е) Анаприлін

99. К стоматологу обратилась мать ребенка 2-х лет с жалобами на разрушение у него зубов. При осмотре молочные зубы деформированы, поражены кариесом, у шейки коричневая кайма. Из анамнеза установлено, что мать во время беременности принимала антибиотики без контроля врача. Укажите, какую группу антибиотиков, обладающую наиболее выраженным тератогенным действием, могла принимать мать?

- * А) тетрациклины;**
- В) пенициллины;
- С) цефалоспорины;
- Д) аминогликозиды;
- Е) макролиды.

100. У хворого на сифіліс при лікуванні препаратами вісмуту з'явилися сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини та симптоми нефропатії. Який засіб використовують як антидот при отруєнні препаратами вісмуту?

- * А) Унітіол**
- В) Метиленовий синій
- С) Налоксон
- Д) Бемегрид
- Е) Налорфін

101. 5-місячній дитині була призначена антибактеріальна терапія з приводу бронхопневмонії. Який засіб негативно впливає на розвиток зубів?

*** А) Доксациклін**

В) Левоміцетин

С) Нітроксолін

Д) Пеніцилін

Е) Бісептол

102. До стоматолога звернувся пацієнт з артритом щелепно-лицевого-суглоба. Лікар стоматолог призначив мазь з діклофенак-натрієм. Який механізм дії цього лікарського засобу?

*** А) пригнічення циклооксигенази**

В) пригнічення фосфоліпази

С) активація опіатних рецепторів

Д) блокада опіатних рецепторів

Е) активація циклооксигенази

103. Під час прийому у стоматолога у хворої розвинувся приступ бронхоспазму, який був купірован в введенням 5% розчину ефедрину гідрохлориду. Через 20 хв приступ повторився. Повторне введення ефедрину не мало ефекту у зв'язку з розвитком тахіфілаксії. Який механізм лежить в основі розвитку цього явища?

*** А) Виснаження депо медіатору в пресинаптичних закінченнях**

В) Блокада адренорецепторів

С) Активація адренорецепторів

Д) Матеріальна кумуляція препарату

Е) Індукція микросомальних ферментів печінки

104. У хворого після видалення зуба довший час не припиняється кровотеча. Який препарат місцево доцільно використати?

*** А) Тромбін**

- В) Фібриноген
- С) Вікасол
- Д) Кальцію хлорид
- Е) Желатин медичний

105. У пацієнта, після застосування новокаїну для проведення провідникової анестезії, розвинувся анафілактичний шок. Який із наведених препаратів є препаратом вибору для його усунення?

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Норадреналіну гідротартрат
- С) Кордіамін
- Д) Дімедрол
- Е) Атропіну сульфат

106. Хворий із серцевою недостатністю приймає дигоксин. Застосування дигоксину ґрунтується на тому, що він:

*** А) Збільшує силу серцевих скорочень**

- В) Зменшує потребу міокарду в кисні
- С) Збільшує частоту серцевих скорочень
- Д) Зменшує пренавантаження на серце
- Е) Зменшує постнавантаження на серце

107. Больному с переломом нижней челюсти с целью обезболивания во время операции ввели раствор тиопентал-натрия. Каков механизм действия этого препарата?

*** А) Угнетение межнейронной передачи возбуждения в ЦНС**

- В) Взаимодействие с опиоидными рецепторами
- С) Блокада периферических рецепторов
- Д) Изменение эмоциональной окраски боли
- Е) Торможение образования медиаторов боли в тканях

108. У больного на приеме у стоматолога возникла гиперсаливация. Препараты какой группы снижают данное явление?

*** А) А.Холиноблокаторы**

- В) В.Холиномиметики
- С) С.Адреноблокаторы
- Д) Д.Адреномиметики
- Е) Е.Вяжущие

109. Хворому з післяопераційним ускладненням в щелепно-лицевій ділянці призначено хіміотерапевтичний засіб для внутрішнього прийому 2 рази на день. Умови прийому препарату лікар не пояснив. Через 7 діб хворий звернувся із скаргою на диспептичні явища, болі в ділянці попереку. Спостерігається олігурія, альбумінурія, кристалурія, гематурія. Який з нижчеперерахованих препаратів приймав хворий?

*** А) Сульфадиметоксин**

- В) Ампіциліну тригідрат
- С) Еритроміцин
- Д) Оксацилін-натрій
- Е) Ампіцилін

110. Дитині з ознаками рахіту педіатр і стоматолог призначили жиророзчинний вітамінний препарат, який впливає на обмін фосфору і кальцію в організмі. Сприяє відкладенню кальцію в кістковій тканині та дентині. При недостатньому вмісті в організмі порушується процес окостеніння, структура зубів та їх порядок. Визначте препарат.

*** А) Ергокальциферол**

- В) Ретинолу ацетат
- С) Токоферолу ацетат
- Д) Вікасол
- Е) Тиреоїдин

111. При парадонтозі хворому призначили жиророзчинний вітамінний препарат, що бере активну участь в окисно-відновних процесах в організмі. Антиоксидант є фактором росту, антиксерофтальмічним, забезпечує нормальний зір. В стоматологічній практиці використовується для прискорення епітелізації при захворюваннях слизових оболонок при парадонтозі.

*** А) Ретинолу ацетат**

- В) Ергокальциферол
- С) Токоферолу ацетат
- Д) Вікасол
- Е) Цианокобаламін

112. При сильному зубному болю хворому рекомендовано прийняти ненаркотичний анальгетик, похідне аніліну, у якого більш виражені анальгезуюча та жарознижувальна дія, та слабкий протизапальний ефект. Визначте препарат.

*** А) Парацетамол**

- В) Кислота ацетилсаліцилова
- С) Анальгін
- Д) Бутадіон
- Е) Ібупрофен

113. Для лікування періоститу хворому призначили антибіотик, до якого чутливі грампозитивні мікроорганізми, грампозитивні коки, споротворні бактерії, клостридії, анаероби. Препарат добре проникає в кісткову тканину. Визначте препарат.

*** А) Лінкоміцин**

В) Еритроміцин

С) Левоміцетин

Д) Бензилпеніцилін

Е) Оксацилін-натрій

114. В стоматологічному кабінеті у хворого розвився напад бронхіальної астми. Лікар застосував препарат з групи бета-адреноміметиків у вигляді інгаляцій. Який препарат був застосований ?

*** А) Сальбутамол**

В) Еуфілін

С) Адреналіну гідрохлорид

Д) Атропіну сульфат

Е) Ефедрину гідрохлорид

115. Для проведення загальної анестезії лікар-анестезіолог призначив хворому засіб для наркозу пропанідид. Яка тривалість дії цього препарату?

*** А) 3 - 5 хв**

В) 20 - 30 хв

С) 40 - 60 хв

Д) 1,5 - 2 год

Е) 30-40 сек

116. Хворому в депресивному стані призначили ніаламід. Лікар застеріг хворого про необхідність виключити з харчування в період лікування:

*** А) Сиру**

В) Яблук

С) Картоплі

Д) Капусти

Е) Груш

117. До приймального відділення був доставлений хворий у непритомному стані з ризьким пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. За словами супроводжуючої його дружини він в останній час страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги?

*** А) Бемегрид**

В) Унітиол

С) Дипіроксим

Д) Атропіну сульфат

Е) Протаміну сульфат

118. Хворий 60 років протягом 9 років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін - семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби. Через годину після прийому гіпотензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який з перелічених препаратів міг викликати подібне явище?

*** А) Анаприлін**

В) Празозин

С) Верапаміл

Д) Каптоприл

Е) Ніфедипін

119. Хворий 60 років протягом 9 років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін - семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби анаприліном. Через годину після прийому гіпотензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який механізм виникнення гіпоглікемії за умови призначення анаприліна?

*** А) Пригнічення глікогенолізу**

- В) Зменшення виділення г періоду напіввиведення глюкагону
- С) Збільшення періоду напіввиведення інсуліну-семіленте
- Д) Збільшення біодоступності інсуліну-семіленте
- Е) Зменшення всмоктування глюкози

120. Хворій, що перенесла мастектомію у зв'язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії. Який з перерахованих вітамінних препаратів володіє явною радіопротекторною дією, зумовленою антиоксидантною активністю?

*** А) Токоферола ацетат**

- В) Ергокальциферол
- С) Рібофлавін
- Д) Цианокобаламін
- Е) Фолієва кислота

121. У другій половині вагітності жінка приймала транквілізатори групи бензодіазепинів. Пологи наступили в строк, протікали нормально, але народилась дитина з численними аномаліями розвитку (заяча губа, полідактилія). Як називається описана дія препарату?

*** А) Тератогенна**

- В) Мутагенна
- С) Ємбріотоксична
- Д) Фетотоксична
- Е) --

122. У больного стоматит, воспаление слизистой полости рта. Какое из перечисленных веществ с местным антиэкссудативным действием следует использовать в этом случае?

*** А) Квасцы**

- В) Висмута субнитрат
- С) Натрия гидрокарбонат
- Д) Дерматол
- Е) Ксероформ

123. У больного после введения новокаина для проведения проводниковой анестезии возник анафилактический шок. Какое из названных средств предпочтительно как первоочередной препарат выбора?

*** А) Адреналин**

- В) Мезатон
- С) Диазолин
- Д) Димедрол
- Е) Дипразин

124. У больного появилось чувство жжения в ротовой полости, белый пушистый налет на языке. Диагностирована молочница. Какое из предлагаемых средств следует использовать?

*** А) Нистатин**

- В) Амфотерицин
- С) Гризеофульвин
- Д) Тетрациклин
- Е) Гентамицин

125. Для лікування абсцедуючого парадонтозу був призначений ферментний препарат з групи протеолітичних ферментів. Визначте препарат.

*** А) Трипсин кристалічний**

- В) Лідаза
- С) Стрептоліаза
- Д) Актилізе
- Е) Контрикал

126. Хворий довгий час вживав антибіотики широкого спектру, що викликали зниження апетиту, нудоту, проносну дію, випорожнення з гнилосним запахом, похудіння. Про яку побічну дію йдеться мова?

*** А) Дисбактеріоз**

- В) Алергічна реакція
- С) Пряма подразнююча дія
- Д) Гепатотоксична дія
- Е) Нефротоксична дія

127. У реанімаційне відділення поступив хворий з ознаками гострого отруєння морфіном. Який засіб необхідно використати у даному випадку для промивання шлунка?

*** А) Калію перманганат**

- В) Натрію гідрокарбонат
- С) Фурацилін
- Д) Розчин натрія хлориду
- Е) Борну кислоту

128. Хворому в післяопераційному періоді тривалий час вводили промедол. Після відміни препарату у пацієнта виникли важкі психічні та соматичні порушення. Як називається це явище?

*** А) Абстинентний синдром**

- В) Ідіосинкразія
- С) Тахіфілаксія
- Д) Синдром обкрадання
- Е) Синдром віддачі

129. Для більш швидкого введення в наркоз хворому застосовано наступну комбінацію: ефір для наркозу + азоту закис + фторотан. Який це тип взаємодії лікарських засобів?

*** А) Сумований синергізм**

- В) Синергоантагонізм
- С) Потенційований синергізм
- Д) Фізичний антагонізм
- Е) Опосередкований синергізм

130. У хворого діагностовано гострий інфаркт міокарду, який супроводжується стійкими болями за грудиною. Неефективність попередньо введених препаратів дала підставу лікарю провести нейролептанальгезію. Який нейролептик використовується для цього виду знеболення?

*** А) Дроперидол**

- В) Метаперазин
- С) Галоперидол
- Д) Резерпин
- Е) Аміназин

131. В лікарню доставлено важко хворого, який по дорозі втратив свідомість. Щоб привести його до тями, лікар дав йому понюхати розчин аміку. Який вид дії лежить в основі фармакологічного ефекту препарата?

*** А) Рефлекторна дія**

- В) Резорбтивна дія
- С) Місцева дія
- Д) Вибіркова дія
- Е) Етіотропна дія

132. У хворого, що звернувся в лікарню із скаргами на пронос, діагностували амебну дизентерію. В комплексне лікування був включений тетрациклін. Який вид дії призначеного препарата?

*** А) Етіотропна дія**

- В) Пряма дія
- С) Рефлекторна дія
- Д) Основна дія
- Е) Незворотня дія

133. У хворого, який звернувся до лікаря, діагностували анацидний гастрит. Для покращення роботи шлунка хворому призначили таблетки ацедин-пепсину. Який вид лікування був призначений хворому?

*** А) Замісна терапія**

- В) Симптоматична терапія
- С) Профілактичне застосування
- Д) Етіотропна терапія
- Е) Каузальна терапія

134. Який із зазначених лікарських засобів слід додати до розчину лідокаїну для збільшення тривалості його дії.

*** А) Адреналін**

- В) Кофеїн
- С) Анальгін
- Д) Атропін
- Е) Анаприлін

135. Стоматологічному хворому для пригнічення страху перед болем призначили психоседативний засіб. Який препарат найбільш ефективний в цьому випадку?

*** А) Діазепам**

- В) Аміназин.
- С) Літію карбонат.
- Д) Настоянка валеріани.
- Е) Натрію бромід.

136. Хвора 50 років госпіталізована в клініку з нападом стенокардії у поєднанні з бронхіальною астмою. Після призначення анаприліну у хворого виник бронхоспазм. Який препарат слід було призначити в даному випадку?

*** А) Метопролол**

- В) Еуфілін.
- С) Карбокромен.
- Д) Платифілін.
- Е) Ізадрин.

137. Вагітна жінка страждає від печії. Який засіб є оптимальним в даному випадку?

*** А) Альмагель.**

- В) Натрію гідрокарбонат.
- С) Вісмуту субнітрат.
- Д) Ранітидин.
- Е) Омепразол.

138. Хворому 60 років було встановлено діагноз цироз печінки, причиною якого було токсичне ураження алкоголем. Який препарат краще за все призначити хворому?

*** А) Ессенціале**

- В) Вітамін Е
- С) Аскорбінову кислоту
- Д) Рибоксін
- Е) Кислота глютамінову

139. Для патогенетичного лікування невралгій, в т.ч. і альвеолярних нервів, використовують ненаркотичні анальгетики. Виберіть найбільш вірогідний механізм їх дії.

*** А) Інактивація циклооксигенази та пригнічення синтезу простагландинів**

- В) Антибрадикінінова активність
- С) Інактивація ліпоксигенази та пригнічення синтезу лейкотрієнів
- Д) Взаємодія з енкефаліновими рецепторами
- Е) Блокада проведення імпульсів на різних рівнях ноціцептивної системи

140. Після прийому нітрогліцерину під язик максимальна концентрація його в крові досягається через:

*** А) 4-5 хвилин**

В) 1 хвилину

С) 15 хвилин

Д) 30 хвилин

Е) 1 годину

141. У хворого після екстракції зуба розвинулася гостра серцева недостатність. Який препарат доцільно призначити?

*** А) Строфантин**

В) Дигітоксин

С) Кордігіт

Д) Настойку конвалії

Е) Адонізид

142. У пацієнта під час проведення провідникової анестезії лідокаїном розвинувся анафілактичний шок. Який із перерахованих препаратів є препаратом вибору:

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

В) Норадреналіну гідротартрат

С) Кордіамін

Д) Дімедрол

Е) Атропіну сульфат

143. Для фармакодинаміки якого лікарського засобу характерно підвищення настрою та психомоторної активності, зменшення відчуття втоми, збільшення фізичної та розумової активності, тимчасове зниження потреби у сні ?

*** А) Кофеїн**

- В) Дроперидол
- С) Аміназин
- Д) Барбітал
- Е) Вольтарен

144. Хворому на тромбофлебіт було призначено антикоагулянт непрямої дії синкумар. Вкажіть, через який проміжок часу слід чекати розвитку максимального антикоагулянтного ефекту.

*** А) 48-72 години**

- В) 12-24 години
- С) 6-12 годин
- Д) 3-6 годин
- Е) 5-10 хвилин

145. Жінка 45 років страждає сезонним алергічним ринітом, пов'язаним з цвітінням амброзії. Який лікарський засіб з групи стабілізаторів тучних клітин, можна застосувати для профілактики даного захворювання?

*** А) Кетотифен**

- В) Діазолін
- С) Фенкарол
- Д) Тавегіл
- Е) Димедрол

146. Хворому 42 років для лікування бактеріальної пневмонії призначено ампіцилін. Вкажіть, який механізм бактерицидної дії препарату?

*** А) Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів**

- В) Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
- С) Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани
- Д) Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
- Е) Антагонізм із параамінобензойною кислотою

147. Хворій 38 років після стаціонарного лікування гострого ревматоїдного артриту для профілактики рецидивів захворювання призначено Біцилін-5. Яка тривалість дії цього препарату?

*** А) 30 діб**

- В) 3 доби
- С) 7 діб
- Д) 14 діб
- Е) 12 год

148. У хворого на туберкульоз, що знаходиться на лікуванні, погіршився слух. Який препарат викликав таке ускладнення?

*** А) Стрептоміцин**

- В) Ізоніазид
- С) Канаміцину сульфат
- Д) Етіонамід
- Е) Ріфампіцин

149. Для лечения крапивницы с целью устранения зудящей сыпи на коже больному назначен димедрол. Какой механизм обеспечивает его эффективность в этом случае?

*** А) Конкурентная блокада H1-рецепторов**

- В) Ингибция синтеза гистамина
- С) Угнетение высвобождения гистамина
- Д) Ускорение разрушения гистамина
- Е) Независимый антагонизм с гистамином

150. У вагітної жінки при аналізі крові виявлено мегалобласти і високий кольоровий показник. Встановлено діагноз: мегалобластична анемія. Який засіб необхідно призначити хворій?

*** А) Ціанокобаламін**

- В) Пірідоксин
- С) Аскорбінову кислоту
- Д) Нікотинову кислоту
- Е) Коамід

151. Хворому встановлено діагноз - активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів найбільш доцільно призначити в першу чергу?

*** А) Ізоніазид**

- В) Сульфален
- С) Циклосерін
- Д) Етіонамід
- Е) Етоксид

152. У больного анафилактический шок. От какого из названных адреномиметиков можно ожидать наибольшего терапевтического эффекта в этом случае?

*** А) Адреналина**

- В) Мезатона
- С) Эфедрина
- Д) Фенотерола
- Е) Норадреналина

153. Після закапування в око крапель у хворого на глаукому розвинувся міоз і короткозорість. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект.

*** А) М-Холіноміметичні засоби**

- В) М-Холіноблокуючі засоби
- С) Альфа-адреноміметичні засоби
- Д) Н-Холіноміметичні засоби
- Е) Гангліоблокатори

154. У хірургічне відділення лікарні поступила хвора з явищами гострого панкреатиту: блюванням, проносом, сильним оперізуючим болем у животі, слабкістю, гіпотензією, збезводненням організму. Який препарат з антиферментною дією слід застосувати?

*** А) Контрикал**

- В) Анальгін
- С) Адреналін
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Натрію гідрокарбонат

155. У жінки, яка тривалий час з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу приймає протитуберкульозні засоби, різко знизився слух. Який з препаратів міг викликати таке ускладнення?

*** А) Амікацин**

- В) Ізоніазид
- С) Етамбутол
- Д) Рифампіцин
- Е) Етіонамід

156. Хворій з приводу мегалобластичної анемії, яка виникла після гастректомії, отримав тривалий курс лікування вітаміном В12. Препарат вводили внутрішньом'язово. В чому перевага парентерального шляху введення вітаміну В12 від ентерального?

*** А) Ефективний при недостатності гастромукопротеїну**

- В) Швидко всмоктується препарат
- С) Тривалий час циркулює у крові
- Д) Не руйнується у печінці
- Е) Швидко виводиться

157. Після тривалої терапії препаратом з кори крушини, його проносний ефект зменшився. Яке явища обумовило цей процес?

*** А) звикання**

- В) тахіфілаксія
- С) лікарська залежність
- Д) алергія
- Е) синдром відміни

158. У хворого на цукровий діабет після чергової ін'єкції інсуліну стан погіршився: появився неспокій, холодний піт, тремор кінцівок, загальна слабкість, запаморочення. За допомогою якого препарату знімаються ці симптоми?

*** А) Адреналін**

- В) Бутамід
- С) Кофеїн
- Д) Норадреналін
- Е) Глібутид

159. Хворому з діагнозом цукровий діабет II типу ендокринолог призначив глібенкламід. Вкажіть основний механізм дії цього засобу.

*** А) Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами ostrivciv Лангерганса**

- В) Пригнічує глюконеогенез
- С) Підсилює метаболізм глюкози
- Д) Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами
- Е) Активує транспорт глюкози в клітину

160. Хворому на шизофренію було призначено аміназин. Який з перерахованих фармакодинамічних ефектів є підставою для його призначення даному хворому?

*** А) Антипсихотичний**

- В) Протиблювотний
- С) Гіпотермічний
- Д) Міорелаксуючий
- Е) Гіпотензивний

161. Який з перерахованих сечогінних засобів не буде проявляти діуретичного ефекту у пацієнта з хворобою Адісона?

*** А) Спіронолактон**

В) Фуросемід

С) Фуросемід

Д) Тріамтерен

Е) Етакринова кислота

162. Тривале вживання деяких лікарських засобів, що передують вагітності, збільшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Як називається ця дія?

*** А) Мутагенний ефект**

В) Ембріотоксичний ефект

С) Тератогенний ефект

Д) Фетотоксичний ефект

Е) Бластомогенний ефект

163. Лікар призначив пацієнту мазь “Ефкамон”, яка за механізмом дії належить до подразнюючих речовин відтяжної дії. Коли ця мазь є протипоказаною?

*** А) Ушкодження шкіри**

В) Невралгія

С) Біль у суглобах

Д) Міалгія

Е) Неврит

164. При алергичному дерматиті лікар призначив хворому у складі комплексної терапії H1-гістаміноблокатор. Визначте цей препарат.

*** А) Дипразин**

В) Кромолін натрій

С) Преднізолон

Д) Адреналін

Е) Гідрокортизон

165. Хворому на ревматоїдний артрит призначено преднізолон. Який механізм його протизапальної дії?

*** А) Зниження активності фосфоліпази A2 та синтезу арахідонової кислоти**

В) Блокада фосфодіестерази й накопичення цАМФ

С) Звуження судин у вогнищі запалення

Д) Покращення нервової трофіки у вогнищі запалення

Е) Пригнічення синтезу простагландинів за рахунок зниження активності ЦОГ

166. У хворого під час відвідування стоматолога трапився напад бронхіальної астми. Що необхідно призначити хворому для зняття бронхоспазму?

*** А) Сальбутамол**

В) Анаприлін

С) Метацин

Д) Дроперидол

Е) Бензогексоній

167. За даними бактеріоскопії мазку з уретри у хворого виявлено гонорею. Враховуючи, що препаратами вибору для лікування гонореї є фторхінолони, хворому необхідно призначити:

*** А) Ципрофлоксацин**

- В) Фуразолідон
- С) Фторурацил
- Д) Уросульфам
- Е) Цефазолін

168. Хвора скаржиться на біль у голені, яка підсилюється при ходьбі. Об'єктивно відмічається набряк та почервоніння по ходу вени, тому лікар призначив антикоагулянт прямої дії для місцевого вживання. Який препарат можна використати з цією метою?

*** А) Мазь гепаринова**

- В) Мазь саліцилова
- С) Мазь троксевазінова
- Д) Мазь бутадіонова
- Е) Тромбін

169. Юнак захворів на гостру диспепсію. Є потреба застосувати сульфаніламідний препарат, що не всмоктується у кишечнику. Який саме?

*** А) фталазол**

- В) норсульфазол
- С) етазол
- Д) сульфадіметоксін
- Е) сульфален

170. Хвора, 19 років, на первинний сифіліс отримує комплексну терапію, до складу якої входить натрієва сіль бензил-пеніциліну. Механізми дії цього препарату?

*** А) блокада синтезу петтидогліканів мікробної оболонки**

- В) Блокада синтезу білків цитоплазми
- С) Блокада тіолових груп ензимів
- Д) Блокада синтезу РНК
- Е) Блокада синтезу ДНК

171. Хворий з алергічним ринітом прийняв антигістамінний препарат у таблетках всередину. Через деякий час хворий відчув сухість у роті, загальмованість, у нього виник легкий сон. Який препарат прийняв хворий?

*** А) Димедрол**

- В) Фенобарбітал
- С) Діазолін
- Д) Діазепам
- Е) Парацетамол

172. Препарат має широкий спектр протимікробної дії. Є антибіотиком вибору для лікування черевного тифу, дизентерії та деяких сальмонельозів. Побічні ефекти: пригнічення кровотворення, диспепсичні розлади, дисбактеріоз. Назвати препарат.

*** А) Левоміцетин**

- В) Фталазол
- С) Бензилпеніциліну натрієва сіль
- Д) Неоміцину сульфат
- Е) Тетрациклін

173. Чоловік віком 50 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль за грудиною, яка виникає у нього на вулиці, по дорозі на роботу, при фізичному напруженні. Хворіє протягом року. Спочатку біль зникав після прийому валідолу, але в останні дні його прийом неефективний. Який препарат слід призначити

*** А) Нітрогліцерин**

В) Калію хлорид

С) Октадин

Д) Клофелін

Е) Салбутамол

174. Отметить концентрацию этилового спирта, обладающую наиболее активным противомикробным действием при наличии белка в среде:

*** А) 70%**

В) 15%

С) 40%

Д) 60%

Е) 96%

175. Указать комбинированный препарат из группы сульфаниламидов с высоким бактерицидным эффектом.

*** А) Бактрим**

В) Фталазол

С) Сульфадимезин

Д) Салазопиридазин

Е) Этамбутол

176. Больному необходимо назначить химиотерапевтическое средство с широким спектром действия из группы фторхинолонов. Указать препарат.

*** А) Ципрофлоксацин**

- В) Амоксициллин
- С) Карбенициллин
- Д) Азлоциллин
- Е) Хиноксидин

177. Указать сердечный гликозид быстрого действия при острой сердечной недостаточности.

*** А) Строфантин**

- В) Настойка горичвета весеннего
- С) Дигитоксин
- Д) Лантозид
- Е) Адонизид

178. Отметить препарат миотропного типа действия при гипертоническом кризе:

*** А) Магния сульфат**

- В) Резерпин
- С) Октадин
- Д) Апрессин
- Е) Хлордиазепоксид

179. Указать препарат для приема внутрь при сахарном диабете у лиц с пониженной инсулинообразующей функцией поджелудочной железы:

*** А) Глибенкламин**

- В) Инсулин
- С) Суспензия инсулин-ультраленте
- Д) Глюкагон
- Е) Кальцитрин

180. Хворого на ішемічну хворобу серця спіткав гострий напад стенокардії. Який з препаратів йому слід призначити?

*** А) Нітрогліцерин.**

- В) Нітронг.
- С) Нітросорбіт
- Д) Тринітролонг.
- Е) Нітромак.

181. Чоловік 30 років прийняв високу дозу дигітоксину. В комплекс лікування отруєння входить підсилення виділення яду з ШКТ за допомогою послаблюючих засобів. Оберіть препарат для отримання сильного одноразового послаблюючого ефекту.

*** А) Магнію сульфат.**

- В) Фенолфталеїн.
- С) Касторове масло.
- Д) Кора крушини.
- Е) Листя Сени.

182. При проведенні планової операції в ділянці верхньої щелепи хірург вирішив використовувати атаралгезію. Які лікарські засоби застосовують для цієї маніпуляції?

*** А) Транквілізатори**

- В) Засоби для наркозу
- С) Наркотичні анальгетики
- Д) Ненаркотичні анальгетики
- Е) Седативні засоби

183. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на стоматит, який він лікував антисептичними засобами. Лікар прийшов до висновку, що ураження слизової оболонки мають герпетичну природу. Який препарат необхідно призначити хворому?

*** А) Ацикловір**

В) Ремантадин

С) Фуразолідон

Д) Бісептол

Е) Клотримазол

184. Для полоскання ротової порожнини хворому призначили лікарський засіб з групи нітрофуранів у таблетках для зовнішнього застосування. Який препарат призначений хворому?

*** А) Фурацилін**

В) Фурапласт

С) Фурадонін

Д) Фурагін

Е) Фуразолідон

185. Після екстракції зуба у хворого розвинулась гостра лівошлуночкова недостатність. Який з нищезазначених препаратів доцільно ввести внутрішньовенно хворому?

*** А) Корглікон**

В) Бемегрид

С) Етимізол

Д) Вінпоцетин

Е) Пірацетам

186. Хворому з невралгією трійчастого нерва був введений парантерально ненаркотичний анальгетик, який має швидку але короткочасну дію, випускається в таблетках і ампулах. Вкажіть який препарат був введений хворому

*** А) Анальгін**

- В) Ібупрофен
- С) Кислота мефенамова
- Д) Піроксикам
- Е) Індометацин

187. У хворого, під час видалення зубу стався напад судом. Який препарат доцільно йому призначити?

*** А) Сібазон**

- В) Дімедрол
- С) Корвалол
- Д) Настоянка валеріани
- Е) Фенобарбітал

188. До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість ротової порожнини. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: ксеростомія. Який з лікарських засобів доцільно застосовувати.

*** А) Пілокарпіну гідрохлорид**

- В) Атропіну сульфат
- С) Метацин
- Д) Іпратропію бромід
- Е) Галазолін

189. Для подовження і підсилення місцевоанестезуючої активності новокаїну, а також для зменшення вірогідності кровотечі під час проведення видалення зубу, лікар-стоматолог застосував препарат з групи адреноміметиків. Назвіть препарат.

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Беротек
- С) Ізадрин
- Д) Дофамін
- Е) Сальбутамол

190. На прийомі у стоматолога хворий відчув біль за грудиною, для лікування якої прийняв таблетку нітрогліцерину під язик. Який механізм дії цього препарату?

*** А) Накопичує цГМФ**

- В) Блокує ЦОГ
- С) Блокує аденозіндезаміназу
- Д) Блокує АПФ
- Е) Блокує аденозинові рецептори

191. Хворий, який приймав засіб для зниження АТ, звернувся до стоматолога зі скаргою на підвищену сухість у роті, який з гіпотензивних засобів має таку побічну дію?

*** А) Клофелін**

- В) Дибазол
- С) Верапаміл
- Д) Анаприлін
- Е) Адельфан

192. Хворому під час пломбування зуба миш'яковиста паста випадково попала на слизову щоки. Який антидот слід ввести цьому хворому для попередження можливої загальнорезорбтивної токсичної дії миш'яку?

*** А) Унітіол**

- В) Активоване вугілля
- С) Натрію тіосульфат
- Д) Тетацин-кальцію
- Е) ЕДТА

193. У лікарню було привезено хворого з опіками шкіри. Для очищення ран від мертвих тканин та слизу для локального лікування лікар призначив ферментний препарат. Назвіть цей препарат.

*** А) Трипсин**

- В) Панзинорм
- С) Аспарагіназа
- Д) Пепсин
- Е) Стрептокіназа

194. К стоматологу обратилась больная с жалобами на боль, чувство жжения в десне от горячего, кислого, соленого, сладкого, кровоточивость десен во время приема пищи и чистки зубов. Д-з: острый катаральный гингивит. Выберите препарат с вяжущим механизмом действия.

*** А) Отвар коры дуба**

- В) Галаскорбин
- С) Хлоргексидин
- Д) Na гидрокарбонат
- Е) Цитраль

195. В стоматологическую поликлинику доставлен больной, который вместо р-ра хлогексидина прополоскал рот раствором уксусной эссенции. Жалуется на чувство жжения, боль при приеме пищи. При осмотре на слизистой рта обнаружена плотная пленка беловато-серого цвета. Выберите из назначенного стоматологом лечения кератопластический препарат.

*** А) Винилин**

- В) Магния окись
- С) Анестезин
- Д) Натрия гидрокарбонат
- Е) Диазолин

196. Больной обратился к стоматологу с жалобами на боль, жжение в слизистой десны, особенно во время приема пищи, повышение температуры тела до 37,5оС, головную боль, слабость. Диагноз: язвенно-некротический гингивит Венсана. Определите антисептик, назначенный врачом при проведении лечения.

*** А) Этакридин**

- В) Настой листьев ромашки
- С) Трипсин
- Д) Галаскорбин
- Е) Ампиокс

197. У пацієнта під час проведення провідникової анестезії лідокаїном розвинувся анафілактичний шок. Який із перерахованих препаратів є препаратом вибору:

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Норадреналіну гідротартрат
- С) Кордіамін
- Д) Дімедрол
- Е) Атропіну сульфат

198. До стоматолога звернувся хворий з артритом щелепно-лицевого суглоба. Лікар призначив мазь, що містила протизапальний засіб з групи похідних піразолону. Який засіб містився в мазі?

*** А) Бутадіон**

- В) Мефенамова кислота
- С) Ібупрофен
- Д) Індометацин
- Е) Диклофенак натрій

199. Для лікування парадонтозу хворому призначено комплексне лікування з використанням антибіотика лінкоміцина. Позитивного ефекту не наступило. Призначте інший антибіотик, здатний накопичуватись в кістках, зубах і сполучній тканині..

*** А) Тетрациклін**

- В) Ерітроміцин
- С) Ністатин
- Д) Левоміцетин
- Е) Оксацилін

200. Хворому на бактеріальну пневмонію призначили курс лікування еритроміцином. Відомо, що його антибактеріальні властивості зумовлені здатністю цього середника сполучатися з вільною 50S-субодиницею рибосоми. Який процес життєдіяльності бактерій блокує цей антибіотик.

*** А) Синтез білків**

- В) Синтез РНК
- С) Синтез ДНК
- Д) Синтез жирів
- Е) Синтез полісахаридів

201. Малотоксичный антибиотик, относительно редко вызывает побочные эффекты. Относится к антибиотикам резерва из группы макролидов. Его механизм действия заключается в угнетении синтеза белка рибосомами бактерии в результате угнетения фермента пептидтранслоказы. Определите препарат.

*** А) Азитромицин**

В) Сизамицин

С) Левомецетин

Д) Ампициллин

Е) Тетрациклин

202. Сердечные гликозиды уменьшают активность калий-натриевой АТФ-азы. Как при этом изменяется возбудимость сердечной мышцы ?

*** А) Снижается**

В) Увеличивается

С) Не изменяется

Д) Значительно увеличивается

Е) Исчезает

203. Хворому для лікування ІХС був призначений бета-адреноблокатор, через деякий час у нього з'явився кашель, бронхоспазм. У якого з перелічених засобів є така побічна дія

*** А) Анаприлін**

В) Талінол

С) Атенолол

Д) Фенігидин

Е) Метопролол

204. Хворому з артритом тазостегневого суглоба лікар призначив протизапальний препарат - селективний інгібітор ферменту циклооксигенази-2 . Що це за препарат?

- * А) Мелоксікам**
- В) Індометацин
- С) Вольт арен
- Д) Ібупрофен
- Е) Кислота мефенамова

205. Хворому на гостру серцеву недостатність було введено серцевий глікозид швидкої дії. Який з перелічених засобів було введено?

- * А) Строфантин**
- В) Адонізид
- С) Дигітоксин
- Д) Целанід
- Е) Мілринон

206. Хворому для короткочасного хірургічного втручання зробили нейролептанальгезію шляхом введення фентаніла і дроперидола. Що з перелічених явищ обґрунтовує досягнення знеболювання, достатнього для проведення операції?

- * А) Потенціювання**
- В) Кумуляція
- С) Сумація
- Д) Сенсibiliзація
- Е) Прямий синергізм

207. В комплексне лікування пародонтозу призначили вітамінний засіб з вираженою судиннорозширюючою дією. Визначити цей препарат?

*** А) Кислота ніотинова**

В) Кислота аскорбінова

С) Тіаміну хлорид

Д) Піридоксину гідрохлорид

Е) Ретинолу ацетат

208. В умовах запалення знижується сила місцевоанестезуючої дії новокаїну. В умовах якого стану у вогнищі запалення виникає порушення гідролізу солі новокаїну і вивільнення активного анестетика-основи?

*** А) Локального тканинного ацидозу**

В) Локального тканинного алкалозу

С) Пригнічення карбангідрази

Д) Активація сукцинатдегідрогенази

Е) Пригнічення окислювального фосфорилування

209. Для купірування гіпертонічного кризу лікар призначив клофелін. До якої групи за механізмом дії відноситься зазначений лікарський засіб?

*** А) Центральних альфа 2-адреноміметиків**

В) альфа-адреноблокаторів

С) Неселективних альфа-адреномиметиків

Д) Селективних альфа 1-адреномиметиків

Е) Селективних бета1- адреноблокаторів

210. Хворому на мигтливу аритмію, в анамнезі у котрого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи протипоказан хворому?

*** А) Анаприлін**

- В) Аймалін
- С) Верапаміл
- Д) Ніфедипін
- Е) Новокаїнамід

211. У хворого анафілактичний шок. Від якого з перерахованих адреноміметиків можна чекати найбільший терапевтичний ефект?

*** А) Адреналін**

- В) Мезатон
- С) Ефедрин
- Д) Норадреналін
- Е) Алупент

212. Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, відчув зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, меншій від середньої терапевтичної. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?

*** А) Потенціювання**

- В) Сумація
- С) Кумуляція
- Д) Лікарська залежість
- Е) Толерантність

213. Однією з вимог до протисклеротичних засобів, які застосовуються на протязі всього життя хворою, є низька токсичність та безпечність в процесі лікування. Яка з перелічених груп гіпохолестеричних засобів має найменшу кількість побічних ефектів?

*** А) Інгібітори всмоктування ХС в кишечнику**

- В) Інгібітори синтезу ХС
- С) Знижуючи рівень загальних ліпідів крові
- Д) Фібрати
- Е) Ангіопротектори прямої дії

214. Студент 3 курсу при проходженні медичної практики повинен був поставити гірчичники на спину хворого. Для цього він змочив гірчичники водою з температурою більше 60 С і поставив їх на спину хворому. Через півгодини студент виявив, що шкіра хворого на місці прикладення гірчичників не почервоніла. З чим пов'язана відсутність ефекту гірчичників?

*** А) З інактивацією мірозину**

- В) З інактивацією холінестерази
- С) З активацією мірозину
- Д) З інактивацією моноамінооксидази
- Е) З активацією метилтрансферази

215. Хворий, який страждає на гіпертонічну хворобу І стадії, приймав препарат у таблетках всередину. Через кілька тижнів він став помічати болі у шлунку, нудоту, апатію, сонливість, зниження інтересу до життя. Який препарат міг викликати такі ускладнення?

*** А) Резерпін**

- В) Дихлотіазид
- С) Октадин
- Д) Фенігідин
- Е) Каптоприл

216. Молода дівчина 17 років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?

*** А) Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу**

- В) Для стимуляції дихання
- С) Для нормалізації АТ
- Д) Для інактивації фенобарбіталу
- Е) Для пробуджуючого ефекту

217. Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено?

*** А) Лідокаїн**

- В) Анестезин
- С) Верапаміл
- Д) Панангін
- Е) Анаприлін

218. К стоматологу обратилась мать ребенка 2-х лет с жалобами на разрушение у него зубов. При осмотре молочные зубы деформированы, поражены кариесом, у шейки коричневая кайма. Из анамнеза установлено, что мать во время беременности принимала антибиотики без контроля врача. Укажите, какую группу антибиотиков, обладающую наиболее выраженным тератогенным действием, могла принимать мать?

*** А) тетрациклины;**

- В) пенициллины;
- С) цефалоспорины;
- Д) аминогликозиды;
- Е) макролиды.

219. У хворого на сифіліс при лікуванні препаратами вісмуту з'явилися сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини та симптоми нефропатії. Який засіб використовують як антидот при отруєнні препаратами вісмуту?

*** А) Унітіол**

В) Метиленовий синій

С) Налоксон

Д) Бемегрид

Е) Налорфін

220. 5-місячній дитині була призначена антибактеріальна терапія з приводу бронхопневмонії. Який засіб негативно впливає на розвиток зубів?

*** А) Доксациклін**

В) Левоміцетин

С) Нітроксолін

Д) Пеніцилін

Е) Бісептол

221. До стоматолога звернувся пацієнт з артритом щелепно-лицевого-суглоба. Лікар стоматолог призначив мазь з диклофенак-натрієм. Який механізм дії цього лікарського засобу?

*** А) пригнічення циклооксигенази**

В) пригнічення фосфоліпази

С) активація опіатних рецепторів

Д) блокада опіатних рецепторів

Е) активація циклооксигенази

222. Під час прийому у стоматолога у хворої розвинувся приступ бронхоспазму, який був купірован введенням 5% розчину ефедрину гідрохлориду. Через 20 хв приступ повторився. Повторне введення ефедрину не мало ефекту у зв'язку з розвитком тахіфілаксії. Який механізм лежить в основі розвитку цього явища?

*** А) Виснаження депо медіатору в пресинаптичних закінченнях**

- В) Блокада адренорецепторів
- С) Активація адренорецепторів
- Д) Матеріальна кумуляція препарату
- Е) Індукція микросомальних ферментів печінки

223. У хворого після видалення зуба довший час не припиняється кровотеча. Який препарат місцево доцільно використати?

*** А) Тромбін**

- В) Фібриноген
- С) Вікасол
- Д) Кальцію хлорид
- Е) Желатин медичний

224. У пацієнта, після застосування новокаїну для проведення провідникової анестезії, розвинувся анафілактичний шок. Який із наведених препаратів є препаратом вибору для його усунення?

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Норадреналіну гідротартрат
- С) Кордіамін
- Д) Дімедрол
- Е) Атропіну сульфат

225. Хворий із серцевою недостатністю приймає дигоксин. Застосування дигоксину ґрунтується на тому, що він:

*** А) Збільшує силу серцевих скорочень**

- В) Зменшує потребу міокарду в кисні
- С) Збільшує частоту серцевих скорочень
- Д) Зменшує пренавантаження на серце
- Е) Зменшує постнавантаження на серце

226. Больному с переломом нижней челюсти с целью обезболивания во время операции ввели раствор тиопентал-натрия. Каков механизм действия этого препарата?

*** А) Угнетение межнейронной передачи возбуждения в ЦНС**

- В) Взаимодействие с опиоидными рецепторами
- С) Блокада периферических рецепторов
- Д) Изменение эмоциональной окраски боли
- Е) Торможение образования медиаторов боли в тканях

227. У больного на приеме у стоматолога возникла гиперсаливация. Препараты какой группы снижают данное явление?

*** А) А.Холиноблокаторы**

- В) В.Холиномиметики
- С) С.Адреноблокаторы
- Д) Д.Адреномиметики
- Е) Е.Вяжущие

228. Хворому з післяопераційним ускладненням в щелепно-лицевій ділянці призначено хіміотерапевтичний засіб для внутрішнього прийому 2 рази на день. Умови прийому препарату лікар не пояснив. Через 7 діб хворий звернувся із скаргою на диспептичні явища, болі в ділянці попереку. Спостерігається олігурія, альбумінурія, кристалурія, гематурія. Який з нижчеперерахованих препаратів приймав хворий?

*** А) Сульфадиметоксин**

В) Ампіциліну тригідрат

С) Еритроміцин

Д) Оксацилін-натрій

Е) Ампіцилін

229. Дитині з ознаками рахіту педіатр і стоматолог призначили жиророзчинний вітамінний препарат, який впливає на обмін фосфору і кальцію в організмі. Сприяє відкладенню кальцію в кістковій тканині та дентині. При недостатньому вмісті в організмі порушується процес окостеніння, структура зубів та їх порядок. Визначте препарат.

*** А) Ергокальциферол**

В) Ретинолу ацетат

С) Токоферолу ацетат

Д) Вікасол

Е) Тиреоїдин

230. При парадонтозі хворому призначили жиророзчинний вітамінний препарат, що бере активну участь в окисно-відновних процесах в організмі. Антиоксидант є фактором росту, антиксерофтальмічним, забезпечує нормальний зір. В стоматологічній практиці використовується для прискорення епітелізації при захворюваннях слизових оболонок при парадонтозі.

*** А) Ретинолу ацетат**

- В) Ергокальциферол
- С) Токоферолу ацетат
- Д) Вікасол
- Е) Цианокобаламін

231. При сильному зубному болю хворому рекомендовано прийняти ненаркотичний анальгетик, похідне аніліну, у якого більш виражені анальгезуюча та жарознижувальна дія, та слабкий протизапальний ефект. Визначте препарат.

*** А) Парацетамол**

- В) Кислота ацетилсаліцилова
- С) Анальгін
- Д) Бутадіон
- Е) Ібупрофен

232. Для лікування періоститу хворому призначили антибіотик, до якого чутливі грампозитивні мікроорганізми, грампозитивні коки, споротворні бактерії, клостридії, анаероби. Препарат добре проникає в кісткову тканину. Визначте препарат.

*** А) Лінкоміцин**

- В) Еритроміцин
- С) Левоміцетин
- Д) Бензилпеніцилін
- Е) Оксацилін-натрій

233. В стоматологічному кабінеті у хворого розвився напад бронхіальної астми. Лікар застосував препарат з групи бета-адреноміметиків у вигляді інгаляцій. Який препарат був застосований ?

*** А) Сальбутамол**

- В) Еуфілін
- С) Адреналіну гідрохлорид
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Ефедрину гідрохлорид

234. Для проведення загальної анестезії лікар-анестезіолог призначив хворому засіб для наркозу пропанідид. Яка тривалість дії цього препарату?

*** А) 3 - 5 хв**

- В) 20 - 30 хв
- С) 40 - 60 хв
- Д) 1,5 - 2 год
- Е) 30-40 сек

235. Хворому в депресивному стані призначили ніаламід. Лікар застеріг хворого про необхідність виключити з харчування в період лікування:

*** А) Сиру**

- В) Яблук
- С) Картоплі
- Д) Капусти
- Е) Груш

236. До приймального відділення був доставлений хворий у непритомному стані з ризьким пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. За словами супроводжуючої його дружини він в останній час страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги?

*** А) Бемегрид**

В) Унітиол

С) Дипіроксим

Д) Атропіну сульфат

Е) Протаміну сульфат

237. Хворий 60 років протягом 9 років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін - семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби. Через годину після прийому гіпотензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який з перелічених препаратів міг викликати подібне явище?

*** А) Анаприлін**

В) Празозин

С) Верапаміл

Д) Каптоприл

Е) Ніфедипін

238. Хворий 60 років протягом 9 років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін - семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби анаприліном. Через годину після прийому гіпотензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який механізм виникнення гіпоглікемії за умови призначення анаприліна?

*** А) Пригнічення глікогенолізу**

- В) Зменшення виділення г періоду напіввиведення глюкагону
- С) Збільшення періоду напіввиведення інсуліну-семіленте
- Д) Збільшення біодоступності інсуліну-семіленте
- Е) Зменшення всмоктування глюкози

239. Хворій, що перенесла мастектомію у зв'язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії. Який з перерахованих вітамінних препаратів володіє явною радіопротекторною дією, зумовленою антиоксидантною активністю?

*** А) Токоферола ацетат**

- В) Ергокальциферол
- С) Рібофлавін
- Д) Цианокобаламін
- Е) Фолієва кислота

240. У другій половині вагітності жінка приймала транквілізатори групи бензодіазепинів. Пологи наступили в строк, протікали нормально, але народилась дитина з численними аномаліями розвитку (заяча губа, полідактилія). Як називається описана дія препарату?

*** А) Тератогенна**

- В) Мутагенна
- С) Ємбріотоксична
- Д) Фетотоксична
- Е) --