

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нормальна анатомія - база тестів 2013 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2013 року**

Кількість запитань: **300**

1. Хворому діагностовано недостатність мітрального клапана. Де даний клапан розміщується ?

*** А) Між лівим передсердям і лівим шлуночком**

В) Між правим передсердям і правим шлуночком

С) Між лівим і правим передсердями

Д) Між лівим і правим шлуночками

Е) В місці виходу аорти

2. При обстеженні дитини виявлено незарощення овального отвору. Де розміщений даний отвір?

*** А) Між лівим і правим передсердями**

В) Між правим передсердям і правим шлуночком

С) Між лівим передсердям і лівим шлуночком

Д) Між лівим і правим шлуночками

Е) В ділянці мітрального клапана

3. При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка з перешкода (пухлина)?

*** А) В воротарному**

В) В кардіальному

С) В ділянці дна

Д) В ділянці тіла

Е) У ділянці малої кривизни

4. У больного при обследовании в кардиологическом отделении установлено нарушение венозного оттока от задних стенок обоих желудочков. Нарушение кровотока в какой вене оно вызвано?

*** A) V. cordis media**

B) V. cordis magna

C) V. v. cordis minimae

D) V. cordis parva

E) V. obliqua atrii sinistri

5. У хворого наявна гіперестезія шкіри присередньої поверхні плеча. З паталогією якого нерва це пов'язано?

*** A) Присереднього шкірного нерва плеча.**

B) Серединного.

C) Ліктьового.

D) Променевого.

E) Пахвового.

6. У медико-генетичній консультації було проведено обстеження вагітної жінки (20- тижнева вагітність). На УЗО плід розвинутий нормально, у серцево-судинній системі відхилень від норми немає, артеріальна протока функціонує. Які судини плода вона з'єднує ?

*** A) Легеневий стовбур з аортою**

B) Легеневий стовбур з легеневими венами

C) Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною

D) Аорту з нижньою порожнистою веною

E) Аорту з верхньою порожнистою веною

7. У дитини 2 років після перенесеного грипу з'явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?

*** А) через слухову трубу**

В) через foramen jugularis

С) через canalis caroticus

Д) через atrium mastoideum

Е) через canalis nasolacrimalis

8. У дитини 1-го року життя виявлена одна з вад розвитку серцево-судинної системи - незарощення боталової протоки. Вкажіть місце її локалізації.

*** А) Судина, що з'єднує легеневу артерію і аорту**

В) Міжпредсердна перегородка

С) Міжшлуночкова перегородка

Д) Судина, що з'єднує пупочну і ніжню порожнисту вену

Е) Судина, що з'єднує воротну і ніжню порожнисту вену

9. У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій ймовірно всього пошкоджена?

*** А) Середня оболонна артерія**

В) Середня мозкова артерія

С) Поверхнева скронева артерія

Д) Передня оболонна артерія

Е) Задня вушна артерія

10. У ребенка 1-го года жизни выявлен один из недостатков развития сердечно-сосудистой системы - незаращение боталового протока. Укажите место его локализации.

- * А) Сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту**
- В) Межпредсердная перегородка
- С) Межжелудочковая перегородка
- Д) Сосуд, соединяющий пупочную и нижнюю полую вену
- Е) Сосуд, соединяющий воротную и нижнюю полую вену

11. У хворого запалення під'язикового сосочка. Із яких слинних залоз буде затруднено виділення слини?

- * А) Під'язикова і піднижньощелепна**
- В) Під'язикова і привушна
- С) Привушна і піднижньощелепна
- Д) Привушна і піднебінна
- Е) Під'язикова і щічна

12. При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини?

- * А) 6-7 років**
- В) 4-5 років
- С) 8-9 років
- Д) 10-11 років
- Е) 12-13 років

13. В микропрепарате спинного мозга необходимо проанализировать состояние ядра, нейроны которого образуют моторные окончания в скелетной мускулатуре. Укажите данное ядро.

*** А) Собственное ядро переднего рога.**

- В) Грудное ядра.
- С) Промежуточное латеральное ядро.
- Д) Собственное ядро заднего рога.
- Е) Собственное ядро серого вещества

14. До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш відповідні?

*** А) Щитовидної залози**

- В) Прищитовидної залози
- С) Підшлункової залози
- Д) Яєчників
- Е) Наднирків

15. До лікаря звернувся чоловік 27 років. При огляді було виявлено збільшення кистей, стоп та нижньої щелепи. Крім того спостерігалась деформація суглобів (kiphosis), гормональні порушення (імпотенція, атрофія яєчок). Функції якої залози порушені?

*** А) Передньої частини гіпофізу**

- В) Надниркових залоз
- С) Шишкоподібного тіла
- Д) Щитовидної залози
- Е) Прищитовидних залоз

16. На розтині померлого після абдомінальної операції в венах малого тазу були знайдені численні тромби. Клінічно був зафіксований тромбоемболічний синдром. Де слід шукати ембол?

*** А) Легеневі артерії**

- В) Портальна вена
- С) Лівий шлуночок серця
- Д) Головний мозок
- Е) Вени нижніх кінцівок

17. У ребенка установлена врожденная расщелина верхней губы (“заячья губа”) и переднего отдела неба (“волчья пасть”). Несращением каких отростков вызван этот дефект?

*** А) Носового, небного**

- В) Верхнечелюстного, лобного
- С) Небного, нижнечелюстного
- Д) Нижнечелюстного, носового
- Е) Носового, лобного

18. В ендокринологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька разів були переломи кінцівок пов'язані з крихкістю кісток. Функція якої ендокринної залози порушена?

*** А) паращитовидна залоза**

- В) щитовидна залоза
- С) вилочкова залоза
- Д) надниркові залози
- Е) епіфіз

19. Во время драки 20-летний мужчина получил ножевое ранение шеи с повреждением наружной сонной артерии. Для временной остановки кровотечения эффективным методом является пальцевое прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку 6 шейного позвонка. В каком треугольнике шеи нужно осуществить пальцевое прижатие сонной артерии для остановки кровотечения?

*** А) Сонном**

- В) Поднижнечелюстном
- С) Пирогова
- Д) Лопаточно-трахеальном
- Е) Лопаточно-ключичном

20. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Біпрогнатія**

- В) Ортогнатія
- С) Прямий прикус
- Д) Закритий прикус
- Е) Прогенія

21. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями. Контакт між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Відкритий прикус**

- В) Ортогнатія
- С) Прямий прикус
- Д) Закритий прикус
- Е) Прогенія

22. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається повне перекриття нижніх різців верхніми (верхні різці закривають нижні). Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A) Прямий прикус

B) Відкритий прикус

*** C) Закритий прикус**

D) Прогенія

E) Ортогнатія

23. Хворий скаржиться на біль очних яблук. При огляді знайдене підвищення внутрішньо очного тиску. Порушення відтоку якої рідини, спровокувало даний стан?

*** A) водянистої вологи**

B) ендолімфи

C) перилімфи

D) лімфи

E) сльози

24. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається правильне змикання передніх зубів, а щічні жувальні горбики нижніх кутних зубів розміщені не досередини, а до зовні від верхніх. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** A) Перехресний прикус**

B) Прямий прикус

C) Відкритий прикус

D) Прогенія

E) Закритий прикус

25. Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність каріозної плями в ділянці язиково-дистальної борозни на жувальній поверхні правого першого верхнього моляра. Ця борозна відмежовує:

*** А) Гіпоконус.**

В) Параконус.

С) Метаконус

Д) Мезоконус.

Е) Протоконус.

26. З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

*** А) LIII -LIV**

В) LII -LIII

С) LI -LII

Д) TXII-LI

Е) LV-SI

27. Небезпечно витискувати гноячки на лиці, особливо вище ротової щілини. Через які венозні анастомози може поширитися інфекція у порожнину черепа?

*** А) Анастомози вен лица з очними венами.**

В) Анастомози вен лица з криловидним сплетенням.

С) Анастомози вен лица з передніми вушними венами.

Д) Анастомози з потиличною веною.

Е) Анастомози вен лица з середньою і глибокими висковими венами.

28. Стоматолог при обстеженні 23-річного хворого встановив, що хворий не може нижню губу висовувати вперед. Який нерв вражений?

*** A) R. Marginalis mandibulae**

- B) N. mentalis
- C) N. buccalis
- D) N. infraorbitalis
- E) N. sublingualis

29. Дитина 5 років поступила в лор- відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха . Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину ?

*** A) М'язовотрубний канал.**

- B) Барабанний каналець.
- C) Сонний канал.
- D) Каналець барабанної струни.
- E) Сонно-барабанні каналці.

30. У хворого після перенесеного простудного захворювання виникло порушення міміки. Він не може закривати очі, наморщувати брови, вискалювати зуби. Який нерв пошкоджено?

*** A) Лицевий**

- B) Блукаючий
- C) Трійчастий
- D) Язикоглотковий
- E) Інфраорбітальний

31. Хворий втратив смак в передній частині двох-третіх язика. порушення функції якого нерва можна припустити?

*** А) Барабанної струни**

- В) Язикоглоткового нерва
- С) Блукаючого нерва
- Д) Під'язикового нерва
- Е) Додаткового нерва

32. У хворого після простудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?

*** А) Трійчастий**

- В) Під'язиковий
- С) Діафрагмальний
- Д) Блукаючий
- Е) Барабанна струна

33. Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?

*** А) В середньому**

- В) В верхньому
- С) В нижньому
- Д) У загальному
- Е) В найвищому

34. Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи м'язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?

*** A) Tr.cortico-nuclearis.**

B) Tr.cortico-spinalis.

C) Tr.cortico-thalamicus.

D) Tr.cortico-fronto-pontinus.

E) Tr.thalamo-corticalis.

35. Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з'явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

*** A) Підшлункової**

B) Щитоподібної

C) Статевих

D) Наднирникових

E) Епіфіза

36. Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

*** A) гіпофіза**

B) щитоподібної

C) статевих

D) наднирникових

E) епіфіза

37. В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

*** A) IX**

B) X

C) VIII

D) V

E) XII

38. Чоловік 42 років звернувся до медпункта з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно: затруднене згинання передпліччя. Які з названих м'язів ймовірно ушкоджені у хворого?

*** A) M. brachialis, m. biceps brachii.**

B) M.biceps brachii, m. anconeus.

C) M.coracobrachialis, m. supraspinatus.

D) M. deltoideus, m. infraspinatus.

E) M. deltoideus, m. biceps brachii.

39. При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованій стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

*** A) N.abducens.**

B) N.trochlearis.

C) N.oculomotorius.

D) N.ophtalmicus.

E) N. infraorbitalis..

40. При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість, розширений зрачок, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений?

*** А) Окоруховий**

- В) Очний
- С) Блоковий
- Д) Відвідний
- Е) Зоровий

41. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

*** А) Вовча паша.**

- В) Викривлення носової перегородки вправо.
- С) Перелом основи черепа.
- Д) Заяча губа.
- Е) Викривлення носової перегородки вліво.

42. У поступившего в клинику больного отмечаются: сильная головная боль, ригидность мышц затылка, повторная рвота, болезненность при перкуссии черепа, повышена чувствительность к световым раздражителям Установлен диагноз — менингит. Показана спинномозговая пункция. Укажите место ее проведения.

*** А) Между 3 и 4 поясничными позвонками**

- В) Между 1 и 2 поясничными позвонками
- С) Между 12 грудным и 1 поясничным позвонками
- Д) Между 5 поясничным и основанием крестца
- Е) Между 11 и 12 грудными позвонками

43. При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринно залози може спричинити таке руйнування кістки?

*** А) Гіпофіз**

- В) Вилочкова залоза
- С) Епіфіз
- Д) Щитовидна залоза
- Е) Наднирник

44. У хворого діагностовано ураження лицевого нерва. На якому рівні пошкоджений нерв, якщо у хворого спостерігається таке сполучення клінічних симптомів: параліч мимічних м'язів, порушення смакової чутливості передньої частини язика, сухість в роті (зменшення слиновідділення). Зниження слюзовідділення немає.

*** А) В каналі лицевого нерву нижче коліна, після відходження великого кам'янистого нерва.**

- В) На основі мозку.
- С) В каналі лицевого нерву, до відходження великого кам'янистого нерва.
- Д) Після виходу нерва з каналу.
- Е) В білявушній залозі.

45. Заболевание печени и желчного пузыря может симулировать аппендицит при следующем положении червеобразного отростка:

*** А) Восходящее.**

- В) Нисходящее.
- С) Медиальное.
- Д) Латеральное.
- Е) Ретроцекальное.

46. У новонародженої дитини на протязі першої доби педіатр помітив, що при смоктанні молока воно потрапляє у носову порожнину. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

*** А) Незарощення піднебіння**

- В) Дивертікул стравоходу
- С) Атрезія стравохиду
- Д) Заяча губа
- Е) Звуження стравохиду

47. У хворого 52 років раптово з'явилась асиметрія лиця. Вся уражена половина лиця непорушна, носогубна складка згладжена, очна щілина розширена; око не закривається, кут рота опущений. Вказаний синдром викликаний ураженням якого нерва ?

*** А) Лицевого.**

- В) Язикоглоткового.
- С) Трійчастого.
- Д) Додаткового.
- Е) Під'язикового.

48. Дитина, 5 років, потрапила в тяжкому стані в інфекційний відділ клінічної лікарні з діагнозом дифтерії. Для запобігання ядухи дитині провели трахеостомію, В якому трикутнику шиї проведена дана операція ?

*** А) Omotracheale.**

- В) Caroticum.
- С) Omoclaviculare.
- Д) Submandibulare.
- Е) Omotrapezoideum.

49. Після травми обличчя у хворого гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози блоковано гематомою?

*** А) привушна**

- В) під'язикова
- С) піднижньощелепна
- Д) губна
- Е) щічна

50. В зв'язку з наявністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід його видалити. В якому місці легко знайти язичну артерію і перев'язати її?

*** А) Трикутника Пирогова.**

- В) В сонному трикутнику.
- С) Влопаточно-підключичному трикутнику.
- Д) В лопаточно-трапецієвидному трикутнику.
- Е) В лопаточно-трахейному трикутнику.

51. У хворого з лікар діагностував тромбоз селезінкової артерії (інфаркт селезінки). Звідки відходить уражена артерія ?

*** А) Черевний стовбур**

- В) Верхня брижова артерія
- С) Нижня брижова артерія
- Д) Загальна печінкова артерія
- Е) Ліва шлункова артерія

52. У боксера після удару в привушну ділянку зліва виник параліч м'язів на цій же стороні. Який нерв ушкоджено?

*** А) Лицевий**

- В) Очний
- С) Верхньощелепний
- Д) Нижньощелепний
- Е) Малий кам'янистий нерв

53. При обстеженні дитини лікар виявив набряк та гіперемію лімфоїдної тканини в ділянці мигдаликової ямки. Який з мигдаликів міститься в нормі в цьому місті?

*** А) Tonsilla palatina**

- В) Tonsilla pharyngealis
- С) Tonsilla tubaria
- Д) Tonsilla lingualis
- Е) -

54. У пациента с повреждением промежуточного мозга выявлено нарушение слуха. Какие структуры при этом повреждены?

*** А) Медиальные коленчатые тела**

- В) Латеральные коленчатые тела
- С) Красное ядро
- Д) Передние ядра гипоталамуса
- Е) Заднее вентральное ядро

55. После повреждения мозга у человека нарушено восприятие зрительной информации. В каком отделе коры произошло повреждение?

*** А) Затылочная область коры**

- В) Теменная область коры
- С) Височная область коры
- Д) Передняя центральная извилина
- Е) Задняя центральная извилина

56. После повреждения мозга у человека нарушено восприятие звука. В каком отделе коры произошло повреждение?

*** А) Височная область коры**

- В) Теменная область коры
- С) Затылочная область коры
- Д) Передняя центральная извилина
- Е) Задняя центральная извилина

57. У хворого порушено кровопостачання медіальної поверхні правої півкулі головного мозку. Яка артерія пошкоджена?

*** А) cerebri anterior**

- В) communicans posterior
- С) cerebri posterior
- Д) cerebri media
- Е) chorioidea

58. У хворого при фіброгастроудоденоскопії виявлене запалення цибулини 12-палої кишки. У якому відділі кишки локалізується запалення?

*** A) Pars superior**

B) Pars descendens

C) Pars horizontalis

D) Pars ascendens

E) –

59. В хірургічне відділення доставлено потерпілого з пораненням променевої поверхні передпліччя. З рани витікає венозна кров. Яка судина постраждала?

*** A) V. cephalica**

B) V. basilica

C) V. intermedia cubiti

D) Vv. ulnares

E) Vv. brachiales

60. При операції на шлунку хірург пересік ліву шлункову артерію, перев'язав її, але кров продовжувала витікати з протилежного кінця артерії. Яка артерія анастомозує з нею?

*** A) Права шлункова артерія**

B) Селезінкова артерія

C) Права шлунково-чепцева артерія

D) Ліва шлунково-чепцева артерія

E) Верхня підшлунково-дванадцятипала артерія

61. В приймальний покій лікарні доставлено хворого з гострою затримкою сечі. При огляді лікар встановив, що в хворого обтурація сечівника зв'язана з патологією органу, який його охоплює. Про який орган йде мова?

*** А) Передміхурова залоза**

- В) Яєчко
- С) Сім'яний пухирець
- Д) Сім'яний канатик
- Е) Надяєчко

62. Щоб взяти спинномозкову рідину для дослідження лікар повинен зробити пункцію підпавутинного простору спинного мозку. Між якими хребцями треба ввести голку, щоб не пошкодити спинний мозок?

*** А) Між III і IV поперековими хребцями.**

- В) Між XI і XII грудними хребцями.
- С) Між XII грудним і I поперековими хребцями.
- Д) Між I і II поперековими хребцями.
- Е) Між IV і V грудними хребцями.

63. У приймальне відділення лікарні доставлений хлопчик з ознаками внутрішньої кровотечі після удару у ліву підреберну ділянку. Який орган найімовірніше пошкоджений?

*** А) Селезінка**

- В) Шлунок
- С) Підшлункова залоза
- Д) Ліва нирка
- Е) Поперечна ободова кишка

64. Пацієнт звернувся до окуліста зі скаргами на опущення верхньої повіки. При обстеженні була діагностована пухлина головного мозку. Ядро якої пари черепних нервів уражено патологічним процесом?

*** А) III**

В) II

С) IV

Д) VI

Е) VII

65. Хворого госпіталізовано з остеомієлітом верхньої щелепи, внаслідок чого відбулося розплавлення стінки орбіти. Яка стінка очної ямки пошкоджена?

*** А) нижня**

В) верхня

С) медіальна

Д) латеральна

Е) -

66. Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на втрату можливості розрізняти кольори. Після огляду сітківки ока виявлено враження структур, що відповідають за цей вид чутливості. Що це за структури?

*** А) Колбочки**

В) Палочки

С) Біполярні нейрони

Д) Мультиполярні нейрони

Е) Гангліозні нейрони

67. Хвора госпіталізована із закритою черепно-мозковою травмою у ділянці потиличної кістки. При огляді: порушення ходи і рівноваги, тремор рук. Яка частина головного мозку ушкоджена?

*** А) мозочок**

- В) довгастий мозок
- С) міст
- Д) проміжний мозок
- Е) спинний мозок

68. У хворого після застосування крапель, що містять атропін, виникло стійке розширення зіниці. Роботу якого м'яза блоковано?

*** А) звужувача зіниці**

- В) розширювача зіниці
- С) війкового
- Д) прямих м'язів
- Е) косих м'язів

69. Після крововиливу в мозок у хворого виникла стійка косоокість правого ока, втрачена здатність до відведення його латерально. Ядро якого черепного нерва ушкоджено при крововиливі?

*** А) n.abducens dexter**

- В) n.facialis dexter
- С) n.oculomotorius
- Д) n.abducens sinister
- Е) n.trochlearis

70. В процессе стоматологических манипуляций повреждены волокна 12 пары черепномозговых нервов. В чем это проявилось?

*** А) Нарушение функции мышц языка**

В) Нарушение сокращения мышц мягкого неба

С) Нарушение сокращения мышц гортани

Д) Нарушение сокращения мышц поднимающих подъязычную кость

Е) Нарушение сокращения мышц глотки

71. У хворого діагностовано перелом вінцевого відроста нижньої щелепи зі зміщенням. Який м'яз змістить відросток?

*** А) Скроневий**

В) Латеральний крилоподібний

С) Медіальний крилоподібний

Д) Жувальний

Е) -

72. При формуванні порожнини рота у дитини не відбулось зрощення бічного носового та верхньощелепного відростків. Виникнення якої аномалії передбачається?

*** А) „заяча губа”**

В) „вовча паща”

С) Мікростома

Д) Макростома

Е) -

73. При обстеженні лікар виявив у пацієнта гіпертрофію та запалення лімфоїдної тканини, набряк слизової оболонки між дужками м'якого піднебіння (гострий тонзиліт). Який з мигдаликів міститься в нормі в цьому місті?

*** A) Tonsilla palatina**

B) Tonsilla pharyngealis

C) Tonsilla tubaria

D) Tonsilla lingualis

E) -

74. Після травми у хворого спостерігається втрата чутливості задніх ділянок шкіри плеча та передпліччя. Гілки якого нерва ушкоджені?

*** A) N. radialis**

B) N. ulnaris

C) N. medianus

D) N. axillaris

E) N. musculocutaneus

75. При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини, хірургу необхідно виділити артеріальну судину, що оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія?

*** A) axillaris**

B) vertebralis

C) transversa colli

D) profunda brachii

E) subscapularis

76. У хворого менінгіт. Показана пункція підпавутинного простору. Визначте, між якими утвореннями він розташований?

*** А) Павутинною та м'якою оболонками**

В) Твердою та павутинною оболонками

С) Окістям та твердою мозковою оболonoю

Д) Окістям та павутинною оболonoю

77. Судовий експерт при вивченні серця визначив, що у загиблого пошкоджена вінцева пазуха серця. Визначте місце впадіння пошкодженого анатомічного утворення.

*** А) Праве передсердя**

В) Нижня порожниста вена

С) Верхня порожниста вена

Д) Правий шлуночок

Е) Ліве передсердя

78. При УЗД дослідженні вагітної в серцево-судинній системі плоду порушень не виявлено, артеріальна протока функціонує. Визначте, які судини вона з'єднує?

*** А) Легеневий стовбур з аортою**

В) Легеневий стовбур з верхньою порожнистою веною

С) Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною

Д) Пупкову вену з аортою

Е) Пупкову вену з пупковою артерією

79. Во время осмотра врач, обследуя пациентку, изучил анализы крови и сделал вывод, что имеет место поражение центральных органов иммуногенеза. Какие органы вероятнее всего поражены?

*** А) Костный мозг**

В) Миндалины

С) Лимфоидные узелки

Д) Селезенка

Е) Печень

80. У хворого 65 років діагностовано крововилив в передні роги спинного мозку. Якими вони є за функцією?

*** А) Руховими**

В) Чутливими

С) Симпатичними

Д) Парасимпатичними

Е) -

81. Внаслідок травми відбувся розрив нюхових волокон, які виходять з порожнини носа. Крізь яку кістку проходять ці волокна?

*** А) Решітчасту**

В) Клиноподібну

С) Верхню щелепу

Д) Нижню носову раковину

Е) Носову

82. При огляді у хворого виявилося запалення анатомічного утворення, що врівноважує тиск між барабанною порожниною та глоткою. Що це за утворення?

*** А) Слухова труба**

- В) Зовнішній слуховий прохід
- С) Внутрішній слуховий прохід
- Д) Соскоподібна печера
- Е) Внутрішнє вухо

83. Хворого оперують з приводу травми печінки та крововиливом в печінкову сумку. Яка структура попереджує проникнення крові до передшлункової сумки?

*** А) Серпоподібна зв'язка**

- В) Кругла зв'язка
- С) Вінцева зв'язка
- Д) Права трикутна зв'язка
- Е) Ліва трикутна зв'язка

84. У хворі похилого віку вже 4 раз трапляється перелом кісток верхньої кінцівки. З підвищенням місткості якої речовини пов'язане підвищення крихкості кісток у такому віці?

*** А) Неорганічних речовин**

- В) Органічних речовин
- С) Води
- Д) Міжклітинної рідини
- Е) Сполучної речовини

85. Хворий скаржиться на втрату чутливості задньої третини спинки язика та у ділянці піднебінних мигдаликів. Який нерв іннервує ці області?

*** А) Язикоглотковий нерв**

В) Додатковий нерв

С) Під'язиковий

Д) Трійчастий

Е) Блоковий

86. Упацієнта ураження мітрального клапана. Де буде вислуховуватись патологічний шум при аускультації?

*** А) На верхівці серця**

В) В II міжребер'ї справа від груднини

С) В II міжребер'ї зліва від груднини

Д) В ділянці мечоподібного відростка

Е) В III міжребер'ї справа від груднини

87. Во время осмотра врач обследовал пациента, изучил анализы крови и сделал вывод, что имеют место нарушения периферических органов иммуногенеза. Какие органы вероятнее всего поражены?

*** А) Миндалины**

В) Вилочковая железа

С) Почки

Д) Красный костный мозг

Е) Желтый костный мозг

88. У людини розвинувся гігантизм. Функція якої залози внутрішньої секреції порушена?

*** А) Гіпофіза**

В) Епіфіза

С) Щитоподібної

Д) Вилочкової

Е) Надниркових залоз

89. Чоловік скаржиться на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, зовнішньої латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановлює запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?

*** А) Підчочнямковий отвір**

В) Рваний отвір

С) Верхню очноямкову щілину

Д) Остистий отвір

Е) Овальний отвір

90. У пацієнта спостерігаються птоз (опущення повіки), розбіжна косоокість, порушення акомодатції, розширення зіниць. Ядра якої пари черепних нервів уражені?

*** А) III.**

В) IV.

С) V.

Д) VI.

Е) VII.

91. У хворого порушений зіничний рефлекс. Зіниці звужені, хворий погано орієнтується в темному приміщенні. Функція якого м'яза очного яблука порушена?

*** A) M. dilatator pupillae**

B) M. sphincter pupillae.

C) M. ciliaris.

D) M. obliquus superior.

E) M. obliquus inferior.

92. У хворого внаслідок ножового поранення шиї розпочалась кровотеча з загальної сонної артерії, яка проходить в сонному трикутнику у складі судинно-нервового пучка . Які складові формують цей пучок разом з артерією?

*** A) n. vagus, v.jugularis interna**

B) n. hypoglossus v.jugularis interna

C) n. vagus, v.jugularis anterior

D) n. hypoglossus, v.jugularis externa

E) n. phrenicus, v.jugularis externa

93. Чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при русі щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого?

*** A) Сконевого (задні волокна)**

B) Сконевого (передні волокна);

C) Крилоподібного медіального

D) Крилоподібного латерального

E) Жувального

94. При огляді 6-місячної дитини лікар виявив не закрите заднє тім'ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини?

*** А) До 3-місячного віку**

В) До народження

С) До 6-місячного віку

Д) До кінця першого року життя

Е) До кінця другого року життя

95. Після операції на щитоподібній залозі у хворого спостерігається порушення голосоутворення (голос тихий, осиплий). Який нерв ушкоджено?

*** А) Поворотний гортанний нерв**

В) Верхній гортанний нерв

С) Бронхіальні гілки

Д) Трахеальні гілки

Е) Горлові гілки

96. У хворого відсутня загальна чутливість передніх 2/3 язика. Який нерв уражено?

*** А) Язиковий нерв**

В) Барабанна струна

С) Верхній гортанний нерв

Д) Піднебінні нерви

Е) Язико-горловий нерв

97. Під час операції на кульшовому суглобі у пацієнта була пошкоджена зв'язка, внаслідок чого почалося кровотеча. Яка зв'язка була пошкоджена?

*** А) Головки стегна**

- В) Поперечна кульшової западини
- С) Клубово-стегнова
- Д) Лобково-стегнова
- Е) Сідничо-стегнова

98. Хвора звернулася зі скаргами на неможливість зводити і розводити пальці кисті. Які м'язи втратили свою функцію?

*** А) міжкісткові**

- В) червоподібні
- С) поверхневий згинач пальців
- Д) глибокий згинач пальців
- Е) розгинач пальців

99. Хворий госпіталізований з приводу крововиливу в головний мозок. Після огляду виявлено, що місце крововиливу локалізоване на верхньо-латеральній поверхні півкуль. Яка судина, що живить цю ділянку мозку, пошкоджена?

*** А) середня мозкова артерія**

- В) передня мозкова артерія
- С) верхня мозочкова артерія
- Д) передня сполучна гілка
- Е) задня сполучна гілка

100. Після проведеної операції на шиї, хворий втратив чутливість на її передній та бічній поверхнях. Яка гілка шийного сплетіння була пошкоджена під час операції?

*** А) поперечний шийний нерв**

- В) великий вушний нерв
- С) малий потиличний нерв
- Д) надключичний нерв
- Е) шийна петля

101. Під час ультразвукового дослідження серця у дитини 1,5 років знайдено незарощення овального отвору, що підтверджено клінічно. У якому відділі серця розташований даний дефект?

*** А) міжпередсердна перегородка**

- В) міжшлуночкова перегородка
- С) правий передсердно-шлуночковий клапан
- Д) лівий передсердно-шлуночковий клапан
- Е) верхівка серця

102. Хворого госпіталізовано з підозрою на пухлину простати. Під час операції виявлено, що пухлина “проросла” до сечового міхура. Який відділ сечового міхура постраждав?

*** А) Шийка**

- В) Верхівка
- С) Дно
- Д) Тіло
- Е) -

103. У хворого під час аускультації вислуховується шум в ділянці проекції верхівки серця. Ваду якого з клапанів серця можна запідозрити?

*** А) Мітрального.**

В) Тристулкового.

С) Клапана легеневого стовбура.

Д) Клапана аорти.

Е) -

104. У приймальне відділення лікарні доставлений хворий з кровотечею внаслідок різаної рани в ділянці медіальної кісточки. Яка з артерій наймовірніше ушкоджена?

*** А) Задня великогомілкова.**

В) Передня великогомілкова.

С) Малогомілкова.

Д) Передня поворотна великогомілкова.

Е) Задня поворотна великогомілкова

105. Після обстеження у хворого виявлені симптоми акромегалії. Яка ендокринна залоза втягнута в патологічний процес?

*** А) Аденогіпофіз.**

В) Нейрогіпофіз.

С) Епіфіз.

Д) Наднирники.

Е) Щитоподібна залоза.

106. Підчас обстеження, ендокринологом виявлено у хворого симптоми базедової хвороби (екзофтальм, зоб, тахіардія). Яка залоза уражена патологічним процесом?

*** А) Щитоподібна.**

В) Аденогіпофіз.

С) Нейрогіпофіз.

Д) Наднирники.

Е) Епіфіз.

107. У хворого знайдені симптоми порушення росту (гігантизм). Патологічний процес якої залози внутрішньої секреції може привести до даної патології?

А) Наднирники.

*** В) Аденогіпофіз.**

С) Нейрогіпофіз.

Д) Епіфіз.

Е) Щитоподібна залоза.

108. При виконанні оперативного втручання на діафрагмі ротової порожнини хірургу необхідно виділити ділянку, що має назву трикутника Пірогова. Яка структура утворює його верхню межу?

*** А) N. hypoglossus**

В) M. stylohyoideus

С) M. geniohyoideus

Д) M. digastricus

Е) M. mylohyoideus

109. У хворого на інсульт спостерігається порушення заднього відділу задньої ніжки внутрішньої капсули. Які з провідних шляхів і там проходять?

*** A) Radiatio acustica et radiatio optica**

- B) Tr. corticonuclearis
- C) Tr. corticospinalis
- D) Tr. parietopontinae
- E) Tr. occipitopontinae

110. В онкологічне відділення поступив хворий з підозрою на пухлину легень. При обстеженні виявили локалізацію патології в нижньої частці правої легені. Скільки бронхолегеневих сегментів має ця частка?

*** A) 5**

- B) 6
- C) 4
- D) 3
- E) 2

111. Чоловіка доставлено в лікарню з травмою черепа. При обстеженні хворого констатовано відсутність у нього вольових рухів м'язів голови і шиї. Пошкодження якої ділянки головного мозку могло бути причиною цього?

*** A) Нижнього відділу передцентральної звивини.**

- B) Нижнього відділу постцентральної звивини.
- C) Верхнього відділу передцентральної звивини.
- D) Верхнього відділу постцентральної звивини.
- E) Нижньої лобової звивини.

112. У хворого виявлено пухлину головного мозку в ділянці задньої ніжки внутрішньої капсули (в самому задньому відділі). Які функціональні порушення повинні бути у такого хворого?

*** А) зору та слуху.**

- В) вольових рухів м'язів голови та шиї.
- С) вольових рухів м'язів тулуба і кінцівок.
- Д) пропріоцептивної та екстероцептивної чутливості з протилежного боку.
- Е) нюху.

113. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на порушення смакової чутливості язика. Пошкодження якого ядра довгастого мозку могло викликати ці розлади?

*** А) Поодинокого.**

- В) Подвійного ядра.
- С) Під'язикового нерва.
- Д) Нижнього слиновидільного .
- Е) Дорсального ядра блукаючого нерва.

114. У хворій спостерігається зменшення маси тіла, збільшення частоти серцевих скорочень, збільшення теплопродукції та тепловіддачі, психоемоційне збудження та безсоння. Гіперфункція якої ендокринної залози спостерігається?

*** А) Щитоподібної**

- В) Наднирникових
- С) Яєчників
- Д) Гіпофізу
- Е) Парагангліїв

115. У постраждалого травма черепа з порушенням дірчастої пластинки решітчастої кістки. Який нерв може бути ушкоджений?

*** A) N. olfactorius**

B) N. opticus

C) N. ophthalmicus

D) N. trochliaris

E) N. abducens

116. У потерпілого при травмі потиличної кістки ушкоджено сигмоподібний синус. Яка частина кістки ушкоджена?

*** A) Pars lateralis**

B) Clivus

C) Pars basilaris

D) Squama

E) –

117. Мімічні м'язи сприяють зміні виразу обличчя. Ушкодження якого нерва може створити явище відсутності міміки?

*** A) Лицевого нерва**

B) Трійчастого нерва

C) Щічного нерва

D) Верхньощелепного нерва

E) Сконево-вушного нерва

118. Во время операции на позвоночном столбе больному удалили дуги позвонков и соединяющие их связки. Назовите эти связки.

*** А) Желтые связки**

- В) Межкостистые связки
- С) Передняя продольная связка
- Д) Задняя продольная связка
- Е) -

119. Хирургу необходимо произвести удаление части травмированной стопы по линии Лисфранкова сустава. Какую связку необходимо пересечь?

*** А) Медиальную межкостную предплюстно-плюсневую.**

- В) Пяточно-ладьевидную
- С) Раздвоенную
- Д) Таранно-ладьевидную
- Е) Таранно-пяточную

120. У женщины с резаной раной левой подмышечной области при обследовании выявлена невозможность пронировать кисть. Сухожилия и волокна мышц предплечья целы. Какой нерв поврежден у данной пострадавшей?

*** А) N.medianus.**

- В) N. ulnaris.
- С) N.radialis.
- Д) N. cutaneus brachii medialis.
- Е) N. cutaneus antebrachii medialis.

121. Мужчина обратился к хирургу с жалобами на боль внизу живота справа. При глубокой пальпации врач обнаружил болезненность в правой паховой области. В каком отделе кишечника возможен патологически процесс?

*** А) Слепая кишка**

- В) Поперечная ободочная
- С) Нисходящая ободочная
- Д) Сигмовидная ободочная
- Е) Прямая.

122. Чоловік скаржиться на порушення чутливості шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового ходу. Пошкодження якого нерва викликало такий стан у хворого?

*** А) n. auricularis magnus**

- В) n. ariculotemporalis
- С) n. auricularis anteriores
- Д) -
- Е) n. facialis

123. У хворого після інсульта втрачена здатність впізнавати букви, слова (алексія), В якій ділянці кори великого мозку у хворого локалізован патологічний процес?

*** А) Gyrus angularis**

- В) Gyrus frontalis medius
- С) Gyrus frontalis superior
- Д) Gyrus supramarginalis
- Е) Gyrus precentralis

124. У чоловіка діагностовано вікова далекозорість в зв'язку з послабленням акомодацийних властивостей кришталика та гладеньких м'язів судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м'яза з віком послаблено?

*** A) M. ciliaris**

B) M. sphincter pupillae

C) M. dilatator pupillae

D) M. obliquus superior

E) M. obliquus inferior

125. У хворого запалення внутрішнього вуха. Після обстеження лікар констатує ураження тіл 1-х нейронів слухового аналізатора. Де вони знаходяться?

*** A) G. spirale**

B) G. vestibulare

C) G. geniculi

D) G. trigeminale

E) G. ciliare

126. Об'єктивним симптомом сальпінгоотита є втягнення барабанної перетинки. Рукоятка слухової кісточки, яка пов'язана з membrana tympani, приймає більш горизонтальне положення. Положення якої кісточки визначає при обстеженні лікар?

*** A) Malleus**

B) Incus

C) Stapes

D) Squama os temporale

E) Processus mastoideus

127. Під час профогляду лікар виявив у школяра сірчану пробку в зовнішньому слуховому проході, яка розташована в самій вузькій його частині. Де вона розташована?

*** A) В місці з'єднання хрящової і кісткової частин**

- B) В ділянці вушної часточки
- C) Біля барабанної перетинки
- D) Біля козелка
- E) -

128. Лікар-стоматолог, знеболюючи нижньощелепний нерв в ділянці овального отвору, випадково ушкодив артерію, яка проходить через остистий отвір. Яку артерію було ушкоджено?

*** A) A.meningea media**

- B) A.sphenopalatina
- C) A.alveolaris inferior
- D) A.maxillaris
- E) A.temporalis profunda

129. У стоматологічну поклініку звернувся хворий з запаленням коміркового відростка верхньої щелепи (остеомиєліт). Яка тканина зуба може постраждати при цьому захворюванні в першу чергу?

*** A) Періодонт**

- B) Пульпа
- C) Дентин
- D) Емаль
- E) Цемент

130. Неефективність ортодонтичного лікування дитини зумовлена стійким ротовим диханням, оскільки носове дихання утруднене. За рахунок гіпертрофії яких мигдаликів?

*** А) Глоткового**

В) Трубних

С) Язикового

Д) Піднебінних

Е) Піднебінних і трубних

131. Хворого госпіталізовано з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м'яз травмований?

*** А) щелепно-під'язиковий**

В) щито-під'язиковий

С) шило-под'язиковий

Д) лопатково-під'язиковий

Е) груднинно-під'язиковий

132. Пацієнт скаржиться на біль у верхній щелепі та зубах. Об'єктивно: відмічається біль при натискуванні в області підчоямкового отвору. Який нерв уражено?

*** А) Друга гілка трійчастого нерва**

В) Перша гілка трійчастого нерва

С) Третя гілка трійчастого нерва

Д) Блоковий нерв

Е) Лицевий нерв

133. У хворого з остеомієлітом нижньої щелепи виявлено ознаки пошкодження plexus dentalis inferior та порушення іннервації зубів та ясен нижньої щелепи. Гілками якого нерва воно утворюється в нормі?

*** A) N. alveolaris inferior**

B) N. maxillaris

C) N. lingualis

D) N. buccalis

E) N. facialis

134. До лікаря звернувся чоловік зі скаргами на зміну голосу. При обстеженні було виявлено порушення іннервації м'язів, що впливають на розширення та звуження голосової щілини. Яким нервом вони іннервуються?

*** A) N. laryngeus inferior**

B) N. laryngeus superior

C) N. laryngeus internus

D) N. accessorius

E) N. glossopharyngeus

135. Травмований не може кивати головою (згинання та розгинання голови вперед та назад). Функція якого суглоба порушена?

*** A) Атлanto-потиличного**

B) Атлanto-аксиального бічного

C) Атлано-аксиального серединного

D) Дуговідросткових

E) -

136. Стоматолог при огляді порожнина рота хворого виявив запалення тканини, які оточують зуб. Які тканини запалено?

*** A) Paradont**

- B) Gingiva
- C) Pulpa dentis
- D) Dentinum
- E) Cementum

137. Стоматолог при огляді видаленого зуба, який має масивну коронку в формі ромба, чотири горбика та три кореня (2 щічних та 1 язиковий). Визначте, який цей зуб.

*** A) Верхній 1-й великий кутній зуб**

- B) Нижній 1-й великий кутній зуб
- C) Верхній 2-й великий кутній зуб
- D) Нижній 2-й великий кутній зуб
- E) Верхній 3-й великий кутній зуб

138. У ЛОР- відділення потрапив хворий з запаленням слизової оболонки порожнини носа і порушенням нюху. Яка зона слизової оболонки вражена?

*** A) Верхній носовий хід**

- B) Середній носовий хід
- C) Нижній носовий хід
- D) Загальний носовий хід
- E) Перегородка носа

139. При огляді порожнини рота дитини 7 років стоматолог знайшов, що за другим молочним великим кутнім зубом виріс зуб. Визначите цей зуб?

*** А) Перший постійний великий кутній зуб**

- В) Другий постійний великий кутній зуб
- С) Третій постійний великий кутній зуб
- Д) Перший постійний малий кутній зуб
- Е) Другий постійний малий кутній зуб

140. Дитині 13 років видалили другий молочний великий кутній зуб. Який постійний зуб виросте на його місці?

*** А) Другий малий кутній зуб**

- В) Перший малий кутній зуб
- С) Перший великий кутній зуб
- Д) Другий великий кутній зуб
- Е) Третій великий кутній зуб

141. Чоловік звернувся до стоматолога зі скаргами на болі при жуванні і висуванні щелепи вперед. Які жувальні м'язи піддалися запаленню?

*** А) M.m. pterigoidei laterales**

- В) M.m. pterigoidei mediales
- С) M.m. temporales
- Д) M.m. Buccalis
- Е) –

142. Видалений зуб у чоловіка має довгий корінь, на язиковій поверхні - серединний валик, який розширювався по напрямленню до ріжучого краю зуба. Який це був зуб?

*** А) Ікло верхньої щелепи**

- В) Великий кутній зуб верхньої щелепи
- С) Медіальний різець верхньої щелепи
- Д) Бічний різець нижньої щелепи
- Е) Премоляр нижньої щелепи

143. У хворого після травми голови виявлено крововилив у ділянці медіальної поверхні лобової звивини та поясної звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?

*** А) Передньої мозкової артерії**

- В) Середньої мозкової артерії
- С) Основної артерії
- Д) Задньої мозкової артерії
- Е) Передньої сполучної артерії

144. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на появу темної плями перед очима. При офтальмоскопії виявлений набряк в ділянці найбільш чутливого до світла місця сітківки. Яка ділянка сітківки уражена?

*** А) Fovea centralis**

- В) Discus nervi optici.
- С) Ora serata
- Д) -
- Е) Pars caeca retinae

145. У хворого після екстракції 7 верхнього зуба у лунці з'явилося повітря. Стінка якої приносової пазухи пошкоджена?

*** А) Гайморової**

- В) Клиноподібної
- С) Лобової
- Д) Середні комірки решітчастої пазухи
- Е) Задні комірки решітчастої пазухи

146. Пацієнту потрібно виконати операцію видалення верхнього третього моляра. Які нерви потрібно знеболити?

*** А) Коміркові верхні задні нерви**

- В) Коміркові верхні передні нерви
- С) Коміркові верхні середні нерви
- Д) Великий піднебінний нерв
- Е) Задні верхні носові нерви

147. При томографічному обстеженні хворого було встановлено ушкодження *lemniscus lateralis* мозкового стовбура. Якому з провідних шляхів належить ця структура?

*** А) Tr. acusticus**

- В) Tr. pyramidalis
- С) Tr. frontopontinus
- Д) Tr. tectospinalis
- Е) Tr. reticulospinalis

148. У пацієнта при ковтанні часточки їжі потрапляють у носову порожнину. Ураження якого м'яза м'якого піднебіння можна припустити?

*** А) М'яз-натягач піднебінної завіски**

В) -

С) М'яз-язичка

Д) Піднебінно-язиковий м'яз

Е) Піднебінно-глотковий м'яз

149. Невропатолог при огляді хворої встановив відсутність шкіряної чутливості на передній і бічній поверхні шиї. Функція якого нерва порушена?

*** А) N. transversus colli**

В) N. occipitalis minor

С) N. auricularis magnus

Д) Nn. supraclaviculares

Е) N. occipitalis major

150. Дитині 10 років видалили перший молочний великий кутній зуб. Який постійний зуб виросте на його місці?

*** А) Перший малий кутній зуб**

В) Другий малий кутній зуб

С) Перший великий кутній зуб

Д) Другий великий кутній зуб

Е) Третій великий кутній зуб

151. У больного при обследовании в кардиологическом отделении установлено нарушение венозного оттока от задних стенок обоих желудочков. Нарушение кровотока в какой вене оно вызвано?

- * A) V. cordis media**
- B) V. cordis magna
- C) V. v. cordis minimae
- D) V. cordis parva
- E) V. obliqua atrii sinistri

152. У хворого відсутня загальна чутливість передніх 2/3 язика. Який нерв уражено?

- * A) Язиковий нерв**
- B) Барабанна струна
- C) Верхній гортанний нерв
- D) Піднебінні нерви
- E) Язико-горловий нерв

153. У хворого наявна гіперестезія шкіри присередньої поверхні плеча. З паталогією якого нерва це пов'язано?

- * A) Присереднього шкірного нерва плеча.**
- B) Серединного.
- C) Ліктьового.
- D) Променевого.
- E) Пахвового.

154. У медико-генетичній консультації було проведено обстеження вагітної жінки (20- тижнева вагітність). На УЗО плід розвинутий нормально, у серцево-судинній системі відхилень від норми немає, артеріальна протока функціонує. Які судини плода вона з'єднує ?

*** А) Легеневий стовбур з аортою**

- В) Легеневий стовбур з легеневими венами
- С) Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною
- Д) Аорту з нижньою порожнистою веною
- Е) Аорту з верхньою порожнистою веною

155. У дитини 2 років після перенесеного грипу з'явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?

*** А) через слухову трубу**

- В) через foramen jugularis
- С) через canalis caroticus
- Д) через atrium mastoideum
- Е) через canalis nasolacrimalis

156. У дитини 1-го року життя виявлена одна з вад розвитку серцево-судинної системи - незарощення боталової протоки. Вкажіть місце її локалізації.

*** А) Судина, що з'єднує легеневу артерію і аорту**

- В) Міжпредсердна перегородка
- С) Міжшлуночкова перегородка
- Д) Судина, що з'єднує пупочну і ніжню порожнисту вену
- Е) Судина, що з'єднує воротну і ніжню порожнисту вену

157. У ребенка 1-го года жизни выявлен один из недостатков развития сердечно-сосудистой системы - незаращение боталового протока. Укажите место его локализации.

- * А) Сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту**
- В) Межпредсердная перегородка
- С) Межжелудочковая перегородка
- Д) Сосуд, соединяющий пупочную и нижнюю полую вену
- Е) Сосуд, соединяющий воротную и нижнюю полую вену

158. У хворого запалення під'язикового сосочка. Із яких слинних залоз буде затруднено виділення слини?

- * А) Під'язикова і піднижньощелепна**
- В) Під'язикова і привушна
- С) Привушна і піднижньощелепна
- Д) Привушна і піднебінна
- Е) Під'язикова і щічна

159. При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини?

- * А) 6-7 років**
- В) 4-5 років
- С) 8-9 років
- Д) 10-11 років
- Е) 12-13 років

160. В микропрепарате спинного мозга необходимо проанализировать состояние ядра, нейроны которого образуют моторные окончания в скелетной мускулатуре. Укажите данное ядро.

*** А) Собственное ядро переднего рога.**

В) Грудное ядра.

С) Промежуточное латеральное ядро.

Д) Собственное ядро заднего рога.

Е) Собственное ядро серого вещества

161. До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш відповідні?

*** А) Щитовидної залози**

В) Прищитовидної залози

С) Підшлункової залози

Д) Яєчників

Е) Наднирків

162. До лікаря звернувся чоловік 27 років. При огляді було виявлено збільшення кистей, стоп та нижньої щелепи. Крім того спостерігалась деформація суглобів (kiphosis), гормональні порушення (імпотенція, атрофія яєчок). Функції якої залози порушені?

*** А) Передньої частини гіпофізу**

В) Надниркових залоз

С) Шишкоподібного тіла

Д) Щитовидної залози

Е) Прищитовидних залоз

163. На розтині померлого після абдомінальної операції в венах малого тазу були знайдені численні тромби. Клінічно був зафіксований тромбоемболічний синдром. Де слід шукати ембол?

*** А) Легеневі артерії**

- В) Портальна вена
- С) Лівий шлуночок серця
- Д) Головний мозок
- Е) Вени нижніх кінцівок

164. У ребенка установлена врожденная расщелина верхней губы (“заячья губа”) и переднего отдела неба (“волчья пасть”). Несращением каких отростков вызван этот дефект?

*** А) Носового, небного**

- В) Верхнечелюстного, лобного
- С) Небного, нижнечелюстного
- Д) Нижнечелюстного, носового
- Е) Носового, лобного

165. В ендокринологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька разів були переломи кінцівок пов'язані з крихкістю кісток. Функція якої ендокринної залози порушена?

*** А) паращитовидна залоза**

- В) щитовидна залоза
- С) вилочкова залоза
- Д) надниркові залози
- Е) епіфіз

166. Во время драки 20-летний мужчина получил ножевое ранение шеи с повреждением наружной сонной артерии. Для временной остановки кровотечения эффективным методом является пальцевое прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку 6 шейного позвонка. В каком треугольнике шеи нужно осуществить пальцевое прижатие сонной артерии для остановки кровотечения?

*** А) Сонном**

- В) Поднижнечелюстном
- С) Пирогова
- Д) Лопаточно-трахеальном
- Е) Лопаточно-ключичном

167. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Біпрогнатія**

- В) Ортогнатія
- С) Прямий прикус
- Д) Закритий прикус
- Е) Прогенія

168. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями. Контакт між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Відкритий прикус**

- В) Ортогнатія
- С) Прямий прикус
- Д) Закритий прикус
- Е) Прогенія

169. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається повне перекриття нижніх різців верхніми (верхні різці закривають нижні). Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Закритий прикус**

- В) Прямий прикус
- С) Відкритий прикус
- Д) Прогенія
- Е) Ортогнатія

170. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається правильне змикання передніх зубів, а щічні жувальні горбики нижніх кутних зубів розміщені не досередини, а до зовні від верхніх. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Перехресний прикус**

- В) Прямий прикус
- С) Відкритий прикус
- Д) Прогенія
- Е) Закритий прикус

171. Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність каріозної плями в ділянці язиково-дистальної борозни на жувальній поверхні правого першого верхнього моляра. Ця борозна відмежовує:

*** А) Гіпоконус.**

- В) Параконус.
- С) Метаконус
- Д) Мезоконус.
- Е) Протоконус.

172. З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

*** A) LIII -LIV**

B) LII -LIII

C) LI -LII

D) TXII-LI

E) LV-SI

173. Небезпечно витискувати гноячки на лиці, особливо вище ротової щілини. Через які венозні анастомози може поширитися інфекція у порожнину черепа?

*** A) Анастомози вен лица з очними венами.**

B) Анастомози вен лица з криловидним сплетенням.

C) Анастомози вен лица з передніми вушними венами.

D) Анастомози з потиличною веною.

E) Анастомози вен лица з середньою і глибокими висковими венами.

174. Стоматолог при обстеженні 23-річного хворого встановив, що хворий не може нижню губу висовувати вперед. Який нерв вражений?

*** A) R. Marginalis mandibulae**

B) N. mentalis

C) N. buccalis

D) N. infraorbitalis

E) N. sublingualis

175. Дитина 5 років поступила в лор- відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха . Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину ?

*** А) М'язовотрубний канал.**

- В) Барабанний каналець.
- С) Сонний канал.
- Д) Каналець барабанної струни.
- Е) Сонно-барабанні канальці.

176. У хворого після перенесеного простудного захворювання виникло порушення міміки. Він не може закривати очі, наморщувати брови, вискалювати зуби. Який нерв пошкоджено?

*** А) Лицевий**

- В) Блукаючий
- С) Трійчастий
- Д) Язикоглотковий
- Е) Інфраорбітальний

177. Хворий втратив смак в передній частині двох-третіх язика. Порушення функції якого нерва можна припустити?

*** А) Барабанної струни**

- В) Язикоглоткового нерва
- С) Блукаючого нерва
- Д) Під'язикового нерва
- Е) Додаткового нерва

178. При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка з перешкода (пухлина)?

*** А) В воротарному**

В) В кардіальному

С) В ділянці дна

Д) В ділянці тіла

Е) У ділянці малої кривизни

179. У хворого після простудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?

*** А) Трійчастий**

В) Під'язиковий

С) Діафрагмальний

Д) Блукаючий

Е) Барабанна струна

180. Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?

*** А) В середньому**

В) В верхньому

С) В нижньому

Д) У загальному

Е) В найвищому

181. Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи м'язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?

*** A) Tr.cortico-nuclearis.**

B) Tr.cortico-spinalis.

C) Tr.cortico-thalamicus.

D) Tr.cortico-fronto-pontinus.

E) Tr.thalamo-corticalis.

182. Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з'явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

*** A) Підшлункової**

B) Щитоподібної

C) Статевих

D) Наднирникових

E) Епіфіза

183. Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

*** A) гіпофіза**

B) щитоподібної

C) статевих

D) наднирникових

E) епіфіза

184. В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

*** A) IX**

B) X

C) VIII

D) V

E) XII

185. Чоловік 42 років звернувся до медпункта з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно: затруднене згинання передпліччя. Які з названих м'язів ймовірно ушкоджені у хворого?

*** A) M. brachialis, m. biceps brachii.**

B) M. biceps brachii, m. anconeus.

C) M. coracobrachialis, m. supraspinatus.

D) M. deltoideus, m. infraspinatus.

E) M. deltoideus, m. biceps brachii.

186. Щоб взяти спинномозкову рідину для дослідження лікар повинен зробити пункцію підпавутинного простору спинного мозку. Між якими хребцями треба ввести голку, щоб не пошкодити спинний мозок?

*** A) Між III і IV поперековими хребцями.**

B) Між XI і XII грудними хребцями.

C) Між XII грудним і I поперековими хребцями.

D) Між I і II поперековими хребцями.

E) Між IV і V грудними хребцями.

187. При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованій стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

*** A) N.abducens.**

B) N.trochlearis.

C) N.oculomotorius.

D) N.opthalmicus.

E) N. infraorbitalis..

188. При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість,розширений зрачок, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений?

*** A) Окоруховий**

B) Очний

C) Блоковий

D) Відвідний

E) Зоровий

189. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

*** A) Вовча паща.**

B) Викривлення носової перегородки вправо.

C) Перелом основи черепа.

D) Заяча губа.

E) Викривлення носової перегородки вліво.

190. У поступившого в клинику больного отмечают: сильная головная боль, ригидность мышц затылка, повторная рвота, болезненность при перкуссии черепа, повышена чувствительность к световым раздражителям. Установлен диагноз — менингит. Показана спинномозговая пункция. Укажите место ее проведения.

*** А) Между 3 и 4 поясничными позвонками**

В) Между 1 и 2 поясничными позвонками

С) Между 12 грудным и 1 поясничным позвонками

Д) Между 5 поясничным и основанием крестца

Е) Между 11 и 12 грудными позвонками

191. При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринно залози може спричинити таке руйнування кістки?

*** А) Гіпофіз**

В) Вилочкова залоза

С) Епіфіз

Д) Щитовидна залоза

Е) Наднирник

192. У хворого діагностовано ураження лицевого нерва. На якому рівні пошкоджений нерв, якщо у хворого спостерігається таке сполучення клінічних симптомів: параліч мимічних м'язів, порушення смакової чутливості передньої частини язика, сухість в роті (зменшення слиновідділення). Зниження слюзовідділення немає.

*** А) В каналі лицевого нерву нижче коліна, після відходження великого кам'янистого нерва.**

В) На основі мозку.

С) В каналі лицевого нерву, до відходження великого кам'янистого нерва.

Д) Після виходу нерва з каналу.

Е) В білявушній залозі.

193. Заболевание печени и желчного пузыря может симулировать аппендицит при следующем положении червеобразного отростка:

*** А) Восходящее.**

В) Нисходящее.

С) Медиальное.

Д) Латеральное.

Е) Ретроцекальное.

194. У новонародженої дитини на протязі першої доби педіатр помітив, що при смоктанні молока воно потрапляє у носову порожнину. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

*** А) Незарощення піднебіння**

В) Дивертікул стравоходу

С) Атрезія стравоходу

Д) Заяча губа

Е) Звуження стравоходу

195. У хворого 52 років раптово з'явилась асиметрія лиця. Вся уражена половина лиця непорушна, носогубна складка згладжена, очна щілина розширена; око не закривається, кут рота опущений. Вказаний синдром викликаний ураженням якого нерва ?

*** А) Лицевого.**

В) Язикоглоткового.

С) Трійчастого.

Д) Додаткового.

Е) Під'язикового.

196. Дитина, 5 років, потрапила в тяжкому стані в інфекційний відділ клінічної лікарні з діагнозом дифтерії. Для запобігання ядухи дитині провели трахеостомію, В якому трикутнику шиї проведена дана операція ?

*** А) Omotracheale.**

В) Caroticum.

С) Omoclaviculare.

Д) Submandibulare.

Е) Omotrapezoideum.

197. Після травми обличчя у хворого гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози блоковано гематомою?

*** А) привушна**

В) під'язикова

С) піднижньощелепна

Д) губна

Е) щічна

198. В зв'язку з наявністю злоякісної пухлини на язичку, хворому слід його видалити. В якому місці легко знайти язичкову артерію і перев'язати її?

*** А) Трикутнику Пирогова.**

- В) В сонному трикутнику.
- С) Влопаточно-підключичному трикутнику.
- Д) В лопаточно-трапецієвидному трикутнику.
- Е) В лопаточно-трахейному трикутнику.

199. У хворого з лікар діагностував тромбоз селезінкової артерії (інфаркт селезінки). Звідки відходить уражена артерія ?

*** А) Черевний стовбур**

- В) Верхня брижова артерія
- С) Нижня брижова артерія
- Д) Загальна печінкова артерія
- Е) Ліва шлункова артерія

200. У боксера після удару в привушну ділянку зліва виник параліч м'язів на цій же стороні. Який нерв ушкоджено?

*** А) Лицевий**

- В) Очний
- С) Верхньощелепний
- Д) Нижньощелепний
- Е) Малий кам'янистий нерв

201. При обстеженні дитини лікар виявив набряк та гіперемію лімфоїдної тканини в ділянці мигдаликової ямки. Який з мигдаликів міститься в нормі в цьому місті?

- * A) Tonsilla palatina**
- B) Tonsilla pharyngealis
- C) Tonsilla tubaria
- D) Tonsilla lingualis
- E) -

202. У пациента с повреждением промежуточного мозга выявлено нарушение слуха. Какие структуры при этом повреждены?

- * A) Медиальные коленчатые тела**
- B) Латеральные коленчатые тела
- C) Красное ядро
- D) Передние ядра гипоталамуса
- E) Заднее вентральное ядро

203. После повреждения мозга у человека нарушено восприятие зрительной информации. В каком отделе коры произошло повреждение?

- * A) Затылочная область коры**
- B) Теменная область коры
- C) Височная область коры
- D) Передняя центральная извилина
- E) Задняя центральная извилина

204. После повреждения мозга у человека нарушено восприятие звука. В каком отделе коры произошло повреждение?

*** A) Височная область коры**

- B) Теменная область коры
- C) Затылочная область коры
- D) Передняя центральная извилина
- E) Задняя центральная извилина

205. У хворого порушено кровопостачання медіальної поверхні правої півкулі головного мозку. Яка артерія пошкоджена?

*** A) cerebri anterior**

- B) communicans posterior
- C) cerebri posterior
- D) cerebri media
- E) chorioidea

206. У хворого при фіброгастродуоденоскопії виявлене запалення цибулини 12-палої кишки. У якому відділі кишки локалізується запалення?

*** A) Pars superior**

- B) Pars descendens
- C) Pars horizontalis
- D) Pars ascendens
- E) –

207. В хірургічне відділення доставлено потерпілого з пораненням променевої поверхні передпліччя. З рани витікає венозна кров. Яка судина постраждала?

*** A) V. cephalica**

- B) V. basilica
- C) V. intermedia cubiti
- D) Vv. ulnares
- E) Vv. brachiales

208. При операції на шлунку хірург пересік ліву шлункову артерію, перев'язав її, але кров продовжувала витікати з протилежного кінця артерії. Яка артерія анастомозує з нею?

*** A) Права шлункова артерія**

- B) Селезінкова артерія
- C) Права шлунково-чепцева артерія
- D) Ліва шлунково-чепцева артерія
- E) Верхня підшлунково-дванадцятипала артерія

209. В приймальний покій лікарні доставлено хворого з гострою затримкою сечі. При огляді лікар встановив, що в хворого обтурація сечівника зв'язана з патологією органу, який його охоплює. Про який орган йде мова?

*** A) Передміхурова залоза**

- B) Яєчко
- C) Сім'яний пухирець
- D) Сім'яний канатик
- E) Надяєчко

210. У приймальне відділення лікарні доставлений хлопчик з ознаками внутрішньої кровотечі після удару у ліву підреберну ділянку. Який орган найімовірніше пошкоджений?

*** А) Селезінка**

В) Шлунок

С) Підшлункова залоза

Д) Ліва нирка

Е) Поперечна ободова кишка

211. Пацієнт звернувся до окуліста зі скаргами на опущення верхньої повіки. При обстеженні була діагностована пухлина головного мозку. Ядро якої пари черепних нервів уражено патологічним процесом?

*** А) III**

В) II

С) IV

Д) VI

Е) VII

212. Хворого госпіталізовано з остеомієлітом верхньої щелепи, внаслідок чого відбулося розплавлення стінки орбіти. Яка стінка очної ямки пошкоджена?

*** А) нижня**

В) верхня

С) медіальна

Д) латеральна

Е) -

213. Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на втрату можливості розрізняти кольори. Після огляду сітківки ока виявлено враження структур, що відповідають за цей вид чутливості. Що це за структури?

*** А) Колбочки**

- В) Палочки
- С) Біполярні нейрони
- Д) Мультиполярні нейрони
- Е) Гангліонозні нейрони

214. Хвора госпіталізована із закритою черепно-мозковою травмою у ділянці потиличної кістки. При огляді: порушення ходи і рівноваги, тремор рук. Яка частина головного мозку ушкоджена?

*** А) мозочок**

- В) довгастий мозок
- С) міст
- Д) проміжний мозок
- Е) спинний мозок

215. Хворий скаржиться на біль очних яблук. При огляді знайдене підвищення внутрішньо очного тиску. Порушення відтоку якої рідини, спровокувало даний стан?

*** А) водянистої вологи**

- В) ендолімфи
- С) перилімфи
- Д) лімфи
- Е) сльози

216. У хворого після застосування крапель, що містять атропін, виникло стійке розширення зіниці. Роботу якого м'яза блоковано?

- * А) звужувача зіниці**
- В) розширювача зіниці
- С) війкового
- Д) прямих м'язів
- Е) косих м'язів

217. Після крововиливу в мозок у хворого виникла стійка косоокість правого ока, втрачена здатність до відведення його латерально. Ядро якого черепного нерва ушкоджено при крововиливі?

- * А) n.abducens dexter**
- В) n.facialis dexter
- С) n.oculomotorius
- Д) n.abducens sinister
- Е) n.trochlearis

218. В процессе стоматологических манипуляций повреждены волокна 12 пары черепномозговых нервов. В чем это проявилось?

- * А) Нарушение функции мышц языка**
- В) Нарушение сокращения мышц мягкого неба
- С) Нарушение сокращения мышц гортани
- Д) Нарушение сокращения мышц поднимающих подъязычную кость
- Е) Нарушение сокращения мышц глотки

219. У хворого діагностовано перелом вінцевого відроста нижньої щелепи зі зміщенням. Який м'яз змістить відросток?

*** А) Скроневий**

- В) Латеральний крилоподібний
- С) Медіальний крилоподібний
- Д) Жувальний
- Е) -

220. При формуванні порожнини рота у дитини не відбулось зрощення бічного носового та верхньощелепного відростків. Виникнення якої аномалії передбачається?

*** А) „заяча губа”**

- В) „вовча паща”
- С) Мікростома
- Д) Макростома
- Е) -

221. При обстеженні лікар виявив у пацієнта гіпертрофію та запалення лімфоїдної тканини, набряк слизової оболонки між дужками м'якого піднебіння (гострий тонзиліт). Який з мигдаликів міститься в нормі в цьому місті?

*** А) Tonsilla palatina**

- В) Tonsilla pharyngealis
- С) Tonsilla tubaria
- Д) Tonsilla lingualis
- Е) -

222. Після травми у хворого спостерігається втрата чутливості задніх ділянок шкіри плеча та передпліччя. Гілки якого нерва ушкоджені?

- * A) N. radialis**
- B) N. ulnaris
- C) N. medianus
- D) N. axillaris
- E) N. musculocutaneus

223. При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини, хірургу необхідно виділити артеріальну судину, що оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія?

- * A) axillaris**
- B) vertebralis
- C) transversa colli
- D) profunda brachii
- E) subscapularis

224. У хворого менінгіт. Показана пункція підпавутинного простору. Визначте, між якими утвореннями він розташований?

- * A) Павутинною та м'якою оболонками**
- B) Твердою та павутинною оболонками
- C) Окістям та твердою мозковою оболonoю
- D) Окістям та павутинною оболonoю

225. Судовий експерт при вивченні серця визначив, що у загиблого пошкоджена вінцева пазуха серця. Визначте місце впадіння пошкодженого анатомічного утворення.

*** А) Праве передсердя**

- В) Нижня порожниста вена
- С) Верхня порожниста вена
- Д) Правий шлуночок
- Е) Ліве передсердя

226. При УЗД дослідженні вагітної в серцево-судинній системі плоду порушень не виявлено, артеріальна протока функціонує. Визначте, які судини вона з'єднує?

*** А) Легеневий стовбур з аортою**

- В) Легеневий стовбур з верхньою порожнистою веною
- С) Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною
- Д) Пупкову вену з аортою
- Е) Пупкову вену з пупковою артерією

227. Во время осмотра врач, обследуя пациентку, изучил анализы крови и сделал вывод, что имеет место поражение центральных органов иммуногенеза. Какие органы вероятнее всего поражены?

*** А) Костный мозг**

- В) Миндалины
- С) Лимфоидные узелки
- Д) Селезенка
- Е) Печень

228. У хворого 65 років діагностовано крововилив в передні роги спинного мозку. Якими вони є за функцією?

*** А) Руховими**

В) Чутливими

С) Симпатичними

Д) Парасимпатичними

Е) -

229. Внаслідок травми відбувся розрив нюхових волокон, які виходять з порожнини носа. Крізь яку кістку проходять ці волокна?

*** А) Решітчасту**

В) Клиноподібну

С) Верхню щелепу

Д) Нижню носову раковину

Е) Носову

230. При огляді у хворого виявилося запалення анатомічного утворення, що врівноважує тиск між барабанною порожниною та глоткою. Що це за утворення?

*** А) Слухова труба**

В) Зовнішній слуховий прохід

С) Внутрішній слуховий прохід

Д) Соскоподібна печера

Е) Внутрішнє вухо

231. Хворого оперують з приводу травми печінки та крововиливом в печінкову сумку. Яка структура попереджує проникнення крові до передшлункової сумки?

*** А) Серпоподібна зв'язка**

- В) Кругла зв'язка
- С) Вінцева зв'язка
- Д) Права трикутна зв'язка
- Е) Ліва трикутна зв'язка

232. У хворої похилого віку вже 4 раз трапляється перелом кісток верхньої кінцівки. З підвищенням місткості якої речовини пов'язане підвищення крихкості кісток у такому віці?

*** А) Неорганічних речовин**

- В) Органічних речовин
- С) Води
- Д) Міжклітинної рідини
- Е) Сполучної речовини

233. Хворий скаржиться на втрату чутливості задньої третини спинки язика та у ділянці піднебінних мигдаликів. Який нерв іннервує ці області?

*** А) Язикоглотковий нерв**

- В) Додатковий нерв
- С) Під'язиковий
- Д) Трійчастий
- Е) Блоковий

234. У пацієнта ураження мітрального клапана. Де буде вислуховуватись патологічний шум при аускультації?

*** А) На верхівці серця**

- В) В II міжребер'ї справа від груднини
- С) В II міжребер'ї зліва від груднини
- Д) В ділянці мечоподібного відростка
- Е) В III міжребер'ї справа від груднини

235. Во время осмотра врач обследовал пациента, изучил анализы крови и сделал вывод, что имеют место нарушения периферических органов иммуногенеза. Какие органы вероятнее всего поражены?

*** А) Миндалины**

- В) Вилочковая железа
- С) Почки
- Д) Красный костный мозг
- Е) Желтый костный мозг

236. У людини розвинувся гігантизм. Функція якої залози внутрішньої секреції порушена?

*** А) Гіпофіза**

- В) Епіфіза
- С) Щитоподібної
- Д) Вилочнової
- Е) Надниркових залоз

237. Чоловік скаржиться на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, зовнішньої латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановлює запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?

*** А) Підочноямковий отвір**

- В) Рваний отвір
- С) Верхню очноямкову щілину
- Д) Остистий отвір
- Е) Овальний отвір

238. У пацієнта спостерігаються птоз (опущення повіки), розбіжна косоокість, порушення акомодациї, розширення зіниць. Ядра якої пари черепних нервів уражені?

*** А) III.**

- В) IV.
- С) V.
- Д) VI.
- Е) VII.

239. У хворого порушений зіничний рефлекс. Зіниці звужені, хворий погано орієнтується в темному приміщенні. Функція якого м'яза очного яблука порушена?

*** А) M. dilatator pupillae**

- В) M. sphincter pupillae.
- С) M. ciliaris.
- Д) M. obliquus superior.
- Е) M. obliquus inferior.

240. У хворого внаслідок ножового поранення шиї розпочалась кровотеча з загальної сонної артерії, яка проходить в сонному трикутнику у складі судинно-нервового пучка . Які складові формують цей пучок разом з артерією?

*** A) n. vagus, v.jugularis interna**

B) n. hypoglossus v.jugularis interna

C) n. vagus, v.jugularis anterior

D) n. hypoglossus, v.jugularis externa

E) n. phrenicus, v.jugularis externa

241. Хворому діагностовано недостатність мітрального клапана.Де даний клапан розміщується ?

*** A) Між лівим передсердям і лівим шлуночком**

B) Між правим передсердям і правим шлуночком

C) Між лівим і правим передсердями

D) Між лівим і правим шлуночками

E) В місці виходу аорти

242. При обстеженні дитини виявлено незарощення овального отвору. Де розміщений даний отвір?

*** A) Між лівим і правим передсердями**

B) Між правим передсердям і правим шлуночком

C) Між лівим передсердям і лівим шлуночком

D) Між лівим і правим шлуночками

E) В ділянці мітрального клапана

243. Чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при русі щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого?

*** А) Сконевого (задні волокна)**

- В) Сконевого (передні волокна);
- С) Крилоподібного медіального
- Д) Крилоподібного латерального
- Е) Жувального

244. При огляді 6-місячної дитини лікар виявив не закриті задні тім'ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини?

*** А) До 3-місячного віку**

- В) До народження
- С) До 6-місячного віку
- Д) До кінця першого року життя
- Е) До кінця другого року життя

245. Після операції на щитоподібній залозі у хворого спостерігається порушення голосоутворення (голос тихий, осиплий). Який нерв ушкоджено?

*** А) Поворотний гортанний нерв**

- В) Верхній гортанний нерв
- С) Бронхіальні гілки
- Д) Трахеальні гілки
- Е) Горлові гілки

246. Під час операції на кульшовому суглобі у пацієнта була пошкоджена зв'язка, внаслідок чого почалося кровотеча. Яка зв'язка була пошкоджена?

*** А) Головки стегна**

- В) Поперечна кульшової западини
- С) Клубово-стегнова
- Д) Лобково-стегнова
- Е) Сідничо-стегнова

247. Хвора звернулася зі скаргами на неможливість зводити і розводити пальці кисті. Які м'язи втратили свою функцію?

*** А) міжкісткові**

- В) червоподібні
- С) поверхневий згинач пальців
- Д) глибокий згинач пальців
- Е) розгинач пальців

248. Хворий госпіталізований з приводу крововиливу в головний мозок. Після огляду виявлено, що місце крововиливу локалізоване на верхньо-латеральній поверхні півкуль. Яка судина, що живить цю ділянку мозку, пошкоджена?

*** А) середня мозкова артерія**

- В) передня мозкова артерія
- С) верхня мозочкова артерія
- Д) передня сполучна гілка
- Е) задня сполучна гілка

249. Після проведеної операції на шиї, хворий втратив чутливість на її передній та бічній поверхнях. Яка гілка шийного сплетіння була пошкоджена під час операції?

*** А) поперечний шийний нерв**

- В) великий вушний нерв
- С) малий потиличний нерв
- Д) надключичний нерв
- Е) шийна петля

250. Під час ультразвукового дослідження серця у дитини 1,5 років знайдено незарощення овального отвору, що підтверджено клінічно. У якому відділі серця розташований даний дефект?

*** А) міжпередсердна перегородка**

- В) міжшлуночкова перегородка
- С) правий передсердно-шлуночковий клапан
- Д) лівий передсердно-шлуночковий клапан
- Е) верхівка серця

251. Хворого госпіталізовано з підозрою на пухлину простати. Під час операції виявлено, що пухлина “проросла” до сечового міхура. Який відділ сечового міхура постраждав?

*** А) Шийка**

- В) Верхівка
- С) Дно
- Д) Тіло
- Е) -

252. У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій ймовірноше всього пошкоджена?

*** А) Середня оболонна артерія**

- В) Середня мозкова артерія
- С) Поверхнева скронева артерія
- Д) Передня оболонна артерія
- Е) Задня вушна артерія

253. У хворого під час аускультатії вислуховується шум в ділянці проекції верхівки серця. Ваду якого з клапанів серця можна запідозрити?

*** А) Мітрального.**

- В) Тристулкового.
- С) Клапана легеневого стовбура.
- Д) Клапана аорти.
- Е) -

254. У приймальне відділення лікарні доставлений хворий з кровотечею внаслідок різаної рани в ділянці медіальної кісточки. Яка з артерій наймовірноше ушкоджена?

*** А) Задня великогомілкова.**

- В) Передня великогомілкова.
- С) Малогомілкова.
- Д) Передня поворотна великогомілкова.
- Е) Задня поворотна великогомілкова

255. Після обстеження у хворого виявлені симптоми акромегалії. Яка ендокринна залоза втягнута в патологічний процес?

*** А) Аденогіпофіз.**

В) Нейрогіпофіз.

С) Епіфіз.

Д) Наднирники.

Е) Щитоподібна залоза.

256. Підчас обстеження, ендокринологом виявлено у хворого симптоми базедової хвороби (екзофтальм, зоб, тахіардія). Яка залоза уражена патологічним процесом?

*** А) Щитоподібна.**

В) Аденогіпофіз.

С) Нейрогіпофіз.

Д) Наднирники.

Е) Епіфіз.

257. У хворого знайдені симптоми порушення росту (гігантизм). Патологічний процес якої залози внутрішньої секреції може привести до даної патології?

*** А) Аденогіпофіз.**

В) Нейрогіпофіз.

С) Епіфіз.

Д) Наднирники.

Е) Щитоподібна залоза.

258. При виконанні оперативного втручання на діафрагмі ротової порожнини хірургу необхідно виділити ділянку, що має назву трикутника Пірогова. Яка структура утворює його верхню межу?

*** A) N. hypoglossus**

B) M. stylohyoideus

C) M. geniohyoideus

D) M. digastricus

E) M. mylohyoideus

259. У хворого на інсульт спостерігається порушення заднього відділу задньої ніжки внутрішньої капсули. Які з провідних шляхів і там проходять?

*** A) Radiatio acustica et radiatio optica**

B) Tr. corticonuclearis

C) Tr. corticospinalis

D) Tr. parietopontinae

E) Tr. occipitopontinae

260. В онкологічне відділення поступив хворий з підозрою на пухлину легень. При обстеженні виявили локалізацію патології в нижньої частці правої легені. Скільки бронхолегеневих сегментів має ця частка?

*** A) 5**

B) 6

C) 4

D) 3

E) 2

261. Чоловіка доставлено в лікарню з травмою черепа. При обстеженні хворого констатовано відсутність у нього вольових рухів м'язів голови і шиї.

Пошкодження якої ділянки головного мозку могло бути причиною цього?

*** А) Нижнього відділу передцентральної звивини.**

В) Нижнього відділу постцентральної звивини.

С) Верхнього відділу передцентральної звивини.

Д) Верхнього відділу постцентральної звивини.

Е) Нижньої лобової звивини.

262. У хворого виявлено пухлину головного мозку в ділянці задньої ніжки внутрішньої капсули (в самому задньому відділі). Які функціональні порушення повинні бути у такого хворого?

*** А) зору та слуху.**

В) вольових рухів м'язів голови та шиї.

С) вольових рухів м'язів тулуба і кінцівок.

Д) пропріоцептивної та екстероцептивної чутливості з протилежного боку.

Е) нюху.

263. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на порушення смакової чутливості язика. Пошкодження якого ядра довгастого мозку могло викликати ці розлади?

*** А) Поодинокого.**

В) Подвійного ядра.

С) Під'язикового нерва.

Д) Нижнього слиновидільного .

Е) Дорсального ядра блукаючого нерва.

264. У хворі спостерігається зменшення маси тіла, збільшення частоти серцевих скорочень, збільшення теплопродукції та тепловіддачі, психоемоційне збудження та безсоння. Гіперфункція якої ендокринної залози спостерігається?

*** A) Щитоподібної**

B) Наднирникових

C) Яєчників

D) Гіпофізу

E) Парагангліїв

265. У постраждалого травма черепа з порушенням дірчастої пластинки решітчастої кістки. Який нерв може бути ушкоджений?

*** A) N. olfactorius**

B) N. opticus

C) N. ophthalmicus

D) N. trochliaris

E) N. abducens

266. У потерпілого при травмі потиличної кістки ушкоджено сигмоподібний синус. Яка частина кістки ушкоджена?

*** A) Pars lateralis**

B) Clivus

C) Pars basilaris

D) Squama

E) –

267. Мімічні м'язи сприяють зміні виразу обличчя. Ушкодження якого нерва може створити явище відсутності міміки?

*** А) Лицевого нерва**

- В) Трійчастого нерва
- С) Щічного нерва
- Д) Верхньощелепного нерва
- Е) Сконево-вушного нерва

268. Во время операции на позвоночном столбе больному удалили дуги позвонков и соединяющие их связки. Назовите эти связки.

*** А) Желтые связки**

- В) Межостистые связки
- С) Передняя продольная связка
- Д) Задняя продольная связка
- Е) -

269. Хирургу необходимо произвести удаление части травмированной стопы по линии Лисфранкова сустава. Какую связку необходимо пересечь?

*** А) Медиальную межкостную предплюстно-плюсневую.**

- В) Пяточно-ладьевидную
- С) Раздвоенную
- Д) Таранно-ладьевидную
- Е) Таранно-пяточную

270. У женщины с резаной раной левой подмышечной области при обследовании выявлена невозможность прониравать кисть. Сухожилия и волокна мышц предплечья целы. Какой нерв поврежден у данной пострадавшей?

*** A) N.medianus.**

B) N. ulnaris.

C) N.radialis.

D) N. cutaneus brachii medialis.

E) N. cutaneus antebrachii medialis.

271. Мужчина обратился к хирургу с жалобами на боль внизу живота справа. При глубокой пальпации врач обнаружил болезненность в правой паховой области. В каком отделе кишечника возможен патологически процесс?

*** A) Слепая кишка**

B) Поперечная ободочная

C) Нисходящая ободочная

D) Сигмовидная ободочная

E) Прямая.

272. Чоловік скаржитися на порушення чутливості шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового ходу. Пошкодження якого нерва викликало такий стан у хворого?

*** A) n. auricularis magnus**

B) n. ariculotemporalis

C) n. auricularis anteriores

D) -

E) n.facialis

273. У хворого після інсульту втрачена здатність впізнавати букви, слова (алексія), В якій ділянці кори великого мозку у хворого локалізован патологічний процес?

*** A) Gyrus angularis**

- B) Gyrus frontalis medius
- C) Gyrus frontalis superior
- D) Gyrus supramarginalis
- E) Gyrus precentralis

274. У чоловіка діагностовано вікова далекозорість в зв'язку з послабленням акомодаційних властивостей кришталика та гладеньких м'язів судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м'яза з віком послаблено?

*** A) M. ciliaris**

- B) M. sphincter pupillae
- C) M. dilatator pupillae
- D) M. obliquus superior
- E) M. obliquus inferior

275. У хворого запалення внутрішнього вуха. Після обстеження лікар констатує ураження тіл 1-х нейронів слухового аналізатора. Де вони знаходяться?

*** A) G. spirale**

- B) G. vestibulare
- C) G. geniculi
- D) G. trigeminale
- E) G. ciliare

276. Об'єктивним симптомом сальпінгоотита є втягнення барабанної перетинки. Рукоятка слухової кісточки, яка пов'язана з membrana tympani, приймає більш горизонтальне положення. Положення якої кісточки визначає при обстеженні лікар?

*** A) Malleus**

B) Incus

C) Stapes

D) Squama os temporale

E) Processus mastoideus

277. Під час профогляду лікар виявив у школяра сірчану пробку в зовнішньому слуховому проході, яка розташована в самій вузькій його частині. Де вона розташована?

*** A) В місці з'єднання хрящової і кісткової частин**

B) В ділянці вушної часточки

C) Біля барабанної перетинки

D) Біля козелка

E) -

278. Лікар-стоматолог, знеболюючи нижньощелепний нерв в ділянці овального отвору, випадково ушкодив артерію, яка проходить через остистий отвір. Яку артерію було ушкоджено?

*** A) A.meningea media**

B) A.sphenopalatina

C) A.alveolaris inferior

D) A.maxillaris

E) A.temporalis profunda

279. У стоматологічну поклініку звернувся хворий з запаленням коміркового відростка верхньої щелепи (остеомієліт). Яка тканина зуба може постраждати при цьому захворюванні в першу чергу?

*** А) Періодонт**

- В) Пульпа
- С) Дентин
- Д) Емаль
- Е) Цемент

280. Неефективність ортодонтичного лікування дитини зумовлена стійким ротовим диханням, оскільки носове дихання утруднене. За рахунок гіпертрофії яких мигдаликів?

*** А) Глоткового**

- В) Трубних
- С) Язикового
- Д) Піднебінних
- Е) Піднебінних і трубних

281. Хворого госпіталізовано з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м'яз травмований?

*** А) щелепно-під'язиковий**

- В) щито-під'язиковий
- С) шило-под'язиковий
- Д) лопатково-під'язиковий
- Е) груднинно-під'язиковий

282. Пацієнт скаржиться на біль у верхній щелепі та зубах. Об'єктивно: відмічається біль при натискуванні в області підчочномкового отвору. Який нерв уражено?

*** A) Друга гілка трійчастого нерва**

B) Перша гілка трійчастого нерва

C) Третя гілка трійчастого нерва

D) Блоковий нерв

E) Лицевий нерв

283. У хворого з остеомієлітом нижньої щелепи виявлено ознаки пошкодження plexus dentalis inferior та порушення іннервації зубів та ясен нижньої щелепи. Гілками якого нерва воно утворюється в нормі?

*** A) N. alveolaris inferior**

B) N. maxillaris

C) N. lingualis

D) N. buccalis

E) N. facialis

284. До лікаря звернувся чоловік зі скаргами на зміну голосу. При обстеженні було виявлено порушення іннервації м'язів, що впливають на розширення та звуження голосової щілини. Яким нервом вони іннервуються?

*** A) N. laryngeus inferior**

B) N. laryngeus superior

C) N. laryngeus internus

D) N. accessorius

E) N. glossopharyngeus

285. Травмований не може кивати головою (згинання та розгинання голови вперед та назад). Функція якого суглоба порушена?

*** А) Атлянто-потиличного**

- В) Атлянто-аксиального бічного
- С) Атлянто-аксиального серединного
- Д) Дуговідросткових
- Е) -

286. Стоматолог при огляді порожнина рота хворого виявив запалення тканини, які оточують зуб. Які тканини запалено?

*** А) Paradont**

- В) Gingiva
- С) Pulpa dentis
- Д) Dentinum
- Е) Cementum

287. Стоматолог при огляді видаленого зуба, який має масивну коронку в формі ромба, чотири горбика та три кореня (2 щічних та 1 язиковий). Визначте, який цей зуб.

*** А) Верхній 1-й великий кутній зуб**

- В) Нижній 1-й великий кутній зуб
- С) Верхній 2-й великий кутній зуб
- Д) Нижній 2-й великий кутній зуб
- Е) Верхній 3-й великий кутній зуб

288. У ЛОР- відділення потрапив хворий з запаленням слизової оболонки порожнини носа і порушенням нюху. Яка зона слизової оболонки вражена?

*** А) Верхній носовий хід**

- В) Середній носовий хід
- С) Нижній носовий хід
- Д) Загальний носовий хід
- Е) Перегородка носа

289. При огляді порожнини рота дитини 7 років стоматолог знайшов, що за другим молочним великим кутнім зубом виріс зуб. Визначите цей зуб?

*** А) Перший постійний великий кутній зуб**

- В) Другий постійний великий кутній зуб
- С) Третій постійний великий кутній зуб
- Д) Перший постійний малий кутній зуб
- Е) Другий постійний малий кутній зуб

290. Дитині 13 років видалили другий молочний великий кутній зуб. Який постійний зуб виросте на його місці?

*** А) Другий малий кутній зуб**

- В) Перший малий кутній зуб
- С) Перший великий кутній зуб
- Д) Другий великий кутній зуб
- Е) Третій великий кутній зуб

291. Чоловік звернувся до стоматолога зі скаргами на болі при жуванні і висуванні щелепи вперед. Які жувальні м'язи піддалися запаленню?

*** A) M.m. pterigoidei laterales**

B) M.m. pterigoidei mediales

C) M.m. temporales

D) M.m. Buccalis

E) –

292. Видалений зуб у чоловіка має довгий корінь, на язиковій поверхні - серединний валик, який розширювався по напрямленню до ріжучого краю зуба. Який це був зуб?

*** A) Ікло верхньої щелепи**

B) Великий кутній зуб верхньої щелепи

C) Медіальний різець верхньої щелепи

D) Бічний різець нижньої щелепи

E) Премоляр нижньої щелепи

293. У хворого після травми голови виявлено крововилив у ділянці медіальної поверхні лобової звивини та поясної звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?

*** A) Передньої мозкової артерії**

B) Середньої мозкової артерії

C) Основної артерії

D) Задньої мозкової артерії

E) Передньої сполучної артерії

294. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на появу темної плями перед очима. При офтальмоскопії виявлений набряк в ділянці найбільш чутливого до світла місця сітківки. Яка ділянка сітківки уражена?

*** A) Fovea centralis**

B) Discus nervi optici.

C) Ora serata

D) -

E) Pars caeca retinae

295. У хворого після екстракції 7 верхнього зуба у лунці з'явилося повітря. Стінка якої приносової пазухи пошкоджена?

*** A) Гайморової**

B) Клиноподібної

C) Лобової

D) Середні комірки решітчастої пазухи

E) Задні комірки решітчастої пазухи

296. Пацієнту потрібно виконати операцію видалення верхнього третього моляра. Які нерви потрібно знеболити?

*** A) Коміркові верхні задні нерви**

B) Коміркові верхні передні нерви

C) Коміркові верхні середні нерви

D) Великий піднебінний нерв

E) Задні верхні носові нерви

297. При томографічному обстеженні хворого було встановлено ушкодження lemniscus lateralis мозкового стовбура. Якому з провідних шляхів належить ця структура?

- * A) Tr. acusticus**
- B) Tr. pyramidalis
- C) Tr. frontopontinus
- D) Tr. tectospinalis
- E) Tr. reticulospinalis

298. У пацієнта при ковтанні часточки їжі потрапляють у носову порожнину. Ураження якого м'яза м'якого піднебіння можна припустити?

- * A) М'яз-натягач піднебінної завіски**
- B) -
- C) М'яз-язичка
- D) Піднебінно-язиковий м'яз
- E) Піднебінно-глотковий м'яз

299. Невропатолог при огляді хворої встановив відсутність шкіряної чутливості на передній і бічній поверхні шиї. Функція якого нерва порушена?

- * A) N. transversus colli**
- B) N. occipitalis minor
- C) N. auricularis magnus
- D) Nn. supraclaviculares
- E) N. occipitalis major

300. Дитині 10 років видалили перший молочний великий кутній зуб. Який постійний зуб виросте на його місці?

*** А) Перший малий кутній зуб**

В) Другий малий кутній зуб

С) Перший великий кутній зуб

Д) Другий великий кутній зуб

Е) Третій великий кутній зуб