

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Фармакологія - база тестів 2014 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2014 року**

Кількість запитань: **240**

1. Вагітна жінка страждає від печії, зумовленої токсикозом. Який засіб є оптимальним в даному випадку?

*** А) Альмагель.**

- В) Натрію гідрокарбонат.
- С) Вісмуту субнітрат.
- Д) Ранітидин.
- Е) Омепразол.

2. Хвору 58-ми років готували до операції холецистектомії. В комплекс засобів премедикації наркозу було введено бензогексоній. Яка роль цього фармакопрепарата при наркозі?

*** А) Функціональна блокада вісцеральних рефлексів**

- В) Розслаблення скелетної мускулатури
- С) Розслаблення гладкої мускулатури
- Д) Редукція фази збудження
- Е) Підсилення ретроградної амнезії

3. У хворого на гіпертонію на прийомі у стоматолога піднявся артеріальний тиск до 180/90 мм рт ст. По рекомендації лікаря він прийняв сублінгвально клофелін в таблетці. Визначте механізм антигіпертензивної дії клофеліну.

*** А) Збуджує центральні α 2-адренорецептори**

- В) Блокує α 1-адренорецептори на периферії
- С) Блокує центральні α 2-адренорецептори
- Д) Збуджує α 1-адренорецептори на периферії
- Е) Блокує α 1-адренорецептори серця

4. Чоловік 49 років був доставлений в гастроентерологічне відділення зі скаргами на нудоту, біль в епігастрії. Після з'ясування у нього виразкової хвороби шлунка було призначено фамотидин. Вкажіть молекулярний субстрат його дії.

*** А) H₂-гістамінорецептори**

В) Na⁺ + H⁺ - АТФаза

С) M₁-холінорецептори

Д) α₁-адренорецептори

Е) α₁-адренорецептори

5. У хворого 38 років на прийомі у лікаря-стоматолога с хронічних холециститом на фоні жовчно-кам'яної хвороби розвився гострий напад болю у правому підребер'ї. Які препарати найбільш раціонально призначити ?

*** А) Но-шпа**

В) Холензим

С) Аллохол

Д) Анальгін

Е) Сульфат магнію

6. Жінці 48-ми років перед екстракцією зуба введено розчин сибазону. Чим пояснюється анксиолітична дія даного лікарського засобу?

*** А) Взаємодія з бензодіазепіновими рецепторами**

В) Блокада α₁-адренорецепторів

С) Активація M-холінорецепторів

Д) Блокада дофамінорецепторів

Е) Гальмування α₁-адренорецепторів

7. У хворого 25 років у стоматологічному кабінеті раптово з'явився напад бронхіальної астми. Лікар дав хворому сальбутамол у вигляді інгаляцій. Який механізм дії цього препарату?

*** А) Стимулює β 2-адренорецептори**

- В) Стимулює β -адренорецептори
- С) Блокує H1-гістамінорецептори
- Д) Блокує фосфодіестеразу
- Е) Блокує М-холінорецептори

8. У хворого після введення лідокаїна виник анафілактичний шок. Який з перелічених препаратів треба обрати лікарю для виведення хворого з шокового стану

*** А) Адреналін**

- В) Кортикотропін
- С) Азатиоприн
- Д) Ацетилсаліцилова кислота
- Е) Амідопірін

9. На прийомі у лікаря – стоматолога у хворого виникли симптоми гострої серцевої недостатності. Яким з перелічених засобів треба купіювати цей стан?

*** А) Строфантин**

- В) Дігітоксин
- С) Лантозид
- Д) Адонізид
- Е) Камфора

10. Хворий гострим ринітом закапує ніс розчином ефедрину. Відчувши полегшення, він прискорив закапування через кожні 15 - 20 хвилин, але від цього покращення не наступило: дихання залишилося утрудненим. З яким із перелічених процесів пов'язане це явище?

*** А) Тахіфілаксія**

- В) Кумуляція
- С) Потенціювання
- Д) Сенсебілізація
- Е) Лікарська залежність

11. У хворого діагностували інфаркт міокарду з тромбозом лівої коронарної артерії. Яка з означених фармакологічних груп препаратів використовується для відновлення кровотоку?

*** А) Активатори фібрinolізу**

- В) Наркотичні анальгетики
- С) Бета - адреноблокатори
- Д) Інгібітори АПФ
- Е) Глюкокортикоїди

12. Після видалення зуба у хворого з'явився гострий біль за грудиною, був поставлений діагноз: напад стенокардії. Який з засобів швидкої допомоги вибере лікар.

*** А) Нітрогліцерин**

- В) Строфантин
- С) Сальбутамол
- Д) Магнію сульфат
- Е) Діазепам

13. Під час ефірного наркозу у хворого виникла виразлива брадікардія з погрозою зупинки серця. Який із перелічених препаратів треба застосувати для прискорення серцевих скорочень в умовах наркозу, що повинен продовжуватися?

*** А) Атропін**

- В) Кофеїн
- С) Адреналін
- Д) Камфора
- Е) Ізадрін

14. Хворий з простудним захворюванням страждає від нестерпного кашлю з погано відділяємим харкотінням. Який з перелічених препаратів поліпшує відділення харкотіння?

*** А) Настій трави термопсису**

- В) Лібексін
- С) Кодеїну фосфат
- Д) Глауцину гідрохлорид
- Е) Фалімінт

15. В клініку поступила дитина, на слизовій оболонці щік, піднебіння і язика якої виявлено точковий наліт білого та жовтуватого кольору, зумовлений *Candida albicans*. Який із перелічених лікарських препаратів використовується для лікування кандидозу?

*** А) Ністатин.**

- В) Гентаміцин.
- С) Пеніцилін.
- Д) Тетрациклін.
- Е) Цефран.

16. Хворому з афтами слизової оболонки призначили препарат, діючим агентом котрого є галоген, а також поверхньо активна речовина, що має дезінфікуючу, дезодоруючу дію. Застосовується для дезінфекції неметалевого інструментарію, рук, предметів догляду за інфекційними хворими. Як антисептик використовується для лікування інфікованих ран, слизової оболонки ротової порожнини, патологічних зубодесневих кишень, дезінфекції кореневих каналів. Визначте препарат.

*** А) Хлоргексидину біглюконат**

- В) Калію перманганат
- С) Кислота борна
- Д) Діамантовий зелений
- Е) Перекис водню

17. При стоматиті хворому призначили препарат з групи сульфаніламідів. Визначте механізм антибактеріальної дії сульфаніламідів:

*** А) Конкурентний антагонізм з ПАБК**

- В) Порушення синтезу білків клітинної стінки
- С) Зменшення проникності мембран
- Д) Пригнічення сульфгідрильних груп тіолових ферментів
- Е) Коагуляція білка

18. Дитині 3 років був призначений препарат антибіотик, який негативно впливає на розвиток кісток і зубів у дитини. Визначте лікарський засіб.

*** А) Тетрациклін**

- В) Левоміцетин
- С) Еритроміцин
- Д) Оксацилін натрій
- Е) Ампіцилін

19. При введенні хворому з метою проведення проводникової анестезії засоба, який використовується в хірургічній стоматології, виникли симптоми отруєння: збудження ЦНС з послідуємим паралічем, гостра серцево-судинна недостатність (колапс), в патогенезі якої має значення сенсibiliзація до даного препарату. Виниклі також алергічні реакції (свербіж, набрячність, еритема). Визначте препарат.

*** А) Лідокаїн**

- В) Дитилін
- С) Тіопентал-натрію
- Д) Тубокурарину хлорид
- Е) Ардуан

20. Хворому, якого привезли в відділення хірургічної стоматології після автокатастрофи ввели лікарський засіб рослинного походження. Має анальгезуючу дію. Викликає сон, який характеризується чутливістю та яскравістю сновидінь. Пригнічує дихальний та кашльовий центри. Викликає медикаментозну залежність. В стоматологічній практиці застосовується при травмах та операціях в щелепно-лицевій ділянці. Визначте препарат.

*** А) Морфіну гідрохлорид**

- В) Фентаніл
- С) Промедол
- Д) Папаверину гідрохлорид
- Е) Пентазоцину лактат

21. В комплексному лікуванні гінгівіту хворому призначили препарат, який за хімічною будовою відноситься до похідних піримідину, стимулює лейкопоез, прискорює заживлення ран, підсилює рост та розмноження клітин (процеси проліферації), виявляє протизапальну дію. Застосовується при лейкопеніях різного генезу, в стоматологічній практиці при запальних захворюваннях слизової оболонки ротової порожнини. Визначте препарат.

*** А) Метилурацил**

В) Меркаптопурин

С) Метотрексат

Д) Ціанокобаламін

Е) Коамід

22. Хворому з гінгівітом після вживання аплікацій призначили полоскання з препаратом, антисептичні властивості якого забезпечуються атомарним киснем, який відщеплюється в присутності органічних речовин. Виявляє також дезодоруючу, в'язучу (протизапальну), а в більших концентраціях - припікаючу дію. Водні розчини використовуються для промивання ран, полоскань рота, а в більш високих концентраціях - для лікування опіків. Застосовується для промивання шлунка при отруєннях. Визначте препарат.

*** А) Калію перманганат**

В) Хлоргексидину біглюконат

С) Перекис водню

Д) Спирт етиловий

Е) Натрію гідрокарбонат

23. При встановленні діагнозу: кандидоз порожнини рота хворому призначили протигрибковий антибіотик, який діє на патогенні гриби, особливо роду *Candida*. Ефективний при поверхневих мікозах слизової оболонки ротової порожнини та інших слизових оболонок. Застосовується, зокрема, в стоматологічній практиці для лікування грибкових стоматитів, які є ускладненнями антибіотикотерапії препаратами широкого спектру дії.

*** А) Ітраконазол**

В) Гризеофульвін

С) Цефазолін

Д) Ампіцилін

Е) Оксацилін-натрій

24. Перед екстракцією зуба хворому ввели місцево знеболюючий препарат з групи заміщених амідів. Визначте препарат.

*** А) Лідокаїн**

В) Новокаїн

С) Анестезин

Д) Дікаїн

Е) Танін

25. Для лікування ксеростомії хворому було призначено пілокарпіну гідрохлорид в краплях всередину. Хворий порушував режим лікування: у нього виникли брадікардія, бронхоспазм, болісне посилення перистальтики, різке потовиділення, слюнотеча, звуження зіниць і спазм акомодатії. Для усунення симптоматики був призначений атропіну сульфат. Як вид взаємодії існує між зазначеними препаратами?

*** А) Антагонізм**

В) Синергізм

С) Кумуляція

Д) Тахіфілаксія

Е) Звикання

26. При медикаментозному стоматиті був призначений антигістамінний препарат, що не має пригнічуючого седативного впливу на ЦНС та діє тривало. Визначте препарат:

*** А) Діазолін**

- В) Дипразин
- С) Димедрол
- Д) Супрастин
- Е) Тавегил

27. При гінгівіті, що викликаний анаеробною інфекцією, до складу пасти ввели похідне нітроімідазолу, що має протитрихомонадну, протилямбліозну, протиамебну дію. Визначте препарат.

*** А) Метронідазол**

- В) Фурацилін
- С) Фуразолідон
- Д) Нітроксолін
- Е) Кислота налідиксова

28. При лікування пародонтиту в комплекс препаратів був включений лікарський засіб з групи водорозчинних вітамінів, похідне біофлаваноїдів, який призначають разом з кислотою аскорбіною. Препарат має антиоксидантні властивості, зменшує кровоточивість ясен. Який це препарат?

*** А) Рутин**

- В) Кальцію пантотенат
- С) Кальцію пангамат
- Д) Ціанокобаламін
- Е) Кислота фолієва

29. В стоматологічному кабінеті у хворого розвився напад бронхіальної астми. Лікар застосував препарат з групи бета-адреноміметиків у вигляді інгаляцій. Який препарат був застосований ?

*** А) Сальбутамол**

- В) Еуфілін
- С) Адреналіну гідрохлорид
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Ефедрину гідрохлорид

30. При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи нейролептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом?

*** А) Дроперидол**

- В) Етаперазин
- С) Левомепромазин
- Д) Клозапін
- Е) сульпірид

31. При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи наркотичних анальгетиків найчастіше застосовується спільно з дроперидолом?

*** А) Фентаніл**

- В) Пентазоцин
- С) Омнопон
- Д) Морфін
- Е) Промедол

32. При гіпертонічному кризі хворому ввели магнію сульфат, що призвело до різкого зниження артеріального тиску. Введенням якого препарату можна запобігти побічні ефекти сульфату магнію?

*** А) Кальцію хлорид**

В) Калію хлорид

С) Трилон Б

Д) Натрію бромід

Е) Натрію сульфат

33. Хворому для ввідного наркозу внутрішньовенно ввели тиопентал натрію, після чого настав ларингоспазм, підсилилась салівація. Введення якого препарату можливо було б запобігти небажані ефекти?

*** А) Атропіну сульфат**

В) Адреналіну гідро хлорид

С) Прозерин

Д) Аллоксин

Е) Пірроксан

34. Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов'язаний цей ефект?

*** А) Звуження судин**

В) Розширення судин

С) Пригнічення тканинних естераз

Д) Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників

Е) Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС

35. У хворого після короткочасного оперативного втручання проведеного з застосування дитиліну понад 30 хвилин відмічалось пригнічення дихання не відновився попередній тонус м'язів. Яку допомогу необхідно надати хворому?

*** А) Перелівання крові**

- В) Гемодіаліз
- С) Гемосорбція
- Д) Форсований діурез
- Е) Перитоніальний діаліз

36. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом в складі комплексної терапії призначили анаприлін. Через деякий час у хворого розпочали з'являтися напади ядухи. З чим пов'язане виникнення даного побічного ефекту?

*** А) Блокада α 2 -адренорецепторів бронхів**

- В) Блокада α 1 -адренорецепторів бронхів
- С) Стимуляція α 2 -адренорецепторів бронхів
- Д) Блокада α 2 -адренорецепторів бронхів
- Е) Стимуляція α 1 -адренорецепторів бронхів

37. Хворий 30-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос і болі в животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,50С з ознобами. На передодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено бактеріологічно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання:

*** А) метронідазол**

- В) Фуразолідон
- С) Левоміцетин
- Д) Фталазол
- Е) Еметина гідрохлорид

38. У хворого при комбінованій терапії хронічної серцевої недостатності дігітоксіном та фуросемідом розвинулась різка м'язова слабкість. Які електролітні порушення можна виявити в крові?

*** А) Гіпокаліємія**

В) Гіперкаліємія

С) Гіпокальціємія

Д) Гіперкальціємія

Е) -

39. До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на запаморочення, зниження гостроти зору, нудоту, слинотечею та спастичні болі в животі. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними з'єднаннями.

Що доцільно включити в склад комплексної терапії?

*** А) Атропіну сульфат та дипіроксим**

В) Тіосульфат натрію та бемеград

С) Тета цин-кальцій та унітіол

Д) Налорфіну гідро хлорид та бемеград

Е) Глюкоза та бемеград

40. У хворого після довготривалого застосування призначеного з приводу гострого респіраторного захворювання препарату виникли слідуючи симптоми: головний біль, запаморочення, шум у вухах, нудота, біль в епігастральній області. Який препарат міг викликати подібну клінічну картину?

*** А) Ацетилсаліцилова кислота**

В) Вітамін С

С) Нафтизин

Д) Бромгексин

Е) Мідантан

41. У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся приступ бронхіальної астми. Який з нижчеперерахованих бронхолітичних засібів може спровокувати гіпертензивну кризу?

*** А) Ефедрину гідрохлорид**

В) Сальбутамол

С) Еуфілін

Д) Беротек

Е) Ізадрин

42. Жінка після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння?

*** А) Нітразепам**

В) Фенобарбітал

С) Етамінал-натрій

Д) Барбаміл

Е) Барбітал

43. Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?

*** А) Пригнічення активності ангіотензинперетворюючого ферменту**

В) Блокада α -адренорецепторів

С) Блокада А-адренорецепторів

Д) Блокада рецепторів ангіотензину II

Е) Периферична вазодилатаційна дія

44. Хворому з гіпертензивною кризою ввели внутрішньовенно клофелін. Який механізм лежить в основі антигіпертензивної дії клофеліну?

*** А) Стимуляція центральних постсинаптичних α_2 -адренорецепторів**

- В) Блокада периферичних α_1 -адренорецепторів
- С) Блокада бета-адренорецепторів
- Д) Блокада Н-холінорецепторів симпатичних гангліїв
- Е) Пряма міотропна дія на судини

45. Хворому з виразковою хворобою призначено фамотидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії даного препарату?

*** А) Блокада H₂-гістамінових рецепторів**

- В) Блокада H₁-гістамінових рецепторів
- С) Блокада M₁-холінорецепторів
- Д) Пригнічення активності H⁺K⁺АТФ-ази
- Е) Блокада Н-холінорецепторів симпатичних гангліїв

46. Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?

*** А) Стимулює альфа -адренорецептори**

- В) Стимулює бета -адренорецептори
- С) Блокує альфа -адренорецептори
- Д) Блокує бета -адренорецептори
- Е) Стимулює альфа - бета -адренорецептори

47. Хірург використав 70% розчин спирту етилового для обробки рук перед оперативним втручанням. Який основний механізм антисептичної дії препарату на мікроорганізми?

*** А) Дегідратація білків протоплазми**

- В) Блокада сульфгідрильних груп ферментних систем
- С) Окислення органічних компонентів протоплазми
- Д) Взаємодія з аміногрупами білків протоплазми
- Е) Взаємодія з гідроксильними групами ферментів

48. Для дезінфекції неметалічного інструментарію у хірургічному відділенні використали розчин формальдегіду. До якої групи за хімічною будовою відноситься даний антисептичний препарат?

*** А) Засоби аліфатичного ряду**

- В) Засоби ароматичного ряду
- С) Спирти
- Д) Галогеновмісні сполуки
- Е) Детергенти

49. У наркологічному відділенні психоневрологічної лікарні хворому призначено тетурам. Яке захворювання може бути показанням до його застосування?

*** А) Алкоголізм**

- В) Гостре отруєння спиртом етиловим
- С) Наркоманія
- Д) Гостре отруєння морфіном
- Е) Алкогольний психоз

50. Після повторного оперативного втручання з використанням того ж самого загального анестетика у хворого виникло гостре ураження печінки (гепатит). Який загальний анестетик найбільш вірогідно може викликати дану патологію?

*** А) Фторотан**

- В) Азоту закис
- С) Тіопентал натрію
- Д) Пропанідид
- Е) Ефір

51. Хворий із хронічним бронхітом тривалий час застосовує ефедрин. З чим пов'язаний механізм дії цього препарату?

*** А) Стимуляція вивільнення норадреналіну в синаптичну щілину**

- В) Блокування вивільнення норадреналіну в синаптичну щілину
- С) Стимуляція альфа -адренорецепторів
- Д) Блокування бета -адренорецепторів бронхів
- Е) Безпосередній вплив на м'язи бронхів

52. При комбінованому наркозі у хворого, якому проведено резекцію шлунку, як міорелаксant застосовано тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення його самостійного дихання?

*** А) Прозерин**

- В) Дитилін
- С) Цитітон
- Д) Етимізол
- Е) Бензогексоній

53. Сорокалітня жінка звирнулась до лікаря зі скаргою на болі в колінних суглобах. При огляді виявлено: припухлість, почервоніння, гіпертермію в ділянці цих суглобів. Лабораторне дослідження показало позитивні ревмопроби. Які препарати мають бути використані для лікування хворої?

*** А) Протизапальні засоби нестероїдної будови**

- В) Наркотичні анальгетики
- С) Антидепресанти
- Д) Антибіотики
- Е) Сульфаніламід

54. Дитина 10 років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулановою кислотою дало швидке одуження. Яка причина позитивної дії цього препарату?

*** А) Інактивація бета - лактамази**

- В) Блокада транслокази
- С) Гальмування аденозиндезамінази
- Д) Гальмування транспептидази
- Е) Активація фосфодіестерази

55. Анальгін ефективно знижує біль при пульпіті не тільки при резорбтивному, але і при місцевому застосуванні. Якою дією анальгіну пояснюється знеболення в останньому випадку?

*** А) Пригніченням ЦОГ-2**

- В) Місцевоанестезуючою активністю анальгіну
- С) Пригніченням утворення альгогенних кінінів
- Д) Відволікаючою дією
- Е) Пригніченням вивільнення речовини Р

56. На прийомі у стоматолога у хворого виник гострий біль за грудниною, іррадіюючий в ліву руку і плече, відчуття нестачі повітря, страх. Яка з запропонованих речовин найбільш адекватна в цьому випадку?

*** А) Нітрогліцерин**

- В) Нітросорбід
- С) Діазепам
- Д) Анальгін
- Е) Парацетамол

57. У хворого запалення слизової оболонки порожнини рота. Який з перерахованих засобів з місцевою антиексудативною дією слід застосувати в цьому випадку?

*** А) Галун**

- В) Вісмуту субнітрат
- С) Натрію гідрокарбонат
- Д) Дерматол
- Е) Ксероформ

58. У хворого після введення новокаїну для проведення провідникової анестезії виник анафілактичний шок. Яку з названих речовин слід ввести хворому в першу чергу?

*** А) Адреналін**

- В) Мезатон
- С) Діазолін
- Д) Димедрол
- Е) Дипразин

59. У хворого на прийомі у стоматолога виник пароксизм тахікардії. Який з названих засобів слід використати для його купіювання?

*** А) Верапаміл**

- В) Ізадрин
- С) Атропін
- Д) Дифенін
- Е) Нітрогліцерин

60. У хворого після екстракції зуба виникла кровотеча. Який із запропонованих засобів адекватний в цьому випадку?

*** А) Адреналін місцево**

- В) Тромбін ін'єкційно
- С) Фібриноген ін'єкційно
- Д) Вікасол орально
- Е) Неодикумарин орально

61. У хворого після екстракції зуба сталося падіння артеріального тиску, втрата свідомості. Констатований колаптоїдний стан. Який з запропонованих засобів слід застосувати?

*** А) Кордіамін**

- В) Строфантин
- С) Ізадрин
- Д) Сустан
- Е) Нітрогліцерин

62. У хворого з'явилося відчуття печіння в ротовій порожнині, білий пухнастий наліт на язичку. Діагностовано молочницю. Який із запропонованих засобів слід використати?

*** А) Ністатин**

- В) Амфотерицин
- С) Грізеофульвін
- Д) Тетрациклін
- Е) Гентаміцин

63. При гострому герпетичному стоматиті хворому призначили протівірусний препарат, який випускається в таблетках і у вигляді мазі для місцевого застосування. Визначте препарат.

*** А) Ацикловір**

- В) Ремантадин
- С) Мідантан
- Д) Ідоксуридин
- Е) Оксолін

64. Для лікування абсцедуючого парадонтозу був призначений ферментний препарат з групи протеолітичних ферментів. Який це препарат?

*** А) Трипсин кристалічний**

- В) Лідаза
- С) Стрептоліаза
- Д) Актилізе
- Е) Контрикал

65. В реанімаційне відділення доставлено хворого з ознаками гострого отруєння морфіном. Який засіб необхідно використати у даному випадку для промивання шлунка?

- * А) Калію перманганат**
- В) Натрію гідрокарбонат
- С) Фурацилін
- Д) Натрію хлорид
- Е) Борна кислота

66. Хворому, який лікувався тетрацикліном, лікар порадив не вживати молочних продуктів. Чому лікар дав таку рекомендацію?

- * А) Сповільнюється всмоктування антибіотика**
- В) Не засвоюються молочні продукти
- С) Збільшується ризик дизбактеріозу
- Д) Зростає токсичність антибіотика
- Е) Порушується процес перетравлення їжі

67. В лікарню доставлено важко хворого, який по дорозі втратив свідомість. Щоб привести його до тями, лікар дав йому понюхати розчин аміку. Який вид дії лежить в основі фармакологічного ефекту препарату?

- * А) Рефлекторна дія**
- В) Резорбтивна дія
- С) Місцева дія
- Д) Вибіркова дія
- Е) Етіотропна дія

68. У хворого, що звернувся в лікарню із скаргами на пронос, діагностували амебну дизентерію. В комплексне лікування був включений тетрациклін. Який вид дії призначеного препарата?

*** А) Етіотропна дія**

- В) Пряма дія
- С) Рефлекторна дія
- Д) Основна дія
- Е) Незворотна дія

69. М-холінолітики мають вельми широке застосування у сучасній практичній медицині. В якому з наступних випадках М-холінолітики є протипоказаними?

*** А) Атонія кишечника**

- В) Ниркова коліка
- С) Бронхіальна астма
- Д) Печінкова коліка
- Е) Виразка шлунка

70. У хворого, який звернувся до лікаря, діагностували анацидний гастрит. Для покращення роботи шлунка хворому призначили таблетки ацедин-пепсину. Який вид лікування був призначений хворому?

*** А) Замісна терапія**

- В) Симптоматична терапія
- С) Профілактичне застосування
- Д) Етіотропна терапія
- Е) Каузальна терапія

71. Перед проведенням інфільтраційної анестезії хворому проведено пробу на чутливість до новокаїну, яка виявилась позитивною. Який з перерахованих препаратів можна використати для проведення знечулення в даному випадку?

*** А) Лідокаїн**

- В) Новокаїнамід
- С) Тримекаїн
- Д) Анестезин
- Е) Дикаїн

72. При очікуванні екстракції зуба у пацієнта виникло сильне відчуття боязні. Який з лікарських препаратів йому слід прийняти для усунення цих відчуттів?

*** А) Діазепам**

- В) Аміназин
- С) Анальгін
- Д) Етімізол
- Е) Карбамазепін

73. Який із зазначених лікарських засобів слід додати до розчину лідокаїну для збільшення тривалості його дії.

*** А) Адреналін**

- В) Кофеїн
- С) Анальгін
- Д) Атропін
- Е) Анаприлін

74. При огляді школярів першого класу стоматолог виявив, що у одної дитини зуби жовто-коричньового кольору, два з них надщерблені. До цього школяра лікували від пневмонії якимись таблетками. Який препарат міг так негативно вплинути на зуби?

*** А) Доксидиклін**

- В) Оксацилін
- С) Еритроміцин
- Д) Ампіцилін
- Е) Бісептол

75. У хворого системне запальне враження сполучної тканини. Який із запропонованих протизапальних засобів призведе до зменшення усіх фаз запалення?

*** А) Преднізолон**

- В) Контрикал
- С) Бутадіон
- Д) Індометацин
- Е) Диклофенак-натрію

76. У больного снижение минутного выброса сердца, обусловленное уменьшением инотропной функции миокарда. Какое из перечисленных веществ повышает его в результате прямого действия на миокард?

*** А) Строфантин**

- В) Дроперидол
- С) Фуросемид
- Д) Эналаприл
- Е) Анаприлин

77. Стоматологічному хворому для пригнічення страху перед болем призначили психоседативний засіб. Який препарат найбільш ефективний в цьому випадку?

*** А) Діазепам**

- В) Аміназин.
- С) Літію карбонат.
- Д) Настоянка валеріани.
- Е) Натрію бромід.

78. Хвора 50 років госпіталізована в клініку з нападом стенокардії у поєднанні з бронхіальною астмою. Після надання допомоги було призначено комплексне лікування, що призвело до виникнення бронхоспазму. Який препарат не слід давати в даному випадку?

*** А) Анаприлін.**

- В) Еуфілін.
- С) Карбокромен.
- Д) Платифілін.
- Е) Ізадрин.

79. Хворому 50 років, з ішемічною хворобою серця лікар призначив лікарський засіб, який має антиагрегантну дію. Хворий почав приймати засіб у дозах більших, ніж йому були призначені. У нього розвилися нудота, блювання, біль натщесерце у животі. Який засіб було призначено хворому?

*** А) Ацетилсаліцилова кислота**

- В) Пармідин
- С) Тиклід
- Д) Діпірідамол
- Е) Пентоксифілін

80. Хворому 60 років було встановлено діагноз цироз печінки, причиною якого було токсичне ураження алкоголем. Який препарат краще за все призначити хворому?

*** А) Ессенціале**

- В) Вітамін Е
- С) Аскорбінову кислоту
- Д) Рибоксін
- Е) Кислота глютамінову

81. Клофелін знижує артеріальний тиск, зменшує периферичний тонус судин, викликає брадикардію, пригнічує ЦНС. Часто для лікування гіпертензивної хвороби застосовується в комбінаціях з іншими препаратами. Вкажіть, з яким препаратом недоцільно його поєднувати

*** А) Сібазон**

- В) Дихлотіазид
- С) Апруесин
- Д) Октадин
- Е) Циклометіазид

82. Назвіть групу препаратів, що зменшують потребу міокарду в кисні, зменшують силу серцевих скорочень та гальмують ліполіз:

*** А) Бета-адреноблокатори**

- В) Альфа-адреноблокатори
- С) Симпатолітики
- Д) Селективні бета-адреноміметики
- Е) Альфа-адреноміметики

83. Після прийому нітрогліцерину максимальна концентрація його в крові досягається через:

*** А) 4-5 хвилин**

В) 1 хвилину

С) 15 хвилин

Д) 30 хвилин

Е) 1 годину

84. У хворого після екстракції зуба розвинулася гостра серцева недостатність. Який препарат доцільно призначити?

*** А) Строфантин**

В) Дигітоксин

С) Кордігіт

Д) Настойку конвалії

Е) Адонізид

85. У пацієнта під час проведення провідникової анестезії лідокаїном розвинувся анафілактичний шок. Який із перерахованих препаратів є препаратом вибору:

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

В) Норадреналіну гідротартрат

С) Кордіамін

Д) Дімедрол

Е) Атропіну сульфат

86. Для фармакодинаміки якого лікарського засобу характерно підвищення настрою та психомоторної активності, зменшення відчуття втоми, збільшення фізичної та розумової активності, тимчасове зниження потреби у сні ?

*** А) (Кофеїн**

- В) Дроперидол
- С) Аміназин
- Д) Барбітал
- Е) Вольтарен

87. Після екстракції зубу у хворого виникла кровотеча. Який препарат з групи антисептиків доцільно застосувати у цьому випадку?

*** А) Розчин пероксиду водню**

- В) Розчин оксамитового зеленого
- С) Розчин адреналіну гідро хлориду
- Д) Розчин етилового спирту
- Е) Йодинол

88. Хворому на тромбофлебіт було призначено антикоагулянт непрямой дії синкумар. Вкажіть, через який проміжок часу слід чекати розвитку максимального антикоагулянтного ефекту.

*** А) 24-72 години**

- В) 12-24 години
- С) 6-12 годин
- Д) 3-6 годин
- Е) 5-10 хвилин

89. Дитина 4-х років госпіталізована в ортопедичне відділення з переломом гомілки з зміщенням. Перед репозицією відламків необхідна аналгезія. Який препарат слід вибрати?

*** А) Промедол**

- В) Анальгін
- С) Морфіну гідрохлорид
- Д) Панадол
- Е) -

90. Чоловік під час епідемії грипу звернувся до лікаря з приводу профілактики та раннього лікування цього захворювання. Який препарат можна призначити?

*** А) Ітерферон**

- В) Метисазон
- С) Адамантан
- Д) Ацикловір
- Е) Бонафтон

91. Хворий госпіталізований до лікарні після бджолиних укусів з вираженим набряком Квінке. Який протигістамінний препарат, що не виявляє одночасно седативний ефект, необхідно призначити хворому?

*** А) Діазолін**

- В) Супрастин.
- С) Фенкарол.
- Д) Тавегіл.
- Е) Димедрол.

92. У хворого анафілактичний шок. Назвіть препарат вибору.

*** А) Адреналін**

- В) Мезатон
- С) Ефедрин
- Д) Фенотерол
- Е) Норадреналін

93. У дитини 9-ти років виявлено порушення навчання, зниження інтелектуального розвитку. Призначення якої групи психотропних засобів є виправданим в даному випадку?

*** А) Ноотропіл**

- В) Антидепресантів
- С) Транквілізаторів
- Д) Нейролептиків
- Е) Адаптогенів

94. Хворому 30 років з діагнозом гострий остеомієліт призначили антибіотик який добре проникає в кісткову тканину. На протязі трьох тижнів застосування даного засобу стан хворого покращився. Який препарат був застосований?

*** А) Лінкоміцин**

- В) Біцилін-3
- С) Бензилпеніцилін
- Д) Поліміксин-М
- Е) Ампіцилін

95. Хворій на гіпертензивну хворобу у комплексній терапії призначено гідрохлортіазид. Який механізм дії препарату сприяє зниженню артеріального тиску?

*** А) Збільшення виділення іонів натрію та води**

- В) Збільшення утворення ангіотензину II
- С) Блокада кальцієвих каналів
- Д) Зменшення виділення іонів натрію та води
- Е) Блокада ферменту карбоангідрази

96. Хворому на тиреотоксикоз, було призначено препарат, який пригнічує ферментні системи, що приймають участь в синтезі гормонів щитовидної залози. Вкажіть цей препарат:

*** А) Мерказоліл**

- В) Дийодтирозин
- С) Калію йодид
- Д) Тиреоїдин
- Е) Радіоактивний йод

97. У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з'явились герпетичні висипання. Для лікування була застосована мазь. Який противірусний засіб містить ця мазь?

*** А) Ацикловір**

- В) Азидотимідин
- С) Дексаметазон
- Д) Індометацин
- Е) Інтерферон

98. Для лікування гнійного синуситу хворому було призначено пероральне застосування тетрацикліну. Який протигрибковий засіб необхідно профілактично приймати хворому для запобігання розвитку кандидозу?

*** А) Ністатин**

- В) Гризеофульвін
- С) Левамизол
- Д) Фуразолідон
- Е) Ципрофлоксацин

99. У хворого гнійна рана. Застосували розчин, який проявив антисептичну дію та сприяв механічному очищенню рани. Який саме розчин був використаний?

*** А) Перекис водню**

- В) Перманганат калію
- С) Розчин йоду спиртовий
- Д) Етакрідина лактат
- Е) Діамантовий зелений.

100. У хворого гостра серцево-легенева недостатність, що супроводжується набряком легенів. Який препарат з групи діуретиків необхідно призначити?

*** А) Фуросемід**

- В) Спіронолактон
- С) Діхлотіазид
- Д) Діакарб
- Е) Триамтерен

101. Хворому встановлено діагноз - активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів найбільш доцільно призначити в першу чергу?

*** А) Ізоніазид**

- В) Сульфален
- С) Циклосерін
- Д) Етіонамід
- Е) Етоксид

102. Хворому на туберкульоз в комплексній терапії призначено препарат - похідне гідразиду ізонікотинової кислоти. Визначити цей препарат?

*** А) Ізоніазид**

- В) Стрептоміцину сульфат
- С) Цефалоридін
- Д) Рифампіцин
- Е) Канаміцин

103. Хворій з приводу мегалобластичної анемії, яка виникла після гастректомії, отримав тривалий курс лікування вітаміном В12. Препарат вводили внутрішньом'язово. В чому перевага парентерального шляху введення вітаміну В12 від ентерального?

*** А) Ефективний при недостатності гастромукопротеїну**

- В) Швидко всмоктується препарат
- С) Тривалий час циркулює у крові
- Д) Не руйнується у печінці
- Е) Швидко виводиться

104. Відомо, що в осіб з генетично обумовленою недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази еритроцитів у відповідь на призначення деяких протималарійних препаратів може розвиватися гемоліз еритроцитів. Як називається цей прояв атипових реакцій на лікарські засоби?

*** А) Ідіосинкразія**

- В) Алергія
- С) Сенсibiliзація
- Д) Тахіфілаксія
- Е) Толерантність

105. У хворого на цукровий діабет після чергової ін'єкції інсуліну стан погіршився: появився неспокій, холодний піт, тремор кінцівок, загальна слабкість, запаморочення. За допомогою якого препарату знімаються ці симптоми?

*** А) Адреналін**

- В) Бутамід
- С) Кофеїн
- Д) Норадреналін
- Е) Глібутид

106. Хворий на гіпертонічну хворобу приймає еналаприл. Який механізм дії цього гіпотензивного засобу?

*** А) Інгібує ангіотензин-перетворюючий фермент**

- В) Антагоніст ангіотензинових рецепторів
- С) Інгібує фосфодієстеразу
- Д) Інгібує циклооксигеназу
- Е) Блокує Ca^{++} -канали

107. Хвора скаржиться на біль у голені, яка підсилюється при ходьбі.

Об'єктивно відмічається набряк та почервоніння по ходу вени, тому лікар призначив антикоагулянт прямої дії для місцевого вживання. Який препарат можна використати з цією метою?

*** А) Мазь гепаринова**

В) Мазь саліцилова

С) Мазь троксевазінова

Д) Мазь бутадіонова

Е) Тромбін

108. У хворого після оперативного втручання розвинувся парез кишечника. Який засіб із групи антихолінестеразних слід йому призначити?

*** А) Прозерин**

В) Карбахолін

С) Ацеклідін

Д) Пілокарпін

Е) Ацетилхолін

109. У хворого хронічним алкоголізмом відзначаються симптоми поліневриту і серцевої недостатності. Який вітамінний препарат слід призначити хворому?

*** А) Тіамін**

В) Ергокальциферол

С) Ретинол

Д) Рутин

Е) Філохінон

110. У дитини 5-ти років відзначається змішана інвазія аскаридами та гостриками. Який протиглисний препарат слід призначити для однократного прийому?

*** А) Мебендазол**

- В) Сем'я гарбуза
- С) Аміноакрихін
- Д) Аміноакрихін
- Е) Піперазину адипінат

111. У хворого, який тривалий час приймав тетрациклін, виник кандидоз слизових оболонок. Який лікарський препарат слід призначити для його лікування?

*** А) Ітраконазол**

- В) Гризеофульвін
- С) Нітрофунгін
- Д) Амфотеріцин
- Е) Фурадонін

112. Хворий на ішемічну хворобу серця приймав протягом дня багатократно препарат, який викликав отруєння. При обстеженні хворого виявлено ціаноз шкіри та слизових оболонок, різке зниження артеріального тиску, тахікардію, пригнічення дихання. У крові підвищений вміст метгемоглобіну. Препарат якої групи приймав хворий?

*** А) Органічні нітрати**

- В) альфа-адреноблокатори
- С) Блокатори кальцієвих каналів
- Д) Препарати аденозинового ряду
- Е) Препарати аденозинового ряду

113. Чоловік віком 50 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль за грудиною, яка виникає у нього на вулиці, по дорозі на роботу, при фізичному напруженні. Хворіє протягом року. Спочатку біль зникав після прийому валідолу, але в останні дні його прийом неефективний. Який препарат слід призначити

*** А) Нітрогліцерин**

- В) Калію хлорид
- С) Октадин
- Д) Клофелін
- Е) Салбутамол

114. При огляді школярів першого класу стоматолог виявив, що у одної дитини зуби жовто-коричньового кольору, два з них надщерблені. До цього школяра лікували від пневмонії якимись таблетками. Який препарат міг так негативно вплинути на зуби?

*** А) Доксидиклін**

- В) Оксацилін
- С) Еритроміцин
- Д) Ампіцилін
- Е) Бісептол

115. Препарат якої групи потрібно призначити хворому для лікування атріовентрикулярної блокади?

*** А) М-холіноблокатори**

- В) Місцеві анестетики
- С) Антагоністи кальцію
- Д) Бета-адреноблокатори
- Е) Препарати калію

116. У больного медленно заживающий перелом кости. Какое средство можно использовать для ускорения образования ее соединительнотканной матрицы?

*** А) Метилурацил**

- В) Преднизолон
- С) Циклофосфан
- Д) Метотрексат
- Е) Циклоспорин

117. Вагітна жінка страждає від печії. Який засіб є оптимальним в даному випадку?

*** А) Альмагель**

- В) Натрію гідрокарбонат
- С) Вісмуту субнітрат
- Д) Ранітидин
- Е) Омепразол

118. Хворого на ішемічну хворобу серця спіткав гострий напад стенокардії. Який з препаратів йому слід призначити?

*** А) Нітрогліцерин.**

- В) Нітронг.
- С) Валідол.
- Д) Тринітролонг.
- Е) Нітромак.

119. Хворому 50 років, з ішемічною хворобою серця лікар призначив лікарський засіб, який має антиагрегантну дію. Хворий почав приймати засіб у дозах більших, ніж було призначено, внаслідок чого виникли нудота, блювання, біль натщесерце у животі. Який засіб було призначено хворому?

*** А) Ацетилсаліцилова кислота**

- В) Пармідин
- С) Тиклід
- Д) Діпіридамол
- Е) Пентоксифілін

120. Хворому при вилученні інородного тіла з ока необхідно провести місцеву анестезію лідокаїном. Який механізм дії цього препарату?

*** А) Порушує проходження Na^+ крізь мембрану**

- В) Блокує проходження оксиду азоту.
- С) Пригнічує активність цитохромоксидаз
- Д) Знижує активність дегідрогеназ.
- Е) Знижує вихід нейромедіаторів

121. Під час оперативного втручання анестезіолог для керованої гіпотонії застосував гангліоблокуючий засіб. Який препарат було призначено хворому в даному випадку?

*** А) Гігроній**

- В) Бензогексоній
- С) Пірілен
- Д) Пентамін
- Е) Пахікарпін

122. Чоловік 30 років прийняв високу дозу дигітоксину. В комплекс лікування отруєння входить підсилення виділення яду з ШКТ за допомогою послаблюючих засобів. Оберіть препарат для отримання сильного одноразового послаблюючого ефекту.

*** А) Магнію сульфат.**

- В) Фенолфталеїн.
- С) Касторове масло.
- Д) Кора крушини.
- Е) Листя Сени.

123. При проведенні планової операції в ділянці верхньої щелепи хірург вирішив використовувати атаралгезію. Які лікарські засоби застосовують для цієї маніпуляції?

*** А) Транквілізатори**

- В) Засоби для наркозу
- С) Наркотичні анальгетики
- Д) Ненаркотичні анальгетики
- Е) Седативні засоби

124. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на стоматит, який він лікував антисептичними засобами. Лікар прийшов до висновку, що ураження слизової оболонки мають герпетичну природу. Який препарат необхідно призначити хворому?

*** А) Ацикловір**

- В) Ремантадин
- С) Оксолін
- Д) Бісептол
- Е) Клотримазол

125. Для полоскання ротової порожнини хворому призначили лікарський засіб з групи нітрофуранів у таблетках для зовнішнього застосування. Який препарат призначений хворому?

*** А) Фурацилін**

- В) Фурапласт
- С) Фурадонін
- Д) Фурагін
- Е) Фуразолідон

126. Після екстракції зуба у хворого розвинулась гостра лівошлуночкова недостатність. Який з нищезазначених препаратів доцільно ввести внутрішньовенно хворому?

*** А) Корглікон**

- В) Бемегрид
- С) Етимізол
- Д) Вінпоцетин
- Е) Пірацетам

127. Хворому з невралгією трійчастого нерва був введений ненаркотичний анальгетик, який має швидку але короткочасну дію, випускається в таблетках і ампулах, може викликати алергічні реакції негайного типу. Вкажіть який препарат був введений хворому

*** А) Анальгін**

- В) Ібупрофен
- С) Кислота мефенамова
- Д) Піроксикам
- Е) Індометацин

128. У хворого, під час видалення зубу стався напад судом. Який препарат доцільно йому призначити?

*** А) Сібазон**

- В) Дімедрол
- С) Корвалол
- Д) Настоянка валеріани
- Е) Галоперідол

129. Хворому для поверхневої анестезії слизової оболонки порожнини рота при лікуванні стоматиту призначили препарат з групи місцевоанестезуючих засобів, пагано розчинний у воді, який застосовують у вигляді розчинів у олії або гліцерині, мазей, паст, присипок, усередину в порошок, ректально в супозиторіях. Назвіть препарат.

*** А) Анестезин**

- В) Новокаїн
- С) Дикаїн
- Д) Танін
- Е) Лідокаїн

130. До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість ротової порожнини. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: ксеростомія. Який з лікарських засобів доцільно застосовувати.

*** А) Пілокарпіну гідрохлорид**

- В) Атропіну сульфат
- С) Метацин
- Д) Іпратропію бромід
- Е) Галазолін

131. Для подовження і підсилення місцевоанестезуючої активності новокаїну, а також для зменшення вірогідності кровотечі під час проведення видалення зубу, лікар-стоматолог застосував препарат з групи адреноміметиків. Назвіть препарат.

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Беротек
- С) Ізадрин
- Д) Дофамін
- Е) Сальбутамол

132. У хворого під час відвідування стоматолога трапився напад бронхіальної астми. Що необхідно призначити хворому для зняття бронхоспазму?

*** А) Сальбутамол**

- В) Анаприлін
- С) Метацин
- Д) Дроперидол
- Е) Бензогексоній

133. У хворого після проведених обстежень встановлено діагноз гострий остеомієліт верхньої щелепи. Який антибіотик необхідно призначити хворому?

*** А) Лінкоміцину гідрохлорид**

- В) Ампіцилін
- С) Доксидикліну гідрохлорид
- Д) Левоміцетин
- Е) Гентаміцин

134. Для лікування ксеростомії стоматолог призначив препарат, що одночасно викликав звуження зіниці та погіршення зору у пацієнта. Назвіть препарат:

*** А) Ацеклідін**

В) Дитилін

С) Пірілен

Д) Скополамін

Е) Атропін

135. Хворий при проходженні курсу лікування нітрофуранами вжив невелику кількість алкоголю, внаслідок чого розвинулось тяжке отруєння. Поясніть причину отруєння:

*** А) Накопичення ацетальдегіду**

В) Алергічна реакція

С) Невралогічні розлади

Д) Серцево-судинна недостатність

Е) Порушення функції нирок

136. Для купіювання больового синдрому пацієнту з інфарктом міокарда лікар призначив аналгетичний засіб. Стан хворого поліпшився, але згодом, у зв'язку з передозуванням, з'явилась сонливість, міоз, лікар відзначив пригнічення дихання. Який лікарський засіб було призначено?

*** А) Морфін**

В) Баралгін

С) Седалгін

Д) Ібупрофен

Е) Парацетамол

137. На прийомі у стоматолога хворий відчув біль за грудиною, для лікування якої прийняв таблетку нітрогліцерину під язик. Який механізм дії цього препарату?

*** А) Накопичує цГМФ**

- В) Блокує ЦОГ
- С) Блокує аденозіндезаміназу
- Д) Блокує АПФ
- Е) Блокує аденозинові рецептори

138. Хворий, який приймав засіб для зниження АТ, звернувся до стоматолога зі скаргою на підвищену сухість у роті, який з гіпотензивних засобів має таку побічну дію?

*** А) Клофелін**

- В) Діакордін
- С) Верапаміл
- Д) Анаприлін
- Е) Аделюран

139. Хворому під час пломбування зуба миш'яковиста паста випадково попала на слизову щоки. Який антидот слід ввести цьому хворому для попередження можливої загальнорезорбтивної токсичної дії миш'яку?

*** А) Унітіол**

- В) Активоване вугілля
- С) Натрію тіосульфат
- Д) Тетацин-кальцію
- Е) ЕДТА

140. При очікуванні екстракції зуба у пацієнта виникло сильне відчуття боязні. Який з лікарських препаратів йому слід прийняти для усунення цих відчуттів?

*** А) Діазепам**

- В) Аміназин
- С) Анальгин
- Д) Етімізол
- Е) Карбамазепін

141. На прийомі у стоматолога в хворого розвинувся колапс. Який засіб можна використати для виведення його із колапсу?

*** А) Мезатон**

- В) Строфантин
- С) Анаприлін
- Д) Нітрогліцерин
- Е) Седуксен

142. Хворому 60 років було встановлено діагноз цироз печінки, причиною якого було токсичне ураження алкоголем. Який препарат краще за все призначити хворому?

*** А) Ессенціале**

- В) Вітамін Е
- С) Аскорбінова кислота
- Д) Рибоксін
- Е) Кислота глютамінова

143. Хворому на герпетичний стоматит лікар призначив місцево ацикловір. Який механізм дії цього препарату?

*** А) Пригнічує синтез нуклеїнових кислот вірусів**

- В) Пригнічує проникнення вірусів у клітину
- С) Пригнічує дозрівання вірусів
- Д) Підвищує резистентність клітин макроорганізму до вірусів
- Е) Пригнічує складання віріонів

144. У хворого після перенесення психічної травми, відзначається підвищена збудливість, дратливість, безсоння, тривога. Який лікарський засіб доцільно призначити?

*** А) (Феназепам**

- В) Пірацетам
- С) Кофеїн
- Д) Бемегрид
- Е) Імізин

145. Хворий скаржиться на болючі тріщини у кутках рота. Який препарат з групи сульфаніламідів можна рекомендувати для місцевого лікування ангулярного стоматиту?

*** А) Лінімент Стрептоциду**

- В) Лінімент Синтоміцину
- С) Мазь преднізолонова
- Д) Мазь бутадіонова
- Е) Мазь тетрацикліну

146. Хворому на гостру серцеву недостатність було введено серцевий глікозид швидкої дії. Який з перелічених засобів було введено?

*** А) Строфантин**

- В) Адонізид
- С) Дигітоксин
- Д) Целанід
- Е) Мілринон

147. Який препарат, що має протиглистну дію, застосовують для стимуляції імунної системи організму при хронічному генералізованому парадонтиті?

*** А) Левамізол**

- В) Піперидину адипінат
- С) Насіння гарбуза
- Д) Пірантел
- Е) Хлоксил

148. У поліклініку звернувся хворий зі скаргами на болі за грудиною, задишку, серцебиття. Після обстеження лікар діагностував у хворого ІБС і призначив верапаміл. Який механізм дії даного препарату?

*** А) Блокує кальцієві канали**

- В) Блокує альфа адренорецептори
- С) Блокує бета адренорецептори
- Д) Блокує калієві канали
- Е) Блокує натрієві канали

149. Хворому на гостру серцеву недостатність з рефрактерністю до серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії у цього препарату?

*** А) Стимулювання бета1-адренорецепторів**

- В) Комплексоутворення з фосфоліпідами мембрани
- С) Блокада K^+ , Na^+ - АТФ-ази
- Д) Пригнічення активності фосфодіестерази
- Е) Підвищення тонуусу *n.vagus*

150. У хворого анафілактичний шок. Від якого з перерахованих адреноміметиків можна чекати найбільший терапевтичний ефект?

*** А) Адреналін**

- В) Мезатон
- С) Ефедрин
- Д) Норадреналін
- Е) Алупент

151. Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, відчув зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, меншій від середньої терапевтичної. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?

*** А) Потенціювання**

- В) Сумація
- С) Кумуляція
- Д) Лікарська залежність
- Е) Толерантність

152. Однією з вимог до проти склеротичних засобів, які застосовуються на протязі всього життя хворою, є низька токсичність та безпечність в процесі лікування. Яка з перелічених груп гіпохолестеричних засобів має найменшу кількість побічних ефектів?

*** А) Інгібітори всмоктування ХС в кишечнику**

- В) Інгібітори синтезу ХС
- С) Знижуючи рівень загальних ліпідів крові
- Д) Фібрати
- Е) Ангіопротектори прямої дії

153. Студент 3 курсу при проходженні медичної практики повинен був поставити гірчичники на спину хворого. Для цього він змочив гірчичники водою з температурою більше 60°C і поставив їх на спину хворому. Через півгодини студент виявив, що шкіра хворого на місці прикладення гірчичників не почервоніла. З чим пов'язана відсутність ефекту гірчичників?

*** А) З інактивацією мірозину**

- В) З інактивацією холінестерази
- С) З активацією мірозину
- Д) З інактивацією моноамінооксидази
- Е) З активацією метилтрансферази

154. Молода дівчина 17 років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?

*** А) Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу**

- В) Для стимуляції дихання
- С) Для нормалізації АТ
- Д) Для інактивації фенобарбіталу
- Е) Для пробуджуючого ефекту

155. В комплексному лікуванні гінгівіту хворому призначили препарат, який стимулює лейкопоез, прискорює заживлення ран, підсилює ріст та розмноження клітин [процеси проліферації], виявляє протизапальну дію. Застосовується при лейкопеніях різного генезу, в стоматологічній практиці при запальних захворюваннях слизової оболонки ротової порожнини. Визначте препарат.

*** А) Пентоксил**

- В) Меркаптопурин
- С) Метотрексат
- Д) Цианокобаламін
- Е) Коамід

156. У хворого артеріальна гіпертензія. Який препарат з групи блокаторів кальцієвих каналів доцільно призначити?

*** А) Амлодипін**

- В) Октадин
- С) Піроксан
- Д) Атенолол
- Е) Резерпін

157. Дитині з ознаками рахіту педіатр і стоматолог призначили жиророзчинний вітамінний препарат, який впливає на обмін фосфору і кальцію в організмі. Сприяє відкладенню кальцію в кістковій тканині та дентині. При недостатньому вмісті в організмі порушується процес окостеніння, структура зубів та їх порядок. Визначте препарат.

*** А) Ергокальциферол**

- В) Ретинолу ацетат
- С) Токоферолу ацетат
- Д) Вікасол
- Е) Тиреоїдин

158. При сильному зубному болю хворому рекомендовано прийняти ненаркотичний анальгетик, похідне аніліну, у якого більш виражені анальгезуюча та жарознижувальна дія, та слабкий протизапальний ефект. Визначте препарат.

*** А) Парацетамол**

- В) Кислота ацетилсаліцилова
- С) Анальгін
- Д) Бутадіон
- Е) Ібупрофен

159. Для лікування періоститу хворому призначили антибіотик, до якого чутливі грампозитивні мікроорганізми, грампозитивні коки, споротворні бактерії, клостридії, анаероби. Препарат добре проникає в кісткову тканину. Визначте препарат.

*** А) Лінкоміцин**

- В) Еритроміцин
- С) Левоміцетин
- Д) Цефазолін
- Е) Оксацилін-натрій

160. У хворого що проходить в стаціонарі курс лікування з приводу виразкової хвороби шлунку супутнім захворювання є глаукома. Препарати якої групи в зв'язку з цим не рекомендується включати в противиразкову терапію?

*** А) Холінолітики**

- В) Антациди
- С) Блокатори гістамінових рецепторів
- Д) Спазмолітики міотропної дії
- Е) -

161. Хворому з гіпертензивною кризою ввели внутрішньовенно клофелін. Який механізм лежить в основі антигіпертензивної дії клофеліну?

*** А) Стимуляція центральних постсинаптичних альфа2-адренорецепторів**

В) Блокада периферичних альфа1-адренорецепторів

С) Блокада бета-адренорецепторів

Д) Блокада Н-холінорецепторів симпатичних гангліїв

Е) Пряма міотропна дія на судини

162. Хвора 56 років, що має гіпертонічну хворобу, звернулась до лікаря з приводу погіршення загального стану. Їй призначено метилдопу. Вкажіть механізм дії цього препарату.

*** А) Порушення синтезу норадреналіну**

В) Збільшення синтезу ацетилхоліну

С) Блокада бета-адренорецепторів

Д) Блокада альфа-адренорецепторів

Е) Пригнічення ангіотензин-перетворюючого фактора

163. Який препарат слід призначити для лікування хворій 57 років з хронічною серцевою недостатністю, що супроводжується тахіаритмією та набряками?

*** А) Дигоксин**

В) Анаприлін

С) Аміадарон

Д) Метопролол

Е) Спіронолактон

164. Хворій на гострий бронхіт, яка скаржиться на затруднення дихання та кашель з густим, в'язким харкотинням призначено муколітик стимулятор синтезу сурфактанту. Який муколітик призначено?

*** А) Амброксол**

- В) Натрію гідрокарбонат
- С) Морфіну гідрохлорид
- Д) Глауцин
- Е) Теофілін

165. Хворий 40 років знаходиться в урологічному відділенні з приводу загострення хронічного циститу. Який з антисептичних засобів можна застосувати для промивання сечового міхура?

*** А) Фурацилін**

- В) Брильянтовий зелений
- С) Перекис водню
- Д) Ко-тримоксазол
- Е) Розчин йоду спиртовий

166. Хвора звернулась до лікаря з скаргами на болі та обмеження рухів у колінних суглобах. Який з нестероїдних протизапальних засобів краще призначити, враховуючи наявність в анамнезі хронічного гастродуоденіту?

*** А) Целекоксиб**

- В) Диклофенак-натрій
- С) Промедол
- Д) Кислота ацетилсаліцилова
- Е) Парацетамол

167. До реанімаційного відділення госпіталізовано хворого з клінікою отруєння нейротропною речовиною. До комплексу лікування включено дихальний аналептик з ноотропною дією. Який препарат призначено?

*** А) Етимізол**

- В) Амітриптилін
- С) Теофілін
- Д) Камфору
- Е) Сульфокамфокаїн

168. У жінці 23-х років після повторного викидня діагностували токсоплазмоз. Який з перерахованих препаратів слід застосувати для лікування токсоплазмозу?

*** А) Ко-тримоксазол**

- В) Ітраконазол
- С) Мебендазол
- Д) Азидотимідин
- Е) Ацикловір

169. Хворому 30 років для лікування пневмонії лікар призначив антибіотик на 3 дні з групи азалідів, що має бактерицидну дію, тривалий ефект, здатність зв'язуватись з фагоцитами і накопичуватись в вогнищах інфекції. Який препарат було призначено хворому?

*** А) Азитроміцин**

- В) Еритроміцин
- С) Бензилпеніциліну натрієва сіль
- Д) Ізоніазид
- Е) Ципрофлоксацин

170. У хворого часті напади стенокардії. Два роки тому він переніс інфаркт міокарду. Вкажіть групу лікарських засобів, препарати якої доцільно призначити для профілактики розвитку повторного інфаркту міокарду

*** А) Антиагреганти**

- В) Антикоагулянти непрямої дії
- С) Фібринолітики
- Д) Коагулянти
- Е) Антагоністи гепарину

171. У больного 65 лет синдром паркинсонизма. Какое средство лечения показано, если у него имеются затруднения мочеиспускания?

*** А) Леводопа**

- В) Циклодол
- С) Скополамин
- Д) Амизил
- Е) -

172. Больному с токсическим параличом дыхательного центра для его стимуляции вводили несколько раз кордиамин. Какой побочный эффект может возникнуть при этом?

*** А) Клонические судороги**

- В) Тонические судороги
- С) Аритмия
- Д) Коллапс
- Е) Бронхоспазм

173. Пацієнт був доставлений до лікарні з симптомами запаморочення, сухрсті в роті, зіниці сильно розширені, порушення акомодатції, тахікардія, утруднення сечовипускання, атонія кишечника. Передозування яким препаратом могло викликати дані симптоми?

*** А) Атропіну сульфат**

- В) Фуросемід
- С) Клофелін
- Д) Каптоприл
- Е) Празозин

174. Хворій 33 років з метою сезонної профілактики загострення ревматизму один раз в чотири тижні вводили препарат з групи біосинтетичних пеніцилінів. Вкажіть цей препарат.

*** А) Біцилін-5**

- В) Оксацилін
- С) Ампіцилін
- Д) Бензилпеніциліну натрієва сіль
- Е) Бензилпеніциліну калієва сіль

175. Хворий скаржиться на нудоту, втрату апетиту, болі у животі. Після проведеного лабораторного дослідження фекалій на наявність яєць глистів був діагностований аскаридоз. Для лікування було призначено одноразовий прийом протигельмінтного засобу, який має імуномодуючі властивості. Вкажіть цей препарат.

*** А) Левамизол**

- В) Піперазин
- С) Мебендазол
- Д) Пірантел
- Е) Нафтамон

176. У хворого після травми періодично відмічаються генералізовані тоніко-клонічні судоми із втратою свідомості, які потім змінюються загальним пригніченням центральної нервової системи. Який препарат слід призначити хворому?

*** А) Фенобарбітал**

В) Циклодол

С) Мідантан

Д) Тетурам

Е) Леводопу

177. Жінка після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння (гіпосомнії)?

*** А) Нітразепам**

В) Фенобарбітал

С) Хлоралгідрат

Д) Аміназин

Е) Барбітал

178. У хворого 55 років на 4-й день лікування диклофенаком натрію виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунка. З чим пов'язана ульцерогенна дія препарату?

*** А) Зменшення утворення простагландіну E2**

В) Зменшення утворення лейкотриєнів

С) Зменшення утворення простагландіну E1

Д) Зменшення утворення циклічних ендоперекисів

Е) Зменшення утворення тромбоксану

179. У хворого на гострий панкреатит у сечі виразно підвищено вміст діастази. Який засіб з групи інгібіторів протеолізу необхідно включити до складу комплексної терапії цього хворого?

*** А) Контрикал**

- В) Фестал
- С) Панкреатин
- Д) Дигестал
- Е) Мезім форте

180. Під час приступу стенокардії хворий прийняв таблетку валідолу під язик. Який з перелічених механізмів антиангінальної дії має валідол?

*** А) Подразнення холодкових рецепторів слизової оболонки порожнини рота, що викликає рефлекторну коронародилатацію**

- В) Пряма стимуляція судинорухового центру
- С) Блокування фосфодіестерази
- Д) Зниження потреби міокарда до кисню
- Е) Зниження системного артеріального тиску та загального периферичного опіру судин

181. Чоловіку 50 років для лікування гіпертонічної хвороби лікар призначив лозартан. Який механізм гіпотензивної дії цього засобу?

*** А) Блокада рецепторів ангіотензину II**

- В) Блокада Ca^{2+} каналів
- С) Пригнічення ФДЄ
- Д) Стимулювання альфа2-аденорецепторів
- Е) Пригнічення АПФ

182. В реанімаційне відділення поступив пацієнт 18 років, без свідомості з ознаками сухості шкіри та слизових, розширеними зіницями. З анамнезу відомо, що він отруївся ягодами беладонни, які містять М-холіноблокатор атропін. Який препарат слід призначити хворому в цьому стані?

*** А) Прозерин**

- В) Адреналін
- С) Пілокарпін
- Д) Анаприлін
- Е) Платифілін

183. У хворого на гіпертонічну хворобу після прийому антиангінального препарату виник бронхоспазм. Який препарат міг його викликати?

*** А) Пропранолол**

- В) Нітрогліцерин
- С) Корглікон
- Д) Аміодарон
- Е) Ізосорбіту мононітрат

184. В ендокринологічне відділення поступив хворий в стані сопору, спостерігалась підвищена пітливість та запах ацетону з рота. Концентрація цукру в крові становить 22,43 ммоль/л. Була діагностована діабетична кома. Який з цукровознижуючих препаратів необхідно призначити даному хворому?

*** А) Інсулін короткої дії**

- В) Інсулін середньої тривалості дії
- С) Інсулін тривалої дії
- Д) Препарат з групи бігуанідів
- Е) Препарат з групи похідних сульфонілсечовини

185. Який з перерахованих препаратів застосовують у стоматології для збільшення тривалості дії місцевого анестетика?

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Промедол
- С) Атропіну сульфат
- Д) Лідокаїн
- Е) Азитроміцин

186. У хворого 64 років після екстракції зуба виникла гостра серцева недостатність. Який препарат з кардіотонічною дією необхідно призначити хворому?

*** А) Корглікон**

- В) Дібазол
- С) Анаприлін
- Д) Нітрогліцерин
- Е) Верапаміл

187. У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки *Candida albicans*. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?

*** А) Флуконазол**

- В) Бісептол
- С) Тетрациклін
- Д) Фуразолідон
- Е) Поліміксин

188. Призначення бензилпеніциліну натрієвої солі призвело до виникнення нейротоксичних ефектів (галюцинацій, судом). Результат антагонізму з яким нейромедіатором є причиною такої реакції?

*** А) ГАМК**

- В) Дофамін
- С) Серотонін
- Д) Аденозін
- Е) Ацетилхолін

189. Лікар-стоматолог планує провести пацієнту екстракцію зуба під місцевим знеболенням із використанням лідокаїну. Який із нижчеперерахованих судинозвужуючих препаратів доцільно використати для подовження дії місцевого анестетика?

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Промедол
- С) Ефедрину гідрохлорид
- Д) Аналгін
- Е) Нафтизин

190. Хворий через 5 хв. після проведення місцевої анестезії лідокаїном з-приводу екстракції зуба став скаржитись на сильну задишку, утруднення дихання, запаморочення, серцебиття, набряк в ділянці шиї та появу численних сверблячих висипів по всій поверхні шкіри. Діагностовано анафілактичну реакцію негайного типу на лідокаїн. Який з перерахованих препаратів слід використати в даній ситуації?

*** А) Дімедрол**

- В) Омепразол
- С) Гепарин
- Д) Аналгін
- Е) Омнопон

191. Хворому з ерозивно-виразковим стоматитом, який супроводжувався сильним больовим синдромом, лікар призначив аплікації розчину лідокаїну гідрохлориду. Який вид терапії застосований в даному випадку?

*** А) Симптоматична**

- В) Патогенетична
- С) Етіологічна
- Д) Замісна
- Е) Гормональна

192. Лікарю-стоматологу після року роботи в країні центральної Африки було встановлено діагноз малярія і призначено протипротозойний препарат з імуносупресивною дією. Назвіть препарат:

*** А) Хінгамін**

- В) Примахін
- С) Хлоридин
- Д) Метронідазол
- Е) Декаріс

193. Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з протипротозойною та антибактеріальною діями, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, який призначив лікар?

*** А) Метронідазол**

- В) Тетрациклін
- С) Левоміцетин
- Д) Лінкоміцину гідрохлорид
- Е) Цефтриаксон

194. У хворого на стоматологічному прийомі виник напад пароксизмальної тахікардії, у зв'язку з чим йому ввели лідокаїн. З яким механізмом дії лідокаїну пов'язаний його протиаритмічний ефект?

*** А) Мембранно-іонним**

- В) Потенціюванням
- С) Кумуляцією
- Д) Антагонізмом
- Е) Сумацією

195. До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на наявність мілкопухирчастої висипки на слизовій оболонці ротової порожнини, болючість в уражених ділянках та підвищене слиновиділення. Після проведеного обстеження лікар встановив діагноз гострого герпетичного стоматиту. Який з перерахованих лікарських засобів можна застосувати в якості етіотропного лікування?

*** А) Мазь Ацикловір**

- В) Ін'єкції бензилпеніциліну
- С) Розчин анестезину в соняшниковій олії
- Д) Обліпихова олія
- Е) Драже діазоліну

196. У хворої після обробки яснево-зубних карманів спиртовим розчином йоду з'явились гіперемія ясен, свербіж шкіри і кропив'янка. З чим може бути пов'язана зазначена побічна дія йоду?

*** А) Індивідуальна непереносимість препарату**

- В) Вплив на функцію щитоподібної залози
- С) Відволікаюча дія
- Д) Місцевоподразнювальний ефект
- Е) Вплив на патогенні мікроорганізми

197. Хворому 55 років для лікування легеневої форми туберкульозу, у комплексну терапію захворювання призначений туберкулоцидний засіб. Який з вказаних лікарських засобів проявляє свою антимікробну активність виключно по відношенню до мікобактерій туберкульозу?

*** А) Ізоніазид**

- В) Стрептоміцину сульфат
- С) Гатіфлоксацин
- Д) Циклосерин
- Е) Канаміцину сульфат

198. Хворій 43 років для лікування бронхопневмонії призначений бензилпеніцилін. Які з вказаних побічних ефектів, найбільш характерний для даного засобу?

*** А) Алергічні реакції**

- В) Анемія
- С) Агранулоцитоз
- Д) Ураження печінки
- Е) Неврит слухового нерва

199. Для лікування флегмони шиї, викликаної анаеробною інфекцією, у комплексну терапію включений протимікробний препарат з групи імідазолу. Вкажіть даний хіміотерапевтичний засіб.

*** А) Метронідазол**

- В) Ампіцилін
- С) Тетрациклін
- Д) Кліндаміцин
- Е) Норфллоксацин

200. У пацієнта після переохолодження на губах з'явилися герпетичні висипання. Для лікування призначений крем ацикловіру, терапевтичний ефект якого пояснюється здатністю:

- * А) Гальмувати активність ДНК-полімерази**
- В) Порушувати функцію зворотної транскриптази
- С) Інгібувати нейрамінідазу
- Д) Гальмувати активність протеази
- Е) Уповільнювати реплікацію РНК- и ДНК-геномних вірусів

201. У жінки 53 років при лікуванні періодонтального абсцесу, викликаного анаеробною флорою, для промивання зубоясенних кишень застосований засіб, дія якого пов'язана з відновленням нітрогрупи під впливом нітроредуктаз. Який препарат призначено?

- * А) Метронідазол**
- В) Бензилпеніцилін
- С) Азитроміцин
- Д) Ко-тримоксазол
- Е) Тетрациклін

202. Під час проведення стоматологічної лікувальної процедури у пацієнта виник напад стенокардії. Препарати якої групи необхідно призначити для надання швидкої допомоги ?

- * А) Антиангіральні засоби.**
- В) Кардітоніки.
- С) Стимулятори дихання.
- Д) Протиаритмічні засоби.
- Е) Антигіпертензивні засоби.

203. Чоловікові 36 років за 2 тижні перед відрядженням до ендемічного по малярії району рекомендований прийом засобу, який порушує редуплікацію макромолекули ДНК плазмодіїв. Вкажіть цей препарат.

*** А) Хлорохін (хінгамін)**

- В) Хлоридин
- С) Сульфален
- Д) Сульфапіридазин
- Е) Тетрациклін

204. У пацієнта діагностований первинний туберкульоз легень. Призначення якого протитуберкульозного засобу з групи антибіотиків, що порушують синтез РНК мікобактерій, є бажаним?

*** А) Рифампіцин**

- В) Піразинамід
- С) Канаміцину сульфат
- Д) ПАСК
- Е) Етамбутол

205. До приймального відділення надійшов хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат йому необхідно ввести для зняття больового шоку?

*** А) Промедол**

- В) Сиднокарб
- С) Ібупрофен
- Д) Пантогам
- Е) Мідокалм

206. У пацієнтки Р., 26 р. висипання на шкірі, свербіж після вживання цитрусових. Призначте лікарський засіб з групи блокаторів H1-гістамінорецепторів.

*** А) Дімедрол**

- В) Кислота ацетилсаліцилова
- С) Вікасол
- Д) Аналгін
- Е) Парацетамол

207. При візиті до лікаря-стоматолога у хворого К., розвинувся судинний колапс. Який препарат показаний?

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Аналгін
- С) Атенолол
- Д) Нафтизин
- Е) Анаприлін

208. Хворий М., 28 р. з діагнозом нейроциркуляторна дистонія потребує тривалого лікування у стоматолога. Страх перед візитом до стоматолога супроводжується тахікардією і підвищенням артеріального тиску. Виберіть лікарський засіб з групи β 1-адреноблокаторів для усунення вказаних симптомів.

*** А) Метопролол**

- В) Дімедрол
- С) Вікасол
- Д) Альмагель
- Е) Аміназин

209. У студентки С., 18 р. фолікулярна ангіна супроводжується болем в горлі, ознаками інтоксикації, слабкістю, гарячкою. Призначте ефективний жарознижуючий препарат.

*** А) Парацетамол**

- В) Аскорбінова кислота
- С) Окситоцин
- Д) Лоратидин
- Е) Ціанокобаламін

210. У пацієнта Х., 48 р. виразково-некротичний стоматит. Виберіть лікарський засіб, що покращує регенерацію слизової ротової порожнини.

*** А) Ретинолу ацетат**

- В) Ферковен
- С) Кальцію глюконат
- Д) Лоратидин
- Е) Коргліконт

211. На прийомі у стоматолога у пацієнта, у якого в анамнезі бронхіальна астма, виник напад ядухи. Призначте препарат для усунення даного стану:

*** А) Салбутамол**

- В) Нафтизин
- С) Мезатон
- Д) Анаприлін
- Е) Бісопролол

212. Хворому на акне призначений доксицикліну гідрохлорид. Які застереження повинен дати лікар хворому при застосуванні цього препарату?

- * А) Уникати тривалого перебування на сонці**
- В) Запивати великою кількістю рідини, бажано молоком
- С) Приймати перед їжею
- Д) Курс лікування не повинен перевищувати 1 день
- Е) Не приймати разом з вітамінними препаратами

213. Хвора на гострий афтозний стоматит скаржиться на біль у ротовій порожнині, підвищення температури тіла, загальну слабкість та запаморочення. Який лікарський засіб необхідно призначити з метою зниження температури?

- * А) Ацетилсаліцилова кислота**
- В) Стоматидин
- С) Гідрокортизон
- Д) Індометацин
- Е) Піроксикам

214. Який лікарський засіб потрібно призначити для зниження слюновиділення при проведенні часткової резекції нижньої щелепи?

- * А) Атропіна сульфат**
- В) Карбахолін
- С) Армін
- Д) Тубокурарина хлорид
- Е) Лобелін

215. До стоматолога звернувся хворий з ознаками стоматиту. Був встановлений діагноз: парадонтит. Який протипротозойний засіб слід обрати для лікування?

*** А) Метронідазол**

- В) Левамизол
- С) Грізеофульвін
- Д) Мікосептин
- Е) Фуразалідон

216. Хворий на мегалобластну анемію приймав препарат з групи водорозчинних вітамінних засобів. Визначте препарат, що приймав хворий.

*** А) Ціанокобаламін**

- В) Тіаміну хлорид
- С) Токоферолу ацетат
- Д) Аскорбінова кислота
- Е) Піридоксин

217. У хворого під час проведення видалення зуба виник серцевий напад, що супроводжувався болем за грудиною. Який препарат доцільно призначити?

*** А) Нітрогліцерин**

- В) Бензогексоній
- С) Алоксим
- Д) Анестезин
- Е) Лантозил

218. До комплексної терапії хворого на бронхопневмонію, що супроводжується виснажливим сухим кашлем, лікар включив муколітичний препарат, який деполімеризує мукопротеїди. Вкажіть цей препарат

*** А) Ацетилцистеїн**

В) Кодеїн

С) Строфантин

Д) Неодикумарин

Е) Атенолол

219. Хворий на цукровий діабет I типу після протезування знепритомнів: з'явилися - слабкість, серцебиття, розширені зіниці. Лікар встановив гіпоглікемічну кому. Який засіб треба ввести хворому?

*** А) Адреналіну гідро хлорид**

В) Метформін

С) Глібенкламід

Д) Акарбозу

Е) Амарил

220. При хронічному отруєнні препаратами ртуті поруч з ураженням різних органів і тканин у хворого виникає виразковий стоматит. Вкажіть антидот при цьому отруєнні.

*** А) Унітіол**

В) Амінокапронова кислота

С) Хлорид натрію

Д) Амікацин

Е) Сульфат магнію

221. До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість у роті. Під час подальшого обстеження діагностовано ксеростомію. Препарат якої фармакологічної групи йому слід призначити для збільшення секреції слюни?

*** А) М-холіноміметики**

- В) М-холіноблокатори
- С) Адреноміметики
- Д) Адреноблокатори
- Е) Н-холіноміметики.

222. У хворого, 25 років, у стоматологічному кабінеті раптово розвинувся бронхоспазм. Лікар ввів хворому сальбутамол у вигляді інгаляцій. Який механізм дії цього препарату?

*** А) Стимуляція бета2-адренорецепторів.**

- В) Стимуляція альфа-адренорецепторів.
- С) Блокада H1-гістамінових рецепторів.
- Д) Блокада фосфодіестерази.
- Е) Блокада м-холіорецепторів.

223. Хворому при видаленні чужорідного тіла з нижньої щелепи необхідно провести місцеву анестезію лідокаїном. Який механізм дії цього засобу?

*** А) Порушення проходження іонів натрію через мембрану нервових клітин.**

- В) Блокада проходження оксиду азоту.
- С) Пригнічення активності цитохромоксидаз.
- Д) Зниження активності дегідрогеназ.
- Е) Блокада м-холіорецепторів.

224. При очікуванні екстракції зуба у пацієнта розвинувся напад бронхіальної астми. Препарат якої фармакологічної групи йому слід призначити для усунення бронхоспазму?

*** А) β 2-адреноміметики**

- В) М-холіноміметики.
- С) Анальгетики.
- Д) Психотоніки.
- Е) Аналептики.

225. До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на помірний біль у нижній щелепі. Після огляду ротової порожнини діагностовано гострий пульпіт. Назвіть препарат, який доцільно призначити хворому для зменшення больового синдрому при запальному процесі?

*** А) Диклофенак-натрій**

- В) Діазепам
- С) Промедод
- Д) Новокаїн
- Е) Фторотан

226. Перед операцією з приводу співставлення уламків верхньої щелепи для нейролептанальгезії у комбінації з анальгетиком фентанілом застосували нейролептик дроперидол. Який вид взаємодії лікарських засобів був використаний?

*** А) Потенційований синергізм.**

- В) Адитивний синергізм.
- С) Синергоантогонізм.
- Д) Антагонізм конкурентний.
- Е) Антагонізм неконкурентний.

227. Для загального знеболення при операції у щелепно-лицевій ділянці, застосували засіб для інгаляційного наркозу . Який препарат необхідно призначити для попередження побічних ефектів цього препарату - брадиаритмії і підвищеної салівації?

*** А) Атропіну сульфат.**

В) Морфіну гідрохлорид.

С) Ультракаїн

Д) Унітіол

Е) Анестезин

228. Больному с общим отеком на фоне сердечной недостаточности назначен фуросемид. Действие на какой процесс обеспечивает его терапевтический эффект в данном случае?

*** А) Котранспорт ионов через апикальную мембрану**

В) Активный транспорт ионов через базальную мембрану

С) Почечный кровоток

Д) Карбоангидразу

Е) Синтез натриевых каналов в дистальных канальцах

229. Больная 65 лет страдает хроническим запором вследствие гипотонии толстого кишечника. Какое средство лечения следует избрать при этих обстоятельствах?

*** А) Бисакодил**

В) Касторовое масло

С) Магния сульфат

Д) Прозерин

Е) Метоклопрамид

230. У больного аллергический насморк с обильным выделением слизи, зудом, частым чиханием. Какое из перечисленных средств следует выбрать в этом случае, если известно, что оно избирательно блокирует гистаминовые рецепторы?

*** А) Лоратадин**

В) Эфедрин

С) Адреналин

Д) Нафтизин

Е) Преднизолон

231. Большая доза симпатолитика вызвала у больного падение артериального давления. Какую группу антигипотензивных средств наиболее целесообразно использовать для его повышения в этом случае?

*** А) Адреномиметики**

В) Сердечные гликозиды

С) Аналептики

Д) Плазмозаменители

Е) Н-холиномиметики

232. В приемное отделение поступил больной с признаками острой сердечной недостаточности: бледностью, акроцианозом, частым, поверхностным дыханием. Какое из перечисленных средств показано в этом случае?

*** А) Коргликон**

В) Дигитоксин

С) Кордиамин

Д) Нитроглицерин

Е) Адреналина гидрохлорид

233. У больного на фоне инфаркта миокарда возникла пароксизмальная желудочковая тахикардия. Какое из перечисленных противоаритмических средств следует избрать, чтобы не уменьшить сердечный выброс?

*** А) Лидокаина гидрохлорид**

- В) Новокаинамид
- С) Верапамил
- Д) Анаприлин
- Е) Калия хлорид

234. У больного с хроническим гиперацидным гастритом появились боли в суставах. Для их уменьшения, учитывая сопутствующую патологию был назначен целекоксиб. Избирательное действие на какой фермент обеспечивает отсутствие его действия на слизистую желудка?

*** А) Циклооксигеназу 2**

- В) Циклооксигеназу 1
- С) Фосфолипазу A2
- Д) Фосфолипазу C
- Е) Калликреин

235. Женщина 45 лет обратилась к врачу с жалобами на головную боль, головокружение, сердцебиение. Обследование установило повышение АД и наличие высокой концентрации ангиотензина 2 в крови больной. Какое из перечисленных антигипертензивных средств наиболее показано в этом случае?

*** А) Лизиноприл**

- В) Празозин
- С) Метопролол
- Д) Резерпин
- Е) Верапамил

236. В кардиологическое отделение поступил больной с интенсивной болью, обусловленной инфарктом миокарда. Для купирования боли было решено потенцировать действие анальгетика нейролептиком. Какой из перечисленных нейролептиков наиболее пригоден в данном случае?

*** А) Дроперидол**

- В) Аминазин
- С) Трифтазин
- Д) Галоперидол
- Е) Сульпирид

237. У хворого діагностували гострий інфаркт міокарду, який супроводжується стійкими болями за грудиною. Лікар вирішив провести нейролептаналгезію. Комбінацію яких препаратів у даному випадку буде найраціональнішою?

*** А) Фентаніл+дроперидол**

- В) Анальгін+димедрол
- С) Кодеїну фосфат+супрастин
- Д) Дигоксин+кальцію хлорид
- Е) Пірацетам+магнію сульфат

238. Стоматолог назначив пацієнту препарати кальцію для профілактики карієсу. Лікар не знав, що пацієнт хворіє на хронічну серцеву недостатність і приймає серцеві глікозиди. Що відбудеться в результаті поєднання препаратів кальцію і серцевих глікозидів?

*** А) Збільшиться активність і токсичність серцевих глікозидів**

- В) Прискориться виведення серцевих глікозидів
- С) Знизиться активність і токсичність серцевих глікозидів
- Д) Препарати не взаємодіють
- Е) Уповільниться метаболізм серцевих глікозидів

239. Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, карієс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який засіб викликав побічні ефекти?

*** А) L-тіроксин**

В) Хумулін

С) Паратіреоїдин

Д) Тірокальцитонін

Е) Преднізолон

240. Хворому з бронхопневмонією лікар призначив ацетилцистеїн. Визначити показання до його застосування.

*** А) Бронхіт з харкотінням**

В) Судоми

С) Бронхіальна астма

Д) Серцева недостатність

Е) Асфіксія новонароджених