

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нормальна анатомія - база тестів 2014 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2014 року**

Кількість запитань: **300**

1. Для вправлення вивиху нижньої щелепи необхідно звести її донизу. Яка анатомічна структура обумовлює таку дію?

- * А) Суглобовий горбок вискової кістки**
- В) Нижньощелепна ямка вискової кістки
- С) Виростковий відросток нижньої щелепи
- Д) Вінцевий відросток нижньої щелепи
- Е) Вирізка нижньої щелепи

2. У хворого стеноз легеневого стовбура. З якої камери серця починається цей суд?

- * А) Правий шлуночок**
- В) Лівий шлуночок
- С) Праве передсердя
- Д) Ліве передсердя
- Е) -

3. До лікаря педіатра звернулася мати с приводу того, що у її дитини віком 1 рік голова повернена в лівий бік. Який із м'язів шиї недорозвинений?

- * А) Грудинно-ключично-соскоподібний м'яз**
- В) Підшкірний м'яз
- С) Двочеревцевий м'яз
- Д) Довгий м'яз шиї
- Е) Шило-під'язиковий м'яз

4. Поранений робітник поступив у лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з артеріальною кровотечею. Яка артерія імовірно пошкоджена?

*** A) a. brachialis**

B) a. radialis

C) a. axillaris

D) a. subscapularis

E) a. profunda brachii

5. Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?

*** A) uncus**

B) operculum frontale

C) gyrus temporalis superior

D) gyrus postcentralis

E) sul. calcarinus

6. Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні шиї. Який нерв забезпечує чутливість цієї області шиї?

*** A) n. transversus colli**

B) n. auricularis magnus

C) nn. supraclaviculares

D) n. occipitalis minor

E) n. phrenicus

7. До хірурга стоматолога привели хворого з вуличною травмою в ділянці піднижньощелепного трикутника. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована артерія, яка іде до м'якого піднебіння. Яку артерію пошкоджено?

*** A) palatina ascendens**

B) palatina descendens

C) sphenopalatina

D) pharyngea ascendens

E) facialis

8. 57-річна хвора на гіпертонію звернулась до лікаря з скаргою на біль великого пальця руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідність шкіри і зниження температури в цій області. Яка з артерій верхньої кінцівки найімовірніше ушкоджена?

*** A) a. princeps pollicis**

B) a. ulnaris

C) a. perforans

D) a. digitalis communis

E) a. digitalis propria

9. До уролога звернувся чоловік віком 58 років зі скаргами на різкі болі при сечівиділенні та зменшенні кількості сечі. Лікар припустив наявність сечокам'яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірно затримання каміння?

*** A) pars membranacea**

B) Pars prostatica

C) Pars spongiosa

D) Pars pelvina

E) Pars intramuralis

10. В ендокрінологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька разів були переломи кінцівок пов'язані з крихкістю кісток. Функція яких ендокринних залоз (ендокринної залози) порушена?

*** А) прищитоподібні**

- В) щитоподібна
- С) вилочкова
- Д) надниркові
- Е) епіфіз

11. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття різцями верхньої щелепи зубів нижньої. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Ортогнатія**

- В) Прогенія
- С) Біпрогнатія
- Д) Прямий прикус
- Е) Закритий прикус

12. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття різцями нижньої щелепи зубів верхньої. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Прогенія**

- В) Ортогнатія
- С) Біпрогнатія
- Д) Закритий прикус
- Е) Прямий прикус

13. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Біпрогнатія**

- В) Ортогнатія
- С) Прямий прикус
- Д) Закритий прикус
- Е) Прогенія

14. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями. Контакт між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Відкритий прикус**

- В) Ортогнатія
- С) Прямий прикус
- Д) Закритий прикус
- Е) Прогенія

15. Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований медіальний горбик на ріжучому краї правого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:

*** А) Параконус.**

- В) Метакоус
- С) Мезоконус
- Д) Гіпоконус
- Е) Протоконус

16. Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого вехнього моляра. Цей горик називається:

*** А) Гіпоконус.**

В) Метаконус.

С) Параконус.

Д) Мезоконус.

Е) Протоконус.

17. Під час рентгеноскопічного дослідження органів грудної клітки у хворого відзначена нерухомість діафрагми з правого боку. Який нерв пошкоджено з правого боку?

*** А) Діафрагмальний нерв**

В) Блукаючий нерв

С) Симпатичний стовбур

Д) Шийна петля

Е) Додатковий нерв

18. Гнійні вогнища на обличчі вище ротової порожнини небезпечні можливістю поширення інфекції у порожнину черепа. Наявністю яких анастомозів вен обличчя це зумовлено?

*** А) З очними венами**

В) З крилоподібним сплетенням

С) З передніми вушними венами

Д) З потиличною веною

Е) З середньою і глибокими скроневими венами

19. Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?

*** А) Задня**

- В) Передня
- С) Бічну права
- Д) Бічну ліва
- Е) Будь-яка

20. В результаті травми у хворого розірвався відвідний нерв. Який з перелічених симптомів спостерігається?

*** А) Параліч латерального прямого м'яза очного яблука.**

- В) Параліч медіального прямого м'яза очного яблука.
- С) Стійке розширення зіниці.
- Д) Розлад акомодациї.
- Е) Порушення слъзовиділення.

21. У травмпункт поступив хворий, який не може розігнути передпліччя в ліктьовому суглобі. Який м'яз пошкоджений?

*** А) Триголовий м'яз плеча.**

- В) Двоголовий м'яз плеча.
- С) Плечо-променевий м'яз.
- Д) Дзьобо-плечовий м'яз.
- Е) Плечовий м'яз.

22. Хвора з діагнозом пієлонефрит поступила в клініку урології. Після проведення обстеження відмічено приєднання інфекції, що супроводжувалося пієловенозним рефлюксом. Ураження якої структури призвело до виникнення ускладнення?

*** А) Форнікальний апарат нирки**

В) Екскреторні шляхи нирки

С) Прямі трубочки

Д) Ниркові канальці

Е) Ниркове тільце

23. У хворого скарги на порушення сечовипускання. Діагностовано гіпертрофію передміхурової залози. Пошкодження якої частини органа призводить до виникнення даної патології?

*** А) Середньої частки.**

В) Лівої частки.

С) Правої частки.

Д) Основи.

Е) Верхівки.

24. Хворий, 43 років, звернувся зі скаргою на пухлину на корені язика. Хірург стоматолог виявив, що це зло'якісна пухлина. Плануючи операцію, він вирішив перев'язати артерію, що проходить в трикутнику Пирогова. Це:

*** А) a. lingualis**

В) a. sublingualis

С) a. profunda linguae

Д) a. suprahyoideum

Е) a. palatina ascendens

25. Хворий 27-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на наявність твердої пухлини спереду від козелка вушної раковини. Хірург стоматолог, видаляючи пухлину, зустрів вену. Це була :

*** A) v. retromandibularis**

B) v. facialis

C) v. jugularis interna

D) v. jugularis externa

E) v. auricularis posterior

26. Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку, хірург стоматолог виявив камінь в піднижньощелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

*** A) a. facialis**

B) a. submental

C) a. alveolaris inferior

D) a. labialis inferior

E) a. lingualis

27. Хворому для виготовлення функціонально повноцінного протеза необхідно видалити ліве верхнє ікло. Після інфраорбітальної анестезії у хворого з'явилась гематома в передній ділянці обличчя, яка швидко збільшувалась. Було встановлено, що травмовано артерію, яка є гілкою:

*** A) a. maxillaris**

B) a. alveolaris inferior

C) a. temporalis superficialis

D) a. ophthalmica

E) a. labialis superior

28. Хірург стоматолог зашивав чоловіку 26 років різану рану в ділянці шиї над грудниною і запобігав кровотечі з судини, що лежить між поверхневим і глибоким листком власної фасції шиї. Це:

*** A) arcus venosus juguli**

B) v. thyroidea inferior

C) v. thyroidea superior

D) v. jugularis interna

E) v. jugularis externa

29. Чоловік 28-ми років з різаною раною шкіри лобової ділянки, був доставлений до лікарні. Для зупинки кровотечі перев'язана судина, яка кровопостачає цю ділянку. Яка судина була перев'язана?

*** A) a. supraorbitalis**

B) a. infraorbitalis

C) a. angularis

D) a. dorsalis nasi

E) a. temporalis superficialis

30. Хворий 60-ти років при падінні отримав травму голови та був доставлений до лікарні. При обстеженні виявлена підшкірна гематома скроневої ділянки. Пошкодження якої судини призвело до появи гематоми?

*** A) a.temporalis superficialis**

B) a.maxillaris

C) a.auricularis posterior

D) a.buccalis

E) a.occipitalis

31. У хворого з травмою голови хірург стоматолог виявив, що тромб, який утворився в сигмоподібній пазусі, досягнув яремного отвору та перейшов на цибулину внутрішньої яремної вени. У хворого спостерігається порушення ковтання, зниження частоти серцевих скорочень, судом м. sternocleidomastoideus та m. trapezius, важке дихання. Хірург встановив, що викликано подразнення черепних нервів, які лежать поряд з цибулиною внутрішньої яремної вени? Які це пари черепних нервів?

*** A) IX, X, XI**

B) VII

C) XII

D) III, IV, VI

E) V

32. Стоматолог встановив, що хворий 23-х років скаржиться на велику кількість слини. Стимуляція якого вегетативного вузла викликає утворення великої кількості слини серозного характеру?

*** A) ganglion oticum**

B) Ganglion pterygopalatinum

C) Ganglion ciliare

D) Ganglion submandibulare

E) Ganglion sublinguale

33. При видаленні липоми у хворого біля крила носу хірург-стоматолог пошкодив судину, що привело до утворення підшкірної гематоми. Яка судина пошкоджена?

*** A) a. facialis**

B) a. maxillaris

C) a. supraorbitalis

D) a. infraraorbitalis

E) a. angularis

34. До хірурга-стоматолога привезли чоловіка 28 років з вуличною травмою. Лікар виявив, що при пошкодженні луски скроневої кістки у хворого виникла субдуральна гематома. Пошкодження якої артерії призвело до утворення гематоми?

*** А) a. meningea media**

В) a. maxillaris

С) a. carotis interna

Д) a. ophthalmica

Е) a. sphenopalatina

35. Небезпечно витискувати гноячки на лиці, особливо вище ротової щілини. Анастомозами яких вен може поширитися інфекція у порожнину черепа?

*** А) Анастомози вен лица з очними венами**

В) Анастомози вен лица з криловидним сплетенням

С) Анастомози вен лица з передніми вушними венами

Д) Анастомози з потиличною веною

Е) Анастомози вен лица з середньою і глибокими висковими венами

36. Хворий з запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане?

*** А) Барабанна струна**

В) Барабанний

С) Малий кам'янистий

Д) Язиковий

Е) Язикоглотковий

37. Яка артерія може бути пошкоджена при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?

*** А) Нижня альвеолярна артерія**

- В) Щічна артерія
- С) Язикова артерія
- Д) Крилоподібні гілки
- Е) Середня оболонна артерія

38. У відділення хірургічної стоматології поступила новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхатись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. В якій ділянці піднебіння знаходилась розщілена? Між:

*** А) Os incisivum et processus palatinus maxillae**

- В) Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
- С) Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
- Д) Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
- Е) В ділянці canalis incisivus

39. Чоловік 65 років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений м'яз:

*** А) Скроневий**

- В) Жувальний
- С) Бічний крилоподібний
- Д) Присередній крилоподібний
- Е) Двочеревцевий

40. Хворий звернувся до стоматолога зі скаргою на сухість ділянки під язиком справа. Лікар встановив, що ущемлена chorda tympani при її виході в праву підскроневу ямку через fissura:

*** A) Petrotympanica**

B) Tympanomastoidea

C) Petrosquamosa

D) Sphenopetrosa

E) Petrooccipitalis

41. Вирвавши зуб у пацієнта, стоматолог побачив, що він має два корені. Що то за зуб?

*** A) Нижній великий кутній**

B) Верхній великий кутній

C) Ікло

D) Нижній малий кутній

E) Верхній різець

42. У новонародженної дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

*** A) Атрезія заднього проходу**

B) Атрезія стравоходу

C) Заяча губа

D) Дивертікул стравоходу

E) Дивертікул порожньої кишки

43. У новонародженої дитини під час смоктання молоко потрапляє до носової порожнини. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

*** А) Незарощення піднебіння**

- В) Дивертікул стравоходу
- С) Атрезія стравоходу
- Д) Заяча губа
- Е) Звуження стравоходу

44. У хворого поранення у праву бічну ділянку живота. Яка частина товстої кишки найімовірніше може бути пошкоджена?

*** А) Висхідна ободова кишка**

- В) Поперечна ободова кишка
- С) Низхідна ободова кишка
- Д) Сигмовидна ободова кишка
- Е) Пряма кишка

45. У хворого судоми. Про гіпофункцію якої ендокринної залози можна думати?

*** А) Прищитоподібної залози**

- В) Шишкоподібного тіла
- С) Гіпофіза
- Д) Статевих залоз
- Е) Наднирникових залоз

46. 30 річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого?

*** А) Сконевого (задні волокна)**

В) Сконевого (передні волокна)

С) Крилоподібного медіального

Д) Крилоподібного латерального

Е) Жувального

47. Під час рентгенологічного дослідження у хворого у вертикальному положенні лікар констатує наявність повітря у шлунці. В якій частині воно знаходиться?

*** А) В дні**

В) В тілі

С) В кардіальній

Д) В пілоричній

Е) В ділянці малої кривини

48. Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. У якому носовому ході під час риноскопії було виявлено гній?

*** А) Середній**

В) Верхній

С) Нижній

Д) Загальний

Е) Найвищий

49. Потерпілий доставлений у клініку з відкритим переломом гілки нижньої щелепи з великою кровотечею в ділянці перелому. Пошкодження якої артерії, вірогідніше за все, мало місце?

*** А) Коміркової нижньої**

- В) Середньої вискової
- С) Лицевої
- Д) Язикової
- Е) Висхідної піднебінної

50. Хворому проведена субтотальна субфасціальна резекція щитовидної залози за Ніколаєвим. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?

*** А) Зворотній гортанний нерв**

- В) Верхній гортанний нерв
- С) Під'язиковий нерв
- Д) Язиковий нерв
- Е) Нижньощелепний нерв

51. При обстеженні миміки хворого виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може свистіти, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

*** А) Колового м'яза рота**

- В) Великого виличного м'язу
- С) Шийного м'язу
- Д) М'язу сміху
- Е) Жувального м'язу

52. У хворого на тимому (пухлину виличкової залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?

*** А) Верхню порожнисту вену**

- В) Зовнішню яремну вену
- С) Підключичну вену
- Д) Внутрішню яремну вену
- Е) Передню яремну вену

53. Дитина віком 10 років скаржиться на затруднення носового дихання. При обстеженні встановлено, що причиною є стійка гіпертрофія лімфоїдної тканини. Збільшення якого мигдалика має місце ?

*** А) Глоткового**

- В) Піднебінного
- С) Трубного лівого
- Д) Язикового
- Е) Трубного правого

54. У хворого 28 років, діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки носо-сльозової протоки. З анамнезу стало відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла проникнути у носо-сльозову протоку ?

*** А) Із нижнього носового ходу**

- В) Із середнього носового ходу
- С) Із верхнього носового ходу
- Д) Із присінку носа
- Е) Із лобової пазухи

55. Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого і жувального м'язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений?

*** А) Рухова частина нижньощелепного**

- В) Лицевий
- С) Нижній альвеолярний
- Д) Верхньощелепний
- Е) Щелепно-під'язиковий

56. Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи м'язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?

*** А) Tr.cortico-nuclearis**

- В) Tr.cortico-spinalis
- С) Tr.cortico-thalamicus
- Д) Tr.cortico-fronto-pontinus
- Е) Tr.thalamo-corticalis

57. Після звільнення з під завалу в постраждалого відзначається затемнення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?

*** А) Тім'яна та потилична кістка**

- В) Клиновидна кістка та нижня щелепа
- С) Лобна та носові кістки
- Д) Скронева кістка та верхня щелепа
- Е) Вилична кістка та слізна кістка

58. Під час ультразвукового обстеження серця лікар спостерігає за стулками мітрального клапана. Що відбувається з ними при систолі передсердь?

*** А) Вивертаються в порожнину шлуночка**

- В) Притискаються до стінок передсердя
- С) Вивертаються в порожнину передсердя
- Д) Стуляються, закриваючи просвіт отвору
- Е) Притискаються до стінки судин

59. Підвищення кров'яного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

*** А) Правого шлуночка**

- В) Лівого шлуночка
- С) Правого передсердя
- Д) Лівого передсердя
- Е) Венозного синуса

60. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у середню черепну ямку?

*** А) Через верхню очноямкову щілину**

- В) Через передній решітчастий отвір
- С) Через задній решітчастий отвір
- Д) Через нижню очноямкову щілину
- Е) Через вилично-очноямковий отвір

61. Потерпілого доставлено у лікарню з переломом нижньої щелепи та значною кровотечею у ділянці перелому. Пошкодження якої артерії вірогідніше всього мало місце?

*** А) Нижньої коміркової артерії**

В) Висхідної глоткової артерії

С) Язикової артерії

Д) Висхідної піднебінної артерії

Е) Верхньої коміркової артерії

62. В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

*** А) IX**

В) X

С) VIII

Д) V

Е) XII

63. Дитина 3-х років поступила у лікарню з чужорідним тілом у бронхах. В який бронх вірогідніше всього потрапило інорідне тіло?

*** А) в правий головний бронх**

В) в лівий головний бронх

С) в правий сегментарний бронх

Д) в лівий сегментарний бронх

Е) в дольковий бронх

64. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено?

*** A) d.Ureter**

- B) Pelvis renalis
- C) Uretra
- D) Vesica urinaria
- E) Ren

65. Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер'я. Ушкодження якого з органів, що проєктуються в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу.

*** A) Lien**

- B) Cauda pancreatis
- C) Fundus ventriculi
- D) Flexura coli sinistra
- E) Ren sinistra

66. У дітей часто можна спостерігати затруднене носове дихання, яке пов'язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

*** A) Tonsilla pharyngea**

- B) Tonsilla lingualis
- C) Tonsilla palatina
- D) Tonsilla tubaria
- E) Усіх названих мигдаликів

67. До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу болюча. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?

*** A) N. auricularis magnus**

B) N. occipitalis minor

C) N. supraclaviculares

D) N. vagus

E) N. transversus colli

68. Чоловік 42-х років звернувся до медпункта з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно: затруднене згинання передпліччя. Які з названих м'язів ймовірно ушкоджені у хворого?

*** A) M.brachialis, m.biceps brachii**

B) M.biceps brachii, m.anconeus

C) M.coracobrachialis, m.supraspinatus

D) M.deltoideus, m.infraspinatus.

E) M.deltoideus, m.biceps brachii.

69. У потерпілого є травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кровотечею? Яке з утворень вірогідно ушкоджено?

*** A) Sinus sagittalis superior.**

B) Sinus petrosus superior.

C) Sinus rectus.

D) Sinus sagittalis inferior.

E) Sinus transversus.

70. Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці підочнямкового отвору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?

*** A) Canalis infraorbitalis.**

B) Canalis pterigoideus.

C) Canalis nasolacrimalis.

D) Canalis incisivus.

E) Fissura orbitalis inferior.

71. При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованій стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

A) N. infraorbitalis

*** B) N.abducens**

C) N.trochlearis

D) N.oculomotorius

E) N.opthalmicus

72. У хворого під час висування язика спостерігається відхилення його верхівки вліво. Рухова інервація якого черепного нерву порушена в цьому випадку?

*** A) N.hypoglossus dexter**

B) N.glossopharyngeus dexter

C) N. vagus dexter

D) N. trigeminus sinister

E) N.facialis sinister

73. Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики), при збиванні долотом крилоподібного гачка, ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча. Яку артерію ушкоджено?

*** А) Низхідну піднебінну артерію.**

В) Висхідну піднебінну артерію.

С) Висхідну глоткову артерію.

Д) Клиноподібну артерію.

Е) Задню верхню альвеолярну артерію.

74. У хворого, 26 років, виявлений великий фурункул м'яких тканин обличчя біля кореню носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути уражена?

*** А) Печеріста пазуха**

В) Верхня сагітальна пазуха

С) Потилична пазуха

Д) Сигмовидна пазуха

Е) Верхня кам'яниста пазуха

75. При обстеженні підлітка, лікарем виявлена вроджена вада серця - функціонування боталової протоки. Що з'єднує ця протока у внутрішньоутробному періоді розвитку?

*** А) Легеневий стовбур та аорту**

В) Правий та лівий шлуночок

С) Аорту та нижню порожисту вену

Д) Праве та ліве передсердя

Е) Легеневий стовбур та верхню порожисту вену

76. При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість, розширена зіниця, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений?

*** А) Окоруховий**

- В) Очний
- С) Блоковий
- Д) Відвідний
- Е) Зоровий

77. Трикутник шиї обмежений ззаду грудинноключичнососковидним м'язом, зверху-заднім черевцем двочеревцевого м'яза, зпереду - верхнім черевцем лопатковопід'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.

*** А) Сонний.**

- В) Лопатковотрахейний.
- С) Підщелепний.
- Д) Лопатковоключичний.
- Е) Лопатковотрапецієвидний.

78. До лікаря звернувся хворий з периодонтом нижнього кутного зуба. Встановлено, що запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими втягнуті в запальний процес?

*** А) Піднижньощелепні**

- В) Бічні шийні
- С) Передні шийні
- Д) Підборідні
- Е) Лицеві

79. У дитини рвана рана лівої щоки. З рани цівкою витікає яскраво-червона кров. В якому місці і яку артерію слід притиснути для зупинки кровотечі?

- * А) Лицьову артерію в ділянці краю нижньої щелепи спереду жувального м'яза**
- В) Язикову артерію в ділянці кута нижньої щелепи
- С) Верхньощелепну артерію в ділянці шийки нижньої щелепи
- Д) Нижньощелепну артерію в ділянці підборіддя
- Е) Підчонамкову артерію в ділянці виличної дуги

80. У хворого з флегмоною (гнійним запаленням) щоки розвинувся менінгіт. Який судинний анастомоз найбільш вірогідно послужив причиною ускладнення?

- * А) Між лицьовою веною і венами очної ямки**
- В) Між лицьовою і очною артеріями
- С) Між лицьовою і позадущелепною венами
- Д) Між скроневою і надчонамковою артеріями
- Е) Між лицьовою веною и крилоподібним сплетінням

81. У потерпілого відмічається правосторонній перелом і крововилив в ділянці передньої третини нижньої щелепи, втрата шкірної чутливості в ділянці підборіддя. Який нерв травмований?

- * А) Підборіддєвий нерв**
- В) Щелепно-під'язикові нерви
- С) Нижній альвеолярний нерв
- Д) Щічний нерв
- Е) Верхні альвеолярні нерви

82. У потерпілого лівосторонній уламковий перелом виличної кістки з втратою шкірної чутливості над нею. Який нерв пошкоджений?

*** А) Вилично-лицьовий нерв**

- В) Нижньоочноямковий нерв
- С) Мала гусяча лапка
- Д) Лицьовий нерв
- Е) Щічний нерв

83. У потерпілого правосторонній перелом середньої третини нижньої щелепи. Який канал може бути ушкоджений?

*** А) Нижньощелепний**

- В) Нижній очноямковий
- С) Малий піднебінний
- Д) Великий піднебінний
- Е) Крилоподібний

84. У травмованого правосторонній перелом вінцевого відростка нижньої щелепи із зміщенням. Який м'яз змістить відросток?

*** А) Скроневий**

- В) Медіальний крилоподібний
- С) Латеральний крилоподібний
- Д) Жувальний
- Е) Напружуючий м'яке піднебіння

85. У хворої 47 років діагностовано пухлину верхівки язика. В які регіонарні лімфатичні вузли можливе метастазування?

*** А) Піднижньощелепні**

- В) Привушні
- С) Соскоподібні
- Д) Потиличні
- Е) Заглоткові

86. До лікаря звернулася мати з дитиною віком 1 рік, у якої прорізалось шість зубів. Яку кількість зубів повинна мати дитина даного віку?

*** А) 8**

- В) 10
- С) 7
- Д) 12
- Е) 6

87. Після видалення другого великого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відмічається кровотеча з альвеолярної комірки. З системи якої артерії спостерігається кровотеча?

*** А) Верхньощелепної**

- В) Нижньої альвеолярної
- С) Лицьової
- Д) Висхідної глоткової
- Е) Щелепно-під'язикової

88. При розкритті глибокого абсцесу щоки був виконаний вертикальний розріз, після чого спостерігається порушення функції м'язів на стороні операції. Гілки якого нерва були перерізані?

*** А) Лицьового**

В) Верхньощелепного

С) Нижньощелепного

Д) Блукаючого

Е) Під'язикового

89. Хворий скаржиться на сухість в роті, зменшення виділення слини. Які нерви уражені?

*** А) Парасимпатичні волокна барабанної струни**

В) Чутливі волокна язикового нерва

С) Рухові волокна під'язикового нерва

Д) Симпатичні волокна симпатичного стовбура

Е) Парасимпатичні волокна блукаючого нерва

90. Хворий з запаленням слизової язика скаржиться на розлад загальної чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва він викликаний?

*** А) Язикового**

В) Барабанної струни

С) Язикоглоткового

Д) Блукаючого

Е) Барабанного

91. У травмованого двосторонній звих скронево-нижньощелепного суглоба. Які основні зв'язки суглоба будуть ушкоджені?

*** А) Латеральні**

- В) Шило-щелепні
- С) Крилоподібно-щелепні
- Д) Клиноподібно-щелепні
- Е) Внутрішньосуглобові

92. При огляді хворого виявлено, що при висовуванні язика його верхівка відхиляється в сторону. Функція якого м'яза язика при цьому порушена?

*** А) Підборідно-язикового**

- В) Під'язикового
- С) Верхнього поздовжнього
- Д) Нижнього поздовжнього
- Е) Шило-язикового

93. Необхідно знечувити праві нижні великі кутні зуби. Куди ввести голку для провідникової анестезії?

*** А) В ділянку правого отвору нижньої щелепи**

- В) В ясна нижньої щелепи справа
- С) В ділянку правого підборідного отвору
- Д) В ділянку підчочномкового отвору
- Е) В ділянку овального отвору

94. До стоматолога звернулась жінка зі скаргою на втрату смаку на верхівці язика. Лікар виявив, що внаслідок безперервного паління сигарет загинули смакові рецептори, які лежать в papillae:

*** A) Fungiformes**

B) Lentiformes

C) Foliate

D) Filiformes

E) Vallatae

95. У хворого 25 років, який скаржився на утруднене ковтання, виявлене пухлиноподібне підвищення на корені язика; 1-2 см в діаметрі, в ділянці сліпого отвору. Лікар встановив розростання залишків залози:

*** A) Щитоподібної**

B) Прищитоподібної

C) Аденогіпофіза

D) Загруднинної

E) Під'язикової

96. Внаслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність якого м_яза блоковано?

*** A) Musculus sphincter pupillae**

B) Musculus ciliaris

C) Musculus rectus lateralis

D) Musculus rectus superior

E) Musculus rectus inferior

97. У хворого запалення легенів ускладнилось ексудативним плевритом. В якому з перелічених анатомічних утворень переважним чином може накопичуватися рідина?

*** A) sinus costodiaphragmaticus pleurae**

B) sinus costomediastinalis pleurae

C) sinus phrenicomediastinalis pleurae

D) sinus transversus pericardii

E) sinus obliquus pericardii

98. Хворий після порушення кровопостачання головного мозку втратив здатність до написання букв і цифр. В якій частці мозку виникла патологія?

*** A) lobus frontalis**

B) lobus occipitalis

C) lobus temporalis

D) lobus parietalis

E) insula

99. У хворого виявлений фурункул у зовнішньому слуховому проході. Які з перелічених лімфатичних вузлів у першу чергу можуть відреагувати на запальний процес?

*** A) nodi lymphatici parotidei**

B) nodi lymphatici retropharyngeales

C) nodi lymphatici mandibulares

D) nodi lymphatici cervicales superficiales

E) nodi lymphatici cervicales profundi

100. У постраждалого черепно-мозкова травма. Рентгенологічно: перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий та круглий отвори. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

*** А) Клиноподібна**

- В) Вискова
- С) Решітчаста
- Д) Лобова
- Е) Потилична

101. Лікар-стоматолог при лікуванні зубів вводить в просвіт між щокою і альвеолярним відростком верхньої щелепи ватний тампон. Вивідний отвір протока якої залози він закриває?

*** А) Привушної**

- В) Піднижньощелепної
- С) Під'язикового
- Д) Щитоподібної
- Е) Прищитоподібної

102. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у крилопіднебінну ямку?

*** А) Через нижню очноямкову щілину**

- В) Через круглий отвір
- С) Через клинопіднебінний отвір
- Д) Через верхню очноямкову щілину
- Е) Через вилично-очноямковий отвір

103. Під час операції хірург виконує серединний розріз поверхневих шарів шиї над рукояткою груднини. Гілки якого венозного анастомозу повинен перев'язати хірург для зупинки кровотечі?

*** А) Яремної дуги**

- В) Нижніх щитовидних вен
- С) Вен підгруднинної залози
- Д) Внутрішніх яремних вен
- Е) Плечоголовних вен

104. У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично-соскоподібного м'яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?

*** А) Зовнішня яремна вена**

- В) Передня яремна вена
- С) Внутрішня яремна вена
- Д) Задня вушна вена
- Е) Поперечна вена шиї.

105. Хронічна нежить ускладнилася запаленням лобової пазухи. Через який носовий хід потрапила інфекція до цього синусу?

*** А) Середній**

- В) Нижній
- С) Загальний
- Д) Верхній
- Е) Носоглотковий

106. При виконанні операції з приводу пухлини черевної частини сечоводу у хворого , лікар повинен пам'ятати, що попереду його розташована важлива артеріальна судина. Яка саме?

*** A) testicularis**

B) renalis

C) ileocolica

D) iliaca interna

E) iliaca communis

107. На прийом до лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кістки (етмоїдіт). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання. Гілками якої артерії кровопостачаються решітчасті комірочки в нормі?

*** A) ophtalmica**

B) infraorbitalis

C) facialis

D) cerebri anterior

E) transversa faciei

108. При обстеженні хворого з порушенням іннервації шкіри та слизових оболонок обличчя, було виявлено запалення трійчастого вузла та порушення його кровопостачання. Гілкою якої артерії він кровопостачається в нормі?

*** A) meningea media**

B) carotis interna

C) A. infraorbitalis

D) sphenopalatina

E) ophtalmica

109. Хворому чоловіку 60-ти років після операції потрібно вивести сечу катетером. В якому місці сечівника можливо зробити прорив при недостатньо вмілій маніпуляції (найбільш звужена у нормі частина)?

*** А) pars membranacea**

- В) ostium uretrae externum
- С) fossa navicularis
- Д) pars spongiosa
- Е) pars prostatica

110. У жінки 30 років розвився неврит лицевого нерва, який призвів до параліча м'язів та погіршення слуху. Погіршення слуху було наслідком параліча:

*** А) Стремінцевого м'яза**

- В) Переднього вушного м'яза
- С) Верхнього вушного м'яза
- Д) Заднього вушного м'яза
- Е) Носового м'яза

111. У хворого на заглотковий абсцес внаслідок розповсюдження гною по міжфасціальному простору шиї виникло запалення органів заднього середостіння. Цим міжфасціальним простором є :

*** А) Позадувісцеральний простір**

- В) Надгруднинний міжапоневротичний простір
- С) Препревісцеральний простір
- Д) Претрахеальний простір
- Е) Піхва сонної артерії

112. Аналізуючи діагностичні тести хворої жінки, хірург планує взяти лімфу з грудної протоки при її впадінні в венозне русло. Де це відбувається?:

*** А) Лівому венозному куті.**

- В) Правому венозному куті.
- С) Місці утворення нижньої порожнистої вени.
- Д) Місці утворення верхньої порожнистої вени.
- Е) Місці утворення ворітної вени.

113. Хворий 82 років скаржиться на втрату смакової чутливості. Всебічне обстеження встановило кіркову локалізацію патологічного процесу. Де саме?

*** А) Гачку та нижній ділянці зацентральної звивини**

- В) Гачку і гіпокампі (морському конику)
- С) Нижній лобовій звивині та підмозолистому полі
- Д) Кутовій звивині та звивині морського коника
- Е) Підмозолистому полі та поясній звивині

114. Хворий 15 років скаржиться на сильний біль в очах, голові, розпливчастість літер при читанні після довгої роботи на близькій відстані. Ураження якого м'яза ока має місце в даному випадку?

*** А) Війковий м'яз**

- В) М'яза – розширювача зіниці
- С) Верхнього косого м'яза
- Д) Нижнього косого м'яза
- Е) -

115. У хворого 69-ти років при гнійній інфекції носової порожнини виник абсцес лобової частки мозку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилася інфекція?

*** A) Foraminae cribrosae**

- B) Foramen ovale
- C) Foramen ethmoidalae posterior
- D) Foramen sphenopalatinum
- E) Foramen rotundum

116. Унаслідок травми в ділянці вінцевого відростка нижньої щелепи у хворого спостерігається порушення зміщення нижньої щелепи назад. Вірогідність пошкодження якого м'яза існує?

*** A) m. temporalis**

- B) m. masseter
- C) m. pterygoideus lateralis
- D) m. pterygoideus medialis
- E) m. levator anguli oris

117. При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої травми він не може опустити нижню щелепу. Пошкодження якого м'язу може бути причиною вказаного порушення?

*** A) Підборідно-під'язиковий**

- B) Жувальний
- C) Скроневий
- D) Медіальний крилоподібний
- E) Латеральний крилоподібний

118. 30-ти річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого?

*** А) Сконевого (задні волокна)**

- В) Крилоподібного латерального
- С) Сконевого (передні волокна)
- Д) Крилоподібного медіального
- Е) Жувального

119. У чоловіка 40 років внаслідок удару по голові з'явилися порушення слуху і парез мимічних м'язів. Лікар поставив йому діагноз – гематома мосто-мозочкового кута. Які нерви при цьому пошкоджені?

*** А) VII, VIII пари черепних нервів**

- В) V, VI, пари черепних нервів
- С) VIII, IX пари черепних нервів
- Д) IX, X, пари черепних нервів
- Е) XI, XII пара черепних нервів

120. Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепній пазусі . У який носовий хід виділяється гній?

*** А) У середній носовий хід**

- В) У носоглотковий хід
- С) У нижній носовий хід
- Д) У верхній носовий хід
- Е) У загальний носовий хід

121. При гнійному отиті гній розповсюдився у комірки соскоподібного відростка і далі ускладнився менінгітом. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?

*** А) В задню черепну ямку**

В) В крило-піднебінну ямку

С) В середню черепну ямку

Д) В передню черепну ямку

Е) В очну ямку

122. У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення слюзи. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?

*** А) Крилопіднебінний**

В) Вушний

С) Війковий

Д) Піднижньощелепний

Е) Під'язиковий

123. Хворий не може на одній половині лиця підняти брову, закрити повністю око, оголити зуби. Який нерв уражений?

*** А) Лицевий нерв**

В) Верхньощелепний

С) Очний

Д) Нижньощелепний

Е) Окоруховий

124. У хворого спостерігається асиметрія лица, особливо при спробах виконати активне скорочення м'язів лица. Про пошкодження якого нерва повинен думати лікар?

*** А) Лицевого (його рухової частини)**

- В) Трійчастого I - гілки
- С) Трійчастого II - гілки
- Д) Трійчастого III - гілки
- Е) Під'язикового

125. Дитина 5 років поступила в лор-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт). Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину ?

*** А) М'язовотрубний канал.**

- В) Каналець барабанної струни.
- С) Сонно-барабанні канальці.
- Д) Барабанний каналець.
- Е) Сонний канал.

126. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено при операції?

*** А) Ureter**

- В) Uretra
- С) Vesica urinaria
- Д) Pelvis renalis
- Е) Ren

127. Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

*** A) N. ulnaris**

B) N. radialis

C) N. medianus

D) N. musculocutaneus

E) N. cutaneus antebrachii medialis

128. У чоловіка 52-х років при піднятті надмірної ваги виникло грижове вип'ячування в здухвинній ділянці. Через яке анатомічне утворення ймовіріше всього виникло грижове вип'ячування?

*** A) Canalis inguinalis**

B) Anulus femoralis

C) Anulus umbilicalis

D) Linea alba

E) Lig. Inguinalis

129. Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер'я. Ушкодження якого з органів, що проектується в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу.

*** A) Lien**

B) Fundus ventriculi

C) Flexura coli sinistra

D) Cauda pancreatis

E) Ren sinistra

130. При огляді хворого, 32 років, відмічається диспропорційний рост скелету, збільшення понадбровних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток, стоп. Функція якої залози порушена?

*** A) Гіпофіз**

- B) Епіфіз
- C) Підшлункова
- D) Щитоподібна
- E) Надниркова

131. Внаслідок операційної травми м'яких тканин шиї справа, порушилися регулярні рухові екскурсії правого куполу діафрагми. Який з нервів нервів вірогідно постраждав?

*** A) N. phrenicus dexter.**

- B) N. intercostales.
- C) N. vagus
- D) N. accessorius
- E) Rr. dorsales nervi spinalis

132. У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?

*** A) N. facialis**

- B) N. trigeminus
- C) N. vestibulo-cochlearis
- D) N. vagus
- E) N. glossopharyngeus

133. Після травми м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з названих нервів знаходиться в зоні ушкодження?

*** A) N.ulnaris**

B) N.musculocutaneu

C) N.dorsalis scapularis

D) N.subscapularis

E) N.radialis

134. Випадково ударившись ліктем об край стола, студент відчув пекучість і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

*** A) N. ulnaris.**

B) N. radialis.

C) N. medianus.

D) N. axillaris.

E) N. musculocutaneus.

135. До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу боляча. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?

*** A) N. auricularis magnus.**

B) n.occipitalis minor.

C) Nn.supraclaviculares.

D) n.vagus.

E) n.transversus colli.

136. При оперативному втручанні в черевній порожнині хірургу необхідно проникнути в чепцеву (сальникову) сумку. Як може проникнути хірург в цю частину порожнини очеревини, не порушуючи цілісність малого чепця (сальника)?

*** А) Через чепцевий (сальниковий) отвір**

- В) Через праву біляободову борозну
- С) Через ліву біляободову борозну
- Д) Через правий брижовий синус
- Е) Через лівий брижовий синус

137. Після падіння хворий став скаржитись на неспроможність розігнути ногу у колінному суглобі. Які м'язи пошкоджено?

*** А) Чотирьохголовий**

- В) Напівсухожилковий
- С) Напівперетинчастий
- Д) Двоголовий стегна
- Е) Триголовий гомілки

138. Хворий скаржиться, на біль в яснах зубах верхньої щелепи. Про запалення якого нерва йде мова?

*** А) II гілка V пари**

- В) III гілка V пари
- С) I гілка V пари
- Д) Під'язикового
- Е) Додаткового

139. Запалення барабанної порожнини (гнойний отіт) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній до комірок?

*** А) Задню**

В) Передню

С) Медіальну

Д) Латеральну

Е) Верхню

140. Дитина 5-ти років страждає на деформацію шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, обличчя повернене вправо, пасивні рухи голови вправо обмежені. Порушення розвитку якого м'язу мало місце у цій патології?

*** А) Грудинно-ключично-соскоподібного**

В) Трапецієподібного

С) Ремінного м'язу голови

Д) Грудинно-під'язикового

Е) Довгого м'язу голови

141. У хворого порушилася робота жувальних м'язів. Який нерв пошкоджен ?

*** А) Нижньощелепний нерв**

В) Язиковий нерв

С) Вушно-скроневий нерв

Д) Щічний нерв

Е) Верхньощелепний нерв

142. Спортсмен-баскетболіст скаржиться на біль вище п'яти, що підсилюється під час ходіння. Сухожилок якого з м'язів вірогідно ушкоджено?

*** A) m.triceps surae**

B) m.tibialis posterior

C) m.flexor digitorum longus

D) m.fibularis longus

E) m.fibularis brevis

143. У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі, сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. Якого саме?

*** A) VI**

B) V

C) IV

D) III

E) II

144. У дитини природжене спастичне скорочення м'язів на одній стороні шиї, або “кровошия”. Який м'яз при цьому страждає?

*** A) Грудинноключичнососцеподібний**

B) Підшкірний

C) Грудиннопід'язичний

D) Грудиннощитоподібний

E) Лопаточнопід'язичний

145. Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого з м'язів вірогідно буде страждати?

*** A) m.masseter**

B) m.orbicularis oris

C) m.buccinator

D) m.procerus

E) m.isorius

146. Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального положення. Який із м'язів ймовірно пошкоджений?

*** A) m.deltoideus**

B) m.triceps brachii

C) m.anconeus

D) m.coracobrachialis

E) m.supinator

147. Хворий скаржиться на неможливість бічних рухів нижньої щелепи. Який з м'язів найвірогідніше ушкоджено?

*** A) m.pterygoideus lateralis**

B) m.pterygoideus medialis

C) m.buccinator

D) m.masseter

E) m.risorius

148. У хворого утруднене щільне змикання щелеп при жуванні. Відзначається часткова атрофія жувальних м'язів, що розташовані нижче скулової дуги. Гілки якого нерва іннервують вказані м'язи?

*** A) N. mandibularis**

B) N. maxillaris

C) N. alveolaris inferior

D) Nn. alveolares superiores

E) N. infraorbitalis

149. При обстеженні хворого похилого віку, був встановлений супутній діагноз “Блукаюча нирка”. Зміни в яких структурах нирки, найбільш вірогідно, призводять до цього стану?

*** A) Corpus adiposum pararenale**

B) Sinus renalis

C) Hilus renalis

D) Fascia renalis

E) Ureter

150. У хворого 16 років фурункул у ділянці крила носа праворуч. Процес ускладнився збільшенням лімфоїдних вузлів. В які лімфоїдні вузли відбувся відтік з цієї ділянки носа?

*** A) nodi lymphoidei submandibulares**

B) nodi lymphoidei occipitales

C) nodi lymphoidei mastoidei

D) nodi lymphoidei parotidei

E) nodi lymphoidei cervicalis superficialis

151. Хірург визначив, що найбільший простір для обстеження і виконання оперативних втручань на підшлунковій залозі хворого дає розтин lig. gastrocolicum. В який простір черевної порожнини при цьому потрапляє хірург?

*** А) Чепцеву сумку**

- В) Правий бічний канал
- С) Лівий бічний канал
- Д) Передшлункову сумку
- Е) Печінкову сумку

152. У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоїдітом. Надалі виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

*** А) Сигмоподібної**

- В) Нижньої кам'янистої
- С) Верхньої сагітальної
- Д) Поперечної
- Е) Прямої

153. У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення слюзи. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?

*** А) Крилопіднебінний**

- В) Вушний
- С) Війковий
- Д) Піднижньощепепний
- Е) Під'язиковий

154. У хворого 52 років раптово з'явилась асиметрія лиця. Вся уражена половина лиця непорушна, носогубна складка згладжена, очна щілина розширена; око не закривається, кут рота опущений. Вказаний синдром викликаний ураженням якого нерва ?

*** А) Лицевого.**

В) Трійчастого.

С) Язикоглоткового.

Д) Додаткового.

Е) Під'язикового.

155. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено при операції?

*** А) Ureter**

В) Uretra

С) Vesica urinaria

Д) Pelvis renalis

Е) Ren

156. При огляді хворого відмічається диспропорційний рост скелету, збільшення понадбровних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток, стоп. Функція якої залози порушена?

*** А) Гіпофіз**

В) Епіфіз

С) Підшлункова

Д) Щитоподібна

Е) Надниркова

157. До травматологічного відділення доставлено чоловіка з закритою травмою живота праворуч та підозрою на розрив печінки. В якому з приведених утворень очеревини слід чекати скопичення крові?

*** A) В прямокишково-міхуровій заглибині**

B) В верхньому клубово-сліпокишковому заутку.

C) В міжсигмовидному заутку.

D) В сальниковій сумці.

E) В лівій приободовій борозні.

158. При запаленні глибоких лімфатичних вузлів пахвової області хірург повинен був розкрити глибоко розміщений гнійник. Після операції хворий втратив здатність згинати передпліччя в ліктьовому суглобі та порушилася шкірна чутливість передньо-бічної поверхні передпліччя. Якого нерва було ушкоджено при оперативному втручанні?

*** A) N.musculocutaneus**

B) N.radialis

C) N.ulnaris

D) N.medianus

E) N.axillaris

159. Випадково ударившись ліктем об край стола, студент відчув пекучість і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

*** A) N. ulnaris**

B) N. radialis

C) N. medianus

D) N. axillaris

E) N. musculocutaneus

160. У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці таї порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації в променевій артерії). Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш ймовірна?

*** А) Здавлення підключичної артерії**

В) Здавлення пахвової артерії

С) Здавлення підключичної вени

Д) Здавлення хребтової артерії

Е) Здавлення пахвової вени

161. Хронічна нежить ускладнилася запаленням лобової пазухи. Через який носовий хід потрапила інфекція до цього синусу?

*** А) Середній**

В) Нижній

С) Загальний

Д) Верхній

Е) Носоглотковий

162. Хворому важко формувати та рухати харчову грудку, це порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стала неможливою. Яка пара черепних нервів при цьому пошкоджена?

*** А) XII**

В) V

С) IX

Д) XI

Е) VII

163. У хворого сечо-кам'яна хвороба ускладнилася виходом камінця з нирки. На якому рівні сечовода, вірогідніше всього, він може зупинитися?

*** А) На межі черевної та тазової частин**

- В) В лоханці
- С) В середній черевній частині
- Д) На 2 см вище впадіння в сечовий міхур
- Е) На 5 см вище тазової частини

164. Під час оперативного втручання у жінки виникла необхідність перев'язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев'язаним разом з нею?

*** А) Сечовід**

- В) Маткова труба
- С) Кругла зв'язка матки
- Д) Внутрішня клубова вена
- Е) Сечівник

165. Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?

*** А) Велика підшкірна вена**

- В) Мала підшкірна вена
- С) Стегнова вена
- Д) Підколінна вена
- Е) Великогомількова вена

166. У чоловіка 40 років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперив не втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?

*** А) Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка**

- В) М'ясисту оболонку
- С) Внутрішню сім'яну фасцію
- Д) М'яз підіймач яєчка
- Е) Зовнішню сі'яну фасцію

167. При онкологічному захворюванні одного з органів грудної порожнини, пухлина метастазує дуже швидко, оскільки лімфа від цього органу частіше за все відтікає одразу до грудної лімфатичної протоки. Який це орган?

*** А) Стравохід**

- В) Легені
- С) Трахея
- Д) Серце
- Е) Виличкова залоза

168. У хворої жінки 47 років при обстеженні виявлено рефлюкс (зворотній закид сечі) . У якій частині нирки розташовані гладенькі м'язи, порушення функції яких може бути причиною рефлюкса?

*** А) Calyx renalis minor**

- В) Calyx renalis major
- С) Pelvis renalis
- Д) Ductuli papillares
- Е) Capsula glomeruli

169. У хворої жінки 52-років після травми при огляді лікар констатував зниження пульсації, блідність шкіри і зниження температури в області великого пальця правої руки. Ушкодження якої з артерій верхньої кінцівки найімовірніше приводить до таких наслідків?

*** A) a. princeps pollicis**

B) a. ulnaris

C) a. radialis

D) a. digitalis communis

E) a. digitalis propria

170. У лікарню госпіталізована хвора у важкому стані з діагнозом - геморагічний інсульт в ділянці лобної долі правої півкулі головного мозку. Ушкодження якої артерії найбільш ймовірно призвело до цього стану?

*** A) Cerebri anterior.**

B) cerebri posterior.

C) communicans anterior.

D) cerebri media.

E) communicans posterior.

171. У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину перев'язує лікар для зупинки кровотечі?

*** A) Язикову артерію**

B) Дорзальну артерію язика

C) Глибокої артерії язика

D) Лицевої артерії

E) Висхідної артерії глотки

172. У лівих вентральних аферентних спиноталамічних шляхах бракує інформації від протилежної частини тіла певного сегмента. Нейрони якого ядра заднього рогу спинного мозку пошкоджені?

*** А) Власного ядра**

- В) Губчастого шару
- С) Желатинозної субстанції
- Д) Грудного ядра Кларка
- Е) Вентрального ядра

173. У хворого при неврологічному обстеженні виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?

*** А) Середня мозкова артерія**

- В) Передня мозкова артерія
- С) Задня мозкова артерія
- Д) Передня сполучна артерія
- Е) Основна артерія

174. В наслідок перенесеної хвороби у чоловіка порушено розширення голосової щілини. Який м'яз пошкоджено?

*** А) Задній персне-черпакуватий**

- В) Бічний персне-черпакуватий
- С) Персне-щитоподібний
- Д) Щито-черпакуватий
- Е) Голосовий

175. У хворой виявлено ексудативний плеврит. На якому рівні необхідно провести плевральну пункцію по задній пахвовій лінії?

*** А) IX міжреберний простір**

В) VIII міжреберний простір

С) VII міжреберний простір

Д) X I міжреберний простір

Е) VI міжреберний простір

176. У жінки 28 років виявлена позаматкова вагітність, яка ускладнилася розривом маткової труби. У який простір очеревини можливе попадання крові?

*** А) Прямокишково - матковий**

В) Міхурово - матковий

С) Правий брижовий синус

Д) Лівий брижовий синус

Е) Міжсигмовидний синус

177. У військкоматі , на УЗО-діагностиці у хлопчика 19 років було виявлено опущення нирки. На рівні яких хребців розташовані нирки в нормі?

*** А) 11 грудного та 3 поперекового**

В) 9-10 грудних

С) 4-5 поперекових

Д) 12 грудного та 1 поперекового

Е) 9-12 грудних

178. Студентка 17 років видавила гнійничок у медіальному куті ока. Через 2 дні вона поступила в інститут нейрохірургії з діагнозом тромбоз печеристої пазухи. Яким шляхом інфекція попала в цю пазуху?

- * A) Через v.angularis**
- B) Через v. maxillaris
- C) Через v. profunda faciei
- D) Через v. transversa faciei
- E) Через v. diploicae frontalis

179. Чоловік 70 років під час бриття зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 дні він був доставлений в лікарню з діагнозом запалення оболон головного мозку. Яким шляхом інфекція проникла в порожнину черепа? Через:

- * A) V. emissariae mastoideae**
- B) V.v. labyrinthi
- C) V.v. tympanicae
- D) V. facialis
- E) V.v. auriculares

180. У хворої М., 37р. в результаті попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи виник кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена трахеотомія в ділянці шиї, яка обмежена верхнім черевцем m. omohyoideus, m.sternocleidomastoideus та серединною лінією шиї. В якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

- * A) omotracheale**
- B) caroticum
- C) submandibulare
- D) omotraperoideum
- E) omoclaviculare

181. Хворий 25 років, звернувся до прийомного покою із скаргами на нежить та головний біль на протязі 4 днів. Після обстеження йому встановили діагноз 0.0. фронтит. Крізь який носовий хід інфекція потрапила до лобної пазухи?

*** А) Середній**

- В) Верхній
- С) Нижній
- Д) Загальний
- Е) Носоглотковий

182. В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може розповсюджуватись інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?

*** А) В грудну порожнину - переднє середостіння**

- В) В грудну порожнину - в середнє середостіння
- С) В грудну порожнину - в заднє середостіння
- Д) В ретровісцеральний простір
- Е) В надгрудинний міжапоневротичний простір

183. Хворий 35-ти років, звернувся до прийомного покою зі скаргами на біль та набряк в ділянці дна ротової порожнини. Після огляду, діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?

*** А) Caruncula sublingualis**

- В) Vestibulum oris
- С) Foramen caecum linguae
- Д) Plica fimbriata
- Е) Recessus gingivalis

184. До лікарні надійшов хворий з пошкодженням щоки. Протока якої слинної залози може бути ушкоджена?

*** А) Привушна**

В) Щічна

С) Піднижньощелепна

Д) Під'язикова

Е) Кутня

185. В урологічному відділенні при проведенні катетеризації уретри у чоловіка 30 років, виникло утруднення при введенні катетера [катетер вводиться наполовину]. Який відділ сечівника звужений?

*** А) Перетинчастий**

В) Передміхуровий

С) Губчастий

Д) Зовнішнє вічко

Е) Внутрішнє вічко

186. В микропрепарате спинного мозга необходимо проанализировать состояние ядра, нейроны которого образуют моторные окончания в скелетной мускулатуре. Укажите данное ядро.

*** А) Собственное ядро переднего рога.**

В) Грудное ядра.

С) Промежуточное латеральное ядро.

Д) Собственное ядро заднего рога.

Е) Собственное ядро серого вещества

187. Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри та м'язів. Які шляхи уражені?

*** А) Спіноталамічні**

- В) Латеральні спінокортикальні
- С) Медіальні спінокортикальні
- Д) Передні спіномозочкові
- Е) Задні спіномозочкові

188. У хворого відзначається різка болючість шкіри в ділянці обличчя. Який нерв уражено?

*** А) Трійчастий**

- В) Лицевий
- С) Окоруховий
- Д) Блукаючий
- Е) Язикоглотковий

189. Дитина 3-х років госпіталізована до клініки з діагнозом: отіт. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвірогідніше може потрапити гній?

*** А) В соскоподібну печеру**

- В) У внутрішнє вухо
- С) В слухову трубу
- Д) В зовнішній слуховий прохід
- Е) В задню черепну ямку

190. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Біпрогнатія**

В) Ортогнатія

С) Прямий прикус

Д) Закритий прикус

Е) Прогенія

191. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями. Контакт між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Відкритий прикус**

В) Ортогнатія

С) Прямий прикус

Д) Закритий прикус

Е) Прогенія

192. При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається повне перекриття нижніх різців верхніми (верхні різці закривають нижні). Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

*** А) Закритий прикус**

В) Прямий прикус

С) Відкритий прикус

Д) Прогенія

Е) Ортогнатія

193. Під час рентгеноскопичного дослідження органів грудної порожнини, у хворого спостерігалась нерухомість грудочеревної перепони. Який нерв пошкоджений?

*** А) Правий діафрагмальний нерв.**

- В) Правий блукаючий нерв.
- С) Правий відділ симпатичного стовбура.
- Д) Шийна петля.
- Е) Додатковий нерв.

194. Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (Дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?

*** А) Задню.**

- В) Передню.
- С) Бічну праву.
- Д) Бічну ліву.
- Е) Будь-яку.

195. Хворому 67 років для виготовлення функціонально повноцінного протеза необхідно видалити ліве верхнє ікло. Після інфраорбітальної анестезії у хворого з'явилась гематома в передній ділянці лица, яка швидко збільшувалась. Було встановлено, що травмовано артерію, яка є гілкою:

*** А) a. maxillaris**

- В) a. facialis
- С) a. temporalis superficialis
- Д) a. ophthalmica
- Е) a. labialis superior

196. Хворий 60 років при падінні отримав травму голови і був доставлений до лікарні. При обстеженні виявлена підшкірна гематома скроневої ділянки. Пошкодження якої судини призвело до появи гематоми?

*** A) a. temporalis superficialis**

B) a. maxillaris

C) a. auricularis posterior

D) a. buccalis

E) a. occipitalis

197. Стоматолог встановив, що хворий 23 років скаржиться на велику кількість слини. Стимуляція якого вегетативного вузла викликає утворення великої кількості слини серозного характеру?

*** A) ganglion oticum**

B) Ganglion pterygopalatinum

C) Ganglion ciliare

D) Ganglion submandibulare

E) Ganglion sublinguale

198. Мати привела на консультацію до стоматолога дитину з недорозвинутим язиком. Лікар встановив аплазію м'язів язика, які є похідними:

*** A) Потиличних міотомів**

B) Мезодерми верхньощелепних відростків I-ої зябрової дуги

C) Мезодерми нижньощелепних відростків I-ої зябрової дуги

D) Мезодерми III, IV зябрових дуг

E) Мезодерми II-ої зябрової дуги

199. Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз – фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?

*** А) Середньому**

- В) Верхньому
- С) Нижньому
- Д) Загальному
- Е) Над верхньою носовою раковиною

200. У хворого порушена моторна функція язика. З патологією якого нерва це пов'язано?

*** А) Під'язикового**

- В) Блукаючого
- С) Язикоглоткового
- Д) Лицевого
- Е) Додаткового

201. У хворого після простудної захворювання виникло порушення виділення слюзи. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?

*** А) Крилопіднебінний**

- В) Війчастий
- С) Вушний
- Д) Піднижньощепепний
- Е) Під'язиковий

202. Хворий потрапив у клініку з пораненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м'яза. Який нерв ушкоджено?

*** А) Діафрагмальний**

- В) Блукаючий
- С) Язикоглотковий
- Д) Під'язиковий
- Е) Шийний відділ симпатичного стовбуру

203. Після перенесеного простудного захворювання у хворого з'явилося оніміння в ділянці правої половини обличчя. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливості правої половини обличчя. Який нерв ушкоджено?

*** А) Трійчастий**

- В) Лицевий
- С) Язикоглотковий
- Д) Блукаючий
- Е) Під'язиковий

204. Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?

*** А) В середньому**

- В) В верхньому
- С) В нижньому
- Д) У загальному
- Е) В найвищому

205. Після зіштовхнення двох автомобілів у одного з водіїв відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, посилюється крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена?

*** А) Великогомілкова кістка**

В) Малогомілкова кістка

С) Стегнова кістка

Д) Наколінок

Е) Надп'яtkова кістка

206. При цистоскопії у нормі слизова оболонка сечового міхура утворює складки за винятком однієї ділянки трикутної форми, де слизова оболонка гладка. В якій частині сечового міхура знаходиться цей трикутник?

*** А) дно міхура**

В) шийка міхура

С) верхівка м

Д) тіло м

Е) перешийок м

207. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено при операції?

*** А) Ureter**

В) Pelvis renalis

С) Uretra

Д) Vesica urinaria

Е) Ren

208. У дітей часто можна спостерігати затруднене носове дихання, яке пов'язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

*** A) Tonsilla pharyngea**

B) Tonsilla palatina

C) Tonsilla lingualis

D) Tonsilla tubaria

E) Усіх названих мигдаликів

209. Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

*** A) Пазуха клиновидної кістки**

B) Сонний канал.

C) Зоровий канал.

D) Барабанна порожнина.

E) . Лицевий канал.

210. У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м'яких тканин обличчя біля кореню носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути уражена?

*** A) Печеріста пазуха**

B) Верхня сагітальна пазуха

C) Потилична пазуха

D) Сигмовидна пазуха

E) Верхня кам'яниста пазуха

211. Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок щитоподібної залози?

*** A) II- IV**

B) III-IV

C) I-II

D) IV-V

E) V-VI

212. При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив в реанімаційне відділення лікарні з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна дуга, яка лежить у:

*** A) spatium interaponeuroticum suprasternale.**

B) spatium pretracheale.

C) spatium retropharyngeale.

D) spatium interscalenum.

E) spatium antescalenum.

213. У новородженої дитини у течії першої доби педіатр помітив, що при смоктанні молока воно потрапляє у носову порожнину. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт.

*** A) Незарощення твердого склепіння**

B) Атрезія заднього проходу

C) Атрезія стравоходу

D) Заяча губа

E) Звуження стравоходу

214. У хворого 52 років раптово з'явилась асиметрія лиця. Вся уражена половина лиця непорушна, носогубна складка згладжена, очна щілина розширена; око не закривається, кут рота опущений. Вказаний синдром викликаний ураженням якого нерва ?

*** А) Лицевого.**

В) Язикоглоткового.

С) Трійчастого.

Д) Додаткового.

Е) Під'язикового.

215. Дитина, 5 років, потрапила в тяжкому стані в інфекційний відділ клінічної лікарні з діагнозом дифтерії. Для запобігання ядухи дитині провели трахеостомію, В якому трикутнику шиї проведена дана операція ?B trigonum

*** А) Omotracheale.**

В) Caroticum.

С) Omoclaviculare.

Д) Submandibulare.

Е) Omotrapezoideum.

216. Хворий 28 років на виробництві отримав хімічний опік обличчя і рідина потрапила в око. Хворий втратив зір. Яка структура очного яблука ушкоджена внаслідок хімічного опіку?

*** А) Рогівка**

В) Кришталик

С) Склисте тіло

Д) Сітківка

Е) Райдужка

217. При операції на шлунку хірург пересік ліву шлункову артерію, перев'язав її, але кров продовжувала витікати з протилежного кінця артерії. Яка артерія анастомозує з лівою шлунковою артерією?

*** А) Права шлункова артерія**

- В) Селезінкова артерія
- С) Права шлунково-чепцева артерія
- Д) Ліва шлунково-чепцева артерія
- Е) Верхня підшлунково-дванадцятипала артерія

218. У травмпункт доставлено пацієнта із кровотечею із рваної рани в ділянці кута рота. Цілісність якої артерії порушена?

*** А) лицевої.**

- В) верхньощелепної.
- С) язикової.
- Д) передньої верхньої коміркової.
- Е) підочноямкової.

219. До ЛОР-лікаря звернулася жінка зі скаргами на порушення нюху. Під час огляду виявлено атрофічні зміни regio olfactoria слизової оболонки носової порожнини. Де вона знаходиться?

*** А) В ділянці верхнього носового ходу**

- В) В ділянці середнього носового ходу
- С) В ділянці нижнього носового ходу
- Д) В ділянці загального носового ходу
- Е) -

220. Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі.

Порушення функцій якого з основних м'язів може це спричинити?

*** A) m. triceps brachii**

B) m. subscapularis

C) m. teres major

D) m. infraspinatus

E) m. levator scapulae

221. Хворому проведено лобектомію правої середньої частки легені. Які сегменти були ураженні?

*** A) Бічний та присередній**

B) Верхівковий, передній

C) Присередній і передній основні

D) Задній і бічний основні

E) Верхівково-задній та передній

222. Хворий госпіталізований з травмою медіальної групи м'язів стегна. Які види рухів не зможе робити хворий?

*** A) приведення стегна**

B) відведення стегна

C) згинання стегна

D) розгинання стегна

E) супінацію стегна

223. Внаслідок отриманої травми хворий не може рухати язиком вперед і вниз. Який з перелічених м'язів постраждав?

*** А) Підборідно-язиковий м'яз**

- В) Шило-під'язиковий м'яз
- С) Під'язиково-язиковий м'яз
- Д) Верхній поздовжній м'яз
- Е) Нижній поздовжній м'яз

224. Хворий звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об'єктивно - у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

*** А) Глотковий отвір слухової труби**

- В) Барабанний отвір слухової труби
- С) Хоани
- Д) Зів
- Е) Вхід до гортані

225. В дитини фарингіт (запалення слизової оболонки глотки) ускладнився запаленням середнього вуха. Через яке анатомічне утворення сталося розповсюдження запального процесу на середнє вухо?

*** А) Глотковий отвір слухової труби**

- В) Півканал слухової труби
- С) Півканал м'яза-натягувача барабанної перетинки
- Д) Каналець барабанної струни
- Е) М'язово-трубний канал

226. До ЛОР-лікаря звернувся хворий зі скаргами на зміну голосу. При обстеженні виявлено пухлину в межах заднього відділу rima vocalis. Між якими з хрящів гортані розташований цей відділ?

*** A) Cartilago arytenoidea**

B) Cartilago cricoidea

C) Cartilago thyroidea

D) Cartilago corniculata

E) Cartilago cuneiformis

227. У хворого з порушенням згортання крові виявлений тромбоз однієї з гілок нижньої брижової артерії. Який відділ кишечника вражений?

*** A) Colon sigmoideum**

B) Ileum

C) Caecum

D) Colon transversum

E) Colon ascendens

228. Хворий госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?

*** A) Виростковий канал**

B) Тім'яний отвір

C) Круглий отвір

D) Остистий отвір

E) Овальний отвір

229. Хвора звернулася зі скаргами на неможливість зводити і розводити пальці кисті. Які м'язи втратили свою функцію?

*** А) міжкісткові**

- В) червоподібні
- С) поверхневий згинач пальців
- Д) глибокий згинач пальців
- Е) розгинач пальців

230. Хворий госпіталізований з приводу крововиливу в головний мозок. Після огляду виявлено, що місце крововиливу локалізоване на верхньо-латеральній поверхні півкуль. Яка судина, що живить цю ділянку мозку, пошкоджена?

*** А) середня мозкова артерія**

- В) передня мозкова артерія
- С) верхня мозочкова артерія
- Д) передня сполучна гілка
- Е) задня сполучна гілка

231. Хворого госпіталізовано з підозрою на пухлину простати. Під час операції виявлено, що пухлина “проросла” до сечового міхура. Який відділ сечового міхура постраждав?

*** А) Шийка**

- В) Верхівка
- С) Дно
- Д) Тіло
- Е) -

232. У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?

- * А) Піхвова**
- В) М'ясиста
- С) Білкова
- Д) Зовнішня сім'яна
- Е) Внутрішня сім'яна

233. У хворого встановлено параліч мимічних та жувальних м'язів. Гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях ушкоджено?

- * А) Tr. cortico-nuclearis.**
- В) Tr. cortico-spinalis.
- С) Tr. cortico-thalamicus.
- Д) Tr. cortico-fronto-pontinus.
- Е) Tr. cortico-temporo-parieto-occipito-pontinus.

234. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на затруднення рухів язика. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що у хворої є крововплив в нижньому відділі довгастого мозку. Про пошкодження якого ядра довгастого мозку у хворої можна думати?

- * А) Ядра під'язикового нерва.**
- В) Нижнього слиновидільного ядра.
- С) Ядра додаткового нерва.
- Д) Подвійного ядра.
- Е) Поодинокого ядра

235. У хворого 12-річного хлопчика виникають тетанічні судороги. Функція яких залоз може бути порушена в цьому випадку?

*** A) Glandulae parathyroidae**

B) Hypophysis

C) Glandula thyroidea

D) Thymus

E) Glandula pinealis

236. У хворі встановлено порушення відділення тіреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої частки гіпофіза лікар має діло?

*** A) Lobus anterior**

B) Infundibulum

C) Lobus posterior

D) Pars intermedia

E) -

237. У хворого лікар виявив накопичення рідини в плевральній порожнині справа над куполом діафрагми. У якому анатомічному утворі накопичилась рідина?

*** A) Реброво - діафрагмальному правому синусі**

B) Реброво - діафрагмальному лівому синусі

C) Реброво - середостінному синусі

D) Діафрагмально-середостінному синусі

E) -

238. Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта порушена смакова чутливість передніх 2/3 язика та слиновиділення. Травмою якого нерва це викликано?

*** А) Барабанної струни**

- В) Великого кам'янистого нерва
- С) Малого кам'янистого нерва
- Д) Глибокого кам'янистого нерва
- Е) Під'язикового нерва

239. У хворого діагностовано кореневу кісту, яка проросла у носову порожнину. Який зуб імовірно уражений?

*** А) Верхній медіальний різець**

- В) Верхнє ікло
- С) Верхній латеральний різець
- Д) Верхній перший премолар
- Е) Верхній перший моляр

240. При втручанні з метою лікування вивіху нижньої щелепи, лікар повинен пам'ятати про м'яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижнещелепного суглобу. Який це м'яз?

*** А) M. pterygoideus lateralis**

- В) M. masseter
- С) M. pterygoideus medialis
- Д) M. temporalis
- Е) M. mylohyoideus

241. Одним із методів зняття гострого болю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в кінці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулення першої гілки трійчастого нерва?

*** А) Надочномковий край**

- В) Підочномковий край
- С) Орбітальний край виличної кістки
- Д) Ділянка лобного відростка верхньої щелепи
- Е) Ділянка надперенісся

242. До лікаря звернувся чоловік зі скаргами на зміну голосу. При обстеженні було виявлено порушення іннервації м'язів, що впливають на розширення та звуження голосової щілини. Яким нервом вони іннервуються?

*** А) N. laryngeus inferior**

- В) N. laryngeus superior
- С) N. laryngeus internus
- Д) N. accessorius
- Е) N. glossopharyngeus

243. При туберальній анестезії голку просують до задньо-зовнішньої поверхні горбика верхньої щелепи і вводять анестетик. Які нерви при цьому знечуюються?

*** А) r.r. alveolaris superiores posteriores**

- В) r.r. alveolaris superiores anteriores
- С) r. alveolaris superior medius
- Д) n. maxillaris
- Е) n. infraorbitalis

244. Хворому проведена анестезія у ділянці горба верхньої щелепи. При цьому в нього почало спостерігатися зменшення виділення слюзи і сухість кон'юнктиви. Який вегетативний вузол голови знеболено?

*** А) крило-піднебінний**

- В) вушний
- С) війчастий
- Д) піднижньощелепний
- Е) під'язиковий

245. Хвора госпіталізована до лікарні з діагнозом плеврит. В якому місці плевральної порожнини міститься найбільша кількість ексудату?

*** А) Реберно-діафрагмальний синус**

- В) Діафрагмально-медіастинальний синус
- С) Реберно-медіастинальний синус
- Д) Під куполом плеври
- Е) Під коренем легенів

246. Коронка видаленого зуба має овальну форму, 2 горбика на жувальній поверхні, верхівка кореня подвоєна. Визначте який зуб видалено.

*** А) Верхній 1-й малий кутній зуб**

- В) Верхній 2-й малий кутній зуб
- С) Нижній 1-й малий кутній зуб
- Д) Нижній 2-й малий кутній зуб
- Е) Верхнє ікло

247. Пацієнту, що звернувся до стоматолога, необхідно видалити нижнє праве ікло. Який нерв забезпечує іннервацію цього зуба?

*** А) Нижній комірковий нерв**

В) Підборідний нерв

С) Язиковий нерв

Д) Піднебінні нерви

Е) Щічний нерв

248. Під час резекції язика хірург-стоматолог накладає зажими на основу язика. Яка артерія при цьому перетискається?

*** А) Глибока артерія язика**

В) Язикова артерія

С) Під(язикова артерія

Д) Висхідна піднебінна артерія

Е) Низхідна піднебінна артерія

249. Під час операції у чоловіка на пахвинному каналі, з приводу грижі, хірург пошкодив його вміст. Визначте, що пошкодив хірург.

*** А) Funiculus spermaticus**

В) Urachus

С) Lig. teres uteri

Д) Lig. inguinale

Е) -

250. В ведділення черепно-мозкової травми потрапив хворий з пошкодженням великого крила клиноподібної кістки. Лінія перелому пройшла через остистий отвір. Яка судина постраждала?

- * A) Середня оболонна артерія**
- B) Поверхнева скронева артерія
- C) Латеральна крилоподібна артерія
- D) Передня глибока скронева артерія
- E) Задня глибока скронева артерія

251. У хворого у результаті травми порушена чутливість верхньої губи й крила носа. Який нерв, найвірогідніше, ушкоджений?

- * A) n. infraorbitalis**
- B) n. frontalis
- C) n. nasociliaris
- D) n. buccalis
- E) n. mandibularis

252. У потерпілого в результаті травми чоловіка порушена функція всіх жувальних м'язів. Який нерв найвірогідніше ушкоджений?

- * A) n. mandibularis**
- B) n. maxillaries
- C) n. buccalis
- D) n. ophtalmicus
- E) n. facialis

253. При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи, лікар повинен пам'ятати про дію м'язу, задні пучки якого тягнуть назад висунуту нижню щелепу. Про який з м'язів йде мова?

*** A) M. temporalis**

B) M. masseter

C) M. pterygoideus medialis

D) M. pterygoideus lateralis

E) M. mylohyoideus

254. У хворого при обстеженні було виявлено зміну секреторної функції привушної слинної залози, що пов'язане з порушеннями її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?

*** A) Ganglion oticum**

B) Ganglion ciliare

C) Ganglion pterygopalatinum

D) Ganglion submandibulare

E) Ganglion sublinguale

255. У хворого виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який з нервів забезпечує її вегетативну іннервацію ?

*** A) Chorda tympani**

B) N. auriculotemporalis

C) N. mandibularis

D) N. petrosus major

E) N. petrosus minor

256. Хворий скаржиться на біль та оніміння у слизовій ясен верхньої щелепи. Які нерви вражені?

*** А) Верхні коміркові нерви**

- В) Нижні коміркові нерви
- С) Величні нерви
- Д) Вузлові нерви
- Е) Підчочномкові нерви

257. При огляді новонародженої дитини педіатр виявив наявність в ротовій порожнині нижніх центральних різців. В якому віці вони прорізуються в нормі?

*** А) В 6 -8 місяців**

- В) До народження
- С) Протягом першого місяця життя
- Д) В 10 - 12 місяців
- Е) До 2 -х років

258. У пацієнта вилучений верхній медіальний різець. Гілки якої артерії його кровопостачають?

*** А) A.infraorbitalis**

- В) A.buccalis
- С) A.palatina descendens
- Д) A.sphenopalatina
- Е) A.alveolaris inferior

259. Хворий скаржиться на біль та набряк в ділянці дна порожнини рота. Після огляду діагностовано запальний процес в місці виходу вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Яке анатомічне утворення запалене?

*** A) Caruncula sublingualis**

B) Frenulum labii superioris

C) Frenulum labii inferioris

D) Frenulum linguae

E) -

260. У хворого вилучений зуб, у якого коронка овальної форми, на жувальній поверхні два горбки. Корінь сильно здавлений у мезіо-дистальному напрямку, його верхівка роздвоєна. Визначте який зуб вилучений.

*** A) Перший верхній премоляр**

B) Перший нижній премоляр

C) Ікло

D) Другий верхній премоляр

E) Другий нижній премоляр

261. При рентгенологічному дослідженні гайморових пазух установлене проростання кореня зуба в їхню порожнину. Визначте який зуб міг прорости?

*** A) Верхнє ікло**

B) Перший верхній премоляр

C) Другий верхній премоляр

D) Перший верхній моляр

E) Другий верхній моляр

262. Внаслідок травми у хворого спостерігається порушення функції слізної залози. Який нерв забезпечує її секрецію?

- * A) N. petrosus major**
- B) N. petrosus minor
- C) Chorda tympany
- D) N. auricularis magnus
- E) N. occipitalis minor

263. Хворого після автомобільної аварії госпіталізовано з масивною кровотечею з м'яких тканин обличчя. Яку артерію треба притиснути щоб зупинити кровотечу?

- * A) Лицеву**
- B) Язикову
- C) Підключичну
- D) Верхньощелепну
- E) Внутрішню сонну

264. У хворого при обстеженні слюзового апарату було встановлено зміни секреторної функції слюзової залози, що пов'язано з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?

- * A) Ganglion pterygopalatinum**
- B) Ganglion ciliare
- C) Ganglion oticum
- D) Ganglion submandibulare
- E) -

265. Лікарю необхідно знеболити передній відділ слизової оболонки твердого піднебіння. Блокаду яких нервів йому потрібно зробити?

*** А) Носо-піднебінних нервів**

В) Нижніх коміркових нервів

С) Величких нервів

Д) Глоткових нервів

Е) Підчонамкових нервів

266. У хворого після видалення нижнього першого премоляру виникла кровотеча із комірки. Яка артерія зумовила кровотечу?

*** А) Нижня коміркова артерія.**

В) Підборідна артерія.

С) Поперечна артерія обличчя.

Д) Язикова артерія.

Е) Щічна артерія.

267. При томографічному обстеженні хворого було встановлено ушкодження ділянки, що має назву trigonum lemnisci. Якому з провідних шляхів належить ця ділянка?

*** А) Слуховому шляху**

В) Зоровому шляху

С) Tr. Frontopontinus

Д) Tr. Tectospinalis

Е) Tr. Reticulospinalis

268. Уразі пухлини в ділянці верхніх горбків чотиригорбкової пластинки сталося випадіння зіничного рефлексу. Функція якого ядра черепних нервів вірогідніше всього порушена?

*** А) Додаткового ядра окорухового нерва**

В) Рухового ядра окорухового нерва

С) Рухового ядра відвідного нерва

Д) Рухового ядра блокового нерва

Е) Рухового ядра додаткового нерва

269. При огляді порожнини рота пацієнта стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні першого верхнього моляра, яка звернена до другого моляра. Яка поверхня зуба уражена?

*** А) Дистальна**

В) Мезіальна

С) Язична

Д) Жувальна

Е) Вестибулярна

270. Оглядаючи хворого лікар запропонував йому показати язик, висунувши його з рота. Скорочення якого м'яза висовує язик з рота вперед?

*** А) M. genioglossus.**

В) M. longitudinalis superior.

С) M. hyoglossus.

Д) M. styloglossus.

Е) M. longitudinalis inferior.

271. У пацієнта після оперативного втручання на щитоподібній залозі з'явилась осиплість голосу. Який нерв був ушкоджений під час операції?

*** A) n.laryngeus recurrens**

B) n.laryngeus superior

C) n.glossopharyngeus

D) n.hypoglossus

E) n.accessorius

272. У хворого розвинувся птоз (опущення верхньої повіки). Ураження якого нерва має місце?

*** A) Окоруховий**

B) Лицевий.

C) Трійчастий.

D) Блоковий.

E) Відвідний.

273. При виконанні операції хірургу необхідно виділити переддрабинчастий простір. Яка структура утворює границю цього простору позаду ?

*** A) M.scalenus anterior**

B) M. scalenus medius

C) M. scalenus posterior

D) M. longus colli

E) M. longus capitis

274. Хворому поставлено діагноз – крововилив в ділянці бічної борозни мозку. В якій артерії порушений кровоток?

*** A) cerebri media**

- B) communicans anterior
- C) cerebri posterior
- D) cerebri anterior
- E) communicans posterior

275. При огляді ротової порожнини хворого лікар виявив почервоніння слизової оболонки кореня язика, піднебінної завіски, піднебінно-язикових дужок. Межі якого анатомічного утворення запалені?

*** A) Зів**

- B) Язиковий мигдалик
- C) Глотковий мигдалик
- D) Піднебінні мигдалики
- E) Трубні мигдалики

276. У хворого - запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?

*** A) Foramen sphenopalatinum.**

- B) Foramen rotundum.
- C) Canalis palatinus major.
- D) Canalis palatinus minor.
- E) Canalis pterygoideus.

277. У хворого - запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в середню черепну ямку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?

- * A) Foramen rotundum.**
- B) Foramen sphenopalatinum.
- C) Canalis palatinus major.
- D) Canalis palatinus minor.
- E) Canalis pterygoideus.

278. Хворий скаржиться на утруднення щільного змикання щелеп при жуванні. Встановлено атрофію жувальних м'язів. Функція якого нерва порушена?

- * A) N. trigeminus**
- B) N. glossopharyngeus
- C) N. facialis
- D) N. vagus
- E) N. ophtalmicus

279. Хворий скаржиться на підвищену больову чутливість задньої третини язика, також на порушення смаку в цій ділянці язика. Ураження якого нерва має місце?

- * A) Язикоглоткового**
- B) Лицевого
- C) Трійчастого
- D) Додаткового
- E) Під'язикового

280. Щоб запобігти великої кровотечі під час операції в області дна ротової порожнини необхідно перев'язати артерію, яка пролягає у трикутнику Пирогова. Назвіть цю артерію.

*** А) Язикова артерія**

- В) Верхня щитоподібна артерія
- С) Лицева артерія
- Д) Висхідна глоткова артерія
- Е) Верхньощелепна артерія

281. У постраждалого при обстеженні виявлений розрив капсули скронево-нижньощелепного суглоба в місці її прикріплення на нижній щелепі. Визначте місце розрива.

*** А) Шийка нижньої щелепи**

- В) Вінцевий відросток
- С) Головка нижньої щелепи
- Д) Гілка нижньої щелепи
- Е) Кут нижньої щелепи

282. У хворого порушена функція м'язів гомілки. Він не може утримати своє тіло піднявшись навшпиньки. Функція якого м'яза постраждала?

*** А) M. triceps surae**

- В) M. tibialis posterior
- С) M. extensor digitorum longus
- Д) M. flexor digitorum longus
- Е) M. tibialis anterior

283. У травмованого кровотеча з рани позаду соскоподібного відростка. Яка артерія ушкоджена?

*** A) occipitalis**

B) facialis

C) carotis externa

D) temporalis superficialis

E) meningeal media

284. У дитини в результаті травми щоки відбулося нагноєння жирової клітковини щоки. В подальшому процес розповсюдився у ділянку латеральної поверхні глотки. Вздовж якої фасції розповсюдився гній?

*** A) Щічно - глоткової**

B) Сконевої

C) Жувальної

D) Привушної

E) -

285. Після отриманої травми хворий не може змістити нижню щелепу в бік, та не може висунути її вперед. Функція яких м'язів ймовірно була пошкоджена?

*** A) Бічних крилоподібних**

B) Сконевих

C) Жувальних

D) Щелепно-під'язикових

E) Щічних

286. При обстеженні хворого виявлено відхилення язика в бік, атрофічні зміни половини язика, порушення мови, ускладнене ковтання. Який нерв пошкоджений?

*** А) під'язиковий**

В) Язикоглотковий

С) Блукаючий

Д) Додатковий

Е) Трійчастий

287. У хворого на остеомієліт нижньої щелепи виявлені ознаки пошкодження plexus dentalis inferior і порушення іннервації зубів і ясен нижньої щелепи. Гілками якого нерва воно утворене?

*** А) N. alveolaris inferior**

В) N. maxillaris

С) N. lingualis

Д) N. buccalis

Е) N. facialis

288. З травмою в ділянці шиї до відділення хірургічної стоматології потрапив хворий чоловік з розривом arcus venosus jugulae, яка знаходиться в spatium:

*** А) Interaponeuroticum suprasternale**

В) Interscalenum

С) Antescalenum

Д) Retropharyngeale

Е) Previscerale

289. Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

*** А) Пазуха клиновидної кістки**

- В) Сонний канал
- С) Зоровий канал
- Д) Барабана порожнина
- Е) Лицевий канал

290. До відділення поступив пацієнт з переломом кута нижньої щелепи. В результаті пошкодження якої артерії виникає гематома в ділянці перелому?

*** А) Нижньої коміркової**

- В) Язикової.
- С) Лицевої
- Д) Верхньощелепної
- Е) Внутрішньої сонної

291. Яка артерія може бути пошкоджена при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?

*** А) Нижня альвеолярна артерія**

- В) Щічна артерія
- С) Язикова артерія
- Д) Крилоподібні гілки
- Е) Середня оболонна артерія

292. Лікар виконує передній серединний розтин шиї для термінової трахеотомії. Про можливе пошкодження якої судини повинен пам'ятати лікар?

*** A) arcus venosus juguli**

- B) V.jugularis externa
- C) V.jugularis interna
- D) V.facialis
- E) V.thyroidea media

293. У хворого перелом основи черепа спереду від великого потиличного отвору. Частина якої кістки травмована?

*** A) pars basilaris ossis occipitalis**

- B) pars lateralis ossis occipitalis
- C) pars squamosa ossis occipitalis
- D) pars squamosa ossis temporalis
- E) pars petrosa ossis temporalis

294. В хірургічне відділення стоматології поступила жінка з флегмоною передньої ділянки шиї, яка розміщується в області сонного трикутника. Яким м'язом обмежена задня стінка цього трикутника?

*** A) Грудинно-ключично-соскоподібним**

- B) Щито-під'язиковим
- C) Грудинно-під'язиковим.
- D) Лопатково-під'язиковим
- E) Грудинно-щитоподібним.

295. При обробці фрезою великого кутнього зуба стоматолог інструментом, що зірвався, глибоко поранив щоку, пошкодивши при цьому не лише слизову оболонку але й м'яз. Який?

*** А) Щічний.**

- В) Великий виличний м'яз.
- С) Жувальний.
- Д) Коловий м'яз рота.
- Е) Щелепно – під'язиковий м'яз.

296. Мати з дитиною 2-х років звернулась до педіатра. Яка кількість молочних зубів має бути у цієї дитини?

*** А) 20**

- В) 18
- С) 16
- Д) 10
- Е) 8

297. Для вправлення вивиху нижньої щелепи необхідно відтягнути її донизу. Яка анатомічна структура обумовлює таку дію?

*** А) Суглобовий горбок скроневої кістки**

- В) Виростковий відросток нижньої щелепи
- С) Нижньощелепна ямка скроневої кістки
- Д) Нижньощелепна вирізка
- Е) Вінцевий відросток нижньої щелепи

298. Під час огляду ротової порожнини дитини встановлена неможливість висувати язик вперед за межі порожнини рота. Який м'яз язика ушкоджений?

*** А) Підборідно-язиковий м'яз.**

В) Під'язиково-язиковий м'яз.

С) Шило-язиковий м'яз.

Д) Верхній поздовжній м'яз.

Е) Нижній поздовжній м'яз.

299. Хворий звернувся до лікаря з гострим зубним болем в нижньому лівому іклі. Поставлено діагноз - пульпіт. Який нерв забезпечує чутливість цього зуба?

*** А) Нижній комірковий**

В) Верхній комірковий

С) Піднебінний

Д) Виличний

Е) Лицевий

300. При огляді порожнини рота лікар виявив каріозну порожнину на поверхні першого малого кутнього зуба, зверненої до ікла. Як називається уражена поверхня коронки?

*** А) Facies mesialis**

В) Facies distalis

С) Facies vestibularis

Д) Facies lingualis

Е) Facies occlusalis