

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

2 Акушерські кровотечі"

Категорія: **Акушерство і гінекологія**

Кількість запитань: **45**

1. "При гіпотонії матки кровотеча починається:"
2. "Причиною маткових кровотеч у післяпологовому періоді НЕ буває:"
3. "Кровотеча при гіпотонії матки проявляється:"
4. "Кровотеча при затримці в матці частин плаценти характеризується:"
5. "Характеристика матки при гіпотонічній і атонічній кровотечі:"
6. "При кровотечі в ранньому післяпологовому періоді необхідно зробити:"
7. "Перша допомога при кровотечі в ранньому післяпологовому періоді передбачає:"
8. "Післяпологовий гемостаз забезпечують наступні фактори:"
9. "Діагноз затримки в матці додаткової дольки плаценти встановлюють по:"
10. "У пізньому післяпологовому періоді затримку плацентарної тканини в матці можна діагностувати:"
11. "Кровотеча в ранньому післяпологовому періоді:"
12. "Після огляду пологових шляхів, при кровотечі в ранньому післяпологовому періоді необхідно зробити:"
13. "При кровотечі на 6-й день післяпологового періоду необхідно зробити:"
14. "При кровотечі в ранньому післяпологовому періоді доцільно застосовувати:"
15. "Заходи по боротьбі з кровотечею в ранньому післяпологовому періоді починають при крововтраті:"

16. "Для профілактики пізніх післяпологових кровотеч необхідно призначати:"
17. "При крововтраті 900-1000 мл і безуспішності зовнішньо-внутрішнього масажу матки та введення утеротоніків у ранньому післяпологовому періоді необхідно:"
18. "Емболія амніотичними водами пов'язана з:"
19. "Причини, які підвищують внутрішньоматковий тиск:"
20. "Емболія амніотичними водами пов'язана з:"
21. "Причини, які викликають зіяння маткових судин:"
22. "Емболія амніотичними водами супроводжується:"
23. "Клінічні ознаки емболії амніотичними водами:"
24. "Рентгенологічні ознаки емболії амніотичними водами:"
25. "Лабораторні ознаки емболії амніотичними водами:"
26. "ЕКГ-ознаки емболії амніотичними водами:"
27. "Невідкладна допомога при емболії амніотичними водами надається:"
28. "Перші етапи надання допомоги при емболії амніотичними водами:"
29. "Очікувані вторинні ускладнення при емболії амніотичними водами:"
30. "Першочергові заходи при емболії амніотичними водами:"
31. "Заходи інтенсивного нагляду при емболії амніотичними водами:"

32. "Критерії ефективності інтенсивної терапії при емболії амніотичними водами:"
33. "Шоковий індекс Альговера це:"
34. "Нормальні показники індексу Альговера:"
35. "Індекс Альговера залежить від:"
36. "Об'єм інфузійно-трансфузійної терапії залежить від:"
37. "Об'єм крововтрати визначається за наступними ознаками:"
38. "Інфузійна терапія при акушерських кровотечах включає:"
39. "Трансфузійна терапія при акушерських кровотечах включає:"
40. "Клінічна значимість артеріальної гіпотензії при геморагічному шоці:"
41. "До критеріїв тяжкості геморагічного шоку відносяться наступні показники:"
42. "При кровотечі, що зумовлена затримкою в матці плаценти, що відокремилася, доцільно виконати прийом:"
43. "Гіпотонічна кровотеча спостерігається при кесарському розтині:"
44. "У породіллі з масивною гіпотонічною кровотечею виявлено: афібриногенемія, відсутність утворення згустку, високий фібріноліз. Про яке ускладнення гіпотонічної кровотечі йдеться?"
45. "При гіпотонічній кровотечі, що ускладнилася розвитком ДВЗ-синдрому, встановлено відсутність згортання крові. Якому рівню фібріногену відповідає ця клінічна ситуація?"