

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

3 Інфузійна та трансфузійна терапія в акушерстві"

Категорія: **Акушерство і гінекологія**

Кількість запитань: **42**

1. "Для відновлення ОЦК доцільно застосовувати інфузію:"
2. "При збереженні консервованої крові:"
3. "При збереженні консервованої крові:"
4. "Синдром масивних гемотрансфузій розвивається:"
5. "Синдром масивних гемотрансфузій - наслідок:"
6. "Синдром масивних гемотрансфузій є проявом:"
7. "При гемотрансфузії негативний вплив консерванту нейтралізує:"
8. "Профілактика синдрому масивних гемотрансфузій:"
9. "Еритроцитарна маса:"
10. "Поліглюкін - це:"
11. "Об'єм інфузійно-трансфузійної терапії залежить від:"
12. "Трансфузійна терапія включає:"
13. "Інфузійна терапія при акушерських кровотечах включає:"
14. Поліглюкін:
15. "Поліглюкін при введенні 25 мл/кг маси:"
16. "Кристалοїдні плазмозамінники:"
17. "Кристалοїдні плазмозамінники:"
18. "Передозування кристалοїдних плазмозамінників призводить до:"

- 19. Альбумін:
- 20. Альбумін:
- 21. "Відновити об'єм інтерстиціальної рідини можна інфузією:"
- 22. "Поліпшують реологічні властивості крові:"
- 23. "Водно-електролітний склад крові відновлюють"
- 24. "Розвитку ГНН сприяє передозування:"
- 25. Неогемодез:
- 26. Желатиноль:
- 27. Реоглюман:
- 28. Поліфер:
- 29. "Колоїдні плазмозамінники:"
- 30. "Кристалоїдні плазмозамінники:"
- 31. Декстрини:
- 32. "Декстрини в дозі 10-15 мл/кг маси підсилюють:"
- 33. "Декстрини зменшують:"
- 34. "Препаратами крові вважаються:"
- 35. "Нормалізують гіпопротеїнемію:"
- 36. "Дезінтоксикації організму сприяють:"

37. "Відновлення глобулярного об'єму крові забезпечують:"

38. "Найбільш важкою реакцією на переливання несумісної крові, від якої хвора помирає протягом 2-6 днів, є:"

39. "При трансфузійній гемолітичній реакції спостерігається:"

40. "Тривалість життя тромбоцитів після трансфузії складає в середньому:"

41. "Колоїдні плазмозамінники діють за допомогою:"

42. "Для хвороби Верльгофа характерно:"