

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

8 Екстрагенітальна патологія і вагітність"

Категорія: **Акушерство і гінекологія**

Кількість запитань: **49**

1. "Збереження вагітності протипоказане при:"
2. "Синдром нижньої порожнистої вени виникає:"
3. "Принципи лікування набряку легень у вагітних:"
4. "Вагітних із захворюванням серця варто ретельно обстежити:"
5. "В II-й половині вагітності частота пульсу у жінок:"
6. "Норма ЦВТ у III триместрі вагітності:"
7. "Синдром нижньої порожнистої вени супроводжується:"
8. "Протипоказання до продовження вагітності при гіпертонічній хворобі:"
9. "Скорочення II періоду пологів шляхом операції накладення акушерських щипців показане при:"
10. "Гіпертонічну хворобу у вагітних варто диференціювати з:"
11. "Вкажіть можливі симптоми недостатності кровообігу у вагітних із захворюванням серця:"
12. "Набряк легенів може розвинути у вагітної, яка страждає:"
13. "Декомпенсації серцевої діяльності у вагітних із захворюваннями серця сприяють:"
14. "У пологах і ранньому післяпологовому періоді декомпенсація серцевої діяльності в жінок із захворюваннями серця може наступити в результаті:"
15. "Навантаження на серце у вагітних підвищена внаслідок:"

16. "Декомпенсація серцевої діяльності у вагітних із захворюваннями системи кровообігу частіше настає:"
17. "Систолічні шуми, що вислуховуються у вагітних обумовлені:"
18. "Під час перейм ударний об'єм серця збільшується на:"
19. "Якщо жінка до вагітності страждала артеріальною гіпотонією, на гестаційну гіпертонію вказує:"
20. "Підвищення АТ у вагітних НЕ може бути обумовлено:"
21. "Артеріальна гіпертонія НЕ сприяє розвитку:"
22. "Гіпертонічна хвороба у вагітних частіше ускладнюється появою пізнього гестозу:"
23. "При II стадії гіпертонічної хвороби у вагітних на відміну від важкої прееклампсії відсутні:"
24. "Вагітність протипоказана при гіпертонічній хворобі:"
25. "При вагітності в паренхімі нирок відбуваються зміни:"
26. "При вагітності в сечовивідних шляхах:"
27. "Зміни в сечовивідних шляхах при фізіологічній вагітності можуть сприяти:"
28. "При вагітності нирковий кровообіг:"
29. "Пієлонефрит у вагітних частіше розвивається:"
30. "Неефективна терапія гострого пієлонефриту в II половині вагітності протягом 5-7 днів при постійному погіршенні стану вимагає:"

31. "Виявлення при бакдослідженні сечі більш 104 мікробних тіл без клінічних проявів у вагітної вимагає:"
32. "Хронічний гломерулонефрит характеризують наступні показники досліджуваної сечі:"
33. "Форма гломерулонефриту, що найбільш часто зустрічається під час вагітності:"
34. "Ускладнення вагітності, пов'язане з хронічним гломерулонефритом:"
35. "Вагітність категорично протипоказана при:"
36. "Для лікування гострого пієлонефрита в I триместрі вагітності застосовують:"
37. "Збудниками пієлонефриту частіше є:"
38. "Про ураження якого органу свідчить наявність еритроцитів у I порції сечі при трьохсклянковій пробі:"
39. "Про ураження якого органу свідчить наявність еритроцитів у I і II порціях сечі при трьохсклянковій пробі:"
40. "Про ураження якого органу свідчить наявність еритроцитів у всіх 3-х порціях сечі при трьохсклянковій пробі:"
41. "До симптомів гострого пієлонефриту відноситься:"
42. "Гострий пієлонефрит у вагітних слід диференціювати з:"
43. "Для гострого пієлонефриту характерно:"

44. "Вагітні з пієлонефритом складають групу високого ризику по виникненню ускладнень:"

45. "Антибактеріальну терапію гострого пієлонефриту у вагітних проводять:"

46. "Для нефротичної форми гломерулонефриту характерно:"

47. "Для гіпертонічної форми гломерулонефриту характерно:"

48. "Вагітних із хронічним гломерулонефритом лікують:"

49. "Показання для переривання вагітності при сечокам'яній хворобі:"