

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

9 Фізіологія та патологія дитинства, періоду статевого дозрівання"

Категорія: **Акушерство і гінекологія**

Кількість запитань: **124**

1. "Період дитинства у дівчинки продовжується:"
2. "Період новонародженості продовжується:"
3. "Рівень статевих гормонів в організмі дівчинки 7 років:"
4. "У періоді дитинства у дівчинки:"
5. "Епітелій піхви у періоді дитинства:"
6. "Пубертатний період у дівчинки продовжується:"
7. "У першу фазу пубертатного періоду (10-13 років) у дівчинки:"
8. "У другу фазу пубертатного періоду (14-17 років) у дівчинки:"
9. "У другу фазу пубертатного періоду (14-17 років) у дівчинки:"
10. "Передчасне статеве дозрівання:"
11. "Яєчникова форма помилкового передчасного статевого дозрівання:"
12. "При церебральній та конституційній формах помилкового передчасного статевого дозрівання необхідно:"
13. "При яєчниковій формі помилкового передчасного статевого дозрівання необхідно:"
14. "Які твердження відповідають дійсності? Гетеросексуальне передчасне статеве дозрівання (вроджений АГС):"
15. "Прояви естрогенного впливу в новонародженій:"
16. "У періоді дитинства:"

17. "Пубертатний період:"
18. "Час настання і хід статевого дозрівання залежить від:"
19. "Менархе настає:"
20. "Ювенільна кровотеча - це:"
21. "Причини ювенільних кровотеч:"
22. "Ювенільні кровотечі настають внаслідок:"
23. "Для ювенільних кровотеч характерно:"
24. "Хірургічний гемостаз при ювенільних кровотечах необхідно проводити:"
25. "При ювенільних кровотечах мета лікування:"
26. "Гормональний гемостаз при ювенільних кровотечах проводять звичайно:"
27. "При ювенільних кровотечах, проводячи гемостаз комбінованими естроген-гестагенами, використовують:"
28. "Ефект гемостазу естрогенами при ювенільних кровотечах настає:"
29. "У патогенезі ювенільних кровотеч основна роль належить порушенню функції:"
30. "При ювенільних кровотечах у ендометрії найчастіше відбувається:"
31. "При ювенільних кровотечах показанням до хірургічного гемостазу є:"
32. "При ювенільних кровотечах лікування включає:"

33. "Після гемостазу при ювенільних кровотечах застосовують з 16 по 25 дні циклу:"
34. "Порушення злиття паранефральних протоків може привести до:"
35. "Типова дисгенезія гонад - це:"
36. "При вагітності в рудиментарному розі матки:"
37. "При вагітності в сидлоподібній матці:"
38. "При діагнозі подвоєння матки і піхви без порушення функцій:"
39. "Несправжній жіночий гермафродитизм:"
40. "Які з тверджень є правильними? Помилковий жіночий гермафродитизм:"
41. "Біоценоз піхви у дівчаток у пубертатному періоді характеризується перевагою:"
42. "Вульвіт у дівчаток у пубертатному періоді це:"
43. "Вульвовагініт у дівчаток у пубертатному періоді розвивається:"
44. "При лікуванні вульвовагініту у дівчаток у пубертатному періоді перевагу надають:"
45. "При лікуванні вульвовагініту на фоні ентеробіозу показано призначення препаратів:"
46. "При кандидозному вульвовагініті у дівчаток в пубертатному періоді показано проведення наступної терапії:"
47. "Серед пухлин статевих органів у дівчаток частіше спостерігаються:"

48. "Гранульозоклітинні пухлини у дівчаток у пубертатному періоді викликають:"
49. "Для пухлин статевих органів у дівчаток у пубертатному періоді характерно:"
50. "При підозрі на пухлину яєчника у дівчинки варто проводити:"
51. "При встановленні діагнозу пухлини яєчника у дівчинки в пубертатному періоді доцільно:"
52. "Обсяг планового хірургічного втручання при кістомі яєчника у дівчаток в пубертатному періоді:"
53. "Обсяг хірургічного втручання при перекруті ніжки кістоми яєчника у дівчаток:"
54. "Характер зиготи для генотипу жінки:"
55. "Характер зиготи для генотипу дисгенезії гонад:"
56. "Матка новонародженої дівчинки має довжину:"
57. "В якому віці збільшується допубертатна секреція гонадотропінів в нормі:"
58. "Яка кількість ооцитів зникає до періоду менархе:"
59. "Закінчення швидкого росту тіла співпадає:"
60. "В якому періоді розвитку дівчинки спостерігається «стрибок» росту:"
61. "Менархе настає при масі тіла:"
62. "Яка необхідна мінімальна кількість жирової тканини для того, щоб наступив період менархе:"

63. "Синдром Рокітанського-Кюстнера-Майера - це:"
64. "З вадами якої системи найбільш частіше зустрічаються вади розвитку матки?"
65. "З якого тижня гестації починає формуватися матка:"
66. "З якого терміну вагітності починають формуватися зачатки внутрішніх статевих органів?"
67. "Коли починається формування маткових труб?"
68. "На якому тижні гестації відбувається закладання піхви?"
69. "На якому терміні гестації в яєчниках плода з'являються ооцити?"
70. "Що з переліченого нижче є специфічним для передчасного статевого розвитку:"
71. "У якому віці поява вторинних статевих ознак у дівчат розглядається як передчасний статевий розвиток?"
72. "Що таке телархе?"
73. "Про затримку статевого розвитку у дівчаток говорять у разі:"
74. "Яка послідовність вторинних статевих ознак є вірною?"
75. "Під впливом якого гормону відбувається збільшення молочних залоз, матки та розвиток жирової тканини за жіночим типом?"
76. "Назвіть допустимі строки встановлення овуляторних менструальних циклів у дівчат:"

77. "Статевий інфантилізм – це стан, який супроводжується недорозвиненням статевих органів і гіпофункцією яєчників у дівчат віком понад:"
78. "Як називається патологія, при якій спостерігається передчасний статевий розвиток, що має спадковий характер, нормальний темп та послідовність статевого дозрівання та відсутність інших ознак органічної патології?"
79. "Найбільш частими причинами вторинної дисменореї у підлітків та молодих жінок є:"
80. "В чому основна відмінність первинної дисменореї від вторинної:"
81. "Що таке спаніоменорея?"
82. "Псевдо аменорея – це:"
83. "При якій формі адреногенітального синдрому зберігається уrogenітальний синус?"
84. "При якій формі адреногенітального синдрому початок захворювання виявляється гіпертрихозом?"
85. "В патогенезі гіпоестрогенних ювенільних дисфункціональних маточних кровотеч (ЮМК) ведучу роль відіграє:"
86. "В патогенезі гіперестрогенних кровотеч ведучу роль відіграє:"
87. "Чи вживаються андрогени для лікування ювенільних кровотеч:"
88. "За характером, ювенільні кровотечі найчастіше є:"
89. "Який тип статури найбільш характерний для дівчат з ювенільними кровотечами?"

90. "При неефективності консервативної терапії (симптоматичної і гормональної) ювенільної кровотечі необхідно провести:"
91. "В препубертатному періоді життя дівчинки в мікрофлорі піхви з'являється:"
92. "Де найчастіше локалізується запальний процес у дівчат віком 1-8 років?"
93. "З якого віку можливе проведення провокації гоновою вакциною у дівчаток?"
94. "Яка особливість гінекологічного огляду у дівчат віком до 6 років?"
95. "Що включає в себе поняття апендикулярно-генітальний синдром?"
96. "Збудником вульвовагініту у дівчаток віком до 7 років найчастіше є:"
97. "Які з наступних гінекологічних захворювань частіше зустрічаються в дитячому віці (2-7 років)?"
98. "Причинами виникнення псевдоерозії шийки матки у дівчат є:"
99. "Найбільш часті ускладнення вагітності у підлітків:"
100. "Частота патологічного перебігу вагітності в підлітковому віці:"
101. "Частота патологічних пологів у підлітків:"
102. "Які ускладнення пологів частіше зустрічаються у підлітків:"
103. "Порушення стану плода у неповнолітніх матерів частіше проявляється:"
104. "Яка тривалість I періоду пологів у неповнолітніх, що народжують вперше, при фізіологічному перебігу пологів?"
105. "Тривалість пологів у неповнолітніх, що народжують вперше, складає:"

106. "З чим пов'язаний морфогенез більшості пухлин у дітей та підлітків?"
107. "Переважає більшість пухлин та пухлиноподібних новоутворень статевих органів у дівчаток та дівчат-підлітків припадає на:"
108. "При пухлинах яєчника у дівчат найчастіше диференційну діагностику слід проводити з:"
109. "Які із тверджень є вірними по відношенню до гранульозоклітинної пухлини яєчника у дівчаток пубертатного віку?"
110. "Ювенільні фолікулами - це:"
111. "Диспансерне спостереження дівчаток і дівчат-підлітків з ретенційною кістою яєчника повинно проводитись:"
112. "Диспансерне спостереження дівчаток і дівчат-підлітків після видалення кістоми яєчника повинно проводитись:"
113. "Після видалення одного і, особливо, обох яєчників у дівчаток-підлітків в подальшому їх житті спостерігаються:"
114. "У дітей зустрічаються наступні різновиди кондилом:"
115. "Гострокінцеві кондиломи у дівчаток частіше локалізуються на:"
116. "Плоскі кондиломи у дівчаток частіше локалізуються на:"
117. "Серед доброякісних пухлин вульви і вагіни у дітей найбільш часто зустрічаються:"
118. "Переважним гістотипом пухлин шийки матки у дівчаток до 14 років є:"
119. "Джерелами розвитку мезонефроїдних раків шийки матки у дівчаток є:"

120. "Гіпоплазія статевих органів, іноді гермафродитизм або ознаки інтерсексуальності, зустрічаються нерідко у дівчат із:"

121. "При виявленні параоваріальної кісти у дівчинки необхідно провести:"

122. "При наявності кісти жовтого тіла у юної вагітної показано:"

123. "Характерним клінічним проявом ювенільної гранульозоклітинної пухлини у дівчаток є:"

124. "Який обсяг оперативного втручання у дівчаток та підлітків при кістомах яєчника без ознак злоякісної трансформації?"