

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

10 Анемія і вагітність"

Категорія: **Акушерство і гінекологія**

Кількість запитань: **40**

1. "Добова потреба в залізі в II-III триместрі вагітності складає:"
2. "Для підвищення вмісту гемоглобіну в організмі вагітної на 1 ОД по Салі необхідно:"
3. "Дефіцит фолієвої кислоти під час вагітності призводить до:"
4. "Для лікування дефіциту фолатів вагітним призначають:"
5. "Під анемією розуміють:"
6. "При анемії порушується:"
7. "Вагітність у жінок з анемією часто ускладнюється:"
8. "Розвиток залізодефіцитної анемії у вагітних не пов'язаний з:"
9. "Потреба організму вагітної в залізі найбільша:"
10. "Для клініки анемії вагітних НЕ характерно:"
11. "Згідно з класифікацією, анемії, пов'язані з харчуванням, бувають:"
12. "Гемолітичні анемії:"
13. "Апластичні анемії:"
14. "Прийом препаратів заліза вагітним групи ризику по розвитку анемії необхідний з:"
15. "Діагноз залізодефіцитної анемії у вагітних встановлюють при наступних лабораторних показниках:"
16. "Концентрація гемоглобіну 90-109 г/л відповідає ступіню тяжкості анемії:"

17. "Ознаки анемічної гіпоксії:"
18. "Ознаки дефіциту заліза:"
19. "При залізодефіцитній анемії в I риместрі вагітності доцільні:"
20. "При призначенні препаратів заліза перорально вагітним варто рекомендувати:"
21. "Лабораторні ознаки залізодефіциту:"
22. "Лабораторні ознаки залізодефіциту:"
23. "При залізодефіцитній анемії вагітних для поліпшення засвоєння заліза застосовують:"
24. "Протипоказання до прийому препаратів заліза:"
25. "Для усунення місцевоподразнюючої дії заліза необхідно:"
26. "Позатерапевтична дія при вживанні препаратів заліза всередину:"
27. "Анемія вагітних може бути причиною наступних ускладнень:"
28. "Найбільш часте з перерахованих захворювань крові при вагітності:"
29. "Діагноз анемії не викликає сумнівів при гемоглобіні периферичної крові нижче:"
30. "Підвищення концентрації гемоглобіну в результаті прийому заліза веде до суб'єктивного поліпшення самопочуття?"
31. "Легкому ступеню залізодефіцитної анемії відповідають рівні гемоглобіну:"

32. "Середньому ступеню важкості залізодефіцитної анемії при вагітності відповідають рівні гемоглобіну:"
33. "Важкому ступеню важкості залізодефіцитної анемії при вагітності відповідають рівні гемоглобіну:"
34. "Профілактичний прийом фолієвої кислоти становить:"
35. "Лікувальний прийом фолієвої кислоти становить:"
36. "Оптимальна терапія гемолітичної анемії:"
37. "Діагноз апластичної анемії встановлюється на підставі:"
38. "Позатерапевтична дія парентеральних препаратів заліза:"
39. "Рішення щодо можливості виношування вагітності, терміну і способу розродження при наявності гемолітичної анемії вирішує:"
40. "У вагітної 20 тижнів з'явилися слабкість, втома, запаморочення, головний біль. В аналізі крові гемоглобін 80 г/л. Пульс 86 уд./хв. АТ 120/80 мм рт.ст. Шкіра та слизові оболонки бліді. Яка патологія?"