

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Фармакологія - база тестів 2012 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2012 року**

Кількість запитань: **176**

1. Який механізм дії диклофенаку натрію?

*** А) Блокує циклооксигеназу**

- В) Активує синтез фосфодіестерази
- С) Пригнічує холінестеразу
- Д) Активує аденілатциклазу
- Е) Пригнічує фосфодіестеразу

2. Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?

*** А) Пригнічення активності ангіотензинперетворюючого ферменту**

- В) Блокада бета-адренорецепторів
- С) Блокада альфа-адренорецепторів
- Д) Блокада рецепторів ангіотензину II
- Е) Блокада повільних кальцієвих каналів

3. Хворому з виразкою шлунка призначили омепразол. Який механізм дії цього препарату ?

*** А) Пригнічення H^+K^+-ATP ази**

- В) Блокада гістамінових H_2 -рецепторів
- С) Блокада М-холінорецепторів
- Д) Нейтралізація HCl
- Е) Стимуляція утворення слизу

4. У хворого гостре отруєння морфіном. Який препарат слід ввести в якості антидоту?

*** А) Налоксон**

- В) Лобеліну гідрохлорид.
- С) Бемегрид.
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Унітіол

5. Об'ясните своему коллеге провизору, какие показания к применению налоксона?

*** А) Острое отравление наркотическими анальгетиками**

- В) Отравление тяжелыми металлами
- С) Отравление сердечными гликозидами
- Д) Отравление алкалоидами спорыньи
- Е) Отравление атропина сульфатом

6. Проконсультуйте лікаря, яким найбільш близьким за дією препаратом можна замінити відсутній в аптеці ацетилцистеїн.

*** А) Амброксол**

- В) Натрію хлорид
- С) Кодеїну фосфат
- Д) Лібексин
- Е) Натрію гідрокарбонат

7. Хворому з гіпертензивною кризою ввели внутрішньовенно клофелін. Який механізм лежить в основі антигіпертензивної дії клофеліну?

*** А) Стимуляція центральних пресинаптичних альфа-2-адренорецепторів**

- В) Блокада периферичних альфа-1-адренорецепторів
- С) Блокада бета-адренорецепторів
- Д) Блокада Н-холінорецепторів вегетативних гангліїв
- Е) Пряма міотропна дія на судини

8. З якою метою хворому із стенокардією призначили ацетилсаліцилову кислоту ?

*** А) дезагрегантної дії**

- В) пригнічення фібрінолітичної активності крові
- С) агрегантної дії
- Д) протизапальної дії
- Е) підвищення фібрінолітичної активності крові

9. Хворий 32-х років приймає протитуберкульозні препарати. Через деякий час він помітив, що сеча набула червоно-оранжевого кольору. Який препарат сприяв появі цього явища?

*** А) рифампіцин**

- В) ізоніазид
- С) піразінамід
- Д) етамбутол
- Е) стрептоміцину сульфат

10. При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи нейролептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом?

*** А) Дроперидол**

- В) Етаперазин
- С) Левомепромазин
- Д) Клозапін
- Е) сульпірид

11. У хворого 55 років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунка. З чим пов'язана ульцерогенна дія препарату?

*** А) Зменшення активності циклооксигенази-1 (ЦОГ-1)**

В) Зменшення активності циклооксигенази-2 (ЦОГ-2)

С) Зменшення активності ліпооксигенази (ЛОГ)

Д) Зменшення активності тромбоксансинтетази

Е) Зменшення активності простагліцинісинтетази

12. У хворі 45 років, котра протягом двох тижнів приймає неодикумарін з приводу тромбофлебіту, при черговому обстеженні в крові виявлено зниження протромбіну, в сечі спостерігається мікрогематурія. Який лікарський засіб необхідно застосувати в якості антагоністу неодикумарину?

*** А) Вікасол**

В) Протаміну сульфат

С) Натрію цитрат

Д) Гепарин

Е) Кислота амінокапронова

13. До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичні болі у животі, діарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити до складу патогенетичної терапії?

*** А) Атропіну сульфат та дипіроксим**

В) Тіосульфат натрію та бемеград

С) Тетацин-кальцій та унітіол

Д) Налорфіну гідрохлорид та бемеград

Е) Глюкозу та бемеград

14. До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, фотофобію та порушення зору. Шкіра гіперемійована, суха, зіниці розширені, тахікардія. Був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно застосувати?

- * А) Прозерин**
- В) Ацеклідін
- С) Пілокарпін
- Д) Армін
- Е) Дипіроксим

15. Хворому у стані психозу призначено антипсихотік.

- * А) Аміназин**
- В) Діазепам
- С) Циклодол
- Д) Кофеїн
- Е) Фенобарбітал

16. Хворому з виразковою хворобою призначено ранітидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії даного препарату?

- * А) Блокада H₂-гістамінових рецепторів**
- В) Блокада H₁-гістамінових рецепторів
- С) Блокада М-холінорецепторів
- Д) Пригнічення активності H⁺K⁺АТФ-ази
- Е) Блокада Н-холінорецепторів вегетативних гангліїв

17. Хворому з ознаками інтоксикації серцевими глікозидами призначено унітіол. Який механізм лікувальної дії препарату?

*** А) Реактивація мембранної K^+, Na^+ -АТФ-ази**

- В) Зв'язування іонізованого Ca^{2+}
- С) Збільшення проникнення K^+ в міокардіоцити
- Д) Збільшення вмісту Na^+ в міокарді
- Е) Індукція метаболізму серцевих глікозидів

18. Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?

*** А) Інгібування дофамінергічних процесів в ЦНС**

- В) Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС
- С) Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС
- Д) Інгібування холінергічних процесів в ЦНС
- Е) Інгібування адренергічних процесів в ЦНС

19. У чоловіка 52-х років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечника, печінки, легень. Який препарат слід призначити?

*** А) Метронідазол**

- В) Хініофон
- С) Тетрациклін
- Д) Хінгамін
- Е) Фталазол

20. Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено?

*** А) Лідокаїн**

- В) Новокаїнамід
- С) Верапаміл
- Д) Панангін
- Е) Пропранолол

21. У приймальне відділення поступив у важкому стані чоловік 38 років, який отруївся сулемою. Який антидот треба негайно ввести хворому?

*** А) Унітіол**

- В) Дипіроксим
- С) Атропін
- Д) Налорфін
- Е) Ізонітрозин

22. Жінка 33-х років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліартриту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора?

*** А) Преднізолон**

- В) Індометацин
- С) Бутадіон
- Д) Синафлан
- Е) Діклофенак натрію

23. Вагітна жінка (20 тижнів вагітності) захворіла на пневмонію. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити її лікарю для призначення хворій, без загрози для розвитку плода?

*** А) Бензілпеніцилін**

- В) Гентаміцин
- С) Сульфален
- Д) Левоміцетин
- Е) Офлоксацин

24. При проведенні оперативного втручання в якості міорелаксantu було застосовано тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання?

*** А) Прозерин**

- В) Дитилін
- С) Цитітон
- Д) Етимізол
- Е) Бензогексоній

25. Хворому з алергічним дерматитом був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобів належить цей препарат ?

*** А) Блокатори Н 1 гістамінових рецепторів**

- В) Глюкокортикостероїди
- С) Інгібітори дегрануляції тучних клітин
- Д) Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
- Е) Блокатори Н 2 гістамінових рецепторів

26. Дитина випадково випила із флакона розчин, який її бабуся використовувала для лікування глаукоми. Виявилось, що це був пілокарпіну гідрохлорид. Який лікарський засіб можна застосувати в якості атидоту?

*** А) Атропін**

- В) Карбахолін
- С) Ацеклідін
- Д) Бензогексоній
- Е) Пентамін

27. Жінка, яка страждає на невроз, погано спить. Якому з перерахованих засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння?

*** А) Нітразепам**

- В) Фенобарбітал
- С) Етамінал-натрій
- Д) Бромізовал
- Е) Настоянка валеріани

28. У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс?

*** А) Абстинентний синдром**

- В) Тахіфілаксія
- С) Сенсibiliзація
- Д) Кумуляція
- Е) Толерантність

29. С какой группой диуретиков нельзя одновременно назначать гипотензивные средства, относящиеся к группе ингибиторов ангиотензин превращающего фермента?

*** А) Калий сберегающие**

- В) Тиазидные
- С) Петлевые
- Д) Ксантины
- Е) Осмотические

30. У лікуванні гіпертонічної хвороби лікар призначив засіб, що блокує ангіотензинові рецептори. Вкажіть препарат :

*** А) Лозартан**

- В) Ніфедипін
- С) Празозин
- Д) Каптоприл
- Е) Апресин

31. В аптеку звернувся хворий, який протягом місяця приймав феназепам. Хворий наполягав на придбанні ще двох упаковок цього препарату, пояснюючи тим, що він без діазепаму погано себе почуває. Що лежить в основі побічної дії препарату, що розвинулася у хворого?

*** А) лікова залежність**

- В) ідіосинкразія
- С) синдром післядії
- Д) кумуляція
- Е) толерантність

32. Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно покращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але ефект був відсутнім. Що лежить в основі неефективності ефедрину?

*** А) Тахіфілаксія**

В) Лікарська залежність

С) Ідіосинкразія

Д) Алергія

Е) Кумуляція

33. Хворому з гіпертензивним кризом в комплексному лікуванні необхідно призначити сечогінний засіб. Порадьте лікарю-інтерну, який препарат необхідно ввести хворому?

*** А) Фуросемід**

В) Діакарб

С) Спіронолактон

Д) Тріамтерен

Е) Амілорид

34. Який протипротозойний засіб можна порекомендувати жінці, яка хворіє на трихомоніаз?

*** А) Метронідазол**

В) Примахін

С) Хлоридин

Д) Солюсурьмін

Е) Хініофон

35. Порекомендуйте хворому на хронічний бронхіт, який відхаркувальний засіб можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в'язкого харкотиння.

*** А) Амброксол**

В) Фалімінт

С) Глаувент

Д) Лібексин

Е) Сальбутамол

36. Виберіть антисептик із групи галогеномісних сполук, який можна покласти в аптечку для дитини, що збирається у літній табір:

*** А) Розчин йоду спиртовий**

В) Брильянтовий зелений

С) Міді сульфат

Д) Метиленовий синій

Е) Розчин формальдегіду

37. Який місцевий анестетик краще придбати в аптеці для знеболення при екстракції зуба?

*** А) Лідокаїн**

В) Дикаїн

С) Анестезин

Д) Совкаїн

Е) Кокаїн

38. До аптеки надійшов препарат нового покоління нестероїдних протизапальних засобів "мелоксикам". Вкажіть, якими перевагами володіє даний препарат, як переважний блокатор циклооксигенази-2, порівняно з іншими нестероїдними протизапальними засобами:

*** А) Мінімальна побічна дія на травний канал**

- В) Виразний міоспазмолітичний ефект
- С) Наявність інтерфероногенних властивостей
- Д) Мінімальна побічна дія на кровотворення
- Е) Значне пригнічення активності протеаз

39. При відсутності в аптеці фенотеролу в інгаляціях яким препаратом із групи бронхоселективних бета-2-адреноміметиків можна його замінити?

*** А) Сальбутамолом**

- В) Ізадрином
- С) Метацином
- Д) Ефедрин
- Е) Еуфіліном

40. Дайте відповідь на запитання терапевта - який сучасний антигістамінний препарат краще застосувати людям, робота, який потребує швидкої реакції на оточуюче?

*** А) Лоратадин**

- В) Димедрол
- С) Дипразин
- Д) Супрастин
- Е) Піпольфен

41. При відсутності в аптеці строфантину яким препаратом із групи серцевих глікозидів можна його замінити?

*** А) Корглікон**

В) Ізоланід

С) Дигітоксин

Д) Адонізид

Е) Целанід

42. Назвіть найбільш типовий симптом отруєння атропіном.

*** А) Розширення зіниць, що не реагують на світло.**

В) Звуження зіниць, які не реагують на світло.

С) Підвищене потововиділення.

Д) Брадикардія.

Е) Зниження внутрішньоочного тиску.

43. Хворий звернувся до лікаря офтальмолога із скаргами на зниження нічного зору, сухість рогівки. Який препарат призначив лікар?

*** А) Ретинол**

В) Піридоксин

С) Токоферол

Д) Аскорбінова кислота

Е) Кокарбоксилаза

44. У хворого на гіпертонічну хворобу підвищений рівень реніну в плазмі крові. Якій з перерахованих фармакологічних груп треба віддати перевагу для лікування даного хворого?

*** А) Інгібітори АПФ**

- В) Альфа-адреноблокатори
- С) Діуретики
- Д) Антагоністи іонів кальцію
- Е) Симпатолітики

45. Хворому на виразкову хворобу шлунку призначили альмагель. Яка з фармакологічних властивостей препарату використовується для лікування цієї патології?

*** А) Нейтралізація HCl**

- В) Місцевоанестезуюча дія
- С) Блокада H₂-гістамінорецепторів
- Д) Блокада М-холінорецепторів
- Е) Протизапальна дія

46. При тривалому застосуванні фенобарбіталу у хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного явища?

*** А) Прискорення біотрансформації**

- В) Послаблення процесу всмоктування
- С) Підвищення чутливості рецепторів
- Д) Пригнічення біотрансформації
- Е) Накопичення речовини в організмі

47. Хворому на депресію лікар призначив препарат із групи трициклічних антидепресантів. Назвіть препарат.

*** А) амітриптилін**

В) феназепам

С) дроперидол

Д) аміналон

Е) кофеїн

48. Хвора на гіпертонічну хворобу звернулася до лікаря зі скаргою на сухий кашель, що виник на фоні лікування. Який гіпотензивний препарат вона використовувала?

*** А) лізиноприл**

В) атенолол

С) ніфедипін

Д) фуросемід

Е) дихлотіазид

49. В аптеку звернувся хворий, якому з приводу виразкової хвороби лікар призначив фамотидин. Поясніть, який механізм лежить в основі дії даного препарату?

*** А) Блокада H₂-гістамінових рецепторів**

В) Блокада H₁-гістамінових рецепторів

С) Блокада М-холінорецепторів

Д) Пригнічення активності H⁺K⁺АТФ-ази

Е) Блокада холінорецепторів симпатичних гангліїв

50. Що відображає такий фармакокінетичний параметр лікарських засобів як період напіввиведення ($T_{1/2}$)?

*** А) Проміжок часу, за який концентрація препарату в плазмі крові зменшується на 50 %**

- В) Об'єм плазми крові, який звільняється від препарату за одиницю часу
- С) Час повного виведення препарату з організму
- Д) Швидкість виведення препарату через нирки
- Е) Співвідношення між швидкістю виведення препарату та його концентрацією у плазмі крові

51. Зменшення всмоктування препаратів групи тетрацикліну при їх одночасному застосуванні з антацидними засобами є прикладом:

*** А) Фармакокінетичної несумісності**

- В) Фармацевтичної несумісності
- С) Фармакодинамічної несумісності
- Д) Синергізму препаратів
- Е) Функціонального антагонізму препаратів

52. Больному эпилепсией назначен диуретический препарат. Определите этот препарат.

*** А) Диакарб**

- В) Верошпирон
- С) Фуросемид
- Д) Гипотиазид
- Е) Маннит

53. Помогите студенту медицинского вуза выбрать адренергический препарат для лечения анафилактического шока.

*** А) Адреналина гидрохлорид**

- В) Клофелин
- С) Галазолин
- Д) Фенотерол
- Е) Изадрин

54. Дайте ответ посетителю Вашей аптеки, какой побочный эффект характерен для каптоприла?

*** А) сухой кашель**

- В) повышение артериального давления
- С) гипергликемия
- Д) нарушения ритма сердца
- Е) гіпокаліємія

55. Проконсультуйте, який препарат з групи антигістамінних засобів не проявляє снодійної та седативної дії.

*** А) лоратидин**

- В) дімедрол
- С) дипразин
- Д) супрастин
- Е) тавегіл

56. Дайте відповідь провізору-інтерну: який з препаратів відноситься до препаратів задньої долі гіпофізу ?

*** А) Окситоцин**

- В) Інсулін
- С) Преднізолон
- Д) Тіреоїдин
- Е) Естрон

57. Допоможіть лікарю вибрати препарат для замісної терапії після видалення щитовидної залози.

*** А) L-тироксин**

- В) Інсулін
- С) Преднізолон
- Д) Паратиреоїдин
- Е) Мерказоліл

58. Який з антисептичних препаратів свою бактерицидну дію проявляє за рахунок утворення атомарного кисню?

*** А) Калію перманганат**

- В) Хлорамін
- С) Фурацилін
- Д) Етоній
- Е) Срібла нітрат

59. Больному с дискинезией пищеварительного тракта назначен метоклопрамид. С чем связан противорвотный эффект этого препарата?

*** А) Блокада Д₂-рецепторов**

- В) Блокада М₁-холинорецепторов
- С) Блокада Н₁-рецепторов
- Д) Стимуляция бета-адренорецепторов
- Е) Стимуляция М₁-холинорецепторов

60. При лечении хронической сердечной недостаточности дигитоксином у больного появились признаки интоксикации этим препаратом. Врач назначил унитиол. Объясните, в чём заключается механизм действия унитиола при интоксикации сердечными гликозидами?

*** А) Восстановление активности К⁺-Na⁺АТФ-азы**

- В) Связывание ионов кальция
- С) Повышение уровня натрия в кардиомиоцитах
- Д) Повышение проницаемости для калия в кардиомиоцитах
- Е) Связывание гликозида в комплексное соединение

61. Відносна кількість лікарського засобу, що надходить з місця введення до системного кровообігу називається:

*** А) біодоступність**

- В) період напівадсорбції
- С) період напіввиведення
- Д) об'єм розподілу
- Е) період напівелімінації

62. Хворий 67 років з хронічною серцевою недостатністю отримує дигоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з:

*** А) Панангіном**

- В) Глюконатом кальцію
- С) Еуфіліном
- Д) Дихлотіазидом
- Е) Хлоридом кальцію

63. На тлі тривалого введення гепарину у хворого розвинулась шлункова кровотеча. Назвіть специфічний антидот гепарину, який треба негайно застосувати:

*** А) Протаміну сульфат**

- В) Дипіроксим
- С) Вікасол
- Д) Бемегрид
- Е) Натрію цитрат

64. Який основний механізм дії лежить в основі бактерицидного впливу бензилпеніциліну на кокову флору?

*** А) порушення синтезу стінки мікробної клітини**

- В) пригнічення синтезу білка
- С) пошкодження проникності цитоплазматичної мембрани
- Д) активація імунної системи макроорганізму
- Е) підвищення фагоцитарної активності лейкоцитів

65. Больному, страдающему неврозом с явлениями тревоги и страха, врач назначил диазепам. Какой фармакологический эффект препарата позволяет применять его для лечения данного заболевания?

*** А) Анксиолитический**

- В) Противоаритмический
- С) Противовоспалительный
- Д) Гипотензивный
- Е) Антиангинальный

66. Больному с нарушением сердечного ритма ввели лидокаин. Каким фармакологическим эффектом, помимо местноанестезирующего, обладает этот препарат?

*** А) Антиаритмический**

- В) Снотворный
- С) Жаропонижающий
- Д) Антидепрессивный
- Е) Ноотропный

67. Больному с острым отравлением необходимо провести форсированный диурез. Какой препарат можно применить с этой целью?

*** А) Фуросемид**

- В) Кофеин бензоат натрия
- С) Галантамина гидробромид
- Д) Эналаприл
- Е) Пирацетам

68. Больному после перенесенной черепно-мозговой травмы, врач назначил пирацетам. К какой фармакологической группе относится этот препарат?

*** А) Ноотропные препараты**

- В) Ненаркотические анальгетики
- С) Транквилизаторы
- Д) Средства для наркоза
- Е) Нейролептики

69. Больному, страдающему гипертонической болезнью, врач назначил лизиноприл. Каким механизмом действия обладает этот препарат?

*** А) Блокирует АПФ**

- В) Блокирует альфа-адренорецепторы
- С) Блокирует бета-адренорецепторы
- Д) Стимулирует бета-адренорецепторы
- Е) Блокирует М-холинорецепторы

70. Для лечения атеросклероза больной в аптеке приобрел гиполипидемический препарат из группы фибратов. Назовите этот препарат?

*** А) Фенофибрат**

- В) Дротаверина гидрохлорид
- С) Бисакодил
- Д) Спиринолактон
- Е) Силибор

71. Для купирования приступа стенокардии больной использует нитроглицерин в капсулах. Какой рациональный путь введения этого препарата ?

*** А) Сублингвальный**

- В) Пероральный
- С) Ректальный
- Д) Ингаляционный
- Е) Подкожный

72. В больницу доставлен ребенок с признаками отравления алкалоидами белладонны. Какой препарат необходимо применить в качестве антидота?

*** А) Прозерин**

- В) Магния сульфат
- С) Кофеин бензоат натрия
- Д) Парацетамол
- Е) Натрия вольпроат

73. Врач назначил больному по поводу хронического запора, препарат бисакодил. Через 3 недели лечения больной обратил внимание на уменьшение слабительного эффекта. С развитием какого побочного эффекта это связано?

*** А) Привыкание**

- В) Пристрастие
- С) Сенсибилизация
- Д) Кумуляция
- Е) Дисбактериоз

74. Посоветуйте больному с острым бронхитом, муколитический препарат, который облегчает отхаркивание.

*** А) Ацетилцистеин**

- В) Глауцин
- С) Лоратидин
- Д) Диклофенак натрия
- Е) Дротаверина гидрохлорид

75. Вы сотрудник аптечного склада. При внесении поступивших препаратов в компьютерную базу данных укажите к какой фармакологической группе относится парацетамол.

*** А) Ненаркотический анальгетик**

- В) Снотворное средство
- С) Диуретическое средство
- Д) Гипотензивное средство
- Е) Антиангинальное средство

76. Провизор посоветовал больному противоязвенный препарат, который блокирует гистаминовые рецепторы слизистой желудка.

*** А) Фамотидин**

- В) Омепразол
- С) Альмагель
- Д) Атропина сульфат
- Е) Пирензепин

77. Больному стенокардией назначили метопролол. Какой фармакологический эффект позволяет применять этот препарат для лечения стенокардии?

*** А) Антиангинальный**

- В) Гипотензивный
- С) Антиаритмический
- Д) Антиагрегантный
- Е) Бронхолитический

78. В связи со слабостью родовой деятельности врач назначил роженице гормональный препарат для стимуляции родов. Назовите препарат.

*** А) Окситоцин**

- В) Глибенкламид
- С) Преднизолон
- Д) Инсулин
- Е) L-тироксин

79. Ответьте на вопрос своего коллеги провизора. Какой нестероидный противовоспалительный препарат относится к средствам, селективно блокирующим ЦОГ2?

*** А) Целекоксиб**

- В) Анальгин
- С) Парацетамол
- Д) Диклофенак-натрия
- Е) Кислота ацетилсалициловая

80. Дайте ответ на вопрос медсестры: гипогликемическое действие какого препарата обусловлено стимуляцией бета-клеток поджелудочной железы?

*** А) Глибенкламид**

В) Преднизолон

С) Адреналина гидрохлорид

Д) Ретаболил

Е) Гепарин

81. У пожилого больного развилась послеоперационная атония кишечника. Какой антихолинэстеразный препарат показан ему?

*** А) Прозерин**

В) Дитилин

С) Пилокарпина гидрохлорид

Д) Атропина сульфат

Е) Метопролол

82. Больному с болезнью Паркинсона назначили препарат с преобладающим влиянием на дофаминергическую систему. Назовите это лекарственное средство?

*** А) Леводопа**

В) Зопиклон

С) Дроперидол

Д) Аминазин

Е) Лоразепам

83. У больного в связи с обострением мочекаменной болезни возникла почечная колика. Какой препарат необходимо ввести для устранения колики?

*** А) Дротаверина гидрохлорид**

- В) Силибор
- С) Альмагель
- Д) Этимизол
- Е) Прозерин

84. Хворому Н. 56 р. який хворіє на ІХС було призначено метопролол. Який механізм дії бета-адреноблокаторів при ІХС?

*** А) Зменшують потребу міокарда в кисні**

- В) Збільшують потребу міокарда в кисні
- С) Розширюють коронарні судини
- Д) Зменшують тонус периферичних судин
- Е) Звужують коронарні судини

85. Хворий, що страждає на алергічний дерматит звернувся в лікарню. Який препарат з метою протизапальної та протиалергічної дії необхідно призначити?

*** А) Преднізолон**

- В) Етамід
- С) Окситоцин
- Д) Інсулін
- Е) Ретаболіл

86. Хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засіб. Вкажіть який це препарат?

*** А) Фенофібрат**

- В) Аскорбінова кислота
- С) Пірацетам
- Д) Дексаметазон
- Е) Бутадіон

87. У хворого після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану?

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Натрію хлорид
- С) Платифіліну гідротартрат
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Анаприлін

88. Чоловік 55 років скаржиться на безсоння, дратівливість, загальну слабкість. Який з вказаних нижче препаратів доцільно призначити в даному випадку?

*** А) Нітразепам**

- В) Аміназин
- С) Трифтазин
- Д) Дроперидол
- Е) Амітриптилін

89. Хворому на гіпертонічну хворобу з метою зниження артеріального тиску було призначено метопролол. Який механізм дії цього препарату:

- * А) Блокування бета-адренорецепторів**
- В) Блокування альфа-адренорецепторів
- С) Непряма адреноміметична дія
- Д) Спазмолітична дія
- Е) Блокування ангіотензинових рецепторів

90. Хворому на бронхіальну астму для усунення нападу було призначено препарат, в основі механізму дії якого лежить стимулювання переважно бета-2-адренорецепторів. Назвіть препарат:

- * А) Сальбутамол**
- В) Адреналіну гідрохлорид
- С) Дроперидол
- Д) Клофелін
- Е) Ізадрін

91. Хворій на паркінсонізм для усунення м'язевої ригідності було призначено препарат, який є попередником дофаміну. Назвіть цей препарат:

- * А) Леводопа**
- В) Аміназин
- С) Парацетамол
- Д) Скопаламіну гідробромід
- Е) Атропіну сульфат

92. Хворому на невроз було призначено анксиолітичний засіб, похідне бензодіазепіну. Назвіть препарат:

*** А) Діазепам**

В) Атропіну сульфат

С) Піроксикам

Д) Ретаболіл

Е) Циклодол

93. Хворій 34-х років, яка хворіє на бронхіт, лікар призначив протикашльовий засіб центральної дії. Який це препарат?

*** А) Глауцин**

В) Корглікон

С) Еналаприл

Д) Фуросемід

Е) Ферковен

94. Хворому на інсуліннезалежний цукровий діабет було призначено синтетичний протидіабетичний препарат з групи похідних сульфонілсечовини. Назвіть препарат:

*** А) Глібенкламід**

В) Інсулін

С) Анаприлін

Д) Преднізолон

Е) Фуросемід

95. Допоможіть лікарю підібрати препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів, який є інгібітором ЦОГ-2 і не пошкоджує шлунок.

*** А) Целекоксиб**

- В) Кислота ацетилсаліцилова
- С) Індометацин
- Д) Парацетамол
- Е) Диклофенак-натрій

96. Поясніть лікарю, як коректно називати явище, коли при тривалому застосуванні препарату його ефективність знижується:

*** А) Звикання**

- В) Сенсибілізація
- С) Кумуляція
- Д) Залежність
- Е) Тахіфілаксія

97. Хворого попередили, що при застосуванні препарапту, який йому призначили, може виникнути кашель. Назвіть цей препарат:

*** А) Лізіноприл**

- В) Клофелін
- С) Фенігідин
- Д) Діхлотіазид
- Е) Метопролол

98. Хворому при гострому отруєнні для форсованого діурезу призначили петлевий діуретик. Який це препарат ?

- * А) Фуросемід**
- В) Манніт
- С) Гідрохлортіазид
- Д) Тріамтерен
- Е) Спіронолактон

99. Хворому на гіпертонічну хворобу призначено лізиноприл. Який типовий побічний ефект йому властивий ?

- * А) Сухий кашель**
- В) Закреп
- С) Підвищення апетиту
- Д) Безсоння
- Е) Блювання

100. Порекомендуйте хворому на глаукому засіб із групи М-холіноміметиків.

- * А) Пілокарпіну гідрохлорид**
- В) Ефедрину гідрохлорид
- С) Сульфацил натрій
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Левоміцетин

101. Лікар - провізору:" Нагадайте мені, колегі, як називають явище, коли один препарат підсилює дію іншого".

- * А) Потенціювання**
- В) Антагонізм
- С) Сенсибілізація
- Д) Абстиненція
- Е) Тахіфілаксія

102. Проконсультуйте лікаря-інтерна, чому одночасно з препаратами заліза не доцільно застосовувати антацидні засоби?

*** А) Погіршується всмоктування препаратів заліза**

- В) Збільшується зв'язування з білками крові
- С) Порушується депонування заліза в організмі
- Д) Підсилюється інтоксикація препаратами заліза
- Е) Прискорюється елімінація препаратів заліза

103. Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліцину гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат ?

*** А) Тетрацикліни**

- В) Аміноглікозиди
- С) Макроліди
- Д) Цефалоспорини
- Е) Пеніциліни

104. Ви - провізор аптеки. Яку групу бронхолітиків слід замовити пульмонологічному відділенню для лікування хворих на бронхіальну астму?

*** А) Бета-2-адреноміметики**

- В) Бета-адреноблокатори
- С) М-холіноміметики
- Д) Н-холіноміметики
- Е) Антихолінестеразні засоби

105. Больному с острой сердечной недостаточностью и непереносимостью сердечных гликозидов был введен добутамин. Какой механизм действия этого препарата?

*** А) Стимуляция бета -1-адренорецепторов**

- В) Стимуляция альфа-адренорецепторов
- С) Блокада K^+ -, Na^+ -АТФ-азы
- Д) Угнетения активности фосфодиэстеразы
- Е) Стимуляция М-холинорецепторов

106. Для лечения тромбоза врач назначил больному препарат из группы антикоагулянтов прямого действия. Назовите этот препарат.

*** А) Гепарин**

- В) Фенилин
- С) Синкумар
- Д) Неодикумарин
- Е) Викасол

107. Больному хронической сердечной недостаточностью назначили сердечный гликозид из группы наперстянки. Назовите этот препарат:

*** А) Дигоксин**

- В) Строфантин
- С) Корвалол
- Д) Коргликон
- Е) Кордиамин

108. У хворого після вакцинації розвинувся анафілактичний шок. Назвіть препарат вибору.

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Анаприлін
- С) Нафтізин
- Д) Сальбутамол
- Е) Дитилін

109. Хворий похилого віку страждає запором, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечника. Який препарат слід призначити хворому?

*** А) Бісакодил**

- В) Натрію сульфат
- С) Касторову олію
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Новокаїнамід

110. Хворому на гострий бронхіт призначили муколітичний засіб. Назвіть препарат.

*** А) Ацетилцистеїн**

- В) Глауцин
- С) Кодеїну фосфат
- Д) Етимізол
- Е) Бемегрид

111. Жінка після перенесеного стресу погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння ?

*** А) Нітразепам**

В) Фенобарбітал

С) Хлоралгідрат

Д) Аміназин

Е) Барбітал

112. У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс?

*** А) Абстинентний синдром**

В) Ідіосинкразія

С) Сенсibiliзація

Д) Кумуляція

Е) Толерантність

113. Жінці 65 років з переломом нижньої щелепи призначили препарат із групи наркотичних анальгетиків. Назвіть препарат.

*** А) Промедол**

В) Пірацетам

С) Гепарин

Д) Циннаризин

Е) Фуросемід

114. Хворому на гіпертонічну хворобу призначили препарат з групи неселективних бета-адреноблокаторів. Вкажіть цей препарат:

*** А) Анаприлін**

- В) Празозин
- С) Прозерин
- Д) Адреналіну гідрохлорид
- Е) Лабеталол.

115. Для лікування глаукоми лікар вирішив призначити хворому холіноміметичний засіб прямої дії. Який це препарат?

*** А) Пілокарпіну гідрохлорид**

- В) Цинку сульфат
- С) Сульфацил натрію
- Д) Платифіліну гідротартрат
- Е) Атропіну сульфат

116. У процесі фармакотерапії бронхіту у хворого виникли диспептичні розлади, фотодерматит, порушення функції печінки. Який препарат із призначених хворому міг спричинити ці явища?

*** А) Доксидиклін**

- В) Парацетамол
- С) Кислота аскорбінова.
- Д) Ацетилцистеїн.
- Е) Кодеїну фосфат

117. Хворий страждає на жовче-кам'яну хворобу. Який засіб слід йому призначити з метою усунення печінкової коліки?

*** А) Магнію сульфат**

- В) Амальгель
- С) Контрикал
- Д) Бісакодил
- Е) Панкреатин.

118. Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболення пологів?

*** А) Промедол**

- В) Парацетамол
- С) Кодеїну фосфат
- Д) Фентаніл
- Е) Анальгін

119. У стаціонар надійшов хворий з діагнозом “Виразкова хвороба шлунку у фазі загострення”. Проконсультуйте лікаря-інтерна який препарат знизить функцію залоз шлунку за рахунок блокади H₂ -рецепторів

*** А) Фамотидин**

- В) Екстракт беладони сухий
- С) Метацин
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Платифіліну гідротартрат

120. Виберіть на аптечному складі для хірургічного відділення антихолінестеразний засіб зворотної дії для призначення хворим в післяопераційному періоді з атонією кишечника та сечового міхура

*** А) Прозерин**

- В) Фосфакол
- С) Бензогексоній
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Дитилін

121. До міжлікарняної аптеки надійшло замовлення від хірургічного відділення на отримання препарату з групи міорелаксантів деполяризуючого типу дії для проведення хірургічних втручань. Який препарат було замовлено?

*** А) Дитилін**

- В) Нікотин
- С) Атропіну сульфат
- Д) Метацин
- Е) Гігроній

122. До провізора звернулася хвора з проханням відпустити засіб від болю голови, який одночасно має антиагрегатну дію. Назвіть цей препарат?

*** А) Кислота ацетилсаліцилова**

- В) Кодеїну фосфат
- С) Промедол
- Д) Трамадол
- Е) Фентаніл

123. Хворому після гострого інфаркту міокарду лікар порекомендував протягом 3-4 місяців приймати ацетилсаліцилову кислоту. На яку дію ацетилсаліцилової кислоти розраховував лікар?

*** А) Антиагрегантну**

В) Жарознижуючу

С) Анальгезуючу

Д) Протизапальну

Е) Спазмолітичну

124. Лікар-інтерн звернувся до фармацевта за порадою, який засіб краще призначити хворому з діагнозом: амебна дизентерія.

*** А) Метронідазол**

В) Пірантел

С) Левомізол

Д) Біцілін-5

Е) Бензилпеніциліну натрієва сіль

125. Страх, емоційна напруга у хворого неврозом дозволили лікарю підібрати препарат, знижуючий ці симптоми.

*** А) Діазепам**

В) Карбонат літія

С) Сіднокарб

Д) Ноотропіл

Е) Кофеїн

126. Во время оперативного вмешательства с применением миорелаксанта тубокурарина у пациента развилось нарушение дыхания, которое было ликвидировано после введения прозерина. Какому термину соответствует указанное взаимодействие между лекарствами?

*** А) Антагонизм**

- В) Кумуляция
- С) Несовместимость
- Д) Тахифилаксия
- Е) Синергизм

127. У больного, который длительное время страдал заболеванием желудка выявлена гиперхромная анемия. Какое из перечисленных средств применяется для лечения этой патологии?

*** А) Цианокобаламин**

- В) Аскорбиновая кислота
- С) Унитиол
- Д) Феррум Лек
- Е) Оксиферрискорбон

128. Женщине 25 лет с явлениями острой интоксикации морфином был введен налоксон, вызвавший быстрое улучшение ее состояния. Каков механизм действия этого препарата?

*** А) Блокада опиоидных рецепторов**

- В) Блокада ГАМК-рецепторов
- С) Блокада серотониновых рецепторов
- Д) Блокада дофаминовых рецепторов
- Е) Блокада бензодиазепиновых рецепторов

129. У наркологічне відділення надійшов хворий з діагнозом - морфінізм. Лікар відзначив зниження фармакологічної активності морфіну. Як називається явище, коли зменшується ефективність препарату при повторному введенні?

*** А) Звикання**

- В) Матеріальна кумуляція
- С) Функціональна кумуляція
- Д) Антагонізм
- Е) Сумація

130. Препаратом вибору для лікування трихомонозної інфекції є:

*** А) Метронідазол**

- В) Олететрин
- С) Норфлуксацин
- Д) Ністатин
- Е) Клафоран

131. Виберіть препарат для лікування бронхіальної астми з групи ?2-адреностимуляторів.

*** А) Сальбутамол**

- В) Еуфілін
- С) Атровент
- Д) Кетотіфен
- Е) Беклометазон

132. Хворому з шизофренією призначено нейролептик. Який з перерахованих препаратів належить до цієї групи?

*** А) Аміназин**

- В) Целекоксиб
- С) Анаприлін
- Д) Морфін
- Е) Пірацетам

133. В аптеку звернувся студент з проханням порадити лікарський засіб для усунення проявів алергічного риніту, який виникає у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати?

*** А) Лоратидин**

- В) Адреналін
- С) Анаприлін
- Д) Амброксол
- Е) Лозартан

134. У хворого встановлено діагноз - виразкова хвороба шлунка. Препарат з якої з перелічених груп лікарських засобів необхідно використати в комплексній терапії пацієнта ?

*** А) Блокатори H-2 гістамінорецепторів**

- В) Блокатори H-1 гістамінорецепторів
- С) ?-Адреноблокатори
- Д) ? -Адреноблокатори
- Е) ?? Адреноміметики

135. Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?

*** А) Целекоксиб**

- В) Ацетилсаліцилова кислота
- С) Парацетамол
- Д) Анальгін
- Е) Диклофенак-натрій

136. Пацієнту з ішемічною хворобою серця для швидкого зняття приступу стенокардії лікар призначив лікарський препарат, який необхідно вживати під язик. Вкажіть цей препарат.

*** А) Нітрогліцерин**

- В) Корглікон
- С) Ізосорбїду мононітрат
- Д) Лізиноприл
- Е) Амїодарон

137. При проведенні проби на чутливість до бензилпеніциліну у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Яким препаратом слід обколоти місце введення антибіотика?

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Норадреналіну гідротартрат
- С) Атропіну сульфат
- Д) Пропранолол
- Е) Цефтріаксон

138. Назовите препарат из группы тетрациклинов, который назначили больному для лечения бронхита

*** А) Доксициклина гидрохлорид**

- В) Бензилпенициллина натриевая соль
- С) Ацикловир
- Д) Изониазид
- Е) Хингамин

139. Для лечения атеросклероза больной приобрел в аптеке гиполипидемический препарат фенофибрат. К какой фармакологической группе относится этот препарат?

*** А) Фибраты**

- В) Нитрофураны
- С) Блокаторы кальциевых каналов
- Д) (-адреноблокаторы
- Е) М-холиноблокаторы

140. Напомните своему коллеге провизору как называется явление, когда один препарат ослабляет действие другого?

*** А) Антагонизм**

- В) Привыкание
- С) Сенситализация
- Д) Потенцирование
- Е) Тахифилаксия

141. Больному для лечения бронхиальной астмы, врач назначил препарат из группы (-адреномиметиков. Укажите этот препарат?

*** А) Сальбутамол**

- В) Диазепам
- С) Доксциклина гидрохлорид
- Д) Нитроглицерин
- Е) Дигоксин

142. Какой из перечисленных ниже препаратов при сублингвальном применении быстро купирует приступ стенокардии?

*** А) Нитроглицерин**

- В) Дигоксин
- С) Амиодарон
- Д) Лизиноприл
- Е) Коргликон

143. Благодаря какому фармакологическому эффекту диазепам применяется для лечения неврозов?

*** А) Анксиолитическому**

- В) Анальгетическому
- С) Диуретическому
- Д) Жаропонижающему
- Е) Антидепрессивному

144. Вы - провизор, проходящий интернатуру. При сдаче тестового экзамена выберите из предложенных фармакологических эффектов тот, который позволяет применять аминазин для лечения психозов?

*** А) Антипсихотический**

В) Гипотермический

С) Противовоспалительный

Д) Противорвотный

Е) Спазмолитический

145. Ответьте на вопрос своего коллеги провизора, какой механизм действия НПВС целекоксиба?

*** А) Селективное ингибирование ЦОГ-2**

В) Блокада АПФ

С) Стимуляция М-холинорецепторов

Д) Блокада H₂-гистаминовых рецепторов

Е) Стимуляция (2-адренорецепторов

146. Ответьте на вопрос молодого врача: как называется способность лекарств накапливаться в организме больного?

*** А) Кумуляция**

В) Антагонизм

С) Синергизм

Д) Привыкание

Е) Аллергия

147. Вы провизор ЦРА. Выберите из поступивших в вашу аптеку препаратов тот, который относится к жирорастворимым витаминным препаратам

*** А) Ретинола ацетат**

- В) Окситоцин
- С) Ацикловир
- Д) Гепарин
- Е) Димедрол

148. Помогите молодому врачу выбрать из имеющихся у вас в аптеке химиотерапевтических средств препарат для лечения больного, страдающего герпесом

*** А) Ацикловир**

- В) Рифампицин
- С) Доксициклина гидрохлорид
- Д) Хингамин
- Е) Метронидазол

149. Какой фармакологический эффект ацетилсалициловой кислоты позволяет применять ее у больных с ИБС для профилактики тромбозов?

*** А) Антиагрегантный**

- В) Анальгезирующий
- С) Жаропонижающий
- Д) Ульцерогенный
- Е) Противовоспалительный

150. Больному с глаукомой врач назначил прозерин в виде глазных капель. К какой фармакологической группе относится этот препарат?

*** А) Антихолинестеразный обратимого действия**

- В) М-холиноблокатор
- С) Н-холиномиметик
- Д) (-адреноблокатор
- Е) (-адреномиметик

151. Какой препарат из группы местноанестезирующих средств применяется у больных с нарушением сердечного ритма?

*** А) Лидокаин**

- В) Парацетамол
- С) Морфина гидрохлорид
- Д) Кофеина-бензоат натрия
- Е) Нитразепам

152. Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів.

*** А) Атропін**

- В) Прозерін
- С) Галантамін
- Д) Дитилін
- Е) Бензогексоній

153. В лікуванні екстрасистолії використан неселективний ?-адреноблокатор.

*** А) Анаприлін**

- В) Атенолол
- С) Фентоламін
- Д) Празозін
- Е) Резерпін

154. Хворому на бронхіальну астму було призначено сальбутамол після якого зникли симптоми бронхоспазму. Це пов'язано зі стимуляцією:

*** А) β -2-адренорецепторів**

В) α -1-адренорецепторів

С) М-холіноорецепторів

Д) Синтезу ацетилхоліну

Е) β -1-адренорецепторів

155. Після довготривалого прийому ізосорбїду для профілактики приступів стенокардії хворий відмітив значне зниження ефекту останнього. Яке явище мало місце?

*** А) Толерантність**

В) Кумуляція

С) Фізична залежність

Д) Алергія

Е) Потенціювання

156. Під час слабкості пологової діяльності призначають:

*** А) Окситоцин**

В) Но-шпу

С) Прогестерон

Д) Вікасол

Е) Фенотерол

157. Хворому для профілактики тромбоутворення з ІХС був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів.

*** А) Кислота ацетилсаліцилова**

- В) Ібупрофен
- С) Піроксикам
- Д) Кислота мефенамова
- Е) Індометацин

158. Хворому на інфаркт міокарду вводили внутрішньовенно антикоагулянт прямої дії.

*** А) Гепарин**

- В) Неодикумарин
- С) Вікасол
- Д) Тромбін
- Е) Кальцію глюконат

159. Вкажіть антибіотик для лікування сифілісу.

*** А) Бензилпеніцилін**

- В) Стрептоміцин
- С) Канаміцин
- Д) Амфотерицин
- Е) Ністатин

160. Діагностовано трихомоніаз. Який антимікробний препарат необхідно призначити?

*** А) Метронідазол**

- В) Ампіцилін
- С) Хлорохін
- Д) Ністатин
- Е) Гентаміцин

161. У пацієнта з'явилися герпетичні висипання. Який засіб необхідно призначити?

*** А) Ацикловір**

- В) Гентаміцин
- С) Клотримазол
- Д) Бензилпеніцилін
- Е) Бісептол

162. Для індивідуальної профілактики малярії було призначено препарат.

*** А) Хінгамін**

- В) Рифампіцин
- С) Ампіцилін
- Д) Гентаміцин
- Е) Бісептол (Ко-тримаксазол)

163. Відпускаючи з аптеки глауцину гідрохлорид хворому на хронічний бронхіт про який типовий побічний ефект слід його застережити ?

*** А) Зниження артеріального тиску**

- В) Збудження центральної нервової системи
- С) Порушення серцевого ритму
- Д) Підвищення внутрішньоочного тиску
- Е) Алергічні висипи на шкірі

164. Хворій для лікування алергічного дерматиту після укусів бджіл призначено лоратадин. Який механізм протиалергічної дії препарату?

*** А) Пригнічення H1-гістамінових рецепторів**

- В) Пригнічення H2-гістамінових рецепторів
- С) Блокада D4-лейкотрієнових рецепторів
- Д) Зменшення вивільнення лейкотрієну
- Е) Антисеротонінова активність

165. Лікар при підозрі на холеру призначив пацієнту доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?

*** А) Тетрацикліни**

- В) Пеніциліни
- С) Цефалоспорини
- Д) Циклічні поліпептиди
- Е) Макроліди та азаліди

166. Який із холінотропних лікарських засобів застосовують при глаукомі для зниження внутрішньоочного тиску?

*** А) Пілокарпін**

- В) Атропін
- С) Платифілін
- Д) Скополамін
- Е) Метацин

167. Хворому 30 років із розладом сну і неурівноваженістю психоемоційної сфери лікар призначив діазепам. Чим обумовлений психоседативний ефект препарату?

*** А) Активацією ГАМК-ергічної системи**

- В) Гальмуванням лімбічної системи
- С) Гальмуванням ретикулярної формації
- Д) Зменшенням кількості норадреналіну в ЦНС
- Е) Гальмуванням опіоїдних рецепторів

168. Чому бензилпеніциліну натрієву сіль не застосовують всередину?

*** А) Руйнується HCl шлунку**

- В) Погано всмоктується в кишечнику
- С) Подразнює слизову оболонку шлунка
- Д) Зменшує утворення HCl шлунку
- Е) Руйнується пеніциліназою

169. Порадьте лікарю при кровотечі, обумовленій тривалим застосуванням неодикумарину, препарат антагоніст.

*** А) Вікасол;**

- В) Кислота амінокапронова;
- С) Етамзилат;
- Д) Фібриноген;
- Е) Кислота аскорбінова.

170. Який препарат при передозуванні наркотичним анальгетиком слід застосовувати в якості антидоту для зняття пригнічення дихального центру?

*** А) Налоксон;**

- В) Кордіамін;
- С) Етимізол;
- Д) Камфора;
- Е) Нашатирний спирт.

171. У жінки затяжний період пологової діяльності. Із переліку препаратів виберіть той, який завдяки фізіологічній дії стимулюватиме пологову діяльність.

*** А) Окситоцин;**

- В) Прозерин;
- С) Пахикарпін;
- Д) Прогестерон;
- Е) Естрон.

172. Хворій 48-ми років для зняття важкого нападу бронхіальної астми внутрішньовенно ввели розчин преднізолону. До якої групи гормонопрепаратів належить преднізолон?

- * А) Глюкокортикоїди;**
- В) Гестагенні препарати;
- С) Естрогенні препарати;
- Д) Мінералокортикоїди;
- Е) Анаболічні стероїди.

173. Ви працюєте в аптеці, яка розташована на території шкірно-венерологічного диспансеру. Проконсультуйте лікаря-інтерна: який антибіотик є препаратом вибору для лікування сифілісу?

- * А) Бензилпеніциліну натрієва сіль;**
- В) Лінкоміцину гідрохлорид;
- С) Леворину натрієва сіль;
- Д) Стрептоміцину сульфат;
- Е) Поліміксину М сульфат.

174. Ви працюєте на фармацевтичній фірмі у відділі реалізації ліків. Поясніть провізору-інтерну: до якої фармакологічної групи належить фенофібрат.

- * А) Гіполіпідемічні засоби;**
- В) Інгібітори фібринолізу;
- С) Снодійні засоби;
- Д) Антигіпертензивні засоби;
- Е) Антикоагулянти непрямої дії.

175. Ви провізор-інформатор працюєте в аптеці. Порадьте хворому з загостренням ревматоїдного артрити знеболювальний протизапальний препарат, що найменше шкодить шлунку.

*** А) Целекоксиб;**

В) Диклофенак-натрій;

С) Кислота ацетилсаліцилова;

Д) Ібупрофен;

Е) Індометацин.

176. Ви - провізор аптеки. Для оформлення вітрини сечогінних препаратів виберіть “петльовий” діуретик екстренної, сильної і короткотривалої дії:

*** А) Фуросемід;**

В) Клопамід;

С) Діакарб;

Д) Спіронолактон;

Е) Тріамтерен.