

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Кровообіг. Шок. Інфузійно-трансфузійна терапія"

Категорія: **Анестезіологія**

Кількість запитань: **188**

1. "Гемодинамічні ефекти, які виникають при ректокардіальному рефлексі:"
2. "Яка частина загального об'єму крові міститься у венах?"
3. "За нормального кровообігу найбільший об'єм крові міститься в:"
4. "Який об'єм крові (у відсотках до маси тіла) має молода здорова людина?"
5. "В якій ділянці серцево-судинної системи зміна тиску на 10 мм рт.ст викликає найбільші зміни серцевого викиду?"
6. "За ЦВТ можна робити висновок про показники:"
7. "Збільшення венозного повернення до серця зумовлює:"
8. "Ознака правошлуночвої недостатності:"
9. "Вкажіть на неправильне твердження:"
10. "Автоматизм серця підвищується:"
11. "Функцію провідності серця покращують:"
12. "Збудливість міокарда підвищують іони:"
13. "Електрокардіографія з навантаженням:"
14. "У випадках внутрішньошлуночкової блокади спостерігається:"
15. "Підвищення тиску в правому передсерді, яке не перевищує фізіологічних меж:"
16. "Ритмічна активність сіносово вузла, яка залежить від рівня метаболізму в клітинах пейсмекера, пригнічується у випадках:"

17. "Потреба міокарда в кисні знижується при:"
18. "Сила скорочень серця визначається кінцево-діастолічним об'ємом шлуночка, якщо ЦВТ не перевищує:"
19. "Якщо АТ становить 160/100 мм рт.ст., то середній АТ:"
20. "Вінцевий кровотік під час гіпервентиляції:"
21. "Ефект застосування пропранололу:"
22. "Виразений спазм вінцевих артерій викликають:"
23. "Найбільше венозне повернення до лівої половини серця спостерігається під час:"
24. "Ступінь переднавантаження залежить від"
25. "Вінцевий кровотік визначається головним чином:"
26. "Можливі похибки під час визначення АТ неінвазивним методом:"
27. "Рівень діастолічного АТ визначається головним чином:"
28. "Виберіть неправильне положення щодо вінцевого кровотоку:"
29. "Що звичайно не визначається при *cor pulmonale* (легеневому серці) та серцевій слабкості:"
30. "Електрична кардіоверсія є показаною у випадках:"
31. "Миготлива аритмія у пацієнтів з хворобою Паркінсона - Вольфа - Уайта може бути вкрай небезпечною, якщо буде ще один шлях, який забезпечує дуже швидку реакцію шлуночків. Які з перелічених лікарських засобів можуть бути небезпечними для хворого (можуть збільшити тахікардію)?"

32. "Властива і рання гемодинамічна реакція у відповідь на гіпоксемію:"
33. "Механізми зниження підвищеного внутрішньочерепного тиску при гіпервентиляції:"
34. "На рівень артеріального тиску впливають такі чинники:"
35. "Кардіореспіраторна недостатність при крайньому ожирінні полягає у:"
36. "Артеріальна гіпертензія не є характерною для:"
37. "Причиною систолічної гіпертензії зі збільшенням пульсового тиску не може стати:"
38. "Локалізацією міксоми серця найчастіше є:"
39. "Систолічну і діастолічну артеріальну гіпертензію спричиняють стани"
40. "Стани, при яких розвивається артеріальна гіпотензія зі зниженням пульсового тиску, зниженням ЦВТ і тахікардією:"
41. "Стимуляція барорецепторів у системі судин високого тиску викликає:"
42. "Усе перераховане є чинником ризику розвитку періопераційного інфаркту міокарда"
43. "Гемодинамічні ефекти, властиві для ваговагального рефлексу:"
44. "Артеріальна гіпертензія зі збільшенням пульсового тиску і тахікардією виникє при:"
45. "Виберіть неправильні відповіді:"
46. "Середній артеріальний тиск - це:"

47. "Розвиток ортостатичної артеріальної гіпотензії можливий при"
48. "Артеріальна та венозна гіпотензія з тахікардією розвивається при"
49. "Найімовірнішою причиною синусової брадикардії є:"
50. "Причиною брадикардії можуть бути стани"
51. "Шлуночкова екстрасистолія розвивається при"
52. "Лідокаїну гідрохлорид застосовують для усунення:"
53. "Напад пароксизмальної передсердної тахікардії може бути припинений застосуванням наступних препаратів і заходів"
54. "Припинення нападу пароксизмальної тахікардії може бути досягнуто застосуванням таких препаратів"
55. "Невідкладна допомога у разі раптової втрати свідомості (непритомності):"
56. "При лікуванні стійкої шлуночкової тахіаритмії після введення болюсної дози лідокаїну гідрохлориду (1-1.5 мг/кг) підтримувальна його доза:"
57. "На нормальній ЕКГ для кожного серцевого циклу:"
58. "До відхилення електричної осі вліво на ЕКГ призводить:"
59. "Зубець Р на ЕКГ відповідає:"
60. "Подовження на ЕКГ інтервалу Р-Р більше 0,2 с спостерігається при:"
61. "На нормальній ЕКГ більша частина шлуночкового комплексу є позитивною:"
62. "Інтервал Р-Q на електрокардіограмі:"

63. "У пацієнта під час передопераційного огляду частота скорочень серця становила 44 за 1 хв. Після навантаження знизилася до 40 за 1 хв. Пульс ритмічний. Це може бути ознакою:"
64. "Серцевий викид не зменшується при:"
65. "Серцевий викид зменшується при:"
66. "Зниження серцевого викиду може настати при збільшенні:"
67. "При недостатності серця з явищами застою в малому колі кровообігу спостерігаються такі симптоми:"
68. "Ознакою правошлуночкової недостатності серця є:"
69. "Вкажіть на патофізіологічні чинники, які викликають розвиток гострої декомпенсації серцевого м'яза:"
70. "Гостра лівошлуночкова недостатність може проявитися станами:"
71. "При правошлуночковій недостатності серця розвивається:"
72. "Гострий набряк легень може розвинути внаслідок:"
73. "У хворих з хронічною недостатністю серця життєва ємкість легень:"
74. "У випадках недостатності аортального клапана:"
75. "Пусковим чинником у механізмі розвитку набряку легень у хворих з мітральним стенозом є:"
76. "У разі розвитку набряку легень у хворого з лівошлуночковою недостатністю серця показано застосування:"
77. "Глюкагон впливає на скоротливу функцію міокарда:"

78. "Позитивна інотропна дія препарату означає, що він:"
79. "Показання для призначення серцевих глікозидів:"
80. "Скоротливу здатність міокарда підвищують:"
81. "Найчастішим симптомом легеневої емболії без інфаркту легень є:"
82. "Призначення серцевих глікозидів не є протипоказанням при:"
83. "Хворому з нападом серцевої астми не показано застосування:"
84. "Вкажіть на патологічні стани, при яких застосування серцевих глікозидів не є показаним:"
85. "Типова локалізація петехій у випадках жирової емболії:"
86. "Яки Наведені положення щодо кровотоку і метаболізму в міокарді неправильні:"
87. "Виберіть неправильну відповідь:"
88. "Який з перерахованих чинників не впливає суттєво на вінцевий кровотік?"
89. "Які клінічні ознаки можуть свідчити про розвиток інфаркту міокарда в ранньому післяопераційному періоді?"
90. "Для синдрому гострої ішемії кінцівки властиві такі ознаки:"
91. "Який з перерахованих симптомів є найпомітнішим, а іноді єдиним у разі емболії легеневої артерії, яка викликає інфаркт легень?"
92. "Комплекс невідкладних заходів у випадку тромбоемболії стегнової артерії"
93. "Типові клінічні прояви жирової емболії"

94. "У випадках тампонади серця спостерігаються"
95. "У випадках повітряної емболії легеневої артерії виникають"
96. "У випадках повітряної емболії легеневої артерії укладення хворого на лівий бік може врятувати йому життя внаслідок:"
97. "У випадках повітряної емболії артерій великого кола кровообігу спостерігаються такі симптоми:"
98. "Ознаками повітряної емболії легеневої артерії є:"
99. "Повітряна емболія:"
100. "Лікувальні заходи у випадках повітряної емболії легеневої артерії:"
101. "Жирова емболія, ймовірно, може розвинути після:"
102. "Типові симптоми жирової емболії:"
103. "Розвиток жирової емболії може бути при таких станах"
104. "Для гострого ішемічного синдрому кінцівок властиві:"
105. "Зазначте з наведених нижче суперечливі твердження:"
106. "Етіопатогенетичні чинники виникнення непритомності:"
107. "Пульсовий тиск під час судинного колапсу:"
108. "Збільшення об'єму циркулюючої крові визначається при таких станах"
109. "Яке з наведених порушень може бути причиною збільшення вмісту рідини в тканинах?"

110. "Наслідок зменшення загального периферичного судинного опору:"
111. "Загальний периферичний судинний опір:"
112. "Стани,при яких значно порушується мікроциркуляція:"
113. "Збільшення різниці між ректальною температурою і температурою шкіри виникає у таких випадках:"
114. "Які зміни у мікроциркуляторному руслі властиві для шоку?"
115. "Що є загальним для всіх форм шоку?"
116. "Серед причин шоку можна виділити"
117. "Для яких з наведених видів шоку вже на ранніх стадіях є властивою депресія міокарда:"
118. "Для яких видів шоку інфузія альбуміну є протипоказаною?"
119. "Під час шоку підвищується секреція гормонів:"
120. "Під час тяжкого шоку одночасно функціонує капілярних петель:"
121. "Які з наведених чинників є основними причинами недостатності міокарда під час гіповолемічного шоку?"
122. "Які з наведених положень відповідають дійсності?"
123. "Загрожує життю:"
124. "Які ознаки властиві для геморагічного шоку:"
125. "Гостра крововтрата супроводжується такими змінами"

126. "Після гострої крововтрати протягом кількох хвилин:"
127. "Після гострої крововтрати:"
128. "Які з наведених чинників властиві для гіповолемічного шоку?"
129. "Критичним для перфузії головного мозку є середній АТ:"
130. "За відсутності гіповолемії при нормальній компенсації серцево-судинної системи порушення транспорту кисню до тканин спричинить зниження гемоглобіну до:"
131. "Під час геморагічного шоку чинники, яки несприяють підвищенню АТ:"
132. "Одним з компенсаторних механізмів гострої крововтрати є підвищення тону прекапілярних судин, внаслідок чого:"
133. "У процесі компенсації крововтрати не бере участі механізм:"
134. "Серед наведених рекомендацій під час геморагічного шоку зазначте правильні:"
135. "Застосування препаратів, які мають судинорозширювальний ефект (альфа-адреноблокатори, нітрати) протипоказані під час шоку у випадках:"
136. "Який пріорітет у послідовності поповнення внутрішньосудинних факторів у разі тяжкого геморагічного шоку:"
137. "Для лікування хворих з геморагічним шоком правильними є наступні положення"
138. "Яке з перерахованих інфузійних середовищ найефективніше підвищує АТ?"

139. "Декстриани можуть викликати розлади коагуляції, якщо їх вводити в дозах не менше:"
140. "Декстран-40 (реополіглюкін):"
141. "Що не може стати причиною швидкої смерті у разі ураження шиї:"
142. "Яки стани не можуть бути ускладненням перелому кісток таза:"
143. "Яке положення відносно геріатричної травми неправильно:"
144. "У випадках гострої тампонади осердя (перикарда) не трапляється:"
145. "У випадках гострої тампонади осердя (перикарда) потрібно:"
146. "Найнебезпечнішою реакцією на переливання несумісної крові, від якої пацієнт може вмерти протягом 2-6 днів, є:"
147. "Консервована кров містить адекватну кількість:"
148. "Якщо консервована кров зберігається протягом 10 днів, то:"
149. "Ранніми симптомами трансфузії несумісної крові є:"
150. "Які фактори консервованої крові довготривалих строків зберігання знижують її здатність до транспорту кисню ?"
151. "Препарати кальцію, які вводять у великих кількостях при масивних гемотрансфузіях:"
152. "Вірогідними причинами тканинної гіпоксії при опіках є"
153. "Вкажіть на неправильне твердження:"
154. "Гіповолемію можна очікувати у хворих з:"

155. "Шок, який проявляється зниженням АТ, спазмом периферичних судин, тахікардією, підвищенням ЦВТ, є типовим у випадках:"
156. "Причини кардіогенного шоку :"
157. "Порушення тканинної перфузії під час кардіогенного шоку не супроводжуються:"
158. "Яка клінічна ознака не є характерною для кардіогенного шоку?"
159. "Яки гемодинамічні порушення не розвиваються під час кардіогенного шоку:"
160. "Пульсовий тиск під час кардіогенного шоку:"
161. "Заходи етіопатогенетичної терапії під час кардіогенного шоку:"
162. "Вкажіть на неефективні або небезпечні заходи лікування під час кардіогенного шоку:"
163. "Гіповолемічний шок внаслідок травми звичайно супроводжується:"
164. "Який з перерахованих станів супроводжується зниженням опору периферичних судин?"
165. "Перевагами допаміну перед норадреналіном при артеріальній гіпотензії є:"
166. "Жирова емболія:"
167. "Тяжкий опік може спричинити:"
168. "Вкажіть на мінімальний об'єм крововтрати, яка найчастіше проявляється клінікою шоку:"

169. "Найкращим показником адекватного відновлення об'єму циркулюючої крові після травми є:"
170. "Ймовірність розвитку клінічно значимої реакції несумісності крові становить:"
171. "Свіжозаморожені еритроцити можуть зберігатися:"
172. "Який з названих препаратів крові найчастіше може бути джерелом сифілісу для реципієнта?"
173. "Переваги гідрооксиетиленового крохмалю (рефортан) над декстраном для поповнення об'єму плазми:"
174. "Параметри консервованої в цитрат-фосфат-декстрозному консерванті крові протягом 28 днів, яка зберігалася при 40°C:"
175. "Класичні прояви гемотрансфузійної реакції у хворого в умовах загальної анестезії:"
176. "Кров можна вводити одночасно з такими розчинами для інфузії:"
177. "У хворих, які отримали 1,5л підігрітої крові протягом години:"
178. "Під час гемолітичної трансфузійної реакції потребується негайне введення наведених препаратів"
179. "Положення, що характеризують гемолітичну трансфузійну реакцію:"
180. "Яке положення відносно інфузованих еритроцитів є неправильним?"
181. "Про групи крові ABO:"

182. "Вкажіть на неправильне положення стосовно перехресної проби на сумісність крові:"

183. "Найчастішою інфекцією, яка передається з кров'ю, що переливають, є:"

184. "Зберігання крові:"

185. "Можливі визначення масивної трансфузії:"

186. "Масивна трансфузія:"

187. "При зберіганні крові:"

188. "Вкажіть яке значення мають розчини багатоатомних спиртів (сорбілакт і реосорбілакт) в лікуванні тяжкої політравми:"