

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Серцево-легенево-мозкова реанімація"

Категорія: **Анестезіологія**

Кількість запитань: **61**

1. "Які з перерахованих чинників збільшують переживаність кори головного мозку у випадку ішемії?"
2. "Під час реанімаційних заходів існує великий ризик ушкодження мозку (за інших рівних умов) у випадку:"
3. "Після первинної зупинки серця ритмічне спонтанне дихання звичайно припиняється не пізніше як через:"
4. "Після первинної зупинки серця свідомість втрачається через:"
5. "Для діагностування зупинки дихання визначальними є ознаки"
6. "Найінформативнішими для своєчасної діагностики зупинки серця є такі симптоми:"
7. "Наступні ознаки є інформативними симптомами ефективності штучної вентиляції легень"
8. "Найефективнішим ургентним методом ШВЛ є:"
9. "Можливі причини роздування шлунка під час проведення дихання методом рот до рота:"
10. "У випадку дуже небезпечної інфекції або отруєння ФОС у хворого з відсутністю спонтанного дихання слід застосувати такий ургентний метод ШВЛ:"
11. "У випадку правильного проведення ШВЛ методом рот до рота:"
12. "У випадках тяжкого бронхіоло-спазму найефективнішим є такий ургентний метод ШВЛ:"

13. "Найефективнішим методом підтримки прохідності верхніх дихальних шляхів за неможливості інтубації є:"
14. "Прийом Геймліха:"
15. "Найчастішим ЕКГ-симптомом гострої серцевої смерті у перші хвилини є:"
16. "Під час серцево-легеневої реанімації на розмір зіниць і їхню реакцію на світло можуть впливати такі чинники:"
17. "Під час серцево-легеневої реанімації:"
18. "В якому положенні хворого слід проводити заходи серцево-легенево-мозкової реанімації?"
19. "Негайний етап серцево-легенево-мозкової реанімації передбачає проведення"
20. "У пацієнта на ЕКГ діагностована фібриляція шлуночків. Першочерговим терапевтичним заходом повинно бути:"
21. "Які з наведених тверджень, що стосуються серцево-легеневої реанімації, є правильними?"
22. "Виберіть правильне твердження:"
23. "Вибериіть правильні твердження:"
24. "Перед проведенням заходів СЛР у випадку повітряної емболії легеневої артерії слід повернути пацієнта"
25. "У разі повітряної емболії:"

26. "Який з перерахованих заходів потрібно застосувати першим у разі зупинки кровообігу, яка відбулася не на очах реаніматора, за відсутності кардіомоніторингу?"
27. "Точка для нанесення прекардіального удару розміщена:"
28. "Яке з наведених тверджень є правильним:"
29. "Під час проведення закритого масажу серця у дорослих компресії груднини рекомендується робити з частотою:"
30. "Під час проведення закритого масажу серця у дітей раннього віку компресії груднини рекомендується робити з частотою:"
31. "Для проведення ефективного закритого масажу серця у дорослих груднина має прогинатися у напрямку до хребта на:"
32. "Для проведення ефективного закритого масажу серця у дітей груднина має прогинатися у напрямку до хребта на:"
33. "Достовірно свідчать про ефективний кровообіг"
34. "Які з перерахованих ознак свідчать про ефективність масажу серця?"
35. "За потреби проведення протягом серцево-легеневої реанімації спеціальних процедур (внутрішньосерцева ін'єкція, дефібриляція) час припинення ШВЛ та масажу серця не повинен перевищувати:"
36. "Під час проведення закритого масажу серця з'явився специфічний хрускіт, який свідчить про перелом ребер. Ваші подальші дії:"
37. "Яке з перерахованих ускладнень малоймовірно під час проведення закритого масажу серця?"

38. "У дітей під час проведення зовнішнього масажу серця порівняно із дорослими частіше спостерігається ускладнення:"
39. "Середні значення енергії монополярного електричного імпульсу під час дефібриляції у дітей:"
40. "Початкова енергія монополярного електромагнітного імпульсу під час дефібриляції у дорослих становить:"
41. "Енергія монополярного електромагнітного імпульсу під час повторної дефібриляції у дорослих становить:"
42. "Енергія монополярного електромагнітного імпульсу під час повторної дефібриляції у випадку неефективності двох попередніх у дорослих становить:"
43. "При використанні дефібрилятора підлопатковий і грудний електроди повинні розміщуватися відповідно:"
44. "При використанні дефібриляторів з двома грудними електродами, останні повинні розміщуватися:"
45. "При використанні дефібриляторів з синхронізаторами для нормалізації серцевого ритму розряд наносять:"
46. "Електрична дефібриляція може бути неефективною, якщо:"
47. "Застосування електричної дефібриляції у пацієнта із зупинкою серця та імплантованим водієм ритму:"
48. "Електричну дефібриляцію при зупинці серця:"
49. "Який з перерахованих препаратів у більшості випадків є найефективнішим для відновлення серцевої діяльності?"

50. "Ефективність введення адреналіну гідрохлориду для відновлення серцевої діяльності знижується у випадках:"
51. "Селективні бета-адреноміметики недоцільно застосовувати для відновлення серцевої діяльності внаслідок:"
52. "Допустимими шляхами введення адреналіну гідрохлориду у випадку зупинки серця є:"
53. "У разі внутрішньотрахеального введення під час серцево-легеневої реанімації:"
54. "Які з наступних положень, що стосуються введення лідокаїну гідрохлориду під час і після серцево-легеневої реанімації, є коректними?"
55. "Які з нижчеперерахованих засобів можна вводити ендотрахеально під час серцево-легеневої реанімації?"
56. "При введенні яких з перерахованих лікарських засобів під час проведення серцево-легеневої реанімації може розвинути контрактура міокарда (камінне серце)?"
57. "Застосування кальцію хлориду рекомендується при зупинці серця у випадках:"
58. "Застосування натрію гідрокарбонату у випадках припинення серцевої діяльності:"
59. "Передозування натрію гідрокарбонату під час проведення серцево-легеневої реанімації може призвести до"
60. "Виберіть коректні положення, які стосуються раннього постреанімаційного періоду:"

61. "У ранньому постреанімаційному періоді показання для застосування гіпертонічного розчину глюкози:"