

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Клінічна фізіологія нирок. Діуретичні засоби"

Категорія: **Анестезіологія**

Кількість запитань: **79**

1. "Для ГНН, спричиненої гемолізом еритроцитів, властиво:"
2. "У хворого з ретенційною азотемією буде виявлено:"
3. "У нирках людини за добу утворюється:"
4. "В основі функції нирки лежать процеси:"
5. "Фільтрація в нирці може здійснюватися за мінімального гідростатичного тиску в капілярах ниркового клубочка:"
6. "Зниження кровотоку в ниркових клубочках супроводжується:"
7. "Відносно ниркового кровотоку (НКТ) та швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) все перераховане правильно, за винятком:"
8. "До механізмів утворення гіперосмолярної сечі можна віднести:"
9. "За добу нирковими клубочками фільтрується в нормі первинної сечі:"
10. "В нормі у проксимальних звивистих каналцях нирок абсорбується:"
11. "У дистальних звивистих каналцях безпосередньо в кров'яне русло відбувається реабсорбція:"
12. "Добова сеча в нормі містить:"
13. "Збільшення секреції калію у дистальних ниркових каналцях відбувається у випадках"
14. "Активний транспорт Na^+ та Cl^- у висхідній частині петлі нефрону (Генле) зумовлює:"
15. "Механізм антидіуретичної дії вазопресину (АДГ) полягає у:"

16. "Застосування інгібіторів ангіотензинконвертуючого ферменту (наприклад, каптоприлу) знижує артеріальний тиск за рахунок"
17. "Для гострої недостатності нирок (ГНН), яка виникає у зв'язку з позанирковою патологією (екстраренальна ГНН) властиві такі характеристики:"
18. "Для ГНН, спричиненої первинною нирковою патологією (ренальна ГНН), властиві такі характеристики:"
19. "Для преренальної ГНН, спричиненої порушеннями водно-електролітного балансу, властиві:"
20. "Інтерстиціальний нефрит з наступним розвитком ГНН може бути викликаний застосуванням"
21. "Гострий канальцевий некроз нирки можуть викликати:"
22. "Міоглобінурія може бути викликана:"
23. "У випадках ГНН, спричиненої тяжким ентеритом, у першу чергу потрібно здійснити корекцію таких порушень:"
24. "У випадках ГНН, спричиненої невгамовним блюванням, у першу чергу потрібно провести корекцію таких порушень:"
25. "Для ГНН, яка розвинулася внаслідок симетричного некрозу кіркового шару нирок, властиво:"
26. "Для установлення діагнозу ГНН, спричиненої септичним абортom, найбільше значення мають:"
27. "Для діагностики сулемової нирки мають значення:"

28. "Для діагностики сульфаніламідної нефропатії з розвитком ГНН не мають значення положення:"
29. "Ризик розвитку ГНН при ангіографії залежить від:"
30. "Для преренальної олігурії властиві такі показники:"
31. "Для діагностики нефропатії, спричиненої антибіотиками, з розвитком ГНН симптоми, які є не інформативними:"
32. "Для міоглобінурійної нирки (у тому числі у випадках синдрому тривалого стискання) властиві:"
33. "Препарати, які сприяють збільшенню клубочкової фільтрації:"
34. "В основу класифікації діуретичних засобів покладено такі чинники"
35. "Виберіть калійсберігаючі діуретики:"
36. "До ртутних діуретиків належать:"
37. "Ртутні діуретики:"
38. "Амонію хлорид:"
39. "Осмотичні діуретики незначно змінюють:"
40. "Осмотичні діуретики:"
41. "Манітол можна віднести до:"
42. "Сечовина може підвищувати:"
43. "До властивостей манітолу можна віднести:"

44. "Застосування манітолу показане:"
45. "Початковий ефект внутрішньовенного введення манітолу:"
46. "Найважливіші властивості салуретиків:"
47. "До властивостей фуросеміду належать такі"
48. Діакарб:
49. "До антагоністів альдостерону належать:"
50. "Спіронолактон (верошпирон):"
51. "Похідні ксантину:"
52. "Випадки, коли слід накладати жгут на кінцівку при травматичному рабдоміолізі?"
53. "Незворотній ішемії при рабдоміолізі властиво:"
54. "Декомпенсованій ішемії при рабдоміолізі властиво:"
55. "Компенсованій ішемії при рабдоміолізі властиво:"
56. "Головні причини порушення гемодинаміки у хворих на рабдоміоліз:"
57. "Розвитку гострої недостатності нирок у хворих на рабдоміоліз сприяють:"
58. "Основу феномену реперфузії у хворих на рабдоміоліз становлять:"
59. "У хворих на рабдоміоліз:"
60. "Для нефропатичного синдрому властиві"

61. "Основним місцем дії гідрохлортіазиду є:"
62. "У патогенезі гострої недостатності нирок при гострому гломерулонефриті найважливішим чинником є:"
63. "Основним шляхом кислотної екскреції нирками є:"
64. "У хворих з хронічною недостатністю нирок визначають остеодистрофію. У патогенезі цього стану грають роль такі чинники"
65. "У хворих з тяжкою недостатністю нирок, особливо хронічною, нормохромна та нормоцитарна анемія зумовлена, головним чином:"
66. "Споживання 150 ммоль натрію на день збалансовує таку саму кількість, яка втрачається з сечею. Оскільки за добу фільтрується в ультрафільтрат близько 26000 ммоль натрію, то ряд реабсорбційних механізмів мають важливе значення, в тому числі"
67. "Основним механізмом дії в організмі капотену (каптоприлу) є:"
68. "Для ГНН, спричиненої первинною патологією нирок, властиві такі характеристики:"
69. "Виберіть неправильне положення з наведених:"
70. "Виберіть правильні положення з наведених нижче, що стосуються рабдоміолізу:"
71. ""Поріг екскреції нирками глюкози в нормі відповідає концентрації глюкози в плазмі:"
72. "Секреція органічних іонів (наприклад, ПАГ, сечова кислота, креатинін) головним чином проходить у:"

73. "Яка із слідуєчих субстанцій як реабсорбсорується , так і секретується в нирках?"

74. "Яке з цих положень відносно транспорту натрію в нирках є вірним?"

75. "Який з приведених факторів протидіє ультрафільтрації у гломерулі?"

76. "Вазоконстрикція ниркової артерії може привести до підняття середнього артеріального тиску як наслідок:"

77. "Підвищення секреції ренину супроводжується збільшенням"

78. "Яка з приведених субстанцій має найнижчий нирковий кліренс?"

79. "Який з приведених факторів найбільш збільшує швидкість клубочкової фільтрації?"