

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Клінічна фізіологія печінки"

Категорія: **Анестезіологія**

Кількість запитань: **101**

1. "Хворому з гострим гепатитом:"
2. "У хворого із захворюванням печінки:"
3. "Сталий об'єм крові в печінці в нормі порівняно з ОЦК становить:"
4. "У нормі перфузія печінки здійснюється артеріальною і венозною кров'ю відповідно:"
5. "Густина кисню, що надходить до печінки за рахунок артеріальної та венозної крові, в нормі становить відповідно:"
6. "Насичення киснем крові ворітної вени в нормі становить:"
7. "Вкажіть на неправильні положення щодо участі печінки у вуглеводному обміні:"
8. "Печінка відіграє велику роль у синтезі:"
9. "У нормі основними місцями утворення амонію в організмі є:"
10. "Печінка є основним місцем синтезу:"
11. "Ліпотранспортні механізми в печінці активуються під впливом таких речовин, як:"
12. "Ліпотранспортні механізми в печінці стають слабшими під впливом:"
13. "Про зменшення участі печінки в холестериновому обміні достовірніше свідчить:"
14. "Визначте правильне твердження щодо участі печінки в жировому обміні:"

15. "У якій з перерахованих внутрішньоклітинних структур гепатоцита відбувається ензиматична інактивація більшої частини гормонів, лікарських речовин, токсичних речовин та отрут?"
16. "Неспецифічну "ензимну індукцію" біотрансформації ксенобіотиків у печінці викликають:"
17. "Процеси кон'югації сульфатом і глюкуронідом токсичних речовин у печінці роблять їх більш:"
18. "Ключове положення в циклі сечовиноутворення в печінці займає:"
19. "Синтез сечовини в організмі людини відбувається у:"
20. "Формування жовчі в гепатоцитах відбувається в:"
21. "Головним чинником, який визначає об'єм жовчі, що продукується печінкою, є:"
22. "Крім води в жовчі міститься найбільша кількість:"
23. Уробілін:
24. Уробіліноген:
25. "Утворення білірубін-моноглюкуроніду та білірубін-диглюкуроніду відбувається в:"
26. "Фермент УДФ-глюкуронілтрансфераза здійснює:"
27. "Причиною розвитку жовтяниці за тривалого застосування аміназину є:"
28. "Неспецифічна "ензимна індукція" посилює токсичність:"

29. "Жирова інфільтрація печінки та її функціональна недостатність може виникнути:"
30. "Вкажіть найбільш гепатотоксичні лікарські засоби з перерахованих нижче:"
31. "Найчастіше медикаментозний гепатит розвивається після застосування:"
32. "У хворого з захворюванням печінки:"
33. "Після перев'язки воротної вени:"
34. "Дезінтоксикаційна функція печінки у здорових людей найнижча у віці:"
35. "При захворюваннях печінки:"
36. "При захворюваннях печінки застосовувати міорелаксанти слід обережно у випадках, коли у хворого є:"
37. "Найбільш ранні симптоми захворювання печінки:"
38. "Найнесприятливіша ознака при захворюванні печінки:"
39. "Для раннього етапу повної механічної жовтяниці властиві такі зміни:"
40. "Для пізніх етапів механічної жовтяниці властиві такі зміни:"
41. "У давнених випадках часткової обтураційної жовтяниці у хворого визначається:"
42. "Підвищення фракції прямого білірубіну при паренхіматозній жовтяниці зумовлено:"
43. "Якщо при паренхіматозній жовтяниці превалює збільшення вмісту непрямого білірубіну і підвищується активність трансаміназ у плазмі крові, то:"

44. "Якщо при паренхіматозній жовтяниці превалює збільшення фракції прямого білірубіну, то:"
45. "При паренхіматозній жовтяниці показники білірубіну в крові можуть бути:"
46. "Суттєве збільшення вмісту аспартатамінотрансферази (АСТ) у хворого з жовтяницею ймовірно пов'язано з:"
47. "Для диференційної діагностики жовтяниці може бути корисною оцінка таких показників:"
48. "У хворого з паренхіматозною жовтяницею в сечі виявляють:"
49. "Для вираженої гемолітичної жовтяниці властиво:"
50. "Тимолова проба може бути високоінформативною для диференційної діагностики між:"
51. "Одноразове введення холінхлориду, особливо в поєднанні з нікотиновою кислотою, еуфіліном, аскорбіною кислотою може бути використане для диференційної діагностики між жовтяницею:"
52. "Сульфаніламід у хворих з тяжким ураженням печінки можуть:"
53. "У хворого в комі внаслідок печінкової енцефалопатії властиві такі розлади:"
54. "Поява у хворого із захворюванням печінки гіпоальбумінемії у поєднанні з гіперпротеїнемією вказує на:"
55. "Підвищення імуноглобулінів понад 40% у фракції глобулінів може бути ознакою:"
56. "Продукційна азотемія може розвиватися у хворого з:"

57. "Гіперпродукційна азотемія може розвиватися у хворого з:"
58. "Зниження концентрації сечовини на фоні продукційної азотемії у хворого з тяжким захворюванням печінки свідчить про:"
59. "У нормі азот сечовини в структурі залишкового азоту плазми крові становить:"
60. "У хворого з гіперпродукційною формою азотемії виявляється:"
61. "У хворого з помірним гемолізом визначається:"
62. "Уробіліноген у сечі ймовірно не буде у випадках:"
63. "Зеленувато-бурий колір осаду сечі є наслідком:"
64. "Телеангіоектазії з'являються у хворих з цирозом печінки внаслідок:"
65. "Метилмеркаптан, який зумовлює специфічний запах "печінки, що розкладається" у хворих з тяжкою недостатністю печінки, утворюється у надлишку в результаті порушення обміну:"
66. "Розвиткові енцефалопатії у хворих з тяжкою недостатністю печінки сприяє порушення обміну"
67. "У хворих з тяжкою недостатністю печінки тканини організму як додаткове джерело енергії використовують такі амінокислоти:"
68. "Поряд з амоніємією тяжким порушенням функції ЦНС при ураженні печінки сприяють також:"
69. "Визначте найефективніший метод підвищення кисневого балансу печінки за нормального серцевого викиду:"

70. "Призначення глікокортикоїдів доцільно у випадках:"
71. "Рівень амоніємії у хворих з тяжкою недостатністю печінки може знизити:"
72. "Метою введення аргініну хлориду при тяжкій недостатності печінки є:"
73. "Застосування яблучної кислоти обґрунтовано у випадках:"
74. "Для пригнічення амоніогенезу у травному каналі у хворих із захворюваннями печінки (особливо при кровотечах у травний канал) можна при-значати:"
75. "Для припинення нападів психомоторного збудження у хворого з печінковою енцефалопатією перевагу слід віддавати таким препаратам:"
76. "Для лікування хворого з гострою недостатністю печінки при концентрації альбуміну плазми крові 32 г/л доцільніше призначати:"
77. "Порівняно із звичайними розчинами амінокислот адаптовані розчини типу "Аміностерил-Нерар":
78. "Призначаючи глікокортикоїди хворим з тяжким ураженням печінки, доцільно їх поєднувати з:"
79. "Введення холінхлориду хворим з тяжким ураженням печінки може:"
80. "У хворого з жовтяницею:"
81. "Застосування фенobarбіталу та седуксену не показано більш ніж за добу до передбачуваного наркозу:"
82. "Виберіть правильні положення:"

83. "Для хворого із захворюванням печінки оптимальна анестезіологічна допомога:"
84. "Підвищення якого печінкового ферменту в крові визначається у хворих з обструкцією жовчних шляхів?"
85. "Під час холецистектомії найчастіше ушкоджують:"
86. "У людини основним шляхом метаболізму азоту з амінокислот є сечовиноутворення в печінці. Які з перерахованих ферментів беруть участь у цьому процесі?"
87. "Яка сполука є найважливішим алостеричним активатором гліколізу в печінці?"
88. "Гліконеогенез у печінці з аланіну потребує участі:"
89. "Ускладнення, що часто трапляються у хворих з хронічною гемолітичною анемією"
90. "Для цирозу печінки властиві такі ознаки:"
91. "Які з перерахованих нижче заходів є найефективнішими для зниження амоніємії при енцефалопатії, зумовленій захворюванням печінки?"
92. "Стінка жовчних капілярів печінки утворена:"
93. Печінка:
94. "Для визначення тяжкості недостатності печінки слід враховувати:"
95. "У здорової людини щоденний синтез альбуміна в печінці становить:"

96. "Підвищення концентрації альфа-протеїну у плазмі крові більш ніж 400 нг/мл та прогресуюче її збільшення вказує на:"

97. "Які з наведених амінокислот є глюкогенними амінокислотами?"

98. "Утилізація жирних кислот у печінці відбувається двома шляхами: естерифікацією або бета-окисленням. Вкажіть дві вірні відповіді відносно цього:"

99. "Опіоїди (?-агоністи) можуть підвищити інтрабіліарний тиск. Вкажіть речовини, котрі можуть протидіяти цьому:"

100. "В печінці синтезуються усі чинники згортання крові, крім:"

101. "Синтез яких чинників згортання крові залежить від вітаміну К?"