

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Клінічна фізіологія травної системи. Парентеральне живлення"

Категорія: **Анестезіологія**

Кількість запитань: **60**

1. "До характеристик етанолу належать:"
2. "Добова потреба дорослої людини в енергії в умовах абсолютного спокою, приблизно становить:"
3. "Ускладнення повного парентерального живлення (ППЖ):"
4. "Добова потреба дорослого хворого після операції, який перебуває на постільному режимі без вираженої катаболічної активності, приблизно становить:"
5. "Добова потреба в енергії дорослого післяопераційного хворого з вираженою катаболічною активністю приблизно становить:"
6. "Для забезпечення енергетичних потреб організму при парентеральному живленні використовують:"
7. "Для забезпечення пластичних потреб організму при парентеральному живленні використовують:"
8. "Для адекватного забезпечення енергетичних і пластичних потреб організму оптимальним співвідношенням між вуглеводами, жирами та білками відповідно є ,%:"
9. "Для здійснення адекватного парентерального живлення дорослій людині потрібно за добу вводити води мінімум:"
10. "Добова потреба натрію та хлору при повному парентеральному живленні для дорослого хворого становить:"
11. "Добова потреба у вуглеводах для дорослої людини становить:"
12. "Вкажіть на органи і тканини, які в нормі утилізують тільки глюкозу:"

13. "Внаслідок інфузії великих кількостей гіпертонічного розчину глюкози може розвинутися:"

14. "Найвищою добовою дозою глюкози для дорослого в процесі проведення парентерального живлення є:"

15. "Внаслідок тривалого парентерального введення надлишкових кількостей глюкози можуть розвинутися"

16. "Причинами, які зумовлюють неможливість використання тільки глюкози для забезпечення енергетичних потреб організму, є:"

17. "Виберіть суміші субстратів, які дають змогу зменшити стресову резистентність до глюкози:"

18. "Обґрунтуванням для використання замінювачів глюкози (фруктози, сорбітолу, ксилітолу) можуть бути такі положення:"

19. "Утилізувати замітники глюкози (фруктозу, сорбітол) може:"

20. "У нормі для енергетичних цілей деякі органи і тканини можуть метаболізувати жирні кислоти. Які з наведеного переліку?"

21. "Використання жирових емульсій у процесі повного парентерального живлення обґрунтовується такими положеннями:"

22. "Інфузії жирових емульсій протипоказані у таких випадках"

23. "Побічними ефектами інфузії жирових емульсій можуть бути:"

24. "Результатом передозування жирових емульсій можуть бути такі симптоми"

25. "При використанні жирової емульсії рекомендується додавати гепарин дозою:"

26. "Застосування жирових емульсій для парентерального живлення у випадку гострого панкреатиту"

27. "Щоб запобігти несприятливим ефектам при інфузії етанолу потрібно керуватися такими положеннями:"

28. "Виберіть основні протипоказання до використання етанолу в процесі парентерального живлення:"

29. "Протипоказання для внутрішньовенного введення розчинів фруктози та етанолу:"

30. "Внаслідок раптового припинення інфузії концентрованих розчинів глюкози може розвинути:"

31. "Виберіть значення оптимальної швидкості інфузії етанолу при парентеральному живленні у дорослих:"

32. "Максимальною добовою дозою етанолу (96%) у дорослого є:"

33. "Ефекти внутрішньовенного введення етанолу:"

34. "Виберіть правильні положення стосовно підтримання нормального білкового балансу при парентеральному живленні:"

35. "Протипоказанням для використання препаратів амінокислот є:"

36. "Щоб досягти максимальної утилізації амінокислот і уникнути втрати їх із сечею, слід дотримуватися таких правил:"

37. "За нормального балансу між анаболічними та катаболічними процесами добова потреба в білку становить:"

38. "Мінімальна добова потреба в амінокислотах дорослої людини становить:"

39. "Виберіть положення, які обґрунтовують потребу введення сполук міді під час проведення повного парентерального живлення:"
40. "Виберіть положення, які обґрунтовують необхідність введення фосфатів під час проведення повного парентерального живлення:"
41. "Виберіть положення, які обґрунтовують необхідність введення сполук заліза під час проведення повного парентерального живлення:"
42. "Необхідність застосування сполук кобальту під час проведення повного парентерального живлення обґрунтовується такими положеннями"
43. "Стимуляція глюкозою бета-клітин ostrivciv підшлункової залози викликає:"
44. "Вкажіть на неправильне положення щодо ентерального живлення:"
45. "Добова секреція шлункового соку в нормі становить:"
46. "За наявності гастриту з високою секрецією у шлунковому вмісті відносно:"
47. "Найбільша кількість натрію міститься у:"
48. "Концентрація калію в 4-5 разів більша порівняно з кров'ю у:"
49. "Концентрація гідрогенкарбонатного іону в 3-4 рази більша у:"
50. "Найбільша кількість хлору міститься у:"
51. "Найбільш тяжкі порушення водно-електролітного балансу виникають у випадку непрохідності на рівні:"
52. "Паралітичну непрохідність кишок може спричинити передозування:"
53. "Найчастіше смерть хворих з нелікованою непрохідністю кишок спричинює:"

54. "У хворого зі странгуляційною непрохідністю кишок нетиповою є така ознака:"

55. "Для лікування хворого з динамічною непрохідністю кишок використовують:"

56. "В лікуванні важкого гострого панкреатиту показані заходи"

57. "Застосування інгібіторів протеолітичних ферментів у хворих з важким гострим панкреатитом"

58. "Інтенсивна терапія перитоніту передбачає проведення"

59. "Лікувальна тактика у хворого з гострою післятравматичною внутрішньочеревною кровотечею:"

60. "Недостатності функції зовнішнього дихання після операцій на травному каналі сприяють"