

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нейроендокринна система"

Категорія: **Анестезіологія**

Кількість запитань: **69**

1. "Призначення глікокортикоїдів показано при"
2. "Передня частка гіпофіза виділяє:"
3. "Синтез якого гормону кори надниркової залози найменше залежить від впливу гіпофіза?"
4. "Пригнічують дію вазопресину (АДГ) на нирки такі препарати"
5. "Вкажіть положення, які не стосуються до біологічного ефекту вазопресину (АДГ):"
6. "Якими ознаками не може бути характеризован синдром неадекватної секреції вазопресину (АДГ):"
7. "До синдрому надмірного виділення вазопресину входять:"
8. "У лікуванні хворих із синдромом неадекватної секреції вазопресину є необхідно"
9. "До чинників, які впливають на секрецію вазопресину належать такі"
10. "Тяжкі форми гіпопітуїтаризму (недостатності гіпофіза) проявляються недостатністю ендокринних залоз:"
11. "Гостра форма недостатності гіпофіза (ураження передньої частки гіпофіза) розвивається у випадках"
12. "Яке захворювання не сприяє розвитку артеріальної гіпертензії?"
13. "Підвищення систолічного АТ зі збільшенням пульсового тиску є ознакою:"
14. "Артеріальна гіпертензія, зумовлена збільшенням периферичного судинного опору, розвивається у випадках:"

15. "Артеріальна гіпотензія властива для:"
16. "В островцях підшлункової залози утворюється:"
17. "Яке з наведених тверджень є неправильним:"
18. "Основні біологічні ефекти інсуліну"
19. "Потреба в інсуліні підвищується у випадках"
20. "Вірусна інфекція може бути етіологічним чинником:"
21. "Кількість специфічних рецепторів до інсуліну знижується у випадка:"
22. "Для юнацького (інсулінозалежного) цукрового діабету властиво:"
23. "Виразна тенденція до розвитку кетоацидозу властива для:"
24. "До патофізіологічних порушень, які є властивими для діабетичного кетоацидозу, не належать:"
25. "До клінічного симптомокомплексу інсулінонезалежного цукрового діабету не входять:"
26. "При якому захворюванні застосовується хлорпропамід?"
27. "До патогенетичних чинників діабетичної ангіопатії не належить:"
28. "Толбутамід застосовують хворим на:"
29. "При діабетичному кетоацидозі зазвичай не розвивається:"
30. "Основним патогенетичним механізмом виникнення діабетичного кетоацидозу є:"

31. "Можливими етіологічними чинниками діабетичного кетоацидозу можуть бути"
32. "Для лікування у разі діабетичного кетоацидозу слід застосовувати"
33. "Основною перевагою методу малих доз інсуліну при діабетичноу кетоацидозі є:"
34. "У випадках діабетичного кетоацидозу слід призначати внутрішньовенне введення натрію гідрогенкарбонату:"
35. "Ознаками гіперосмолярної некетоацидотичної коми є ознаки"
36. "У випадках гіперосмолярної некетоацидотичної коми показані"
37. "Специфічні ускладнення, які можуть виникнути під час операції у хворого на цукровий діабет 1-го типу:"
38. "Абсолютні протипоказання до планової операції у хворого на цукровий діабет:"
39. "До перших симптомів кетоацидозу належать"
40. "Кетоацидозу властиві такі функціональні та біохімічні порушення"
41. "Щитоподібна залоза секретує"
42. "Яке з наведених тверджень неправильне:"
43. "Для гіпертиреозу властиве"
44. "У хворих на гіпертиреоз розвиваються такі гемодинамічні розлади"
45. "До симптомокомплексу гемодинамічних порушень у хворих на тиреотоксикоз входить:"

46. "Артеріальна гіпертензія зі збільшенням пульсового тиску, зменшенням діастолічного тиску і тахікардією властива для:"
47. "Шок у випадках хронічної недостатності надниркових залоз (аддісонічний криз) первинно зумовлений:"
48. "Терапія під час аддісонічного кризу (хронічна недостатність надниркових залоз) спрямована на:"
49. "Вкажіть на неправильне твердження з наведених нижче:"
50. "Феохромоцитома: що є правильним?"
51. "Лікування у випадках гіпертонічного кризу у хворих з феохромоцитомою слід починати:"
52. "Артеріальна гіпертензія у поєднанні зі зменшенням ОЦК зазвичай спостерігається при:"
53. "Головні причини розвитку артеріальної гіпотензії після видалення феохромоцитоми:"
54. "Які засоби слід мати наготові під час операції видалення феохромоцитоми?"
55. "До спеціальної підготовки перед операцією видалення феохромоцитоми не входять:"
56. "Головною проблемою, яка виникає після виділення та видалення феохромоцитоми, є:"
57. "Вкажіть на ускладнення , які виникають за умови швидкої відміни глікокортикоїдів:"

58. "Клінічними проявами гострої недостатності надниркових залоз (синдром Уотерхауза-Фрідеріхсена) є:"
59. "Який з перерахованих нижче гормонів має найбільшу глікокортикоїдну активність?"
60. "Який з перерахованих нижче гормонів та гормональних препаратів має максимальну мінералокортикоїдну активність?"
61. "Виберіть правильні положення:"
62. "При довготривалому використанні кортикостероїдів характерні такі ускладнення:"
63. "У регуляції обміну кальцієм беруть участь такі гормони:"
64. "Вкажіть на порушення водно-електролітного обміну у дорослого хворого, властиві для кетоацидотичної коми з помірною артеріальною гіпотензією:"
65. "У хворих на гіперпаратиреоз?"
66. "Виберіть неправильне твердження щодо нейрогіпофізу та механізму осморегуляції в організмі:"
67. "Виберіть неправильне твердження щодо взаємозв'язку між осмолярністю та вазопресином (АДГ):"
68. "Що є невластивим для нецукрового діабету:"
69. "Які механізми нейрогуморальної регуляції гемодинаміки та осмолярності не є пов'язаними:"