

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

9 Клінічна бактеріологія"

Категорія: **Бактеріологія**

Кількість запитань: **65**

1. "Вкажіть мікроорганізми, які в нормі домінують в дистальних відділах кишечника людини"
2. "Вкажіть кількість біфідобактерій, що характеризує нормальний мікробіоценоз товстого кишківника людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
3. "Вкажіть кількість лактобактерій, що характеризує нормальний мікробіоценоз товстого кишківника людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
4. "Вкажіть кількість ешерихій, що характеризує нормальний мікробіоценоз товстого кишківника людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
5. "Вкажіть кількість бактероїдів, що характеризує нормальний мікробіоценоз товстого кишківника людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
6. "Вкажіть кількість пептококів і пептострептококів, що характеризує нормальний мікробіоценоз товстого кишківника людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
7. "Вкажіть кількість коагулазопозитивних стафілококів, що порушує мікробіоценоз товстого кишківника людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
8. "Вкажіть кількість клостридій, що характеризує нормальний мікробіоценоз товстого кишківника людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
9. "Вкажіть кількість пропіонібактерій, що характеризує нормальний мікробіоценоз товстого кишківника людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
10. "Вкажіть кількість бактерій роду *Acinetobacter*, що порушує мікробіоценоз товстого кишківника людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
11. "Вкажіть кількість умовно-патогенних ентеробактерій і неферментуючих глюкозу грамнегативних паличок, що порушує мікробіоценоз товстого кишківника людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"

12. "Вкажіть кількість грибів роду *Candida*, що порушує мікробіоценоз товстого кишківника людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
13. "Вкажіть бактерії, що входять до облігатної складової мікробіоценозу шкірних покривів людини:"
14. "Вкажіть бактерії, що входять до облігатної складової мікробіоценозу слизових оболонок носових ходів людини:"
15. "Вкажіть бактерії, що входять до облігатної складової мікробіоценозу слизових оболонок зіву, носоглотки, мигдаликів людини:"
16. "Вкажіть бактерії, що входять до факультативної складової мікробіоценозу слизових оболонок зіву, носоглотки, мигдаликів людини:"
17. "Вкажіть первинний резервуар *S. aureus* в організмі людини:"
18. "Які мікроорганізми в нормі домінують у змішаному дихально-травному біотопі (ротоглотці) організму людини?"
19. "Чи колонізують в нормі мікроорганізми кінцеві гілки бронхів та альвеоли?"
20. "Вкажіть кількість альфа-гемолітичних та зеленящих стрептококів, що характеризує нормальний мікробіоценоз слизової оболонки ротоглотки людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
21. "Вкажіть кількість непатогенних нейссерій, що характеризує нормальний мікробіоценоз слизової оболонки ротоглотки людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
22. "Вкажіть кількість непатогенних коринебактерій, що характеризує нормальний мікробіоценоз слизової оболонки ротоглотки людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"

23. "Вкажіть кількість бета - гемолітичних стрептококів, що порушує мікробіоценоз слизової оболонки ротоглотки людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
24. "Вкажіть кількість *S. pneumoniae*, що порушує мікробіоценоз слизової оболонки ротоглотки людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
25. "Вкажіть кількість *S. aureus*, що порушує мікробіоценоз слизової оболонки ротоглотки людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
26. "Вкажіть кількість *H. influenzae*, що порушує мікробіоценоз слизової оболонки ротоглотки людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
27. "Вкажіть кількість бактерій родів *Moraxella* і *Branchamella*, що порушує мікробіоценоз слизової оболонки ротоглотки людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
28. "Вкажіть кількість бактерій сімейства *Enterobacteriaceae*, що порушує мікробіоценоз слизової оболонки ротоглотки людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
29. "Вкажіть кількість грибів роду *Candida*, що порушує мікробіоценоз слизової оболонки ротоглотки людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
30. "Вкажіть кількість бактерій роду *Enterococcus*, що порушує мікробіоценоз слизової оболонки ротоглотки людини (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
31. "Вкажіть кількість грибів роду *Candida*, що порушує мікробіоценоз слизової оболонки піхви (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
32. "Вкажіть бактерії, що входять до облігатної складової мікробіоценозу піхви:"

33. "Вкажіть бактерії, що зустрічаються в нормі на слизових оболонках органу зору людини:"
34. "Вкажіть бактерії, що входять до мікробіоценозу шкіри зовнішнього вуха і слухового проходу людини:"
35. "Чи містять мікроорганізми порожнина матки та додатки матки в нормі?"
36. "Чи містить в нормі мікроорганізми сеча людини?"
37. "Чи містить в нормі мікроорганізми середнє і внутрішнє вухо?"
38. "Вкажіть кількість лактобактерій, що характеризує нормальний мікробіоценоз піхви (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
39. "Вкажіть кількість гарднерел, що характеризує нормальний мікробіоценоз піхви (в мікробних клітинах в 1 см^3):"
40. "Який термін видачі заключної негативної відповіді при дослідженні крові на стерильність?"
41. "Які з перерахованих мікроорганізмів входять до складу облігатної мікрофлори слизової оболонки носа?"
42. "Вкажіть співвідношення аеробної і анаеробної мікрофлори, характерне для нормального мікробіоценозу кишечника людини:"
43. "Які з наведених анаеробних мікроорганізмів переважають в нормомікробіоценозі кишечника людини?"
44. "Які з наведених факультативно-анаеробних мікроорганізмів переважають в нормомікробіоценозі кишечника людини?"

45. "Яка з наведених концентрацій біфідобактерій (кількість мікробних клітин в 1 см³) розцінюється як нижня межа норми їх вмісту у фекаліях?"
46. "Який рівень антитіл проти H - антигену є діагностичним при підозрі на інфікування нирок бактеріями роду *Proteus*?"
47. "Який з наведених клінічних матеріалів підлягає бактеріологічному дослідженню на мікоплазми?"
48. "З яким видом протеїв найчастіше пов'язані урологічні інфекції?"
49. "Яке середовище використовують для виділення протеїв з клінічного матеріалу?"
50. "Вкажіть, яка мінімальна кількість мікробних клітин *Str.pneumoniae* та *H.influenzae* в 1 см³ слизу з верхніх дихальних шляхів має діагностичне значення при бактеріологічному дослідженні:"
51. "Вкажіть поживні середовища, на які роблять засів донорської крові при контролі на стерильність:"
52. "Чи можливий коректний висновок стосовно значення грибів *Candida albicans*, що базується виключно на факті виділення культури з клінічного матеріалу?"
53. "Чи можливий коректний висновок стосовно значення грибів *Candida albicans*, що базується виключно на факті виявлення відповідних мікроорганізмів в препараті з нативного матеріалу шляхом світової мікроскопії?"
54. "Вкажіть збудник правцю:"
55. "Вкажіть збудник некротизуючого (псевдомембранозного) ентероколіту:"

56. "На яку добу від моменту засіву видають заключну відповіді при дослідженні крові на стерильність в разі відсутності бактеріологічних знахідок?"
57. "Які з наведених факультативно-анаеробних мікроорганізмів переважають в нормомікробіоценозі кишечника людини?"
58. "Яка з наведених концентрацій лактобактерій (кількість мікробних клітин в 1 см^3) розцінюється, як нижня межа норми їх вмісту у фекаліях?"
59. "Яка з наведених концентрацій E.coli (кількість мікробних клітин в 1 см^3) розцінюється, як нижня межа норми їх вмісту у фекаліях?"
60. "Який з наведених клінічних матеріалів підлягає бактеріологічному дослідженню на уреоплазми?"
61. "Чи відрізняються між собою мікоплазми та уреоплазми за морфотінкторіальними характеристиками?"
62. "Який шлях виникнення патології, пов'язаної з *Gardnerella vaginalis*?"
63. "До якої групи за типом дихання відносять мікроорганізми роду *Gardnerella*?"
64. "Назвіть критерій встановлення етіологічно значимої присутності гарднерел за умови застосування бактеріоскопічного методу:"
65. "Які морфотінкторіальні властивості притаманні бактеріям роду *Gardnerella*?"