

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

3 Методи дослідження функцій органів травлення"

Категорія: **Гастроентерологія**

Кількість запитань: **20**

1. "Який з перерахованих методів визначення кислотності шлункового вмісту дозволяє судити не тільки про концентрацію іонів водню, а й про дебіт продукції хлористоводневої кислоти"
2. "Визначення рН шлунка при проведенні традиційної внутрішньошлункової рН-метрії проводять:"
3. "До стимуляторів шлункової секреції відноситься:"
4. "Основним ферментом шлункового соку є:"
5. "Виявлення в шлунковому соці молочної кислоти має значення для діагностики:"
6. "Для виявлення *H.pylori* проводять:"
7. "До абсолютних протипоказів для проведення ФЕГДС відносяться:"
8. "Наявність жовчі в шлунку найбільш характерна для:"
9. "Ексфоліативна цитологія застосовується при наступних станах:"
10. "Ексфоліативна цитологія застосовується для виявлення:"
11. "Для дослідження моторно-евакуаторної функції шлунка застосовують:"
12. "Рентгенологічний метод дослідження не дозволяє визначити:"
13. "При гастроскопії нормальної слизової оболонки шлунка:"
14. "Морфологічні дослідження слизової оболонки тіла шлунка застосовують для діагностики"
15. "Біоптат слизової оболонки шлунка може бути застосований для:"

16. "Діагностичний тест, що не відображує мезенхімально-запальний синдром:"

17. "До індикаторів порто-кавальної енцефалопатії не відноситься:"

18. "Індикатор регенерації та пухлинного росту печінки - це:"

19. "Після провокаційного тесту з навантаженням гліадіном при глютенівій ентеропатії:"

20. "Хвора Л. страждає на безпліддя. При більш детальному опитуванні вона поскаржилась на наявність діареї, поліфекалії, слабкості. Лікар запідозрив целиацію. Цей діагноз можуть підтвердити наступні обстеження:"