

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

4 Хвороби стравоходу"

Категорія: **Гастроентерологія**

Кількість запитань: **71**

1. "Верхню дисфагію викликають захворювання:"
2. "Найбільш поширені симптоми при захворюваннях стравоходу:"
3. "Парадоксальна дисфагія частіше буває при:"
4. "При захворюваннях стравоходу болі можуть:"
5. "Болі після прийому їжі є характерними для:"
6. "Характерним для стравохідного блювання є:"
7. "Какосмія (поганий запах з рота) буває при:"
8. "Ікавка частіше спостерігається при:"
9. "Функціональні гастродуоденальні розлади включають:"
10. "Що з нижчепереліченого рекомендується для лікування диспепсії:"
11. "Інформативними методами діагностики диспепсії є:"
12. "Резервна терапія при функціональній диспепсії містить:"
13. "Диспепсія є:"
14. "Функціональна диспепсія є:"
15. "Класифікація гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) містить"
16. "Методами діагностики гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) є:"
17. "До етіологічних факторів грижі стравохідного отвору діафрагми відносять:"
18. "Серед гриж стравохідного отвору діафрагми частіше зустрічаються:"

19. "Найбільш характерними скаргами при аксіальній грижі стравохідного отвору діафрагми є:"
20. "Найбільш поширеною клінічною формою гриж стравохідного отвору діафрагми є:"
21. "При грижі стравохідного отвору діафрагми зустрічаються наступні синдроми:"
22. "Кровотечі при грижі стравохідного отвору діафрагми мають місце:"
23. "До основних симптомів бронхостравохідного синдрому відносять:"
24. "До ускладнень грижі стравохідного отвору діафрагми відносять:"
25. "До основних методів діагностики грижі стравохідного отвору діафрагми відносять:"
26. "До рентгенологічних ознак грижі стравохідного отвору діафрагми відносять:"
27. "Основною ендоскопічною ознакою грижі стравохідного отвору діафрагми є:"
28. "Консервативне лікування грижі стравохідного отвору діафрагми включає:"
29. "Функціональні езофагеальні розлади включають:"
30. "Діагностичні критерії функціональної печії включають:"
31. "Справжні дивертикули стравоходу:"
32. "Ценкерівські дивертикули стравоходу виявляються:"

33. "Для ценкеровських (глоточно-стравохідних) дивертикулів 1-стадії характерним являється:"
34. "Для ценкеровських (глоточно-стравохідних) дивертикулів 2 та 3-стадії характерним являється:"
35. "Для біфуркаційних дивертикулів вірно:"
36. "Для епіфренальних (наддіафрагмальних) дивертикулів вірно:"
37. "Рентгенологічні признаки дивертикулів стравоходу:"
38. "Лікування дивертикулів стравоходу включає:"
39. "Можливі ускладнення дивертикулів стравоходу:"
40. "До важливих етіологічних факторів ахалазії кардії відносяться:"
41. "До позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби відносять:"
42. "До інгібіторів протонної помпи відносять:"
43. "Підтримуючим лікуванням гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) є:"
44. "Термін лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) становить:"
45. "Найбільш характерні клінічні симптоми ахалазії кардії:"
46. "Рентгенологічні ознаки ахалазії кардії:"
47. "Діагностичні критерії функціональної дисфагії включають:"

48. "Консервативне лікування хворих ахалазією кардії включає:"
49. "До основних факторів патогенезу гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби відносять:"
50. "До етіологічних факторів гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби відносять:"
51. "Для гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби характерно:"
52. "Консервативне лікування гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби включає:"
53. "До групи прокінетиків відносять:"
54. "Хірургічне лікування при гастроєзофагеальній рефлюксній хворобі показано при:"
55. "В більшості випадків езофагіти:"
56. "Найбільш надійні методи діагностики рефлюкс-езофагіту:"
57. "Ерозивний езофагіт частіше зустрічається при:"
58. "При езофагіті використовуються групи препаратів:"
59. "Для лікування кислого рефлюкс-езофагіту не рекомендується мінеральна вода:"
60. "Анемії частіше зустрічаються при:"
61. "Що з нижчепереліченого рекомендується для лікування рефлюкс-езофагіту:"
62. "Факторами, що сприяють розвитку езофагіту є:"

63. "До передракових захворювань стравоходу можна віднести:"
64. "Частіше рак стравоходу локалізується в:"
65. "Рак стравоходу дає метастази:"
66. "Найчастіше рак стравоходу проявляється:"
67. "До ранніх ознак раку стравоходу відносять:"
68. "До пізніх ознак раку стравоходу відносяться:"
69. "До функціональних захворювань стравоходу відносять:"
70. "До симптомів тривоги при функціональній диспепсії відносять:"
71. "До функціональних захворювань стравоходу не відносять:"