

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

7 Хвороби жовчного міхура та жовчовивідних шляхів"

Категорія: **Гастроентерологія**

Кількість запитань: **166**

1. "Для профілактики холелітіазу в раціоні має значення:"
2. "Хологенну діарею викликає:"
3. "Постхолецистектомічні розлади це:"
4. "Розвиток дисфункції жовчного міхура у хворих з атрофічними формами гастродуоденіту пов'язаний з:"
5. "Гіпертонічний жовчний міхур на рентгенівських знімках має форму:"
6. "Жовчний міхур знаходиться:"
7. "Жовчний міхур в нормі:"
8. "Міхуровий проток з'єднує:"
9. "Епітелій серединнопечінкових протоків:"
10. "Заповнення жовчного міхура жовчю відбувається під впливом:"
11. "Жовчний міхур приймає участь:"
12. "Основним гормоном, що викликає скорочення жовчного міхура, є:"
13. "В жовчному міхурі з жовчю відбуваються наступні зміни:"
14. "Утворення жовчі - це функція:"
15. "В міжтравний період сфінктер Одді:"
16. "Сфінктер Одді розкривається під впливом:"
17. "Жовчні кислоти в печінці синтезуються із:"

18. "Кон'югація жовчних кислот відбувається:"
19. "Декон'югація жовчних кислот в основному відбувається:"
20. "Кон'югація жовчних кислот відбувається:"
21. "Жовчні кислоти в кишечнику:"
22. "Для enteroгепатичної циркуляції жовчних кислот важливе значення має функціональний стан:"
23. "Жовчні кислоти приймають участь в травленні:"
24. "Основна роль жовчних кислот в травленні - це:"
25. "За допомогою жовчних кислот всмоктуються:"
26. "Жовчні кислоти приймають участь у всмоктуванні:"
27. "Жовчні кислоти мають вплив на кишківник:"
28. "Загальний вплив жовчних кислот полягає у їх здатності викликати"
29. "Первинні дисфункції жовчного міхура найчастіше виникають:"
30. "Нючий постійний біль у правому підребер'ї найбільш характерний для:"
31. "При пальпації органів черевної порожнини для захворювань жовчного міхура найбільш характерне відчуття болючості"
32. "Гіркий присмак у роті - це найбільш типова ознака:"
33. "Хологенна діарея - це типова ознака:"
34. "Після холецистектомії синтез жовчних кислот в печінці:"

35. "Диспептичний синдром при захворюваннях жовчного міхура пов'язаний з порушенням травлення:"
36. "Основна причина дисфункції жовчного міхура:"
37. "Дисфункція жовчного міхура - це:"
38. "Найбільш характерна ознака дисфункції жовчного міхура по гіпертонічному типу:"
39. "У міжприступний період хворі з дисфункцією жовчного міхура по гіпертонічному типу частіше скаржаться на:"
40. "Розвиток дисфункції жовчного міхура по гіпотонічному типу часто пов'язаний з:"
41. "Гіпотонія жовчного міхура найбільш часто спостерігається при:"
42. "При дисфункції жовчного міхура по гіперкінетичному типу, на відміну від жовчнокам'яної хвороби не буває:"
43. "Часте сечовипускання при захворюваннях жовчного міхура та жовчовивідних шляхів найбільш характерне для:"
44. "Гіпотонічний жовчний міхур на рентгенівських знімках має форму:"
45. "Брадикардія при захворюваннях жовчовивідних шляхів пов'язана з:"
46. "Тахікардія при хронічних холециститах найчастіше пов'язана:"
47. "Для розвитку гострого холециститу необов'язково:"
48. "Гострий холецистит найбільш часто розвивається:"
49. "Яким шляхом інфекція не розповсюджується на жовчовивідні шляхи?"

50. "Бактеріостатичні та бактерицидні властивості мають наступні компоненти жовчі:"
51. "Напруження м'язів у ділянці правого підребер'я характерне для:"
52. "Гострий катаральний холецистит по клініці нагадує:"
53. "Розлитий біль по всьому животу з напруженням м'язів та позитивними симптомами подразнення очеревини при захворюваннях жовчного міхура характерний для:"
54. "Тяжкість гострого холециститу визначається:"
55. "До ускладнень гострого холециститу не відносять:"
56. "Типова форма хронічного холециститу:"
57. "У розвитку диспептичного синдрому при холециститах найбільш важливе значення має:"
58. "Фактор, що не сприяє холелітіазу:"
59. "Фактор, що не приймає участь у розвитку холестеринового холелітіазу:"
60. "Тяжкість хронічного холециститу визначається:"
61. "Симптом Ортнера-Рашбе характерний для:"
62. "Приступ печінкової коліки не ускладнюється:"
63. "Для диспептичного синдрому при захворюваннях жовчовивідних шляхів не характерно:"
64. "Частота холелітіазу залежить від:"

65. "Виникнення болю при жовчнокам'яній хворобі зумовлене:"
66. "Причина жовтяниці при жовчнокам'яній хворобі:"
67. "Причина підвищення ШОЕ при хронічному холециститі:"
68. "Фактор нуклеації в жовчі - це:"
69. "Фактор нуклеації має значення для розвитку:"
70. "Холелітіаз рідко зустрічається:"
71. "Механізм збільшення активності лужної фосфатази при нападі печінкової коліки пов'язаний з:"
72. "Висхідний шлях інфікування жовчовивідних шляхів частіше всього можливий при:"
73. "Холестериновий холелітіаз - це захворювання:"
74. "Пігментні камені у жовчному міхурі найчастіше утворюються внаслідок:"
75. "Ознака відмінності гострого холециститу від хронічного:"
76. "Гіркий смак у роті у хворих хронічними захворюваннями жовчного міхура та жовчовивідних шляхів - це наслідок:"
77. "Найбільш типовий симптом здавлювання загального жовчного протоку:"
78. "З біохімічних показників для механічної жовтяниці найбільш характерно:"
79. "В розвитку холелітіазу найбільш суттєву роль має:"
80. "Збільшення вмісту жовчних кислот в жовчі може викликати:"

81. "Істинний холеретик:"
82. "Протипоказом для призначення холеретиків є:"
83. "Холекінетики протипоказані при:"
84. "Концентраційна функція жовчного міхура при проведенні холеграфії оцінюється по:"
85. "Для проведення холеграфії найбільш ефективними вважаються наступні контрастні речовини:"
86. "Фактор, що не сприяє холелітіазу:"
87. "Пероральна холеграфія не показана хворим:"
88. "Для успішної пероральної холеграфії важливе значення має:"
89. "Для внутрішньовенної холеграфії важливим є:"
90. "Моторно-евакуаторну функцію жовчного міхура при проведенні холецистографії оцінюють:"
91. "До основних рентгенологічних ознак гіпотонії жовчного міхура не відносять:"
92. "Не дає тіні на холецистограмі:"
93. "Для оцінки функціонального стану жовчного міхура при дуоденальному зондуванні не має значення:"
94. "Для гіперкінетичної дисфункції жовчного міхура при дуоденальному зондуванні не характерно:"
95. "До опадкових елементів при мікроскопії жовчі відносять:"

96. "В жовчі здорової людини не знаходять:"
97. "Мікроліти це:"
98. "Наявність мікролітів свідчить про:"
99. "Тюбажі найбільше ефективні у хворих:"
100. "При чому протипоказано проведення дуоденального зондування:"
101. "Дуоденальне зондування протипоказано хворим з:"
102. "Гіпохолія це:"
103. "Основні компоненти жовчі це:"
104. "Жовчні кислоти синтезуються із:"
105. "Основним ферментом перетворення холестерину в жовчні кислоти є:"
106. "Первинні жовчі кислоти - це жовчні кислоти, що утворюються:"
107. "На синтез жовчних кислот має вплив:"
108. "Коньюгація жовчних кислот - це їх поєднання з:"
109. "Коньюгація жовчних кислот проходить в:"
110. "Деконьюгація жовчних кислот проходить в:"
111. "У здорової людини компоненти жовчі знаходяться:"
112. "Найбільший вплив на синтез жовчних кислот має:"
113. "Високий рівень жовчних кислот в крові портальної вени:"

114. "Дисбактеріоз кишечника:"
115. "При дисбактеріозі в жовчі збільшується вміст:"
116. "В крові жовчні кислоти викликають:"
117. "В гепатоцитах жовчні кислоти покращують виділення:"
118. "В серединнопечінкових протоках жовчні кислоти:"
119. "Дезоксихолева кислота має здатність:"
120. "Холестерин жовчі має властивості:"
121. "В харчуванні хворих з дисфункцією жовчного міхура по гіпотонічному типу показано збільшити кількість:"
122. "В харчуванні хворих жовчнокам'яною хворобою слід обмежити вживання:"
123. "Жовчні кислоти в просвіті кишечника не:"
124. "Надлишок жовчних кислот в шлунково-кишковому каналі може викликати:"
125. "Зменшувати вміст жовчних кислот в просвіті кишечника мають здатність:"
126. "При призначенні антибіотиків в лікуванні хворих з хронічними холецистами враховуємо:"
127. "Антибактеріальна терапія показана при холециститах, що перебігають з:"
128. "Після закінчення курсу антибіотикотерапії хворим слід призначити:"
129. "Найбільш ефективним при лікуванні хронічного холециститу з підвищеними літогенними властивостями жовчі є призначення:"

130. "Урсофальк найбільш раціонально призначати хворим з початковими стадіями:"
131. "Для успішного розчинення холестеринових каменів найбільше значення має:"
132. "Після закінчення основного курсу терапії препаратами жовчних кислот і позитивного результату /конкременти не реєструються при ультразвуковому дослідженні/ лікування слід:"
133. "Найнебезпечнішим ускладненням медикаментозної літотрипсії є:"
134. "Одним із ускладнень медикаментозного розчинення холестеринових каменів є розвиток:"
135. "Медикаментозна літотрипсія показана хворим:"
136. "При дисфункції жовчного міхура по гіпотонічному типу найкраще призначати мінеральні води, багаті:"
137. "Електрофорез із спазмолітиками найбільш показаний хворим:"
138. "Наявність тупого болю в правому підребер'ї, лихоманки у хворих з видаленим жовчним міхуром може вказувати на:"
139. "Болі в верхній половині живота з ірадіацією в поперек, нудота у хворих з видаленим жовчним міхуром вказує на:"
140. "Найбільш багаті пектином"
141. "Для формування постхолецистектомічних розладів суттєве значення має:"
142. "При дисфункції великого дуоденального сосочку постхолецистектомічні розлади зумовлені:"

143. "Дисфункція сфінктера Одді обумовлена:"
144. "При стенозуючому папіліті спостерігається розвиток:"
145. "Найбільш інформативним для діагностики стенозуючого папіліту є:"
146. "Найефективніший метод лікування стенозуючого папіліту є:"
147. "В позапечінкових жовчних протоках у хворих з постхолецистектомічними розладами можуть утворюватись наступні жовчні камені:"
148. "Після холецистектомії частота жовчнокам'яної хвороби:"
149. "Фебіхол призначають при:"
150. "Для хворих жовчнокам'яною хворобою найбільш характерно:"
151. "Для механічної жовтяниці у хворих жовчнокам'яною хворобою похилого віку характерно:"
152. "Урсофальк відносять до:"
153. "При появі у хворого жовчнокам'яною хворобою частого блювання, оперезуючих болей в верхній половині живота можна запідозрити:"
154. "Втрата апетиту і маси тіла у хворого жовчнокам'яною хворобою дозволяє запідозрити:"
155. "Холестероз жовчного міхура це:"
156. "Кількість жиру в харчуванні хворих через тиждень після холецистектомії складає:"
157. "Невідкладна хірургічна допомога показана при:"

158. "Випорожнення жовчного міхура найбільш інтенсивне при вживанні:"
159. "Літогенні властивості жовчі зростають:"
160. "В утворенні жовчі приймають участь:"
161. "Скринінговим методом для діагностики захворювань жовчного міхура є:"
162. "За розмірами жовчні камені бувають:"
163. "Кількість легкозасвоюваних вуглеводів в харчуванні залежить від:"
164. "Есенціальних фосфоліпідів багато в:"
165. "У хворої 46 р. після вживання смаженої їжі з"явився сильний біль в правому підребер"ї з ірадіацією в праве плече, нудота, метеоризм, блювання. Що є причиною болю?"
166. "У хворої 68 р.через 2 роки після холецистектомії з"явилась жовтяниця, підвищення температури. Що є найвірогіднішою причиною жовтяниці?"