

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

9 Хвороби кишечника"

Категорія: **Гастроентерологія**

Кількість запитань: **101**

1. "Тиха та найтихіша перкусія НЕ застосовуються для визначення:"
2. "Збільшення розмірів живота при огляді може бути пов'язане із наступними станами:"
3. "При огляді живота не виявляється:"
4. "Поверхнева орієнтовна пальпація не дає можливості визначити:"
5. "Відсутність кишечних шумів при аускультації кишечника вказує на:"
6. "При застосуванні методичної, глибокої, ковзної пальпації живота за Образцовим-Стражеско дотримуються наступних правил (вказіть неправильну відповідь):"
7. "Причинами розвитку хронічного коліту можуть бути:"
8. "Стілець при кровотечі з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту:"
9. "Стілець при припиненні виділення жовчі до кишки:"
10. "Діагностика глютенкової ентеропатії базується на:"
11. "При глютенковій ентеропатії не слід виключати із раціону продукти з:"
12. "Основні клінічні симптоми глютенкової ентеропатії (вказіть неправильну відповідь):"
13. "Основна причина глютенкової хвороби полягає у :"
14. "Для глютенкової ентеропатії не характерні наступні гістоморфологічні зміни біоптату слизової оболонки:"
15. "В діагностиці глютенкової ентеропатії найбільш суттєве значення має :"

16. "До методів розпізнавання дисахаридазної недостатності не відносяться:"
17. "Лімфоаденопатія, поліартрит, шкірна пігментація, виражена гіпотонія, пронос з виділенням пінистого, водянистого або мазеподібного, своєрідного хільозного стільця, дані ентеробіопсії - полігональні макрофаги з пінистою цитоплазмою характерні для:"
18. "Глютенову хворобу необхідно диференціювати із наступними захворюваннями:"
19. "Вкажіть механізм діареї при лактазній недостатності"
20. "При недостатності лактази пронос з'являється після вживання:"
21. "До проявів лактазної недостатності не відносять:"
22. "Для синдрому мальабсорбції не характерно:"
23. "Порушення білкового обміну при синдромі мальабсорбції не проявляються:"
24. "Порушення обміну жиру при мальабсорбції не супроводжується:"
25. "До причин доліхоколону не відносять:"
26. "Лікування доліхоколону не передбачає:"
27. "Для прокталгії не характерно:"
28. "Для тріщин заднього проходу не характерно:"
29. "Причиною болі при синдромі подразненої кишки є:"
30. "Синдром подразненої кишки слід диференціювати з:"
31. "Обов'язковим методом діагностики синдрому подразненої товстої кишки є:"

32. "Вторинна прокталгія не спостерігається при:"
33. "Для кокцигодинії характерно:"
34. "Розвитку запорів сприяє:"
35. "Гетерогенний кал (перші порції - тверді, наступні- рідкої консистенції) буває при:"
36. "Синдром подразненого кишечника класифікується:"
37. "Для лікування діареї при синдромі подразненого кишечника застосовують:"
38. "Для лікування закрепу при синдромі подразненого кишечника застосовують:"
39. "Морфологічне дослідження біоптату слизової оболонки товстої кишки при синдромі подразненого кишечника виявляє:"
40. "До причин метеоризму не відносять:"
41. "Для соматичних захворювань характерні наступні стани і синдроми, крім:"
42. "В товстій кишці проходять:"
43. "Причинами хронічного коліту буває:"
44. "Для важкого перебігу хронічного коліту характерно все, крім:"
45. "Для синдрому кишкової диспепсії у хворих на хронічний коліт не характерно:"
46. "Для синдрому подразненого кишечника характерно:"
47. "Для хворих на хронічний ентероколіт характерно:"

48. "Для копрограми здорової людини не характерно:"
49. "Для копрограми хворих хронічним колітом характерно:"
50. "Найбільш інформативним методом дослідження хворих на хронічний коліт є:"
51. "В лікуванні хворих на хронічний коліт застосовують:"
52. "Хворим на хронічний коліт рекомендують:"
53. "Хворим на хронічний коліт не доцільно застосовувати:"
54. "На початкових стадіях неспецифічний виразковий коліт уражає:"
55. "Слизова оболонка у вигляді "булижної мостової" характерна для:"
56. "Діагноз неспецифічного виразкового коліту не підтверджується, якщо:"
57. "Основний симптом при неспецифічному виразковому коліті:"
58. "До ускладнення неспецифічного виразкового коліту не відносять:"
59. "В лікуванні анемії у хворих на неспецифічний виразковий коліт не використовують:"
60. "Для неспецифічного виразкового коліту характерно все, крім:"
61. "Препаратом вибору при неспецифічному виразковому коліті є:"
62. "Для легкого ступеня тяжкості неспецифічного виразкового коліту не характерно:"
63. "Для неспецифічного виразкового коліту середньої тяжкості не характерно:"

64. "Для важкої форми неспецифічного виразкового коліту не характерно:"
65. "Щілиновидні виразки слизової оболонки зустрічаються при:"
66. "При підозрі на перфорацію кишки у хворих на неспецифічний виразковий коліт слід провести:"
67. "До ускладнень глюкокортикостероїдної терапії не відносять:"
68. "При ректороманоскопії хворих на неспецифічний виразковий коліт середнього ступеня тяжкості має місце наступна картина:"
69. "При колоноскопії у хворих на неспецифічний виразковий коліт в стадії клінічної ремісії відсутні:"
70. "Зміни, що лежать в основі хвороби Крона:"
71. "Патоморфологія хвороби Крона характеризується розвитком:"
72. "Клінічні ознаки при гострій формі хвороби Крона:"
73. "Ускладнення при хворобі Крона:"
74. "Термінальний ілеїт найчастіше слід диференціювати з :"
75. "Препаратом вибору при лікуванні хворих з хворобою Крона є:"
76. "Дисбактеріоз кишечника викликають:"
77. "В діагностиці дисбактеріозу кишечника не використовують:"
78. "Для лабораторної діагностики кандидомікозу не має значення:"
79. "При кишковому дисбактеріозі мають місце наступні синдроми:"

80. "Лікування хворих на кишковий дисбактеріоз передбачає:"
81. "Кандидоз травного каналу, як правило, починається з ураження:"
82. "Для кишкового дисбактеріозу характерно:"
83. "Для профілактики та лікування кишкового дисбактеріозу використовують:"
84. "Для корекції кишкового дисбактеріозу використовують:"
85. "При кандидозному ураженні ротової порожнини найбільш ефективним шляхом введенням протигрибкових препаратів є:"
86. "До основної групи мікробів, що заселяють товсту кишку здорової людини, відносять:"
87. "До супутньої групи мікробів, що заселяють товсту кишку, відносять:"
88. "До групи пробіотиків відносять:"
89. "Основні функції нормальної кишкової мікрофлори включають:"
90. "До причин розвитку дисбактеріозу кишечника відносять:"
91. "При кишковому дисбактеріозі в харчовий раціон включають:"
92. "Якщо кишковий дисбактеріоз протікає з запорами, то в дієту не включають:"
93. "Якщо гнилісна диспепсія протікає з тенезмами, то не призначають:"
94. "Хлорофіліпт використовують в лікуванні:"
95. "До симптомів дисбактеріозу кишечника не відносять:"

96. "Для дисбактеріозу не характерно:"
97. "Антибіотики найчастіше викликають кандидоз при введенні:"
98. "При кандидозному глоситі язик має вигляд:"
99. "Кандидозне ураження кишок слід диференціювати з:"
100. "Найбільш вірогідними доказами кандидозного ураження кишок є:"
101. "При кандидозі кишечника рекомендують:"