

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Кардіологія

Категорія: **Геріатрія**

Кількість запитань: **444**

1. "Стан чутливості барорецепторів аорти у літніх людей:"
2. "Вікові зміни капілярного русла:"
3. "У віці 50-80 років діастолічний артеріальний тиск в середньому вищий:"
4. "Систолічний артеріальний тиск з віком має тенденцію:"
5. "Систолічний артеріальний тиск з віком швидше зростає:"
6. "Основна задача геріатричного кабінету:"
7. "У жінок систолічний артеріальний тиск в середньому досягає таких же значень, як і у чоловіків у віці:"
8. "Ізольована систолічна гіпертензія у віці старше 80 років зустрічається у:"
9. "Клінічний успіх щодо зменшення серцево-судинних ускладнень за допомогою антигіпертензивного лікування у осіб похилого віку був продемонстрований у таких дослідженнях, окрім:"
10. "Більшість досліджень показують, що тіазидові діуретики при лікуванні артеріальної гіпертензії у осіб похилого віку:"
11. "При лікуванні артеріальної гіпертензії, ускладненої розвитком серцевої недостатності, у осіб похилого віку слід уникати призначення:"
12. "Більшість гіпертоніків похилого віку для нормалізації артеріального тиску потребують:"
13. "Врахування супутніх станів, що наявні у гіпертоніка похилого віку може:"

14. "Ризик розвитку ниркової недостатності та гіперкаліємії при застосування нестероїдних протизапальних препаратів зростає при супутньому використанні з:"
15. "Нестероїдні протизапальні препарати у пацієнта похилого віку з гіпертензією:"
16. "Нестероїдні протизапальні препарати у пацієнта похилого віку з гіпертензією:"
17. "Тіазидові діуретики у гіпертоніків похилого віку сприяють:"
18. "Селективні інгібітори ЦОГ-2 у пацієнта похилого віку з гіпертензією:"
19. "Селективні інгібітори ЦОГ-2 у пацієнта похилого віку з гіпертензією:"
20. "Призначення якого антигіпертензивного препарату в епідеміологічних дослідженнях асоціюється зі зменшенням частоти перелому стегна у осіб похилого віку:"
21. "Призначення якого антигіпертензивного препарату в епідеміологічних дослідженнях асоціюється зі збільшенням щільності кітскової тканини у осіб похилого віку:"
22. "Тіазидові діуретики не слід призначати при таких супутніх станах, які часто зустрічаються у похилому віці, окрім:"
23. "При лікуванні артеріальної гіпертензії у похилих осіб використовуються:"
24. "При лікуванні артеріальної гіпертензії у похилих осіб використовуються:"
25. "При лікуванні артеріальної гіпертензії у похилих осіб особлива увага надається можливості розвитку:"

26. "У якого відсотка осіб з систолічною гіпертензією спостерігається падіння систолічного артеріального тиску в положенні стоячи:"
27. "До розвитку постуральної гіпотензії може призводити застосування:"
28. "До розвитку постуральної гіпотензії може призводити застосування:"
29. "До розвитку постуральної гіпотензії може призводити застосування:"
30. "До розвитку постуральної гіпотензії може призводити застосування:"
31. "До розвитку постуральної гіпотензії може призводити застосування всіх препаратів, окрім:"
32. "Постпрандіальне падіння артеріального тиску найчастіше виникає через:"
33. "Для уникнення постпрандіальної гіпотензії потрібно:"
34. "Лікування артеріальної гіпертензії у осіб старше 80 років:"
35. "Цільовим діастолічним артеріальним тиском при лікуванні гіпертоніків похилого віку є:"
36. "Цільовим систолічним артеріальним тиском при лікуванні гіпертоніків похилого віку є:"
37. "У віці до 70 років гострий інфаркт міокарда частіше виникає:"
38. "У віці до 70-80 років гострий інфаркт міокарда частіше виникає:"
39. "У віці понад 80 років гострий інфаркт міокарда частіше виникає:"
40. "У пацієнтів з інфарктом міокарда віком старше 65 років частіше зустрічається:"

41. "Смертність при інфаркті міокарда у пацієнтів понад 85 років, як порівняти до пацієнтів молодших за 65 років:"
42. "Найчастішою скаргою у осіб похилого віку з гострим інфарктом міокарда є:"
43. "Частими супутніми станами при розвитку інфаркта міокарда у похилому віці є:"
44. "Частими супутніми станами при розвитку інфаркта міокарда у похилому віці є:"
45. "Частими супутніми станами при розвитку інфаркта міокарда у похилому віці є:"
46. "Частими супутніми станами при розвитку інфаркта міокарда у похилому віці є:"
47. "Частими супутніми станами при розвитку інфаркта міокарда у похилому віці є все, окрім:"
48. "ЕКГ у пацієнтів похилого віку з інфарктом міокарду часто є недіагностичною в зв'язку з:"
49. "ЕКГ у пацієнтів похилого віку з інфарктом міокарду часто є недіагностичною в зв'язку з:"
50. "ЕКГ у пацієнтів похилого віку з інфарктом міокарду часто є недіагностичною в зв'язку з:"
51. "ЕКГ у пацієнтів похилого віку з інфарктом міокарду часто є недіагностичною в зв'язку з:"

52. "Така ж, як і у молодших осіб, або вища ефективність тромболітичної терапії при інфаркті міокарда спостерігається у пацієнтів похилого віку до:"

53. "При проведенні тромболітичної терапії у осіб старше 75 років ризик геморагічних інсультів:"

54. "Ризик геморагічного інсульту при проведенні тромболітичної терапії зростає:"

55. "Ризик геморагічного інсульту при проведенні тромболітичної терапії зростає:"

56. "Ризик геморагічного інсульту при проведенні тромболітичної терапії зростає:"

57. "Ризик геморагічного інсульту при проведенні тромболітичної терапії зростає:"

58. "Ризик геморагічного інсульту при проведенні тромболітичної терапії зростає:"

59. "Ризик геморагічного інсульту при проведенні тромболітичної терапії зростає:"

60. "Ризик геморагічного інсульту при проведенні тромболітичної терапії зростає:"

61. "Ризик геморагічного інсульту при проведенні тромболітичної терапії зростає:"

62. "Для антитромбоцитарної терапії при гострому інфаркті міокарда використовується:"

63. "Для антитромбоцитарної терапії при гострому інфаркті міокарда використовується:"
64. "Для антитромбоцитарної терапії при гострому інфаркті міокарда використовується:"
65. "Для антитромбоцитарної терапії при гострому інфаркті міокарда можуть використовуватися всі ці препарати, окрім:"
66. "Додавання клопідогрелу до аспірину при лікуванні гострого інфаркту міокарда зменшує рівень серйозних ускладнень у осіб старше 65 років:"
67. "Найбільша небезпека антитромбоцитарних препаратів при лікуванні гострого інфаркту міокарда у осіб старше 65 років пов'язана з:"
68. "Первинна ангіопластика, якщо проводиться у висококваліфікованому центрі, у порівнянні з тромболітичною терапією у більшості пацієнтів похилого віку:"
69. "Ускладненням первинної ангіопластики при гострому інфаркті міокарда у пацієнтів похилого віку є:"
70. "Ускладненням первинної ангіопластики при гострому інфаркті міокарда у пацієнтів похилого віку є:"
71. "Для профілактики розвитку контраст-індукованої нефропатії необхідно:"
72. "В перші 24 години від розвитку гострого інфаркту міокарда інгібітори АПФ призначаються:"
73. "В перші 24 години від розвитку гострого інфаркту міокарда інгібітори АПФ призначаються:"
74. "Вікові зміни структури серця:"

75. "Вікові зміни метаболізма міокарда"
76. "Вікові особливості регуляції функції серця:"
77. "Серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією у осіб похилого віку зустрічається:"
78. "При ішемічній хворобі серця у похилому віці переважає:"
79. "При старішанні людини спостерігається:"
80. "Зі збільшенням віку:"
81. "З віком:"
82. "Які з лікарських засобів можуть подовжити QT і стати можливою причиною розладів ритму:"
83. "Для синдрому уповільненої реполяризації шлуночків найбільш характерні наступні ознаки:"
84. "З віком рефлекторна здатність серця"
85. "Ендотелій-обумовлена вазодилатація з віком:"
86. "Найбільш характерна зміна фазової структури систоли серця в старості:"
87. "Найбільш характерна вікова зміна структури артеріальних судин:"
88. "З віком метаболізм NO:"
89. "У механізмах старіння організму людини головне значення мають:"
90. "Ризик розвитку ішемічної хвороби серця протягом життя у чоловіків становить:"

91. "Ризик розвитку ішемічної хвороби серця у жінок становить:"
92. "Симптоматика ІХС у чоловіків, як порівняти до жінок, виникає:"
93. "Прискорюють розвиток ішемічної хвороби серця такі фактори, як:"
94. "Симптокомплекс стенокардії, якій формується при грижі стравохідного отвору діафрагми, відрізняється такою ознакою:"
95. "Симптоматика ІХС у геріатричній популяції:"
96. "Що лежить в основі безбольових диспнотичних форм стенокардії у літніх і старих?"
97. "До атипових проявів стенокардії у похилому віці належать:"
98. "Розвиток толерантності до нітратів залежить:"
99. "Кальцифікація мітрального кільця частіше спостерігається:"
100. "Швидкий розвиток толерантності до нітратів у літньому і старечому віці частіше усього обумовлений:"
101. "Механізм дії бета-блокаторів при ІХС:"
102. "Можливі метаболічні зміни в літніх і старих людей при застосуванні бета-блокаторів:"
103. "Можливі впливи бета-блокаторів на судинне артеріальне русло:"
104. "Німа (асимптомна) ішемія у осіб віком старше 65 років, спостерігається:"
105. "Навантажувальні електрокардіографічні проби у осіб літнього віку, як порівняти до молодших пацієнтів"

106. "У осіб похилого віку, що не здатні виконувати тести з фізичним навантаженням, для діагностики ІХС застосовують проби з:"
107. "Аміодарон може викликати наступні побічні дії:"
108. "Метою лікування хронічної ІХС у похилому віці є:"
109. "В якому з досліджень по застосуванню статинів при хронічній ІХС була представлена найбільша частка пацієнтів похилого віку"
110. "Статини при хронічній ІХС у осіб похилого віку:"
111. "Факторами ризику рабдоміолізу при застосуванні статинів є:"
112. "У осіб зі схильністю до ортостатичних гіпотензій надається перевагам таким нітратам для підтримуючого лікування:"
113. "Меншу кількість побічних ефектів з боку центральної нервової системи можуть давати такі бета-блокатори"
114. "ЕКГознаки субендокардіального інфаркту:"
115. "Ознаки гострого періоду трансмурального інфаркту міокарда"
116. "Найбільш загрозливі розлади функцій організму при застосуванні наркотичних анальгетиків при інфаркті міокарда у літніх і старих хворих"
117. "Довготривала ефективність (рівень смерті + нефатального інфаркту міокарда) при хронічній ІХС перкутаних інтервенцій (ПКІ) у порівнянні з оптимальним медикаментозним лікуванням (ОМТ):"
118. "Абсолютні протипоказання до проведення тромболітичної терапії при інфаркті міокарда у літніх і старих:"

119. "Найбільш характерні ЕКГ ознаки інфаркту правого шлуночка:"
120. "Одна із характерних ознак інфаркту правого шлуночка:"
121. "При розвитку інфаркта правого шлуночка слід уникати:"
122. "При розвитку правошлуночкової недостатності на тлі інфаркту правого шлуночка віддаємо перевагу:"
123. "Характерними ознаками активації ревматизму в осіб старше 60 років і:"
124. "При призначенні літнім пацієнтам анаболічних гормонів в раціоні харчування необхідно:"
125. "При багатосудинному ураженні коронарних атерій у діабетика зі стенокардією ФК III-IV, перевага надається:"
126. "Які з перелічених субстанцій не використовуються у елютинг-стентах:"
127. "Найчастіші причини розвитку хронічного легеневого серця у літніх людей:"
128. "Класичні електрокардіографічні ознаки хронічного легеневого серця у літніх людей спостерігаються:"
129. "Зазначте частоту пульса, характерну для субмаксимального навантаження у віці 60-69 років:"
130. "Критерієм 2го функціонального класу стенокардії є поява болю в серці при:"
131. "Назвіть найважливіший чинник ризику розвитку ІХС:"
132. "Висока фізична активність викликає такі зміни в метаболізмі ліпідів:"

133. "Тривалий прийом яких із названих засобів може збільшити частоту приступів стенокардії у літніх людей:"
134. "Поверхнєве часте дихання при хронічному легеневому серці у літніх людей частіше зв'язане:"
135. "Синюшний відтінок кольору шкіри при хронічному легеневому серці переважно пов'язаний з:"
136. "Найбільш характерні ЕКГознаки хронічного легеневого серця:"
137. "Основна скарга хворих ревматичними хворобами літнього віку:"
138. "Які загальноклінічні лабораторні дослідження хворого ревматоїдним артритом найбільш інформативні:"
139. "Найчастіше застосовуваний неінвазивний метод у діагностиці ревматичних уражень серця:"
140. "Який з препаратів відноситься до антагоністів кальція:"
141. "Яке ускладнення зустрічається при лікуванні препаратами ацетілсаліцилової кислоти?"
142. "Зазначте, який з ендокардитів частіше усього призводить до розвитку набутих пороків серця:"
143. "Ускладнення мітрального стенозу:"
144. "Електрокардіографічні ознаки при мітральній недостатності:"
145. "Слерозування аортального клапану спостерігається у такого відсотка осіб літнього віку:"

146. "Вікові зміни структури клапанів включають все, окрім:"
147. "Факторами прогресування аортального стенозу є все, окрім:"
148. "Найчастіша етіологія клапанного стенозування у осіб похилого віку:"
149. "Найчастіші етіологічні фактори формування клапанної недостатності у похилому віці:"
150. "Основними факторами, що асоційовані з розвитком інфекційних ендокардитів у похилому віці є все, окрім:"
151. "Найчастішими етіологічними чинниками розвитку інфекційного ендокардиту у осіб похилого віку є такі, окрім:"
152. "Поширеність вираженого аортального стенозу у популяції осіб старше 65 років становить:"
153. "Патофізіологічні наслідки аортального стенозу у похилому віці включають:"
154. "Патофізіологічні наслідки аортального стенозу у похилому віці включають:"
155. "Патофізіологічні наслідки аортального стенозу у похилому віці включають:"
156. "Відсутність симптоматики у пацієнтів похилого віку при значному аортальному стенозі, може бути обумовлена:"
157. "Стандартом діагностики аортального стенозу пацієнтів похилого віку являється:"

158. "При низькому серцевому викиді покращити оцінку важкості стенозу можна за допомогою:"
159. "Доплерівська ехокардіографія при аортальному стенозуванні дає можливість визначити все наступне, окрім:"
160. "Фактори, що впливають на периоперативну смерність та рівень ускладнень при аортальному стенозі включають все, окрім:"
161. "Ризик ускладнень при хірургічному лікуванні аортального стенозу у пацієнтів похилого віку можна зменшити за допомогою:"
162. "Перевагою застосування біопротезів при протезуванні аортального клапану у пацієнтів похилого віку є"
163. "Ефективність прийому нітрогліцерину при стенокардії:"
164. "Протипоказання до призначення бетаблокаторів:"
165. "Чинник, що сприяє виникненню інфаркту міокарда:"
166. "Часте ускладнення в підгострому періоді інфаркту міокарда:"
167. "Частий чинник, що приводить до розвитку інфекційного ендокардита:"
168. "Найбільш часта причина аритмій у літніх і старих людей:"
169. "Найважливіший віковий чинник аритмогенеза в старості:"
170. "Каротидна проба при передсердній пароксизмальній тахікардії в літніх і старих хворих:"
171. "Миготлива аритмія в літніх і старих людей характеризується:"

172. "Рівень госпітальної смертності при виконанні ПКІ у осіб старше 75 років становить:"
173. "Рівень госпітальної смертності при виконанні АКШ у осіб старше 75 років становить:"
174. "Ризик серйозних нефатальних ускладнень (кома + інсульт) при АКШ у віці старше 75 років становить:"
175. "Ризик серйозних нефатальних ускладнень (кома + інсульт) при ПКІ у віці старше 75 років становить:"
176. "Ускладненням первинної ангіопластики при гострому інфаркті міокарда у пацієнтів похилого віку є:"
177. "Препаратом першого вибору для купірування пароксизмальної миготливої аритмії в літніх і старих хворих при серцевій недостатності є:"
178. "Для вторинної профілактики після інфаркту міокарду у осіб похилого віку слід призначати:"
179. "Для вторинної профілактики після інфаркту міокарду у осіб похилого віку слід призначати:"
180. "Для вторинної профілактики після інфаркту міокарду у осіб похилого віку слід все, окрім:"
181. "Поширеність великої депресії у пацієнтів похилого віку після інфаркту міокарда становить:"
182. "Застосування антидепресантів для лікування депресій після інфаркту міокарда супроводжується:"

183. "Призначення бета-блокаторів після перенесеного інфаркту міокарда у осіб похилого віку:"
184. "Гормонозамісна терапія у постменопаузальних жінок:"
185. "Гормонозамісна терапія у постменопаузальних жінок:"
186. "Гормонозамісна терапія у постменопаузальних жінок:"
187. "Гормонозамісна терапія у постменопаузальних жінок:"
188. "Стосовно гормонозамісної терапії у постменопаузальних жінок правильно все, окрім:"
189. "Після якої віку починає стрімко зростати ризик розвитку ускладнень при лікуванні ІХС як інтервенційним, так і медикаментозним шляхом:"
190. "Для купірування пароксизмальної шлуночкової тахікардії показаний:"
191. "З яким із перерахованих препаратів можна поєднати бетаадреноблокатори у літніх і старих людей для лікування ІХС:"
192. "Верапаміл протипоказаний при одному із названих порушень серцевого ритму:"
193. "Який різновид серцевої недостатності реєструється у пацієнтів похилого віку частіше, ніж у молодших:"
194. "Як часто у пацієнтів похилого віку з серцевою недостатністю спотерігається збережена систолічна функція:"
195. "У жінок похилого віку серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка спостерігається:"

196. "У чоловіків похилого віку серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка спостерігається:"
197. "Ризик смерті при серцевій недостатності зі збереженою систолічною функцією, як порівняти до здорових осіб:"
198. "Головним симптомом серцевої недостатності з систолічною дисфункцією лівого шлуночка, слід уважати:"
199. "Головним симптомом серцевої недостатності з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка, слід уважати:"
200. "Підвищена втомлюваність, слабкість характерні для таких станів, окрім:"
201. "Який відсоток пацієнтів з ехокардіографічними ознаками діастолічної або систолічної дисфункції лівого шлуночка, має серцеву недостатність:"
202. "Можливою причиною невиявлення серцевої недостатності у пацієнта похилого віку є:"
203. "Можливою причиною невиявлення серцевої недостатності у пацієнта похилого віку є:"
204. "Можливою причиною невиявлення серцевої недостатності у пацієнта похилого віку є:"
205. "Можливою причиною невиявлення серцевої недостатності у пацієнта похилого віку є:"
206. "Периферичні набряки у осіб похилого віку можуть виникати внаслідок таких причин, окрім:"
207. "Периферичні набряки у осіб похилого віку можуть виникати внаслідок таких причин:"

208. "Периферичні набряки у осіб похилого віку можуть виникати внаслідок таких причин:"
209. "Периферичні набряки у осіб похилого віку можуть виникати внаслідок таких причин:"
210. "Периферичні набряки у осіб похилого віку можуть виникати внаслідок таких причин:"
211. "Дифдіагностика застійної серцевої недостатності і пневмонії у осіб похилого віку утруднена в зв'язку:"
212. "Кардіомегалія на оглядовій рентгенографії органів грудної клітини частіше спостерігається при серцевій недостатності внаслідок:"
213. "Враховуючи низьку діагностичну цінність фізикального обстеження та оглядової рентгенографії ОГК при діагностиці серцевої недостатності у осіб похилого віку важливе значення мають:"
214. "Лікування пацієнта похилого віку з серцевою недостатністю має враховуватися все, окрім наступного:"
215. "У пацієнтів похилого віку з серцевою недостатністю з систолічною дисфункцією і фібриляцією передсердь для контролю ЧСС використовуються:"
216. "Препаратом, що знижує рівень смертності у пацієнтів похилого віку з серцевою недостатністю і систолічною дисфункцією ЛШ є:"
217. "При призначенні бета-блокаторів для лікування серцевої недостатності з систолічною дисфункцією ЛШ у осіб похилого віку:"
218. "Кальцифікація мітрального кільця частіше спостерігається у віці після:"

219. "При призначенні інгібіторів АПФ для лікування серцевої недостатності з систолічною дисфункцією ЛШ у осіб похилого віку можна очікувати розвитку всіх таких побічних ефектів, окрім:"

220. "При призначенні неселективних інгібіторів альдостерону для лікування серцевої недостатності з систолічною дисфункцією ЛШ у осіб похилого віку можна очікувати розвитку всіх таких побічних ефектів, окрім:"

221. "Нефармакологічні заходи для лікування серцевої недостатності з систолічною дисфункцією ЛШ у осіб похилого віку включають все, окрім:"

222. "Механічна реваскуляризація для лікування серцевої недостатності з систолічною дисфункцією ЛШ у осіб похилого віку в першу чергу показана при:"

223. "Кардіальна ресинхронізаційна терапія для лікування серцевої недостатності з систолічною дисфункцією ЛШ у осіб похилого віку в першу чергу показана при:"

224. "При лікуванні серцевої недостатності з діастолічною дисфункцією ЛШ у осіб похилого віку показані:"

225. "Для уникнення загострень серцевої недостатності необхідно рекомендувати:"

226. "За даними патгістологічних досліджень до віку 75 років відзначається деструкція клітин синусового вузла до:"

227. "До найтипівіших вікових змін ЕКГ належать:"

228. "Передсердна екстрасистолія на ЕКГ у осіб похилого віку без серцево-судинних захворювань зустрічається у:"

229. "Передсердна екстрасистолія при холтерівському моніторингу ЕКГ у осіб похилого віку без серцево-судинних захворювань зустрічається у:"

230. "Короткі епізоди передсердних тахіаритмій при холтерівському моніторингу ЕКГ у осіб похилого віку без серцево-судинних захворювань зустрічаються у:"

231. "Шлуночкова екстрасистолія при холтерівському моніторингу ЕКГ у осіб похилого віку без серцево-судинних захворювань зустрічається у:"

232. "Найчастіше показання для імплантації штучного водія ритму при брадикардії у осіб похилого віку:"

233. "Блокада АВ вузла I ступеню у здорових осіб похилого віку зустрічається у:"

234. "Фібриляція передсердь при холтерівському моніторингу ЕКГ у осіб похилого віку зустрічається у:"

235. "Який вік є додатковим фактором ризику щодо розвитку інсульту при фібриляції передсердь:"

236. "У пацієнта віком 75 років та старше з фібриляцією передсердь на фоні артеріальної гіпертензії для профілактики інсульту необхідно призначити:"

237. "У пацієнта віком 75 років та старше додатковими факторами ризику розвитку інсульту при фібриляції передсердь є всі, окрім:"

238. "У пацієнта віком 75 років та старше з фібриляцією передсердь на фоні застійної серцевої недостатності для профілактики інсульту необхідно призначити:"

239. "У пацієнта віком 75 років та старше з фібриляцією передсердь на фоні цукрового діабету для профілактики інсульту необхідно призначити:"

240. "Терапевтичною метою призначення варфарину для профілактики ішемічного інсульту при неклапанній фібриляції передсердь у осіб похилого віку є досягнення міжнародного нормалізованого співвідношення (МНС):"
241. "Довготривале лікування пероральними антагоністами вітаміну К збільшує ризик:"
242. "Помірна або значна аортальна недостатність при проведенні ехокардіографії у осіб 80 років і старше виявляється у приблизно:"
243. "Основними причинами розвитку аортальної недостатності у осіб похилого віку є:"
244. "У осіб похилого віку після розвитку серцевої недостатності на фоні хронічної аортальної недостатності тривалість життя, якщо не провести протезування, становить:"
245. "При фізикальному обстеженні важливою діагностичною ознакою аортальної недостатності у осіб похилого віку є:"
246. "Стандартом діагностики аортальної недостатності у осіб похилого віку є:"
247. "Недооцінки вираженості аортального стенозу у пацієнта похилого віку можна уникнути за допомогою:"
248. "Недооцінки вираженості аортального стенозу у пацієнта похилого віку можна уникнути за допомогою:"
249. "Кальцифікація мітрального кільця є фактором ризику розвитку:"
250. "Кальцифікація мітрального кільця є фактором ризику розвитку:"
251. "Відносним протипоказанням до електроімпульсного лікування порушень ритму серця і попередній прийом:"

252. "При купіруванні суправентрикулярних пароксизмальних порушень серцевого ритму серцеві глікозиди протипоказані при:"
253. "Препарат вибору при шлуночковій тахікардії:"
254. "Який із препаратів збільшує концентрацію дигоксіна в крові при одночасному застосуванні:"
255. "Критерії насичення аміодароном:"
256. "Сінокаротидна проба при миготливій аритмії:"
257. "Синдром пролабування мітрального клапана в літніх і старих людей виявляється:"
258. "Антиаритмічний препарат, протипоказаний при аденомі передстатевої залози з дизуричними явищами:"
259. "Який з антиаритмічних препаратів не знижує скорочувальну функцію міокарда:"
260. "Зазначте препарат, внутрішньовенне введення якого для купірування тахіаритмій у старих небажано:"
261. "Антиаритмічний препарат, що не має проаритмогенного ефекту:"
262. "Який із симптомів при передсердній пароксизмальній тахікардії рідко зустрічається в літніх і старих людей:"
263. "Частота серцевих скорочень при передсердній пароксизмальній тахікардії змінюється:"
264. "Передсердна пароксизмальна тахікардія може в літніх і старих людей супроводжуватися:"

265. "Симптом позасерцевої локалізації атеросклерозу:"
266. "Ослаблення I тону спостерігається при:"
267. "Верхня межа норми артеріального тиску для літніх і старих людей:"
268. "Центральний венозний тиск у нормі дорівнює:"
269. "При вимірі артеріального тиску на нижніх кінцівках аускультативним методом Короткова манжетку тонометра накладають:"
270. "Посилення II тону над аортою частіше спостерігається при:"
271. "Для якого захворювання найбільше характерна гіпертрофія лівого шлуночка:"
272. "Яка гіпертензія частіше зустрічається в літніх і старих людей:"
273. "До якої групи симптоматичних гіпертензій відноситься ізольована систолічна гіпертензія:"
274. "Ознакою систолічної гіпертензії є:"
275. "Який гемодинамічний варіант характерний для систолічної гіпертензії у літніх і старих людей?"
276. "Найбільш поширений варіант вазоренальної гіпертензії:"
277. "Найбільш ефективний метод лікування вазоренальної гіпертензії:"
278. "АТ при класичному типі коарктації аорти підвищене:"
279. "Частіше зустрічаються в літніх і старих людей:"
280. "Наявність гіпертонічної хвороби виключають наступні дані ангиографії:"

281. ""У розгорнутий клінічний діагноз гіпертонічної хвороби не включається вказівка на:"
282. "При поєднанні гіпертонічної хвороби з ожирінням, яке захворювання необхідно виключати:"
283. "Доказом генетично обумовленої етіології гіпертонічної хвороби може бути:"
284. "Основний пресорний гуморальний агент патогенезу ранніх стадій гіпертонічної хвороби:"
285. "Діагностичний критерій межової гіпертонії:"
286. "З якою метою проводять пробу Ослера:"
287. "Помилкова гіпертензія частіше зустрічається при:"
288. "Основний механізм підвищення переважно систолічного артеріального тиску у літніх і старих людей:"
289. "Назвіть головний клінічний синдром у хворих гіпертонічною хворобою літнього і старечого віку:"
290. "Суб'єктивні скарги, найбільш характерні для хворих гіпертонічною хворобою літнього і старечого віку:"
291. "Найбільш небезпечне для життя ускладнення гіпертонічної хвороби:"
292. "Яка група гіпотензивних препаратів показана хворим гіпертонічною хворобою з гіперурікемією:"
293. "Назвіть основне правило призначення гіпотензивних препаратів хворим гіпертонічною хворобою літнього і старечого віку:"

294. "Яка тактика призначення гіпотензивних препаратів має перевагу у хворих гіпертонічною хворобою II стадії літнього і старечого віку:"
295. "Яка з перерахованих ознак свідчить про наявність лівошлуночкової серцевої недостатності:"
296. "При хронічній правошлуночкової недостатності можуть виявлятися всі перераховані ЕКГ-ознаки, крім:"
297. "При розвитку серцевої недостатності серцевий викид:"
298. "Який чинник може спровокувати розвиток гострої серцевої недостатності у хворих літнього і старечого віку:"
299. "Яка ЕКГознака може бути використана для діагностики ранніх форм серцевої недостатності:"
300. "Яка ознака є більш частою для недостатності кровообігу II А у хворих літнього і старечого віку:"
301. "Тривалий біль в області серця постійного характеру без раптового початку з ірадіацією в лівий плечовий суглоб і передпліччя з найбільшою імовірністю обумовлений:"
302. "Ознакою появи недостатності кровообігу I ступеня у хворих літнього і старечого віку може бути:"
303. "Підвищення венозного тиску при серцевій недостатності можна визначити:"
304. "Яким із серцевих глікозидів віддати перевагу у хворих з недостатністю кровообігу літнього і старечого віку:"

305. "Яким із серцевих глікозидів віддати перевагу при серцевій недостатності з брадикардією:"
306. "Назвіть основний принцип фармакотерапії хворих із недостатністю кровообігу літнього і старечого віку:"
307. "У хворих літнього і старечого віку з недостатністю кровообігу II А стадії печінка:"
308. "Порушення яких гуморальних систем грає велику роль у патогенезі недостатності кровообігу в літньому і старечому віці:"
309. "Яка ознака характерна для недостатності кровообігу П-А стадії:"
310. "Препаратам якої групи віддати перевагу у хворих з недостатністю кровообігу I стадії:"
311. "Найбільша частота і виразність ортопноє відзначається при:"
312. "Найбільш частою причиною розвитку лівошлуночкової недостатності в літніх і старих людей і:"
313. "Під терміном ортопноє розуміють:"
314. "Обов'язковою ознакою серцевої недостатності є:"
315. "Набряк легенів може бути обумовлений:"
316. "Серцева астма зустрічається в хворих із недостатністю кровообігу по класифікації Н.Д.Стражеска, В.Х.Василенко:"
317. "Для лівошлуночкової недостатності характерні всі симптоми за винятком:"
318. "До артеріальних вазодилататорів відносяться:"

319. "Зміна показників функції зовнішнього дихання в стані спокою відзначається у хворих з недостатністю кровообігу:"
320. "Особливості режиму для хворих із недостатністю кровообігу літнього і старечого віку:"
321. "Якому з вазодилататорів віддати перевагу у хворих із застоєм у малому колі:"
322. "Який симптом не є протипоказанням для призначення вазодилататорів хворим із недостатністю кровообігу літнього і старечого віку:"
323. "Лікувальна тактика при виявленні недостатності кровообігу I стадії в хворих літнього і старечого віку:"
324. "WPW синдром характеризується проведенням імпульсу від передсердь до шлуночків:"
325. "Найбільш часта форма порушення ритму в хворих із WPW синдромом:"
326. "Про перехід інтерстиціального набряку легень в альвеолярний свідчать:"
327. "Набряк легень розвивається, коли тиск у легневих капілярах починає перевищувати:"
328. Ортопноє:
329. "При активній диуретичній терапії в хворих із хронічною недостатністю кровообігу добовий діурез повинний складати:"
330. "Яке сечогінне є калійсберігаюче:"
331. "Клінічний симптом, не характерний для хворих гіпертонічною хворобою літнього і старечого віку:"

332. "Рівень систолічного артеріального тиску при ефективному зовнішньому масажі серця:"
333. "Ортостатичні коливання АТ характерні для хворих гіпертонічною хворобою літнього і старечого віку внаслідок:"
334. "Який препарат крім антиаритмічного ефекту має гіпотезивну і антиангінальну дію:"
335. "Який принцип повинний бути дотриманий при лікуванні хворих гіпертонічною хворобою II стадії літнього і старечого віку:"
336. "Який з гіпотензивних препаратів часто викликає ортостатичне коливання АТ у хворого гіпертонічною хворобою літнього і старечого віку:"
337. "Найбільш важливий чинник ризику при атеросклерозі:"
338. "Яке порушення кінетики судин не характерно для гіпертонічного кризу в літніх і старих людей:"
339. "Причиною гіпертонічного кризу в літніх і старих людей можуть бути наступні, за винятком:"
340. "Яке ускладнення зустрічається при лікуванні атеросклерозу фібратами:"
341. "Які антибактеріальні засоби застосовують при ревматизмі?"
342. "Яке ускладнення зустрічається при глюкокортикоїдній терапії?"
- 2831,0"посивіння волосся"
343. "Яке ускладнення зустрічається при лікуванні препаратами ацетілсаліцилової кислоти?"
344. "Які ЕКГ ознаки гіпертрофії лівого передсердя?"

345. "Які ФКГ ознаки мітрального стенозу?"
346. "Зазначте ЕКГ ознаки мітрального стенозу:"
347. "Ехокардіографічні ознаки мітральної недостатності:"
348. "ЕКГ ознаки стенозу устя аорти:"
349. "ЕКГ зміни при стенозі аорти:"
350. "Які ЕКГ ознаки стенозу устя аорти?"
351. "Рентгенологічна ознака стенозу устя аорти?"
352. "Назвіть показання до призначення ЛФК при гіпертонічній хворобі:"
353. "Форма гіпертонії, що часто супроводжується абдомінальним систолічним шумом:"
354. "При передозуванні серцевих глікозидів екстрасистоли частіше виходять із:"
355. "Клітини нирок, що секретують ренін:"
356. "Зміни ультраструктури міоцитів при міокардитах, ускладнених недостатністю серця наступні:"
357. "Основний патоморфологічний механізм серцевої недостатності при захворюваннях міокарда наступний:"
358. "Для серцевої недостатності характерно:"
359. "Для правошлуночкової декомпенсації внаслідок трикуспідальної недостатності характерні всі перераховані ознаки, за винятком:"

360. "При недостатності кровообігу в м'язовій тканині серця:"
361. "Інгібітором ферменту, що перетворює ангіотензин I в ангіотензин II, є:"
362. "Яка особливість обміну ліпідів характерна для літніх і старих людей?"
363. "Назвіть механізм компенсації при недостатності серця від перевантаження:"
364. "Ехокардіографічні дані стенозу устя аорти:"
365. "Основний патогенетичний механізм вазоконстрикції при хронічному легеневого серця:"
366. "З аускультативних даних для діагностики компенсованого легеневого серця надається велике значення:"
367. "Найбільш ранньою гемодинамічною ознакою декомпенсації хронічного легеневого серця є наступний показник:"
368. "Найбільш часта об'єктивна ознака початкової стадії декомпенсації хронічного легеневого серця:"
369. "У патогенезі гострого легеневого серця найбільш важливе значення має наступний механізм:"
370. "Хронічне легеневе серце відрізняється від обструктивного типу дихальної недостатності наступним симптомом:"
371. "Найбільш характерною скаргою хворого в початковій стадії декомпенсації легеневого серця є:"
372. "Які цифри відповідають нормальному систолічному тиску в легеневій артерії?"

373. "Можливі причини підвищення артеріального тиску в гострому періоді інфаркту міокарда:"
374. "При підвищенні артеріального тиску в гострому періоді інфаркту міокарда перевага віддається наступним лікарським засобам:"
375. "Оксид азоту, що забезпечує дилатацію вінцевих артерій, синтезується в:"
376. "Механізм вазодилатації, що викликається нітрогліцерином:"
377. "Який з антиаритмічних препаратів не протипоказаний при застійній недостатності кровообігу:"
378. "Який антиаритмічний препарат неефективний при шлуночкових порушеннях ритму:"
379. "Патологічно подовжений інтервал QT не і протипоказанням до призначення:"
380. "При синусовій тахікардії у літніх і старих хворих належить насамперед виключити:"
381. "Для попередження пароксизмів тахіаритмії при синдромі слабкості синусового вузла показаний:"
382. "Для ліквідації або зменшення толерантності до нітратів у літніх хворих віддасте перевагу наступній тактиці:"
383. "В яких випадках очікується посилення хронічної мозкової судинної недостатності при лікуванні В адреноблокаторами літніх і старих людей:"
384. "ЕКГ ознаки аневризми лівого шлуночка:"

385. "Про яку ваду серця можна думати при вислуховуванні посиленого 1, акценту II тону над легеневою артерією, щиглика відкриття митрального клапана, систолічного шуму в т.Боткіна:"
386. "У хворого 72 років відхилення електричної осі серця вправо, хвилі мерехтіння передсердь великі V1-V3, III, aVF. Це більш характерно для:"
387. "Які біохімічні дослідження не ' обов'язковими при гіпертонічній хворобі?"
388. "При диференціальній діагностиці феохромоцитом і гіпертонічної хвороби кризового плину необхідно враховувати симптом:"
389. "Зазначте рентгенологічну ознаку аортальної недостатності:"
390. "Наявність ромбовидного систолічного шуму, але меншої амплітуди в інших точках аускультатії при дуже низькій амплітуді II тона над аортою характерно для:"
391. "Наявність гучного пансистолічного шуму над аортою і в точці Боткіна при гучному з металевим відтінком II тона над аортою характерно для:"
392. "Наявність ромбовидного систолічного шуму над аортою, такого ж шуму, але меншої амплітуди в інших точках аускультатії при дуже низькій амплітуді II тону над аортою характерно для:"
393. "Поява діастолічного шуму над аортою при високоамплітудному тоні над цією судиною в літніх характерно для:"
394. "Верапаміл - похідне:"
395. "Блокатори кальцієвих каналів крім основної дії:"
396. "Прийом бетаадреноблокаторів при синдромі слабкості синусового вузла викликає:"

397. "При передозуванні серцевих глікозидів екстрасистоли частіше виходять із:"
398. "CLC синдром характеризується:"
399. "Ортостатичні коливання АТ характерні для хворих гіпертонічною хворобою літнього і старечого віку внаслідок:"
400. "Основний механізм дії місцевих анестетиків (лідокаїн і ін.):"
401. Хінідін:
402. "Назвіть умови виникнення болю, нехарактерні для стенокардії:"
403. "Поява пекучого болю за грудиною після прийому їжі з найбільшою імовірністю обумовлене:"
404. "Основний механізм антиатеросклеротичної дії аспірину:"
405. "Який із неврологічних симптомів не і ознакою дигіталісної інтоксикації у хворих серцевою недостатністю літнього і старечого віку:"
406. "Які ЕКГ-ознаки свідчать про глікозидну інтоксикацію у хворих із недостатністю кровообігу літнього і старечого віку при лікуванні серцевими глікозидами, за винятком:"
407. "Для ранньої діагностики гострого інфекційного ендокардита у літніх необхідно переважно орієнтуватися на:"
408. "При розгорнутій клінічній картині гострого інфекційного ендокардита у людей похилого віку переважним проявом є:"
409. "При підгострому інфекційному ендокардиті у людей похилого віку частіше усього ушкоджуються наступні структури серця:"

410. "Найчастіша причина розвитку бактеріємії і інфекційного ендокардита у людей похилого віку є наступні маніпуляції:"
411. "До одержання результатів бактеріологічного дослідження крові при підозрі на інфекційний ендокардит Ви віддасте перевагу наступній терапії:"
412. "Для проведення вторинної профілактики інфекційного ендокардита в геріатричній практиці особливо показані наступні ситуації:"
413. "IV тон серця виникає в результаті:"
414. "При вислуховуванні протодіастолічного ритму галопа на основі серця самим звучним буде:"
415. "Пансistolічний шум:"
416. "В якому відведенні визначають ознаки інфаркту на верхній частині лівого шлуночка?"
417. "Протодіастолічний шум визначається:"
418. "Основна морфологічна ознака гострого розширення серця при дифузному міокардиті така:"
419. "Чинник, що визначає клінічний прояв міокардита:"
420. "Електрична альтернація - це:"
421. "При миготливій аритмії передсердні хвилі особливо добре виражені у відведеннях:"
422. "Назвіть механізм адаптації в старості:"
423. "Артеріальний тиск на ногах у нормі:"

424. "Для ранніх стадій ГХ найбільш характерний тип гіпертензивного кризу:"
425. "У початкових стадіях ГХ зустрічаються наступні типи кризу:"
426. "Основою лікувального харчування хворого гіпертонічною хворобою і обмеження:"
427. "При венозному застої у великому колі кровообігу найкраще помітно набрякання:"
428. "Циркуючий об'єм крові при хронічній недостатності кровообігу:"
429. "Найбільш простим клінічним показником ефективності діуретичної терапії у хворих із хронічною недостатністю кровообігу і:"
430. "Протипоказання до проведення бальнеологічної терапії при гіпертонічній хворобі:"
431. "Яке ускладнення зустрічається при лікуванні препаратами ацетилсаліцилової кислоти?"
432. "При якій ваді серця вислуховується щиголь відкриття?"
433. "Зазначте основну рентгенологічну ознаку недостатності двостулкового клапана:"
434. "Основна рентгенологічна ознака мітрального стенозу:"
435. "Який із перерахованих симптомів зустрічається при стенозі устя аорти?"
436. "Який із перерахованих симптомів характерний для аортальної недостатності?"
437. "Ознака сполучення стенозу аорти й аортальної недостатності:"

438. "III тон серця виникає в результаті:"

439. "При рентгеноскопії в лівій бічній проекції задні-нижня частина серцевої тіні утворюється:"

440. "При нормальному розташуванні електричної осі серця співвідношення амплітуди зубців Р в стандартних відведеннях таке:"

441. "У нормі тривалість зубця Р на ЕКГ не перевищує:"

442. "Тривалість антибіотикотерапії при інфекційному ендокардиті:"

443. "Який метод дозволяє досліджувати електричну активність серця?"

444. "При якому захворюванні зменшений циркулюючий об'єм крові?"